




АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА 100-150 ЧЕЛОВЕК




АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА 100-150 ЧЕЛОВЕК

(ВНЕШНИЙ ВИД В РАСКРЫТОМ ВИДЕ)




АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА 400-600 ЧЕЛОВЕК



АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА 400-600 ЧЕЛОВЕК

(ВНЕШНИЙ ВИД В РАСКРЫТОМ ВИДЕ)



АММИАКА 10% РАСТВОР 40 мл.. ФЛАКОНЫ



ОАО "Татхимфармпрепараты"

420091, Россия, г. Казань,

ул. Беломорская, 260

(843) тел. 571-85-58; факс 571-85-38

БЕКАРБОН

ТАБЛЕТКИ

6 таблеток

СОСТАВ:

Красавки экстракта

густого 0,01 г

Натрия гидрокарбоната 0,30 г

Хранить в сухом,

защищенном от света месте,

при температуре не выше +25 °С

Хранить в недоступном для детей месте

Применять согласно инструкции

Отпускается без рецепта

Для приема внутрь

Р. № 001192/01



4604060091013



ОАО "Татхимфармпрепараты"

420091, Россия, г. Казань


БЕКАРБОН ТАБЛЕТКИ №6

Отпускается без рецепта. Применять
по назначению врача. Содержит сахарозу.

№ ЛС-002585

 **марбиофарм**

ОАО "Марбиофарм" 424006, Россия, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. К.Маркса, 121.
тел.: (8362) 42-03-12, факс: (8362) 45-00-00



Анальгин

метамизол натрия

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь. Хранить в сухом, защищенном
от света месте при температуре не выше 25°C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Отпускается без рецепта. Применять
по назначению врача. Содержит сахарозу.



4 602876 000380



Анальгин

метамизол натрия


10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь. Хранить в сухом, защищенном
от света месте при температуре не выше 25°C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Отпускается без рецепта. Применять
по назначению врача. Содержит сахарозу.

№ ЛС-002585

 **марбиофарм**

ОАО "Марбиофарм" 424006, Россия, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. К.Маркса, 121.
тел.: (8362) 42-03-12, факс: (8362) 45-00-00




Анальгин

метамизол натрия



10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь. Хранить в сухом, защищенном


АНАЛЬГИН 500 МГ ТАБЛЕТКИ №10




БРИЛЛИАНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО 1% СПИРТОВОЙ РАСТВОР ПО 10мл ВО ФЛАКОНЕ



БРОМКАМФОРА 250 мг ТАБЛЕТКИ №30




ВАЛИДОЛ 60 мг ТАБЛЕТКИ НЕ МЕНЕЕ №6



ЙОДА 5% СПИРТОВОЙ РАСТВОР ПО 10 мл ВО ФЛАКОНЕ



КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ 3г.



ЗАО "МЕДИСОРБ", Россия, 614113, г. Пермь,
ул. Гальперина, 6, тел./факс (342) 259-41-41

УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ МС

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ


10 таблеток по 250 мг

ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ
ОТПУСК БЕЗ РЕЦЕПТА
ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ ВЫШЕ 25°C
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

P N001289/01



4 603182 000019



ЗАО "МЕДИСОРБ", Россия, 614113, г. Пермь,
ул. Гальперина, 6, тел./факс (342) 259-41-41

УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ МС

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ


10 таблеток по 250 мг

ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ
ОТПУСК БЕЗ РЕЦЕПТА
ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ ВЫШЕ 25°C
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

P N001289/01



4 603182 000019



ЗАО "МЕДИСОРБ", Россия, 614113, г. Пермь,
ул. Гальперина, 6, тел./факс (342) 259-41-41

УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ МС

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ

УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ 250 мг ТАБЛЕТКИ №10

ацетилсалициловая
кислота - 500 мг.

Применять по назначению
врача. Хранить в сухом месте,
при температуре не выше
30 °С. Хранить в недоступном
для детей месте.

Отпуск из аптек: без рецепта.
П N016154/01



4 810201 004044 >



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД
МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ"

Республика Беларусь, г. Борисов, ул. Чапаева, 64/27

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА

10 таблеток по 500 мг
Для приема внутрь

Состав на одну таблетку:

Активное вещество:

ацетилсалициловая
кислота - 500 мг.

Применять по назначению
врача. Хранить в сухом месте,
при температуре не выше
30 °С. Хранить в недоступном
для детей месте.

Отпуск из аптек: без рецепта.
П N016154/01



4 810201 004044 >



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД
МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ"

Республика Беларусь, г. Борисов, ул. Чапаева, 64/27

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА

10 таблеток по 500 мг
Для приема внутрь


Состав на одну таблетку:

Активное вещество:


ацетилсалициловая
кислота - 500 мг.

Применять по назначению
врача. Хранить в сухом месте,
при температуре не выше
30 °С. Хранить в недоступном
для детей месте.

Отпуск из аптек: без рецепта.
П N016154/01



КИСЛОТА АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ 500 мг ТАБЛЕТКИ №10



КИСЛОТА БОРНАЯ РАСТВОР СПИРТОВОЙ 3% 25 мл



ООО "Тульская
фармацевтическая
фабрика"

ВАЛЕРИАНЫ НАСТОЙКА

настойка

Валерианы лекарственной
корневища с корнями

25 мл

Хранить в защищенном от
света месте
при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для
детей месте.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь, до еды, раз-
водя в небольшом количестве
воды. Взрослым по 20-30 капель
на прием 3-4 раза в день, детям -
по 1 капле на каждый год жизни.
Курс лечения - до 4 недель.
Повторные курсы возможны
после согласования с врачом.

ЛСР-010400/09

Без рецепта

НАСТОЙКА ВАЛЕРИАНЫ 25 мл



phs Фармстандарт

Хранить при температуре
не выше 25 °С.

Отпускают без рецепта.

Хранить в недоступном
для детей месте.

Препарат хранить в
оригинальной упаковке.

Рег. номер: P N002312/01



4 601669 002051

КОРВАЛОЛ КАПЛИ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ 25 мл

Производитель
ООО "Роспланта",
Россия, Санкт-Петербург,
Новочеркасский пр. д.1, лит. "Н"
Тел.: 740-79-67

СОДА ПИЩЕВАЯ

Масса нетто - 40г

ГОСТ 2156-76

Дата изготовления 07.2014
Срок хранения 12 месяцев

Утилизировать как бытовые отходы

www.rosplanta.ru

НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ 40 г.

Капсулы подъязычные

НИТРОГЛИЦЕРИН

40 капсул по 0,5 мг



Нитроглицерин (раствор нитроглицерина 4% в подсолнечном масле в пересчете на 100% вещество) – 0,5 мг; бутилгидрокситолуол (ионол) – 0,0074 мг; масло подсолнечное – до 50 мг. Состав капсулы: желатин медицинский – 17,1 мг; глицерол (глицерин) – 5,62 мг; метилпарагидроксибензоат (нипагин) – 0,14 мг; азорубин (краситель кислотный красный 2С) – 0,14 мг.

НИТРОГЛИЦЕРИН

капсулы подъязычные по 0,5 мг. 20 штук по 0,5 мг.

Капсулу положить под язык.

ЛСР-000127/09 от 14.01.2009 г.

Список Б. Хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте, вдали от огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

Применять по назначению врача.


Срок годности 2 года. Не применять

по истечении срока годности.

Отпускается без рецепта.

Адрес производства:

РФ, 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 49. Тел./факс: (343) 261-10-38



ООО «ЛЮМИ»

РФ, 191023, г. Санкт-Петербург,
Апраксин двор тер., корпус 42.
Тел./факс: (812) 327-78-76

НИТРОГЛИЦЕРИН КАПСУЛЫ 0,5 мг. №20 (2) или ТАБЛЕТКИ 0,5 мг №40



5 мл

СУЛЬФАЦИЛ
НАТРИЯ -ДИА
(сульфацетамид)



КАПЛИ
ГЛАЗНЫЕ

20%



ЗАО «ДИАФАРМ»

140009, г. Люберцы,
ул. Митрофанова,
д. 20 А,
тел.: (495) 500-18-38

серия 05102014

годен до 11 2016

P N 001943/01-2002

Хранить при
температуре не
выше 25°C,
в защищенном
от света,
недоступном для
детей месте.
Не допускать
замораживания.

СУЛЬФАЦИЛ НАТРИЯ 20% РАСТВОР 5 мл ВО ФЛАКОНЕ или 1,5 мл (2)



СУЛЬФАДИМЕТОКСИН 500 МГ ТАБЛЕТКИ №10

ПРЕПАРАТ СОДЕРЖИТ САХАРОЗУ (САХАР)
P N003262/01



МЕДИСОРБ

ЗАО "МЕДИСОРБ", Россия, 614113, г. Пермь,
ул. Гальперина, 6, тел./факс (342) 283-65-31

"ЦИТРАМОН П"

Ацетилсалициловая кислота + Кофеин + Парацетамол
6 таблеток

Ацетилсалициловой кислоты	- 0,24 г
Парацетамола	- 0,18 г
Кофеина моногидрата	- 0,03 г

ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ
ОТПУСК БЕЗ РЕЦЕПТА
ПРИМЕНЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА
ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ ВЫШЕ 25°C
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ
ПРЕПАРАТ СОДЕРЖИТ САХАРОЗУ (САХАР)
P N003262/01



МЕДИСОРБ

ЗАО "МЕДИСОРБ", Россия, 614113, г. Пермь,

ЦИТРАМОН П ТАБЛЕТКИ НЕ МЕНЕЕ №6

4604060071039



ОАО "Татхинфармпрепараты"
420091, Россия, г. Казань,
ул. Беломорская, 260
(843) тел. 571-85-58; факс 571-85-38

Таблетки от кашля

10 таблеток

СОСТАВ:

Термопсиса ланцетного травы...0,0067 г
Натрия гидрокарбоната.....0,2500 г


Хранить в сухом, защищенном от света
месте, при температуре не выше 25 °С
Хранить в недоступном для детей месте

Применять согласно инструкции

Отпускается без рецепта

Для приема внутрь

Р. № ЛС-002080



4604060071039



ОАО "Татхинфармпрепараты"
420091, Россия, г. Казань,
ул. Беломорская, 260
(843) тел. 571-85-58; факс 571-85-38

Таблетки от кашля

10 таблеток

СОСТАВ:

Термопсиса ланцетного травы...0,0067 г
Натрия гидрокарбоната.....0,2500 г

Хранить в сухом, защищенном от света
месте, при температуре не выше 25 °С
Хранить в недоступном для детей месте

Применять согласно инструкции

Отпускается без рецепта

Для приема внутрь

ТАБЛЕТКИ ОТ КАШЛЯ, ТАБЛЕТКИ №10

10 ТАБЛЕТОК ПО 0,5 Г

10 таблеток сульфазола
фталазол 0,5 г

Хранить в сухом,
защищенном от света месте.
Хранить в недоступном для детей месте.
Применять по назначению врача
для приема внутрь

P N00366901



4 6 0 2 8 2 4 0 0 0 7 2 1



ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»
680001, Российская Федерация,
Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Ташкентская, 22,
т/ф (4212) 53-91-86

ФТАЛАЗОЛ

фталол/сульфазол

10 ТАБЛЕТОК ПО 0,5 Г

В одной таблетке содержится:
фталазол - 0,5 г

Хранить в сухом,
защищенном от света месте.
Хранить в недоступном для детей месте.
Использовать по назначению врача
для приема внутрь

P N00366901



4 6 0 2 8 2 4 0 0 0 7 2 1



ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»
680001, Российская Федерация,
Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Ташкентская, 22,
т/ф (4212) 53-91-86

ФТАЛАЗОЛ


фталол/сульфазол

10 ТАБЛЕТОК ПО 0,5 Г

В одной таблетке содержится:
фталазол - 0,5 г

Хранить в сухом,
защищенном от света месте.
Хранить в недоступном для детей месте.
Применять по назначению врача
для приема внутрь

P N00366901



4 6 0 2 8 2 4 0 0 0 7 2 1



ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»
680001, Российская Федерация,
Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Ташкентская, 22,
т/ф (4212) 53-91-86

ФТАЛАЗОЛ

фталол/сульфазол

10 ТАБЛЕТОК ПО 0,5 Г

ФТАЛАЗОЛ 500 мг ТАБЛЕТКИ №10



КЛЕЙ БФ-6, РАСТВОР ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СПИРТОВОЙ, НЕ МЕНЕЕ 10г.

Лоперамид

2 мг | 20 таблеток

Лоперамид



Противодиарейное средство
Таблетки

Для приёма внутрь.

1 таблетка содержит лоперамида гидрохлорида 2,0 мг.

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат (сахар молочный), крахмал кукурузный, магния стеарат, повидон (поливинилпирролидон).

Смотри инструкцию по применению.

Хранить в сухом, защищённом от света месте при температуре не выше 25 °С.

По истечении срока годности не должно применяться.

Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.


Отпускается без рецепта.

P N002105/01




4 607027 760052

ЛОПЕРАМИД 2 мг. ТАБЛЕТКИ №20 ИЛИ 2 мг. КАПСУЛЫ №20



ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА


БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ 5м x 10 см



БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ 7м x 14 см




БАТА МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ СТЕРИЛЬНАЯ ПО 50 г




ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ РУЛОННЫЙ 5 см x 500 см

Дата выпуска:	09.2012
Годен до:	09.2017
LOT(партия):	20120910





САЛФЕТКА МАРЛЕВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СТЕРИЛЬНАЯ НЕ МЕНЕЕ 14 см x 16 см №10





МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕДМЕТЫ

ЖГУТ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ



ГРЕЛКА РЕЗИНОВАЯ







СТАКАНЧИК ДЛЯ ПРИЕМА ЛЕКАРСТВ, 30 мл

ПОВЕРочная ЛАБОРАТОРИЯ

«Jiangsu Yuyue Medical Instruments Co., Ltd.», Jiangsu, KНР

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОВЕРКЕ

№ 042013

в испытательные термометры медицинские максимальные стеклянные «ИМПЭКС-МЕД» не поверяются

Средство измерений, тип: Термометр медицинский
Максимальный стеклянный «ИМПЭКС-МЕД»
 Исп. ТМР: № Госреестра 52345-12

модель: № Lot No. 13028
 производитель: «Jiangsu Yuyue Medical Instruments Co., Ltd.»
максимальное рабочее давление 0,05 МПа

поверен в на основании результатов первичной поверки признаком годным и
 пригодным:

Отказ поверяемого изделия

General Director: GUANGMING WU
 должность руководителя подразделения

Поверитель: WANGJULING

«2» августа 2013 г.

13
КУ
11



№ 7

ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ «ИМПЭКС-МЕД» (РТУТНЫЙ)

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/11279 от
 27.12.2011 года. Срок действия не ограничен.

Внесён в Гос. реестр средств измерений под № 52345-12.
 Свидетельство об утверждении типа средств измерений
 СИ.С.39.004.А № 49429 от 21.01.2013 года. Срок действия
 29.12.2017 года.

Декларация о соответствии № РОСС СИ.ИМ32.000096 от
 19.06.2012 года. Срок действия 18.06.2015 года.

Сертификат соответствия № РОСС СИ.ИМ32.Н00199 от
 19.06.2012 года. Срок действия 18.06.2015 года.

Качество 93.42/ЕЕС
 Предел допустимой погрешности $\pm 0,1$ °C
 Цена деления шкалы 0,1 °C
 Диапазон измерения от 35 до 42 °C
 Начальное значение шкалы от 32 до 35 °C
 Конечное значение шкалы 42 °C

Область применения - в лечебных учреждениях
 здравоохранения, на дому для личного пользования.
 Предназначен для измерения температуры тела человека.
 Комплектность: термометр, футляр, инструкция, свидетельство
 о поверке.

Термометры могут комплектоваться футлярами: «СБРОС» для
 лёгкого сбрасывания столбика ртути или «ЛУПА» для лёгкого
 считывания результатов измерений.

Способ применения

Перед измерением температуры термометром ртутным
 необходимо взять его за верхнюю часть и встряхнуть таким
 образом, чтобы менiskus столбика ртути опустился ниже
 цифровой отметки 35,5 °C. Термометр, готовый для измерения,
 необходимо разместить резервуаром в подмышечный впадину
 человека. Время измерения должно быть не менее 5 мин.

Меры безопасности

Тяжёлое вещество, применяемое в данных термометрах - ртуть,
 вещество I класса опасности по I ОСТ 12.1.005-88.
 В случае боя термометров, рассыпанную ртуть следует собрать
 ватой, смоченной раствором калия марганцовокислого
 (марганцовка). Открытая ртуть испаряется и загрязняет воздух,
 поэтому сильное испарение паров ртути происходит при
 температуре свыше +20 °C.

ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ

Шина транспортная
иммобилизационная
складная
ШТИВР-42-Мед

Взрослая
"НОГА"

МЕДПАНЕ
WWW.MEDPAN.RU

Шина транспортная
иммобилизационная
складная
ШТИВР-42-Мед

Взрослая
"НОГА"

Сшито 39 (вручен совет) листа(ов)

Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов В.В.

