



Гель-имплантат инъекционный "Overage"

вязкоупругий стерильный на основе гиалуроновой кислоты в шприцах с иглами, вариант исполнения Overage Derma



Гель-имплантат инъекционный "Overage"

вязкоупругий стерильный на основе гиалуроновой кислоты в шприцах с иглами, вариант исполнения Overage Deep



Гель-имплантат инъекционный "Overage"

вязкоупругий стерильный на основе гиалуроновой кислоты в шприцах с иглами, вариант исполнения Overage Deeper




Гель-имплантат инъекционный "Overage"

вязкоупругий стерильный на основе гиалуроновой кислоты в шприцах с иглами, вариант исполнения Overage Meso



Гель-имплантат инъекционный "Overage"

вязкоупругий стерильный на основе гиалуроновой кислоты в шприцах с иглами



Гель-имплантат инъекционный "Overage"
вязкоупругий стерильный на основе гиалуроновой кислоты в шприцах с иглами

OVERAGE
Medical Sodium Hyaluronate Gel

LOT

13053104

STERILE A



2015.04



CE 0476

Mesotech s.r.l

www.mesotech.de

OVERAGE
Medical Sodium Hyaluronate Gel

LOT

13053104

STERILE A



2015.04



CE 0476

Mesotech s.r.l

www.mesotech.de

OVERAGE
Medical Sodium Hyaluronate Gel

LOT

13053104

STERILE A



2015.04



CE 0476

Mesotech s.r.l

www.mesotech.de

наклейка информационная

Инструкция по применению препарата ОВЕРЭЖ®

Препарат ОВЕРЭЖ® предназначен для лечения заболеваний, связанных с нарушением функции надпочечников, а также для профилактики осложнений при длительном применении глюкокортикостероидов.

Показания к применению:

- Первичная надпочечниковая недостаточность.
- Вторичная надпочечниковая недостаточность.
- Профилактика осложнений при длительном применении глюкокортикостероидов.

Способ применения:

Препарат принимают внутрь, запивая водой. Дозировку и длительность лечения определяет врач.

Побочные эффекты:

Возможны головная боль, тошнота, рвота, диарея, запор, боли в животе, головокружение, слабость, сонливость, повышенная утомляемость.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Важные замечания:

Препарат ОВЕРЭЖ® не следует принимать одновременно с другими препаратами, содержащими глюкокортикостероиды.

Срок годности:

3 года.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °C.

Выпускная форма:

Таблетки.

Состав:


Активное вещество: гидрокортизон.

Дополнительные компоненты: лактоза, целлюлоза, крахмал, стеарат кальция.



OVERAGE®
Professional Medical Solutions

ИНСТРУКЦИЯ



Принадлежности: иглы гибкие Neeedflex

Всего прошнуровано и
пронумеровано 7/реверс/ листа.

