





Внешний вид ИМН питательные среды микробиологические сухие "ИПС-Биотехновация"




Приемочная комиссия в составе:
Председатель комиссии:  Доцент кафедры КЛД РМАПО, к.м.н.,
Ройтман А.П.,


Члены комиссии:  Доцент кафедры КЛД РМАПО, к.м.н.,
Ракова Н.Г.











БТН

ООО «Биотехновация»
111033, Москва, ул. Самокатная, 4 А
Тел/факс: (495) 362-15-77


**Среда Кода, для
выделения и
дифференциации
энтеробактерий
сухая**


Для учреждений здравоохранения
Для диагностики
Для выделения и дифференциации
энтеробактерий по признаку
ферментации лактозы.

Состав в г/л
Пептон ферментативный
Натрия хлорид
Лактоза
Сульфаниламид
Бромтимоловый синий
Натрий углекислый

рН от 7,8 до 8,0

Серия
Дата изготовления
Годен до
Масса нетто






BTN

ООО «Биотехновация»
 119133, Москва, ул. Самокатная, 4 А
 Тел-факс: (495) 362-15-77

BTN-Эндо-агар,
 выделения энтеробактерий
 и их дифференциации по
 признаку ферментации
 лактозы, сухая

Для учреждений здравоохранения
 Для диагностики in vitro.
 Для выделения и дифференциации энтеробактерий
 из исследуемого материала по признаку
 ферментации лактозы.

Состав в г/л:
 Пептон ферментативный сухой - 10.0
 Гидролизат соевой муки - 10.0
 Экстракт автолизированных дрожжей - 1.0
 - 1.0г - 1.0
 Д(+)-лактоза - 0.5
 Фуксин основной для МБЦ - 0.2
 Натрия сульфит безводный - 0.2
 Натрий фосфорнокислый - 0.7
 двучам. - 0.7
 Натрий углекислый - 0.1
 Натрия хлорид - 0.1
 Агар микробиологический - 10.0
 pH от 7.5 до 7.7 0.1
 Серия 19.02.2019
 Дата изготовления 19.02.2019
 Годен до 23.02.2020
 Масса нетто



БТН

ООО «Биотехнология»

Тел/факс (85) 362-15-77

**Среда с
малонатом**

для дифференциации

Для учреждений здравоохранения
Для диагностики *in vitro*
Для дифференциации энтеробактерий

Состав в г/л:
Аммоний ацетатный
Хлористый натрий
Калия фосфат -тенный
Натрий фосфориноксид -двуазотный
Экстракт автолизированных дрожжей
осветленный
Натрий малоновокис
Бромтимоловый -синий,

pH от 6,7 до 6,9


Серия


Дата изготовления


Годен до

Масса нетто

01
19.02.2010
19.02.2010
250 г







БТН

ООО «Биотехновация»

119033, Москва, ул. Самокатная, 4 А

Тел/факс: (495) 362-15-77

Фенилаланин-агар

для дифференциации
энтеробактерий по тесту
дезаминирования
фенилаланина, сухая

Для учреждений здравоохранения
Для диагностики *in vitro*
Для дифференциации энтеробактерий
дезаминирования фенилаланина

Состав в г/л:

Агар микробиологический
Натрий хлористый
Экстракт автолизированных дрожжей
осве гленный
L-Фенилаланин
Натрий фосфорнокислый дигидрат

pH от 7,1 до 7,5


Серия

Дата изготовления

Годен до

Масса нетто





БТН

ООО «Биотехновация»

111033, Москва, ул. Самокатная, 4 А
Тел/факс: (495) 362-15-77

Среда Ресселя,
для первичной
идентификации
энтеробактерий, сухая

Для учреждений здравоохранения
Для диагностики *in vitro*
Для первичной идентификации
по признаку ферментации лактозы

Состав в г/л:

Пептон ферментативный, сухой
Экстракт автолизированных дрожжей
осветленный
Глюкоза кристаллическая гидратная
Лактоза
Агар микробиологический
Натрий хлористый
Бромтимоловый синий водорастворимый
индикатор

pH от 7,0 до 7,4

Серия

Дата изготовления

Годен до


Масса нетто

03

12.11.2017

17.01.2018

100 г





БТН

«Биотехновация»

Москва, ул. Самокатная, 4 А
Тел/факс: (495) 362-15-77

**Контрольная
среда для
среды с
лизинном, сухая**

Для учреждений здравоохранения
Для диагностики in vitro
Контрольная среда для среды с лизинном
Состав в г/л:

Пептон ферментативный, сухой
Гидролизат соевой муки ферментативный
Глюкоза кристаллическая гидролизатная
Бромтимоловый синий водорастворимый индикатор

pH от 6,0 до 6,4

Серия

Дата изготовления

Годен до

Масса нетто

БТН

«Биотехновация»

Москва, ул. Самокатная, 4 А
Тел/факс: (495) 362-15-77

**Среда с
лизинном,
для
идентификации
анаэробактерий,
сухая**

Для учреждений здравоохранения
Для диагностики in vitro
Для идентификации анаэробактерий
у них фермента дексариоксидазы

Состав в г/л:

Пептон ферментативный, сухой
Гидролизат соевой муки ферментативный
Глюкоза кристаллическая гидролизатная
Кормовой концентрат L-лизина
Бромтимоловый синий водорастворимый индикатор


pH от 5,9 до 6,1

Серия

Дата изготовления

Годен до

Масса нетто



БТН

ООО «Биотехновация»
111023, Москва, ул. Савокушная, 4 А
Тел/факс: (495) 362-15-77


Среда глюкозо-
пептонная (типа
Эйкмана),
для накопления
энтеробактерий, сухая

Для учреждений здравоохранения.
Для диагностики in vitro.
Для накопления энтеробактерий, для
определения коли-титра и коли-индекса
обнаружения *Escherichia coli* в исследуемых
бактерий.

Состоит в г/г:
Пептон ферментативный, сухой
Глюкоза кристаллическая сухая
Натрий хлористый
Бромтимоловый синий ВР

pH от 7,0 до 7,4

Серия
Дата изготовления
Годен до
Масса нетто



БТН

ООО «Биотехновация»
111023, Москва, ул. Савокушная, 4 А
Тел/факс: (495) 362-15-77



Среда лактозо-
пептонная (типа
Эйкмана),
для накопления
энтеробактерий, сухая

Для учреждений здравоохранения.
Для диагностики in vitro.
Для накопления энтеробактерий, для
определения коли-титра и коли-индекса
обнаружения *Escherichia coli* в исследуемых
бактерий.

Состоит в г/г:
Пептон ферментативный, сухой
Лактоза
Натрий хлористый
Бромтимоловый синий ВР

pH от 7,0 до 7,4

Серия
Дата изготовления
Годен до
Масса нетто



БТН

ООО «Биотехновация»

119031 Москва, ул. Самогатная, 4 А
Тел/факс: (495) 362-15-77

Маннит-солевой
агар. Среда № 10, для
выделения и
идентификации
стафилококков, сухой

Для учреждений здравоохранения.
 Для диагностики *in vitro*.
 Для идентификации
 клинически значимых культур

стафилококков.

Состав в г/л:

Пептон ферментативный, сухой	- 9,7г
Д(-) маннит	- 9,7г
Натрий хлоридный	- 75,1г
Агар микробиологический	- 13,0г
Экстракт автолизированных дрожжей	- 1,1г
осветленный	- 0,4г
Натрий углекислый	- 0,02г
Феноловый красный В Р	

рН от 7,2 до 7,6

Серия

Дата изготовления

Годен до

Масса нетто

01

19.02.2012

19.02.2014

250 г/г



БТН

ООО «Биотехновация»
119032, Москва, ул. Самойловская, 4 А
Тел/факс: (495) 362-15-77

**Среда Сабуро,
(агар) для
культивирования
дрожжевых и плесневых
грибов, сухой**

Для учреждений здравоохранения
Для диагностики in vitro
Для культивирования дрожжевых и плесневых грибов, а также санитарном обследовании объектов
Среды
Состав в г/л:
Пептон ферментативный сухой
Гидролизат соевой чужды ферментации
Глюкоза кристаллическая перекристаллизованная осветленный
Экстракт автолизированных дрожжей осветленный
Агар микробиологический
pH от 5,5 до 5,7
Серия 01
Дата изготовления 19.12.2019
Годен до 19.12.2021
Масса нетто 200г

БТН

ООО «Биотехновация»
119032, Москва, ул. Самойловская, 4 А
Тел/факс: (495) 362-15-77

**Среда Сабуро,
(бульон)
для культивирования
дрожжевых и плесневых грибов,
сухой**

Для учреждений здравоохранения
Для диагностики in vitro
Для культивирования дрожжевых и плесневых грибов, а также санитарном обследовании объектов
Среды
Состав в г/л:
Пептон ферментативный сухой
Гидролизат соевой чужды ферментации
Глюкоза кристаллическая перекристаллизованная осветленный
Экстракт автолизированных дрожжей осветленный
pH от 5,5 до 5,7
Серия 01
Дата изготовления 19.12.2019
Годен до 19.12.2021
Масса нетто 200г

БТН

ООО «Биотехновация»

125010 Москва, ул. Самокатная, 4

Тел/факс (495) 362-15-77

АГВ с да,

определения

чувствительности

микроорганизмов к

антибиотикам.

Для учреждений здравоохранения
 Для диагностики *in vitro*
 Для определения чувствительности
 микроорганизмов к антибиотикам.

Состав в г/л:

Агар микробиологический

Пептон ферментативный сухой

Гидролизат соевой муки

Экстракт автолизированных дрожжей

осветленный

Натрий хлористый

Глюкоза кристаллическая

Натрий фосфорный двучисленный

Крахмал растворимый

pH от 7.2 до 7.6

Серия

Дата изготовления

Годен до


Масса нетто

01

19.02.2017

19.02.2014

50 гр.



БТН

Для учреждений здравоохранения
Для диагностики *in vitro*.
Для культивирования и подсчета хробы бактерий при контроле микробной загрязненности нестерильных лекарственных сред, полупродуктов и т.д.

«Биотехновация»
г. Самара, ул. Самарская, 4 А
Тел: (846) 362-15-77

Состав в г/л:
Пептон ферментативный, сухой - 20,0
Экстракт автолизированных дрожжей - 10,0
осветленный - 12,0
Агар микробиологический - 10,0
Натрия хлорид

Среды БТН-1, для
контроля микробной
загрязненности, сухая

pH от 7.1 до 7.5

Серия 01
Дата изготовления 19.02.2013
Годен до 19.02.2014
Масса нетто 250 гр.

БТН

Для учреждений здравоохранения.
Для диагностики *in vitro*.

Для накопления бактерий семейства
Enterobacteriaceae при контроле микробной
загрязненности нестерильных лекарственных
средств, воды, пищевых продуктов.


Состав в г/л:

Пептон ферментативный, сухой	- 20,0 г
Натрий фосфорнокислый двузамещенный	- 20,0 г
Калий фосфорнокислый однозамещенный	- 10,0 г
Глюкоза кристаллическая гидратная	- 10,0 г
Феноловый красный, индикатор	- 0,06 г
Малахитовый зеленый, индикатор	- 0,015 г
Экстракт автолизированных дрожжей осветленный	- 1,0 г

pH от 7,0 до 7,4

Серия
Дата изготовления
Гожен до
Масса нетто

01
19.02.2012
19.02.2014
250 гр.



БТН

ООО «Биотехновация»

111033, Москва, ул. Самокатная, 4 А

Тел/факс: (495) 362-15-77

Среда БТН-8,
для контроля микробной
загрязненности, сухая

Для учреждений здравоохранения.
Для диагностики *in vitro*.
Для получения накопительных культур
микроорганизмов различных типов
групп, в том числе синегнойной палочки,
стафилококков.


Состав в г/л:

Пептон ферментативный, сухой
Натрия хлорид
Натрий фосфорнокислый дигидрат
Д-глюкоза
Экстракт дрожжевой, осветленный

pH от 7.1 до 7.5

Серия
Дата изготовления
Годен до
Масса нетто

128



БТН

ООО «Биотехновация»
111033, Москва, ул. Самокатная, 4 А
Тел факс: (495) 362-15-77

Магниева среда.
Селективная питательная
среда обогащения для
бактерий рода *Salmonella*,
сухая

Для учреждений здравоохранения
Для диагностики in vitro
Для микробиологического контроля
объектов внешней среды, пищевых

Состав в г/л:
Пептон ферментативный, сухой
Магний хлористый
Экстракт автолизированных дрожжей
осветленный
Хлористый натрий
Калий фосфорнокислый одноосновный
Бриллиантовый зеленый

pH от 4,6 до 5,0

Серия
Дата изготовления
Годен до
Масса нетто

Среда Китта-Тароци
Компонент №1
Масса 30 г
Серия 44

Среда Китта-Тароци
Компонент №1
Масса 30 г
Серия 44

БТН

ООО «Биотехновация»
111031, Москва, ул. Савиновская, 4 А
Тел/факс: (495) 362-15-77

**Среда Китта-Тароци,
для культивирования
анаэробных
микроорганизмов, сухая**

Для учреждений здравоохранения
Для диагностики *in vitro*
Для культивирования анаэробных микроорганизмов.

Состав и г/г: Состоит из 2 компонентов.
Компонент №1 – пептон говяжий, каровая, измельченная и высушенная сублимационным методом, - 30,0 г.
Компонент №2 – модифицированный бульон в составе, г/д:
Пептон ферментативный, сухой - 10,0 г.
Гидролизат соевой муки фермент., сухой - 9,5 г.
Экстракт дрожжевых клеток осветленный - 1,5 г.
Натрия хлорид - 4,6 г.
Агар микробиологический - 1,0 г.
Глюкоза кристаллическая гидратная - 5,0 г.
Натрий углекислый - 0,4 г.

pH Компонента №2 от 7,0 до 7,2

Серия 44
Дата изготовления 19.02.2012
Годен до 19.02.2014
Масса нетто 500г

Способ при оттаивании:
32 г сухого компонента №2 развести в 1 л воды очищенной, довести до кипения, кипятить 2 мин, при необходимости профильтровать через бумажный фильтр. Приготовленный бульон (компонент №2) должен быть прозрачный светло-бежевого цвета. В пробирки с 250-300 мг компонента №1 (кусочки вареной печени высушенной сублимационным методом) добавить по 10 мл раствора компонента №2. Стерилизовать в течение 30 мин при температуре 110 °С.

Дополнительная информация в инструкции по применению.


Препарат не раскопелся, целостность не сл.

Хранить в герметически закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте, при температуре 2-25 °С.

ТУ 9385-001-16542938-2012
Р. № Ф. П. _____
от _____

Среда Китта-Тароци
Компонент №2
Масса 260 г
Серия 44

176



БТН

000

новация»

5-77

С

интероба

ментации

лактоз

сухая

Для учреждений здравоохранения
Для диагностики *in vitro*.
Для выделения энтеробактерий со
ферментации лактозы при санитарно-
бактериологическом исследовании
продуктов и объектов внешней среды
стоки и др.).

Состав в г/л:
Пептон ферментативный, сухой
Гидролизат соевой муки
Лактоза
Желчь, сухая
Генипан виолет
Натрий углекислый

pH от 7,6 до 7,8

Серия
Дата изготовления
Годен до
Масса нетто