

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Д-Медфарм»

Резник О. Д.



Фотографические изображения
медицинского изделия

***Укладки противозидемические медицинские УК-1
по ТУ 9398-005-45508262-2010***

Производства

Общество с ограниченной

ответственностью «Д-Медфарм»

Россия, 199106, Санкт-Петербург, ул.

Шевченко, д.3Б, лит. А, пом. 3Н

Укладка противозидемическая медицинская универсальная УК-1Б

ТУ 9398-005-45508262-2010

Регистрационное удостоверение: ФСР 2012/13488 от XX.XX.XXXXг.

СУМКА № _____

LOT

Партия _____



XXXXXXXXг.



XXXXXXXXг.

Гарантированный срок хранения: 3 года

Производитель: ООО «Д-Медфарм»
Россия, 199106, Санкт-Петербург, ул.
Шевченко, д.3Б, лит. А, пом. 3Н
Тел: 8 (812) 322-17-32
www.d-medfarm.com




От -50°C до +40°C


Пинцет анатомический не менее 250мм.



Пинцет анатомический не менее 250мм.



Пипетки Пастеровские с длинными концами (стерильные)



Скарификатор-копье для прокалывания кожи одноразовое, стерильное




Ножницы прямые с 2-мя острыми концами не менее 140 мм.




Шприц инъекционный однократного применения с иглой 5 мл.




Шприц инъекционный однократного применения с иглой, 10 мл



Иглы инъекционные




Пробирки бактериологические не менее 10 мл




Зонд-тампон для отбора, транспортировки и хранения биологических проб, в комплекте с пустой пробиркой (дерево/хлопок, стерильный)




Пробки резиновые N 12, 14 (под пробирки, флаконы)



Стекло предметное с шлифованными краями




Набор петель микробиологических



Контейнер полипропиленовый с завинчивающейся крышкой, стерильный емкостью не менее 100 мл






ЖКПТ крвооостанаваживающий

Стеклянные трубки с резиновой с грушей малого размера



Шпатель медицинский деревянный, одноразовый, стерильный



Штативы лабораторные полимерные для пробирок (10-гнездный)



Вата медицинская гигроскопическая не менее 100 грамм



10 ампул по

5 мл

Вода для инъекций


Растворитель для приготовления
лекарственных форм для инъекций

ВОДА


Стерильно
Для инъекционных растворов

ОАО "Новосибхимфарм"


630028, Россия, г. Новосибирск,
ул. Декабристов, 275,
тел. (383) 363-32-44
факс (383) 363-32-55




Натрия хлорид раствор 0.9 % флакон 200 мл, закрытый резиновыми пробками и завальцованные металлическими колпачками




Раствор йода спиртовой 5%, 25 мл.



Пептон ферментативный для бактериологических питательных сред сухой, 250 гр





Спиртовка




Коробка стерилизационная (кипятильник)



Коробка стерилизационная (кипятильник)



Клеенка медицинская подкладная с ПВХ покрытием 1м







Нитки суровые или лигатура



Спринцовка резиновая



Емкость для окраски препаратов



НАПРАВЛЕНИЕ N _____ на исследование

от "___" _____ 200__ г.

Наименование объекта, адрес _____

время отбора _____ доставки _____
Условия транспортировки и хранения _____

Цель исследования _____

Дополнительные сведения _____

Вид упаковки _____

НТД на метод отбора _____

№ пробы	Наименование пробы, образца	Количество	Место и точка отбора

Фамилия и подпись отобравшего пробы _____

Лейкопластырь




Блокнот, простой карандаш



Пакеты полиэтиленовые с застежкой-молнией 210x150 мм





Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательный бульон для культивирования микроорганизмов сухой» (ГМР-бульон)



Вазелиновое масло (парафин жидкий)





Бикс для доставки проб в лабораторию



Бикс для доставки проб в лабораторию



Приложение N 8
(рекомендуемое)**ПРАВИЛА
ЗАБОРА МАТЕРИАЛА ОТ БОЛЬНОГО С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ЧУМУ**

Пунктат из бубона (везикул, пустул, карбункулов) берут шприцем емкостью не менее 5 мл. Кожу на участке, намеченном для прокола, обрабатывают 70 град спиртом, а затем смазывают 5%-ным раствором йода и вновь протирают 70 град спиртом. Иглу вводят с таким расчетом, чтобы ее острое достигло центральной части бубона, после чего, оттянув до отказа поршень, медленно вытягивают иглу. Так как экссудат в чумном бубоне расположен между плотными тканями, количество его, попадающее в шприц, как правило, незначительно и часто заполняет только просвет иглы. После извлечения иглы из бубона через нее набирают в шприц 0,5 мл стерильного питательного бульона (рН 7,2), содержимое выливают в стерильную пробирку и закрывают стерильной резиновой пробкой. Бульон можно набрать в шприц и до начала пункции. В качестве метода, повышающего возможность выделения культуры чумного микроба, и в случае невозможности получить материал в бубон вводят 0,3 - 0,5 мл стерильного изотонического раствора натрия хлорида или питательного бульона. При вскрывшемся бубоне забирают материал отдельно из периферической плотной части и отделяемое свища. Обе порции исследуют раздельно.

При кожных поражениях иглу шприца вводят у края везикулы (пустулы) и затем продвигают к середине. У карбункулов и язв пунктируют плотный край.

Мокроту собирают в широкогорлые банки с притертой пробкой. Слизь из зева берут стерильным ватным тампоном по общепринятой методике.

Кровь забирают из локтевой вены в количестве 10 мл разовым шприцем и в нем доставляют кровь в лабораторию.

У больных чумой с локализацией первичных бубонов в области головы и шеи дополнительно забирают на исследование слизистое отделяемое ротовой полости и глотки стерильным ватным тампоном.

Посуду со взятым материалом обрабатывают снаружи марлей, смоченной в дезрастворе, обертывают вощеной бумагой, помещают в металлический бикс, перекладывают ватой. Тару с упакованным материалом опечатывают, на крышке указывают "верх" и отправляют в лабораторию с нарочным на специально выделенном транспорте.

К каждой пробе прикладывают направление с указанием сведений о материале (Ф.И.О. больного, наименование пробы, дата и час забора материала), а также сопроводительный документ, в котором содержатся сведения о больном (Ф.И.О., предполагаемый диагноз, получал ли больной до взятия материала антибиотики, какие и в каком количестве, какой материал направляется на исследование).

Время от момента взятия материала до начала исследования не должно превышать 5-6 ч., если нет условий для его хранения на холоде.

НАПРАВЛЕНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛА ОТ ЛЮДЕЙ В ЛАБОРАТОРИЮ _____

(наименование лаборатории)

Направляются _____

(цель исследования)

Регист- рацион- ный но- мер <*> анализа	Пер- вичный (повтор- ный)	Фами- лия, имя, отчес- тво	Воз- раст	Но- мер проб	Адрес (мес- то жите- льст- ва)	Место работы, учебы, детское учреж- дение	Клини- ческий диагноз. контин- гент	Наи- ме- нова- ние мате- риала	Дата отбора матери- ала час число месяц	Приме- нение антибио- тиков, данные о вакци- нации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Дата доставки проб _____ час, _____ число, _____ месяц, _____ год


Пробы доставил _____
(подпись)

Пробы принял _____
(подпись)

Скальпель хирургический острый не менее 150 мм.



Перекись водорода (Пергидроль) из расчета приготовления 10 л дезинфицирующего раствора




Средство дезинфицирующее
«ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА 6%»
Для наружного применения


ТУ 6187-002.7123300-0113
Упаковка: 1000 мл (1 л) в бутылке из полипропилена, 10 шт. в коробе (10 л) из полипропилена.
Срок годности: 12 месяцев со дня изготовления.
Срок годности: 12 месяцев со дня изготовления.
Срок годности: 12 месяцев со дня изготовления.

2 07 2015 1000 мл

Бумага листовая А4



Бумага копировальная



Перчатки резиновые



Карандаш по стеклу



Марля



Банка с крышкой из темного стекла на 1000 мл



Контейнер полимерный с крышкой для предстерилизационной очистки




Контейнер полимерный с крышкой для предстерилизационной очистки




Катетер урологический мужской для одноразового применения, стерильный



Чашки с крышкой (Петри) пластмассовые лабораторные однократного применения, диаметр 90мм



Зонд-тампон для отбора, транспортировки и хранения биологических проб (дерево/хлопок, стерильный, длина 15 см.)



Скотч «биологическая опасность»










Дата

ФИО

Комбинезон защитный одноразовый из материала спанбонд (ламинированный)



Очки защитные закрытые ЗНГ1 «РОСОМЗ» или Очки защитные герметичные ЗНГ1 PANORAMA (PL) «РОСОМЗ»



Очки защитные закрытые ЗНГ1 «РОСОМЗ» или Очки защитные герметичные ЗНГ1 PANORAMA (PL) «РОСОМЗ»



Фильтрующий респиратор



Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные



Сумка специальная для укладки



П А С П О Р Т

укладка противоэпидемическая медицинская УК-1Б

(ДЛЯ ЗАБОРА МАТЕРИАЛА ОТ БОЛЬНОГО (ТРУПА), ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО НА
ЗАБОЛЕВАНИЕ ЧУМОЙ, ХОЛЕРЫ, МАЛЯРИЕЙ, КВГЛ, СИНДРОМАМИ -
ДЛЯ ИНФЕКЦИОННЫХ СТАЦИОНАРОВ, МОРГОВ, ЦЕНТРОВ ГОССАНЭПИДНАДЗОРА И
ПРОТИВОЧУМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)

ТУ 9398-005-45508262-2010

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13488 от XX.XX.XXXX года

1. Назначение

Укладки предназначены для проведения первичных противоэпидемических мероприятий:

- взятия материала от больных или умерших в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) и в пунктах пропуска через государственную границу;
- патологоанатомического вскрытия умерших людей или туш животных, проводимого в установленном порядке при болезнях неясной этиологии, подозрительных на особо опасную инфекционную болезнь;
- санитарно-эпидемиологического обследования эпидемического очага особо опасных инфекций (ООИ);
- выявления и учета лиц, контактировавших с больными с подозрением на ООИ;
- своевременного проведения комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по локализации и ликвидации эпидемического очага ООИ.

2. Комплектность поставки

Комплектность укладки указана в упаковочном листе.

3. Техническое обслуживание

После работы в очаге ООИ использованные принадлежности укладки **ПОДЛЕЖАТ УТИЛИЗАЦИИ И ЧАСТИЧНО ДЕЗИНФЕКЦИИ** (согласно пункту 2.1.5), в соответствии с нормативами по охране труда, технике безопасности и защите окружающей среды.

4. Транспортирование и хранение

- 4.1 Укладки должны транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
- 4.2 Ящики с Укладками при транспортировании должны быть закреплены таким образом, чтобы была исключена возможность их самопроизвольного перемещения.
- 4.3 Погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться способами, исключающими удары и броски ящиков с Укладками.
- 4.4 Укладки должны транспортироваться в климатических условиях, которые соответствуют условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

5. Гарантии изготовителя

- 5.1 Организация – изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 5.2 Гарантийный срок хранения Укладки – 3 года со дня изготовления, одноразовых изделий – указано на упаковке изделий, но не более 1 года.

Изготовитель: ООО «Д-Медфарм» тел.: (812) 322-17-31, 305-04-76, 322-61-07

Россия, 199106, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д.3Б, лит. А, пом. 3Н

Дата изготовления: сентябрь 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека,
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации
Г.Г.ОНИЩЕНКО
31 мая 2007 г.
Дата введения:
1 августа 2007 г.

4.2. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ХОЛЕРЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ МУК 4.2.2218-07

(с изм., внесенными Дополнением, утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ 18.01.2008)

1. Разработаны: Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Ю.М.Федоров, Н.Я.Жилина); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский противочумный институт" (Ю.М.Ломов, Б.Н.Мишанькин, Л.С.Подосинникова, Л.Г.Воронежская, И.Я.Черепихина, Т.А.Кудрякова, Б.Л.Мазрухо, Л.М.Смоликова, И.В.Рыжко, Р.И.Цураева, Э.А.Москвитина, Б.П.Голубев, С.О.Водопьянов, Е.В.Монахова, В.Д.Кругликов, Н.Р.Телесманич, А.Б.Мазрухо, В.В.Агафонова); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Противочумный Центр" (А.А.Кюрегян, С.М.Иванова, Ю.С.Королев); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб" (А.К.Адамов, З.В.Малыхина, Т.В.Бугоркова, Н.И.Смирнова, Л.Ф.Ливанова, А.В.Топорков, С.И.Заднова, Н.А.Осина, Е.С.Казакова, Н.Б.Челдышева, А.В.Осин); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Иркутский научно-исследовательский противочумный институт" (А.С.Марамович, В.С.Ганин, Л.Я.Урбанович, В.И.Погорелов, Л.В.Миронова, Е.С.Куликалова); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт" (В.Н.Савельев); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Причерноморская противочумная станция" (Г.В.Гальцева); Государственным Центром по антибиотикам (С.В.Сидоренко); Российской медицинской академией последиplomного образования (Е.А.Ведьмина); ГИСК им. Л.А.Тарасевича (Т.И.Анисимова, Л.В.Саяпина).

2. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 31 мая 2007 г.

3. Введены взамен методических указаний "Лабораторная диагностика холеры" МУ 4.2.1097-02.

1. Область применения

1.1. Методические указания "Лабораторная диагностика холеры" разработаны для внедрения и применения действующих нормативных документов, определяющих требования к

Укладка противоэпидемическая медицинская универсальная УК-1М

ТУ 9398-005-45508262-2010

Регистрационное удостоверение: ФСР 2012/13488 от XX.XX.XXXXг.

СУМКА № _____

LOT

Партия _____




XX.XX.XXг.



XX.XX.XXг.


Гарантированный срок хранения: 3 года

Производитель: ООО «Д-Медфарм»
Россия, 199106, Санкт-Петербург, ул.
Шевченко, д.3Б, лит. А, пом. 3Н
Тел: 8 (812) 322-17-32
www.d-medfarm.com




От -50°C до +40°C

Контейнер полипропиленовый с завинчивающейся крышкой, стерильный, емкостью не менее 100 мл




Стеклянные трубки с резиновой грушей мелкого размера



Вазелиновое масло (парафин жидкий)



Клеенка медицинская подкладная с ПВХ покрытием



Стекло предметное с шлифованными краями



Скарификатор-копье для прокалывания кожи одноразовое, стерильное



Пакеты полиэтиленовые с застежкой-молнией 210x150 мм



Пакеты полиэтиленовые с застежкой-молнией 210x150 мм



Пакеты полиэтиленовые с застежкой-молнией 210x150 мм



Салфетка марлевая, медицинская, стерильная



НАПРАВЛЕНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛА ОТ ЛЮДЕЙ В ЛАБОРАТОРИЮ

(наименование лаборатории)

Направляются

(цель исследования)


Регист- рацион- ный но- мер <*> анализа	Пер- вичный (повтор- ный)	Фами- лия, имя, отчес- тво	Воз- раст	Но- мер проб	Адрес (мес- то жите- льст- ва)	Место работы, учебы, детское учреж- дение	Клини- ческий диагноз. контин- гент	Наи- ме- нова- ние мате- риала	Дата отбора матери- ала час число месяц	Приме- нение антибио- тиков, данные о вакци- нации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Дата доставки проб ____ час, ____ число, ____ месяц, ____ год


Пробы доставил _____
(подпись)

Пробы принял _____
(подпись)

Лейкопластырь



Лейкопластырь



Простой карандаш



Карандаш по стеклу



Укладка-контейнер для транспортировки проб



Укладка-контейнер для транспортировки проб



Приложение N 8
(рекомендуемое)**ПРАВИЛА
ЗАБОРА МАТЕРИАЛА ОТ БОЛЬНОГО С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ЧУМУ**

Пунктат из бубона (везикул, пустул, карбункулов) берут шприцем емкостью не менее 5 мл. Кожу на участке, намеченном для прокола, обрабатывают 70 град. спиртом, а затем смазывают 5%-ным раствором йода и вновь протирают 70 град. спиртом. Иглу вводят с таким расчетом, чтобы ее острие достигло центральной части бубона, после чего, оттянув до отказа поршень, медленно вытягивают иглу. Так как экссудат в чумном бубоне расположен между плотными тканями, количество его, попадающее в шприц, как правило, незначительно и часто заполняет только просвет иглы. После извлечения иглы из бубона через нее набирают в шприц 0,5 мл стерильного питательного бульона (рН 7,2), содержимое выливают в стерильную пробирку и закрывают стерильной резиновой пробкой. Бульон можно набрать в шприц и до начала пункции. В качестве метода, повышающего возможность выделения культуры чумного микроба, и в случае невозможности получить материал в бубон вводят 0,3 - 0,5 мл стерильного изотонического раствора натрия хлорида или питательного бульона. При вскрывшемся бубоне забирают материал отдельно из периферической плотной части и отделяемое свища. Обе порции исследуют раздельно.

При кожных поражениях иглу шприца вводят у края везикулы (пустулы) и затем продвигают к середине. У карбункулов и язв пунктируют плотный край.

Мокроту собирают в широкогорлые банки с притертой пробкой. Слизь из зева берут стерильным ватным тампоном по общепринятой методике.

Кровь забирают из локтевой вены в количестве 10 мл разовым шприцем и в нем доставляют кровь в лабораторию.

У больных чумой с локализацией первичных бубонов в области головы и шеи дополнительно забирают на исследование слизистое отделяемое ротовой полости и глотки стерильным ватным тампоном.

Посуду со взятым материалом обрабатывают снаружи марлей, смоченной в дезрастворе, обертывают воюющей бумагой, помещают в металлический бикс, перекладывают ватой. Тару с упакованным материалом опечатывают, на крышке указывают "верх" и отправляют в лабораторию с нарочным на специально выделенном транспорте.

К каждой пробе прикладывают направление с указанием сведений о материале (Ф.И.О. больного, наименование пробы, дата и час забора материала), а также сопроводительный документ, в котором содержатся сведения о больном (Ф.И.О., предполагаемый диагноз, получал ли больной до взятия материала антибиотики, какие и в каком количестве, какой материал направляется на исследование).

Время от момента взятия материала до начала исследования не должно превышать 5-6 ч., если нет условий для его хранения на холоде.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Избегать попадания

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Избегать попадания

том темном месте на сцене в упаковке изготовителя. Недостатки

на хранение от -5°C до $+10^{\circ}\text{C}$ расстояние от нагревательных приборов.

еже 7 м. При случайном пробылании средства его следует считать безопасным, если оно не содержит в себе более 100 мг. ртути на 1 л. При случайном пробылании средства его следует считать безопасным, если оно не содержит в себе более 100 мг. ртути на 1 л.

...и, в частности, горючим веществом.

не допускает в канализацию при утилизации. Не допускать попадания в канализацию комплекта защитной одежды. Не допускать попадания в канализацию.

ВНИМАНИЕ! Детально изучая предложения средств изложены в инструкции по

дезинфицирующей

Александров

ТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОРОС
ТАХОМ ХЛОРА

Одобрено и одобрено

...мочу, зазначая...

...чералью
...ческой
...чизм

Бактерио

1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800

[Faint handwritten notes and red dots visible through the paper.]

1871



Перчатки резиновые




Контейнер полимерный с крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий на 10 л.



Контейнер полимерный с крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий на 10 л.



Пептон ферментативный для бактериологических питательных сред, сухой



Скотч «биологическая опасность»



Оградительная лента «Биологическая опасность»







Дата

ФИО


Комбинезон защитный одноразовый из материала спанбонд (ламинированный)



Комбинезон защитный одноразовый из материала спанбонд (ламинированный)



Очки защитные закрытые ЗНГ1 «РОСОМЗ» или Очки защитные герметичные ЗНГ1 PANORAMA (PL) «РОСОМЗ»



Очки защитные закрытые ЗНГ1 «РОСОМЗ» или Очки защитные герметичные ЗНГ1 PANORAMA (PL) «РОСОМЗ»



Фильтрующий респиратор



Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные



Сумка специальная для укладки



П А С П О Р Т

Укладка противоэпидемическая медицинская УК-1М

(ДЛЯ ЗАБОРА НАТИВНОГО МАТЕРИАЛА ОТ БОЛЬНОГО
С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ХОЛЕРУ И МАЛЯРИЮ.
ДЛЯ БОЛЬНИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НЕИНФЕКЦИОННОГО ПРОФИЛЯ,
СТАНЦИЙ СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СКО, СКП, ПСКИП)

1 У 9398-005-45508262-2010

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13488 от XX.XX.XXXX года

1. Назначение

Укладки предназначены для проведения перечисленных противоэпидемических мероприятий:

- взятии материала от больных или умерших в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) и в пунктах пропуска через государственную границу;
- патологоанатомического вскрытия умерших людей или трупов животных, проводимого в установленном порядке при болезнях неясной этиологии, подозрительных на особо опасную инфекционную болезнь;
- санитарно-эпидемиологического обследования эпидемического очага особо опасных инфекций (ООИ);
- выявления и учета лиц, контактировавших с больными с подозрением на ООИ;
- одновременного проведения комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по локализации и ликвидации эпидемического очага ООИ.

2. Комплектность поставки

Комплектность укладки указана в упаковочном листе.

3. Техническое обслуживание

После работы в очаге ООИ использованные принадлежности укладки ПОДЛЕЖАТ УТИЛИЗАЦИИ И

ЧАСТИЧНО ДЕЗИНФЕКЦИИ (согласно пункту 2.1.5), в соответствии с нормативами по охране труда, технике безопасности и защите окружающей среды.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Укладки должны транспортироваться всеми видами краткого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

4.2 Ящики с Укладками при транспортировании должны быть закреплены таким образом, чтобы была исключена возможность их самопроизвольного перемещения.

4.3 Потребуются разгрузочные работы должны проводиться способами, исключаящими удары и броски ящиков с Укладками.

4.4 Укладки должны транспортироваться в климатических условиях, которые соответствуют условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

5. Гарантии изготовителя

5.1 Организация - изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2 Гарантийный срок хранения Укладки - 3 года со дня изготовления, односторонних изделий - указано на упаковке изделий, но не более 1 года.

Изготовитель: ООО «Д-Медфарм» тел.: (812) 322-17-32, 305-04-76, 322-61-07

Россия, 199106, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д.35, лит. А, пом. 3Н

Дата изготовления: сентябрь 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Федеральной
 службы по надзору в сфере
 защиты прав потребителей и
 благополучия человека,
 Главный государственный
 санитарный врач
 Российской Федерации
 Г.Г.ОНИЩЕНКО
 31 мая 2007 г.
 Дата введения:
 1 августа 2007 г.

4.2. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ХОЛЕРЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ МУК 4.2.2218-07

(с изм., внесенными Дополнением, утв. Главным государственным
 санитарным врачом РФ 18.01.2008)

1. Разработаны: Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Ю.М.Федоров, Н.Я.Жилина); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский противочумный институт" (Ю.М.Ломов, Б.Н.Мишанькин, Л.С.Подосинникова, Л.Г.Воронежская, И.Я.Черепихина, Т.А.Кудрякова, Б.Л.Мазрухо, Л.М.Смоликова, И.В.Рыжко, Р.И.Цураева, Э.А.Москвитина, Б.П.Голубев, С.О.Водопьянов, Е.В.Монахова, В.Д.Кругликов, Н.Р.Телесманич, А.Б.Мазрухо, В.В.Агафонова); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Противочумный Центр" (А.А.Кюрегян, С.М.Иванова, Ю.С.Королев); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб" (А.К.Адамов, З.В.Малыхина, Т.В.Бугоркова, Н.И.Смирнова, Л.Ф.Ливанова, А.В.Топорков, С.И.Заднова, Н.А.Осина, Е.С.Казакова, Н.Б.Челдышева, А.В.Осин); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Иркутский научно-исследовательский противочумный институт" (А.С.Марамович, В.С.Ганин, Л.Я.Урбанович, В.И.Погорелов, Л.В.Миронова, Е.С.Куликалова); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт" (В.Н.Савельев); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Причерноморская противочумная станция" (Г.В.Гальцева); Государственным Центром по антибиотикам (С.В.Сидоренко); Российской медицинской академией последипломного образования (Е.А.Ведьмина); ГИСК им. Л.А.Тарасевича (Т.И.Анисимова, Л.В.Саяпина).

2. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 31 мая 2007 г.

3. Введены взамен методических указаний "Лабораторная диагностика холеры" МУ 4.2.1097-02.

1. Область применения

1.1. Методические указания "Лабораторная диагностика холеры" разработаны для внедрения и применения действующих нормативных документов, определяющих требования к

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 104 листа (ов)



Генеральный директор
ООО «Д-Медфарм»

Подпись _____ Резник _____

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Д-Медфарм»

Резник О. Д.



Фотографические изображения
медицинского изделия

***Укладки противэпидемические медицинские УК-1
по ТУ 9398-005-45508267-2010***

Производства

Общество с ограниченной

ответственностью «Д-Медфарм»


Россия, 199106, Санкт-Петербург, ул.

Шевченко, д.3Б, лит. А, пом. 3Н

Укладка противоэпидемическая медицинская универсальная УК-1Б (общий вид упаковки)



Укладка противозидемическая медицинская универсальная УК-1Б (общий вид упаковки)



Укладка противозидемическая медицинская универсальная УК-1Б

ТУ 9398-005-45508267-2010

Регистрационное удостоверение: ФСР 2012/13488 от XX.XX.XXXXг.

СУМКА № _____

LOT

Партия _____



XX.XX.XX.XX.XXг.



XX.XX.XX.XX.XXг.


Гарантированный срок хранения: 3 года

Производитель: ООО «Д-Медфарм»
Россия, 199106, Санкт-Петербург, ул.
Шевченко, д.3Б, лит. А, пом. 3Н
Тел: 8 (812) 322-17-32
www.d-medfarm.com




От -50°C до +40°C

Пинцет анатомический не менее 250мм.



Пипетки Пастеровские с длинными концами (стерильные)




Скарификатор-копье для прокалывания кожи одноразовое, стерильное




Ножницы прямые с 2-мя острыми концами не менее 140 мм.




Шприц инъекционный однократного применения с иглой 5 мл.




Шприц инъекционный однократного применения с иглой, 10 мл



Иглы инъекционные




Пробирки бактериологические не менее 10 мл




Зонд-тампон для отбора, транспортировки и хранения биологических проб, в комплекте с пустой пробиркой (дерево/хлопок, стерильный)




Пробки резиновые N 12, 14 (под пробирки, флаконы)




Стекло предметное с шлифованными краями




Набор петель микробиологических




Контейнер полипропиленовый с завинчивающейся крышкой, стерильный емкостью не менее 100 мл




Жгут кровоостанавливающий



Стеклянные трубки с резиновой с грушей малого размера



Шпатель медицинский деревянный, одноразовый, стерильный



Штативы лабораторные полимерные для пробирок (10-гнездный)



Вата медицинская гигроскопическая не менее 100 грамм



10 ампул по

5 мл

Вода для инъекций

Растворитель для приготовления
лекарственных форм для инъекций

ВОДА


Стерильно
Для инъекционных растворов

ОАО "Новосибхимфарм"


630028, Россия, г. Новосибирск,
ул. Декабристов, 275,
тел. (383) 363-32-44
факс (383) 363-32-55




Натрия хлорид раствор 0.9 % флакон 200 мл, закрытый резиновыми пробками и завальцованные металлическими колпачками



Раствор йода спиртовой 5%, 25 мл.




Пептон ферментативный для бактериологических питательных сред сухой, 250 гр



Перекись водорода



Спиртовка



Коробка стерилизационная (кипятильник)



Коробка стерилизационная (кипятильник)



Клеенка медицинская подкладная с ПВХ покрытием 1м




Пластелин



Нитки суровые или лигатура



Спринцовка резиновая



Емкость для окраски препаратов



НАПРАВЛЕНИЕ N _____ на исследование

от " _ " _____ 200 _ г.

Наименование объекта, адрес _____

время отбора _____ доставки _____

Условия транспортировки и хранения _____

Цель исследования _____

Дополнительные сведения _____

Вид упаковки _____

НТД на метод отбора _____


№ пробы	Наименование пробы, образца	Количество	Место и точка отбора

Фамилия и подпись отобравшего пробы _____

Лейкопластырь




Блокнот, простой карандаш




Пакеты полиэтиленовые с застежкой-молнией 210x150 мм



Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательный бульон для культивирования микроорганизмов сухой» (ГМР-агар)



Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательный бульон для культивирования микроорганизмов сухой» (ГМР-бульон)




Вазелиновое масло (парафин жидкий)






Бикс для доставки проб в лабораторию



Бикс для доставки проб в лабораторию



Приложение N 8
(рекомендуемое)**ПРАВИЛА
ЗАБОРА МАТЕРИАЛА ОТ БОЛЬНОГО С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ЧУМУ**

Пунктат из бубона (везикул, пустул, карбункулов) берут шприцем емкостью не менее 5 мл. Кожу на участке, намеченном для прокола, обрабатывают 70 град. спиртом, а затем смазывают 5%-ным раствором йода и вновь протирают 70 град. спиртом. Иглу вводят с таким расчетом, чтобы ее острый кончик достиг центральной части бубона, после чего, оттянув до отказа поршень, медленно вытягивают иглу. Так как экссудат в чумном бубоне расположен между плотными тканями, количество его, попадающее в шприц, как правило, незначительно и часто заполняет только просвет иглы. После извлечения иглы из бубона через нее набирают в шприц 0,5 мл стерильного питательного бульона (рН 7,2), содержащее выливают в стерильную пробирку и закрывают стерильной резиновой пробкой. Бульон можно набрать в шприц и до начала пункции. В качестве метода, повышающего возможность выделения культуры чумного микроба, и в случае невозможности получить материал в бубон вводят 0,3 - 0,5 мл стерильного изотонического раствора натрия хлорида или питательного бульона. При вскрывшемся бубоне забирают материал отдельно из периферической плотной части и отделяемое свища. Обе порции исследуют раздельно.

При кожных поражениях иглу шприца вводят у края везикулы (пустулы) и затем продвигают к середине. У карбункулов и язв пунктируют плотный край.

Мокроту собирают в широкогорлые банки с притертой пробкой. Слизь из зева берут стерильным ватным тампоном по общепринятой методике.

Кровь забирают из локтевой вены в количестве 10 мл разовым шприцем и в нем доставляют кровь в лабораторию.

У больных чумой с локализацией первичных бубонов в области головы и шеи дополнительно забирают на исследование слизистое отделяемое ротовой полости и глотки стерильным ватным тампоном.

Посуду со взятым материалом обрабатывают снаружи марлей, смоченной в дезрастворе, обертывают вощеной бумагой, помещают в металлический бикс, перекладывают ватой. Тару с упакованным материалом опечатывают, на крышке указывают "верх" и отправляют в лабораторию с нарочным на специально выделенном транспорте.

К каждой пробе прикладывают направление с указанием сведений о материале (Ф.И.О. больного, наименование пробы, дата и час забора материала), а также сопроводительный документ, в котором содержатся сведения о больном (Ф.И.О., предполагаемый диагноз, получал ли больной до взятия материала антибиотики, какие и в каком количестве, какой материал направляется на исследование).

Время от момента взятия материала до начала исследования не должно превышать 5-6 ч., если нет условий для его хранения на холоде.

НАПРАВЛЕНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛА ОТ ЛЮДЕЙ В ЛАБОРАТОРИЮ

(наименование лаборатории)

Направляются

(цель исследования)


Регист- рацион- ный но- мер <*> анализа	Пер- вичный (повтор- ный)	Фами- лия, имя, отчес- тво	Воз- раст	Но- мер проб	Адрес (мес- то жите- льст- ва)	Место работы, учебы, детское учреж- дение	Клини- ческий диагноз. контин- гент	Наи- ме- нова- ние мате- риала	Дата отбора матери- ала час число месяц	Приме- нение антибио- тиков, данные о вакци- нации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Дата доставки проб ____ час, ____ число, ____ месяц, ____ год

Пробы доставил _____
(подпись)

Пробы принял _____
(подпись)


Скальпель хирургический острый не менее 150 мм.




Перекись водорода (Пергидроль) из расчета приготовления 10 л дезинфицирующего раствора




Бумага листовая А4




Бумага копировальная




Перчатки резиновые



Карандаш по стеклу




Марля



Банка с крышкой из темного стекла на 1000 мл




Контейнер полимерный с крышкой для предстерилизационной очистки




Контейнер полимерный с крышкой для предстерилизационной очистки




Катетер урологический мужской для одноразового применения, стерильный




Чашки с крышкой (Петри) пластмассовые лабораторные однократного применения, диаметр 90мм




Зонд-тампон для отбора, транспортировки и хранения биологических проб (дерево/хлопок, стерильный, длина 15 см.)



Лента оградительная «Биологическая опасность»



Скотч «биологическая опасность»








Дата

ФИО

Комбинезон защитный одноразовый из материала спанбонд (ламинированный)



Очки защитные закрытые ЗНГ1 «РОСОМЗ» или Очки защитные герметичные ЗНГ1 PANORAMA (PL) «РОСОМЗ»



Фильтрующий респиратор



Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные



Сумка специальная для укладки



П А С П О Р Т

укладка противэпидемическая медицинская УК-1Б

(ДЛЯ ЗАБОРА МАТЕРИАЛА ОТ БОЛЬНОГО (ТРУПА), ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО НА
ЗАБОЛЕВАНИЕ ЧУМОЙ, ХОЛЕРЫ, МАЛЯРИЕЙ, КВГЛ, СИНДРОМАМИ -
ДЛЯ ИНФЕКЦИОННЫХ СТАЦИОНАРОВ, МОРГОВ, ЦЕНТРОВ ГОССАНЭПИДНАДЗОРА И
ПРОТИВОЧУМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)

ТУ 9398-005-45508267-2010

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13488 от XX.XX.XXXX года

1. Назначение

Укладки предназначены для проведения первичных противэпидемических мероприятий:

- взятия материала от больных или умерших в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) и в пунктах пропуска через государственную границу;
- патологоанатомического вскрытия умерших людей или трупов животных, проводимого в установленном порядке при болезнях неясной этиологии, подозрительных на особо опасную инфекционную болезнь;
- санитарно-эпидемиологического обследования эпидемического очага особо опасных инфекций (ООИ);
- выявления и учета лиц, контактировавших с больными с подозрением на ООИ;
- своевременного проведения комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по локализации и ликвидации эпидемического очага ООИ.

2. Комплектность поставки

Комплектность укладки указана в упаковочном листе.

3. Техническое обслуживание

После работы в очаге ООИ используемые принадлежности укладки **ПОДЛЕЖАТ УТИЛИЗАЦИИ И ЧАСТИЧНО ДЕЗИНФЕКЦИИ** (согласно пункту 2.1.5), в соответствии с нормативами по охране труда, технике безопасности и защите окружающей среды.

4. Транспортирование и хранение

- 4.1 Укладки должны транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
- 4.2 Ящики с Укладками при транспортировании должны быть закреплены таким образом, чтобы была исключена возможность их самопроизвольного перемещения.
- 4.3 Погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться способами, исключаящими удары и броски ящиков с Укладками.
- 4.4 Укладки должны транспортироваться в климатических условиях, которые соответствуют условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

5. Гарантия изготовителя

- 5.1 Организация – изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 5.2 Гарантийный срок хранения Укладок – 3 года со дня изготовления, одноразовых изделий – указано на упаковке изделий, но не более 1 года.

Изготовитель: ООО «Д-Медфарм» тел.: (812) 322-17-32, 305-04-76, 322-61-07

Россия, 199106, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д.3Б, лит. А, пом. 3Н

Дата изготовления: _сентябрь_ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Федеральной
 службы по надзору в сфере
 защиты прав потребителей и
 благополучия человека,
 Главный государственный
 санитарный врач
 Российской Федерации
 Г.Г.ОНИЩЕНКО
 31 мая 2007 г.
 Дата введения:
 1 августа 2007 г.

4.2. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ХОЛЕРЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ МУК 4.2.2218-07

(с изм., внесенными Дополнением, утв. Главным государственным
 санитарным врачом РФ 18.01.2008)

1. Разработаны: Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Ю.М.Федоров, Н.Я.Жилина); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский противочумный институт" (Ю.М.Ломов, Б.Н.Мишанькин, Л.С.Подосинникова, Л.Г.Воронежская, И.Я.Черепяхина, Т.А.Кудрякова, Б.Л.Мазрухо, Л.М.Смоликова, И.В.Рыжко, Р.И.Цураева, Э.А.Москвитина, Б.П.Голубев, С.О.Водопьянов, Е.В.Монахова, В.Д.Кругликов, Н.Р.Телесманич, А.Б.Мазрухо, В.В.Агафонова); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Противочумный Центр" (А.А.Кюрегян, С.М.Иванова, Ю.С.Королев); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб" (А.К.Адамов, З.В.Малыхина, Т.В.Бугоркова, Н.И.Смирнова, Л.Ф.Ливанова, А.В.Топорков, С.И.Заднова, Н.А.Осина, Е.С.Казакова, Н.Б.Челдышева, А.В.Осин); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Иркутский научно-исследовательский противочумный институт" (А.С.Марамович, В.С.Ганин, Л.Я.Урбанович, В.И.Погорелов, Л.В.Миронова, Е.С.Куликалова); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт" (В.Н.Савельев); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Причерноморская противочумная станция" (Г.В.Гальцева); Государственным Центром по антибиотикам (С.В.Сидоренко); Российской медицинской академией последипломного образования (Е.А.Ведьмина); ГИСК им. Л.А.Тарасевича (Т.И.Анисимова, Л.В.Саяпина).


2. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 31 мая 2007 г.

3. Введены взамен методических указаний "Лабораторная диагностика холеры" МУ 4.2.1097-02.

1. Область применения

1.1. Методические указания "Лабораторная диагностика холеры" разработаны для внедрения и применения действующих нормативных документов, определяющих требования к

Укладка противоэпидемическая медицинская универсальная УК-1М (Общий вид упаковки)



Укладка противозидемическая медицинская универсальная УК-1М (Общий вид упаковки)



**Укладка противозидемическая медицинская
универсальная УК-1М**
ТУ 9358-005-4550267-2010
Регистрационное удостоверение: ФСР 2012/13480 от XX.XX.XXXX.

 09.2018 г.  Партия 09
 09.2021 г.

Проектировщик: ООО «Д.Медфарм»
Россия, 199106, Санкт-Петербург, ул.
Шлиссельбургская, д. 28, лит. А, пом. 101
Тел: 8 (812) 322-47-32
www.d-medfarm.com

Гарантированный срок хранения: 3 года
 От -60°C до +40°C

Укладка противоэпидемическая медицинская универсальная УК-1М

ТУ 9398-005-45508267-2010

Регистрационное удостоверение: ФСР 2012/13488 от XX.XX.XXXXг.

СУМКА № _____

LOT

Партия _____



XX.XX.XXг.



XX.XX.XXг.


Гарантированный срок хранения: 3 года

Производитель: ООО «Д-Медфарм»
Россия, 199106, Санкт-Петербург, ул.
Шевченко, д.3Б, лит. А, пом. 3Н
Тел: 8 (812) 322-17-32
www.d-medfarm.com




От -50°C до +40°C

Контейнер полипропиленовый с завинчивающейся крышкой, стерильный, емкостью не менее 100 мл



Стеклянные трубки с резиновой грушей мелкого размера




Вазелиновое масло (парафин жидкий)



Клеенка медицинская подкладная с ПВХ покрытием



Стекло предметное с шлифованными краями



Скарификатор-копье для прокалывания кожи одноразовое, стерильное



Пакеты полиэтиленовые с застежкой-молнией 210x150 мм



Салфетка марлевая, медицинская, стерильная



НАПРАВЛЕНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛА ОТ ЛЮДЕЙ В ЛАБОРАТОРИЮ

(наименование лаборатории)

Направляются

(цель исследования)

Регист- рацион- ный но- мер <#> анализа	Пер- вичный (повтор- ный)	Фами- лия, имя, отчес- тво	Воз- раст	Но- мер проб	Адрес (мес- то жите- льст- ва)	Место работы, учебы, детское учреж- дение	Клини- ческий диагноз. контин- гент	Наи- ме- нова- ние мате- риала	Дата отбора матери- ала час число месяц	Приме- нение антибио- тиков, данные о вакци- нации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Дата доставки проб ____ час, ____ число, ____ месяц, ____ год

Пробы доставил _____
(подпись)

Пробы принял _____
(подпись)

Лейкопластырь




Простой карандаш




Карандаш по стеклу



Укладка-контейнер для транспортировки проб



Укладка-контейнер для транспортировки проб



Приложение N 8
(рекомендуемое)ПРАВИЛА
ЗАБОРА МАТЕРИАЛА ОТ БОЛЬНОГО С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ЧУМУ

Пунктат из бубона (везикул, пустул, карбункулов) берут шприцем емкостью не менее 5 мл. Кожу на участке, намеченном для прокола, обрабатывают 70 град. спиртом, а затем смазывают 5%-ным раствором йода и вновь протирают 70 град. спиртом. Иглу вводят с таким расчетом, чтобы ее острое достигло центральной части бубона, после чего, оттянув до отказа поршень, медленно вытягивают иглу. Так как экссудат в чумном бубоне расположен между плотными тканями, количество его, попадающее в шприц, как правило, незначительно и часто заполняет только просвет иглы. После извлечения иглы из бубона через нее набирают в шприц 0,5 мл стерильного питательного бульона (рН 7,2), содержимое выливают в стерильную пробирку и закрывают стерильной резиновой пробкой. Бульон можно набрать в шприц и до начала пункции. В качестве метода, повышающего возможность выделения культуры чумного микроба, и в случае невозможности получить материал в бубон вводят 0,3 - 0,5 мл стерильного изотонического раствора натрия хлорида или питательного бульона. При вскрывшемся бубоне забирают материал отдельно из периферической плотной части и отделяемое свища. Обе порции исследуют раздельно.

При кожных поражениях иглу шприца вводят у края везикулы (пустулы) и затем продвигают к середине. У карбункулов и язв пунктируют плотный край.

Мокроту собирают в широкогорлые банки с притертой пробкой. Слизь из зева берут стерильным ватным тампоном по общепринятой методике.

Кровь забирают из локтевой вены в количестве 10 мл разовым шприцем и в нем доставляют кровь в лабораторию.


У больных чумой с локализацией первичных бубонов в области головы и шеи дополнительно забирают на исследование слизистое отделяемое ротовой полости и глотки стерильным ватным тампоном.

Посуду со взятым материалом обрабатывают снаружи марлей, смоченной в дезрастворе, обертывают вощеной бумагой, помещают в металлический бикс, перекладывают ватой. Тару с упакованным материалом опечатывают, на крышке указывают "верх" и отправляют в лабораторию с нарочным на специально выделенном транспорте.

К каждой пробе прикладывают направление с указанием сведений о материале (Ф.И.О. больного, наименование пробы, дата и час забора материала), а также сопроводительный документ, в котором содержатся сведения о больном (Ф.И.О., предполагаемый диагноз, получал ли больной до взятия материала антибиотики, какие и в каком количестве, какой материал направляется на исследование).

Время от момента взятия материала до начала исследования не должно превышать 5-6 ч., если нет условий для его хранения на холоде.

Хлорамин в пакете по 300 г, рассчитанный на получение 10 л. 3% раствора



НАЗНАЧЕНИЕ: Для дезинфекции приноса-
вещей, средств в концентрации 0,2 – 5,0 % в зависимости от
объекта обеззараживания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Избегать контакта с кожей. Все работы проводить в резиновых перчатках. Хранить в темном месте на складе в упаковке изготовителя. Не хранить отдельно от лекарственных препаратов и пищевых продуктов. Хранить при температуре от -5 °C до +30 °C, защищенные от нагревания. Не хранить вблизи источников повышенной влажности. Не допускать смешивания с другими веществами. При уборке пользоваться средствами защиты. Не допускать попадания в сточные воды. Не допускать попадания в окружающую среду.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не использовать для дезинфекции средств, изготовленных в домашних условиях. Не использовать для дезинфекции средств, изготовленных в домашних условиях.


Хлорамин

ТАПЛИНСКИЙ, порош.


НАЗНАЧЕНИЕ: Для дезинфекции приноса-
вещей, средств в концентрации 0,2 – 5,0 % в зависимости от
объекта обеззараживания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Избегать контакта с кожей. Все работы проводить в резиновых перчатках. Хранить в темном месте на складе в упаковке изготовителя. Не хранить отдельно от лекарственных препаратов и пищевых продуктов. Хранить при температуре от -5 °C до +30 °C, защищенные от нагревания. Не хранить вблизи источников повышенной влажности. Не допускать смешивания с другими веществами. При уборке пользоваться средствами защиты. Не допускать попадания в сточные воды. Не допускать попадания в окружающую среду.

Перчатки резиновые




Контейнер полимерный с крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий на 10 л.




Контейнер полимерный с крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий на 10 л.




Пептон ферментативный для бактериологических питательных сред, сухой



Скотч «биологическая опасность»



Оградительная лента «Биологическая опасность»








A yellow rectangular label with a black biohazard symbol (a triangle containing three interlocking circles) on the left side. To the right of the symbol, there are four horizontal lines for writing. Below the symbol, the text "ФИО" is printed, followed by a horizontal line. To the right of "ФИО", the text "Дата" is printed, followed by a horizontal line. The label is placed on a blue and white striped background.


Комбинезон защитный одноразовый из материала спанбонд (ламинированный)



Очки защитные закрытые ЗНГ1 «РОСОМЗ» или Очки защитные герметичные ЗНГ1 PANORAMA (PL) «РОСОМЗ»



Очки защитные закрытые ЗНГ1 «РОСОМЗ» или Очки защитные герметичные ЗНГ1 PANORAMA (PL) «РОСОМЗ»



Фильтрующий респиратор



Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные



Сумка специальная для укладки



П А С П О Р Т

укладка противозидемическая медицинская УК-1М

(ДЛЯ ЗАБОРА НАТИВНОГО МАТЕРИАЛА ОТ БОЛЬНОГО
С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ХОЛЕРУ И МАЛЯРИЮ-
ДЛЯ БОЛЬНИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НЕИНФЕКЦИОННОГО ПРОФИЛЯ,
СТАНЦИЙ СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СКО, СКП, ПСКП)

ТУ 9398-005-45508267-2010

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13488 от XX.XX.XXXX года

1. Назначение

Укладки предназначены для проведения первичных противозидемических мероприятий:

- взятия материала от больных или умерших в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) и в пунктах пропуска через государственную границу;
- патологоанатомического вскрытия умерших людей или трупов животных, проводимого в установленном порядке при болезнях неясной этиологии, подозрительных на особо опасную инфекционную болезнь;
- санитарно-эпидемиологического обследования эпидемического очага особо опасных инфекций (ООИ);
- выявления и учета лиц, контактировавших с больными с подозрением на ООИ;
- своевременного проведения комплекса санитарно-противозидемических (профилактических) мероприятий по локализации и ликвидации эпидемического очага ООИ.

2. Комплектность поставки

Комплектность укладки указана в упаковочном листе.

3. Техническое обслуживание

После работы в очаге ООИ использующие принадлежности укладки ПОДЛЕЖАТ УТИЛИЗАЦИИ И ЧАСТИЧНО ДЕЗИНФЕКЦИИ (согласно пункту 2.1.5), в соответствии с нормативами по охране труда, технике безопасности и защите окружающей среды.

4. Транспортирование и хранение

- 4.1 Укладки должны транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
- 4.2 Ящики с Укладками при транспортировании должны быть закреплены таким образом, чтобы была исключена возможность их самопроизвольного перемещения.
- 4.3 Погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться способами, исключающими удары и броски ящиков с Укладками.
- 4.4 Укладки должны транспортироваться в климатических условиях, которые соответствуют условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

5. Гарантия изготовителя

- 5.1 Организация – изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 5.2 Гарантийный срок хранения Укладки – 3 года со дня изготовления, одноразовых изделий – указано на упаковке изделий, но не более 1 года.

Изготовитель: ООО «Д-Медфарм» тел.: (812) 322-17-32, 305-04-76, 322-61-07

Россия, 199106, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д.3Б, лит. А, пом. 3Н

Дата изготовления: сентябрь 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Федеральной
 службы по надзору в сфере
 защиты прав потребителей и
 благополучия человека,
 Главный государственный
 санитарный врач
 Российской Федерации
 Г.Г.ОНИЩЕНКО
 31 мая 2007 г.
 Дата введения:
 1 августа 2007 г.

4.2. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ХОЛЕРЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ МУК 4.2.2218-07

(с изм., внесенными Дополнением, утв. Главным государственным
 санитарным врачом РФ 18.01.2008)

1. Разработаны: Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Ю.М.Федоров, Н.Я.Жилина); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский противочумный институт" (Ю.М.Ломов, Б.Н.Митанькин, Л.С.Подосинникова, Л.Г.Воронежская, И.Я.Черепяхина, Т.А.Кудрякова, Б.Л.Мазрухо, Л.М.Смоликова, И.В.Рыжко, Р.И.Цураева, Э.А.Москвитина, Б.П.Голубев, С.О.Водопьянов, Е.В.Монахова, В.Д.Кругликов, Н.Р.Телесманич, А.Б.Мазрухо, В.В.Агафонова); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Противочумный Центр" (А.А.Кюрегян, С.М.Иванова, Ю.С.Королев); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб" (А.К.Адамов, З.В.Малыхина, Т.В.Буторкова, Н.И.Смирнова, Л.Ф.Ливанова, А.В.Топорков, С.И.Заднова, Н.А.Осина, Е.С.Казакова, Н.Б.Челдышева, А.В.Осин); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Иркутский научно-исследовательский противочумный институт" (А.С.Марамович, В.С.Ганин, Л.Я.Урбанович, В.И.Погорелов, Л.В.Миринова, Е.С.Куликалова); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт" (В.Н.Савельев); Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Причерноморская противочумная станция" (Г.В.Гальцева); Государственным Центром по антибиотикам (С.В.Сидоренко); Российской медицинской академией последипломного образования (Е.А.Ведьмина); ГИСК им. Л.А.Тарасевича (Т.И.Анисимова, Л.В.Саяпина).

2. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 31 мая 2007 г.

3. Введены взамен методических указаний "Лабораторная диагностика холеры" МУ 4.2.1097-02.

1. Область применения

1.1. Методические указания "Лабораторная диагностика холеры" разработаны для внедрения и применения действующих нормативных документов, определяющих требования к

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 108 листа (ов)

Генеральный директор
ООО «Д-Медфарм»

Резник О.Д.

