

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ЭргоПродакшн»

Р.В. Аносов

«22» июля 2019 г.



**Фотографические изображения
медицинского изделия
Незабуференный формалин HistoSafe®
по ТУ 21.20.23-006-89079081-2017**

Фото 1. Незабуференный формалин HistoSafe® Бейкера - 1 л, лицевая сторона



Фото 2. Незабуференный формалин HistoSafe® Бейкера - 1 л, обратная сторона




Фото 3. Незабуференный формалин HistoSafe® Бейкера – 2,5 л





Фото 4. Незабуференный формалин HistoSafe® Бейкера – 3,8 л



IVD REF XXXXXXX

По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию



Bi Vitrum

Незабуференный формалин HistoSafe® Бейкера - 3,8 л

LOT 3226

12.2017

12.2019

РУ № XXXXXX

Состав: формалин, вода,
хлористый кальций




Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткани/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч; при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.



ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Фото 5. Незабуференный формалин HistoSafe® Бейкера – 5 л



IVD REF xxxxxxxx

По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Bi Vitrum

Незабуференный формалин HistoSafe® Бейкера - 5 л

LOT 3226

12.2017

12.2019

РУ № xxxxxx

Состав: формалин, вода,
хлористый кальций

Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткани/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.

ООО "ЭргоПродакшн", Р.Ф. 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н, Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", Р.Ф. 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Фото 6. Незабуференный формалин HistoSafe® Бейкера – 10 л




Фото 7. Незабуференный формалин HistoSafe® Бейкера – 20 л






Фото 8. Незабуференный формалин HistoSafe® ФСУ – 1 л, лицевая сторона





IVD

REF

XXXXXXXX




Bi Vitrum

Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.



ООО "ЭргоПродакшн", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Фото 10. Незабуференный формалин HistoSafe® ФСУ – 2,5 л






Фото 12. Незабуференный формалин HistoSafe® ФСУ – 5 л




Фото 13. Незабуференный формалин HistoSafe® ФСУ – 10 л







Фото 14. Незабуференный формалин HistoSafe® ФСУ – 20 л







IVD

REF

XXXXXXXX



Bi Vitrum

Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.



ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н, Тел. +7 (812) 305-06-06, Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06, www.biovitrum.ru

Фото 17. Незабуференный формалин HistoSafe® FAA – 2,5 л




Фото 18. Незабуференный формалин HistoSafe® FAA – 3,8 л





Фото 19. Незабуференный формалин HistoSafe® FAA – 5 л







Фото 21. Незабуференный формалин HistoSafe® FAA – 20 л



прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 22 лист(ов)

Генеральный директор
ООО «ЭрбПродакшн»

Р.В. Аносов

«22» декабря 2019 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО "ЭргоПродакшн"

Р.В. Аносов

"30" августа 2018 г.



МАКЕТЫ ЭТИКЕТОК НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

**Незабуференный формалин HistoSafe®
по ТУ 21.20.23-006-89079081-2017**

Типы этикеток используемых в различных вариантах исполнения

При производстве МИ «Незабуференный формалин HistoSafe®»

используются типы различные типы этикеток в зависимости от типа первичной упаковки.

Лицевая этикетка используется для отображения основной информации, обратная этикетка для размещения краткой инструкции. Обратная этикетка применяется при условии, если краткую инструкцию невозможно разместить на лицевой этикетки, но имеется достаточно места для размещения второй этикетки.

При размещении информации на этикетки необходимо руководствоваться ТУ 21.20.23-006-89079081-2017.

Незабуференный формалин HistoSafe® Бейкера - 1 л

Первичная упаковка: бутылка

Лицевая этикетка

IVD

REF

B06-022/S

Bi Vitrum

Незабуференный
формалин HistoSafe®
Бейкера - 1 л

По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.
ПУ № xxxxxx

LOT

xxxxxxx

ММ.ГГГГ

ММ.ГГГГ

Состав: формалин,
вода, хлористый
кальций

25

5

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Оборотная этикетка

IVD

REF

B06-022/S

Bi Vitrum

Краткая инструкция: Внимание: соотношение
ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию
проводить при комнатной температуре.
Максимальная допустимая толщина образца 1
см. При толщине образцов менее 3 мм - время
фиксации должно составлять не менее 5 ч, при
толщине образцов 3 мм и более - время
фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении
формалина кровью и другими
физиологическими жидкостями, фиксатор
необходимо заменить. Описание
метода: Поместить биологический материал в
фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости
от размера образца.

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD

REF

B06-022/S

По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Незабуференный формалин HistoSafe® Бейкера - 1 л

LOT

xxxxxxx

ММ.ГГГГ

ММ.ГГГГ

Кол-во штук:


Масса нетто:

Масса брутто:


ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Незабуференный формалин HistoSafe® Бейкера - 2,5 л

Первичная упаковка: канистра

IVD REF B06-022/Q	По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Bi Vitrum			
Незабуференный формалин HistoSafe® Бейкера - 2,5 л			
LOT xxxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.	
 MM.ГГГГ			
 MM.ГГГГ			
ПУ № xxxxxx			
Состав: формалин, вода, хлористый кальций			
 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD REF B06-022/Q	По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Незабуференный формалин HistoSafe® Бейкера - 2,5 л			
LOT xxxxxxxx			
 MM.ГГГГ			
 MM.ГГГГ			
ПУ №xxxxxxx	Кол-во штук: _____		
	Масса нетто: _____		
	Масса брутто: _____		
 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Незабуференный формалин HistoSafe® Бейкера - 3,8 л

Первичная упаковка: канистра

IVD	REF	B06-022/R	По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Bi Vitrum					
Незабуференный формалин HistoSafe® Бейкера - 3,8 л					
LOT	xxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч; при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
	MM.гггг				
	MM.гггг				
РУ №	xxxxxx				
Состав: формалин, вода, хлористый кальций					
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD	REF	B06-022/R	По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Незабуференный формалин HistoSafe® Бейкера - 3,8 л					
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:		
	MM.гггг		_____		
	MM.гггг		_____		
РУ №	xxxxxxx		Масса нетто:		

			Масса брутто:		

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Незабуференный формалин HistoSafe® Бейкера - 5 л

Первичная упаковка: канистра

IVD	REF	B06-022/M	По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Bi Vitrum					
Незабуференный формалин HistoSafe® Бейкера - 5 л					
LOT	xxxxxxx			Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.	
	MM.гггг				
	MM.гггг				
РУ № xxxxxx					
Состав: формалин, вода, хлористый кальций					
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD	REF	B06-022/M	По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Незабуференный формалин HistoSafe® Бейкера - 5 л					
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:		
	MM.гггг		_____		
	MM.гггг		_____		
РУ №xxxxxx			Масса нетто:		

			Масса брутто:		

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Незабуференный формалин HistoSafe® Бейкера - 10 л

Первичная упаковка: канистра

IVD REF B06-022/L	По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Bi Vitrum			
Незабуференный формалин HistoSafe® Бейкера - 10 л			
LOT xxxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.	
MM.гггг			
MM.гггг			
РУ № xxxxxx			
Состав: формалин, вода, хлористый кальций			
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD REF B06-022/L	По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Незабуференный формалин HistoSafe® Бейкера - 10 л			
LOT xxxxxxxx			
MM.гггг			
MM.гггг			
РУ №xxxxxxx			
Кол-во штук: _____			
Масса нетто: _____			
Масса брутто: _____			
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Незабуференный формалин HistoSafe® Бейкера - 20 л

Первичная упаковка: канистра

IVD REF B06-022/X	По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Bi Vitrum			
Незабуференный формалин HistoSafe® Бейкера - 20 л			
LOT xxxxxxxx MM.ГГГГ MM.ГГГГ ПУ № xxxxxx	 	Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.	
Состав: формалин, вода, хлористый кальций			
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD REF B06-022/X	По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Незабуференный формалин HistoSafe® Бейкера - 20 л			
LOT xxxxxxxx MM.ГГГГ MM.ГГГГ ПУ №xxxxxxx	 Кол-во штук: _____ Масса нетто: _____ Масса брутто: _____		
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Незабуференный формалин HistoSafe® ФСУ - 1 л

Первичная упаковка: бутылка

Лицевая этикетка

IVD

REF

B06-023/S

Bi Vitrum

Незабуференный
формалин HistoSafe®
ФСУ - 1 л

По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию.
ПУ № xxxxxx

LOT

xxxxxxx

ММ.ГГГГ

ММ.ГГГГ

Состав: формалин,
вода, спирт
изопропиловый,
уксусная кислота

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Оборотная этикетка

IVD

REF

B06-023/S

Bi Vitrum

Краткая инструкция: Внимание: соотношение
ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию
проводить при комнатной температуре.
Максимальная допустимая толщина образца 1
см. При толщине образцов менее 3 мм - время
фиксации должно составлять не менее 5 ч, при
толщине образцов 3 мм и более - время
фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении
формалина кровью и другими
физиологическими жидкостями, фиксатор
необходимо заменить. Описание метода:
Поместить биологический материал в
фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости
от размера образца.

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD

REF

B06-023/S

По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию

Незабуференный формалин HistoSafe® ФСУ - 1 л

LOT

xxxxxxx

ММ.ГГГГ

ММ.ГГГГ

Кол-во штук:

Масса нетто:

Масса брутто:

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Незабуференный формалин HistoSafe® ФСУ - 2,5 л

Первичная упаковка: канистра

IVD	REF	B06-023/Q	По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Bi Vitrum					
Незабуференный формалин HistoSafe® ФСУ - 2,5 л					
LOT	xxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
	ММ.ГГГГ				
	ММ.ГГГГ				
РУ № xxxxxx					
Состав: формалин, вода, спирт изопропиловый, уксусная кислота					
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD	REF	B06-023/Q	По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Незабуференный формалин HistoSafe® ФСУ - 2,5 л					
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:		
	ММ.ГГГГ		_____		
	ММ.ГГГГ		Масса нетто:		
РУ №xxxxxxx			_____		
			Масса брутто:		

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Незабуференный формалин HistoSafe® ФСУ - 3,8 л

Первичная упаковка: канистра

IVD	REF	B06-023/R	По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Bi Vitrum					
Незабуференный формалин HistoSafe® ФСУ - 3,8 л					
LOT	xxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
	ММ.ГГГГ				
	ММ.ГГГГ				
РУ № xxxxxx					
Состав: формалин, вода, спирт изопропиловый, уксусная кислота					
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD	REF	B06-023/R	По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Незабуференный формалин HistoSafe® ФСУ - 3,8 л					
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:		
	ММ.ГГГГ		_____		
	ММ.ГГГГ		Масса нетто:		
РУ №xxxxxxx			_____		
			Масса брутто:		

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Незабуференный формалин HistoSafe® ФСУ - 5 л

Первичная упаковка: канистра

IVD REF B06-023/M

По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию




Bi Vitrum

Незабуференный формалин HistoSafe® ФСУ - 5 л

LOT xxxxxxxx

MM.гггг

MM.гггг



Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.



РУ № xxxxxx

Состав: формалин, вода, спирт
изопропиловый, уксусная
кислота

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD REF B06-023/M

По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017
Для профессионального применения.
Реагент готов к использованию



Незабуференный формалин HistoSafe® ФСУ - 5 л

LOT xxxxxxxx

MM.гггг

MM.гггг



Кол-во штук:

Масса нетто:

Масса брутто:



ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06.
Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru

Незабуференный формалин HistoSafe® ФСУ - 10 л

Первичная упаковка: канистра

IVD	REF	B06-023/L	По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Bi Vitrum					
Незабуференный формалин HistoSafe® ФСУ - 10 л					
LOT	xxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
	MM.ГГГГ				
	MM.ГГГГ				
РУ № xxxxxx					
Состав: формалин, вода, спирт изопропиловый, уксусная кислота					
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD	REF	B06-023/L	По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Незабуференный формалин HistoSafe® ФСУ - 10 л					
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:		
	MM.ГГГГ		_____		
	MM.ГГГГ		Масса нетто: _____		
РУ №xxxxxxx			Масса брутто: _____		
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Незабуференный формалин HistoSafe® ФСУ - 20 л

Первичная упаковка: канистра

IVD	REF	B06-023/X	По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Bi Vitrum					
Незабуференный формалин HistoSafe® ФСУ - 20 л					
LOT	xxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
	мм.гггг				
	мм.гггг				
РУ № xxxxxx					
Состав: формалин, вода, спирт изопропиловый, уксусная кислота					
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD	REF	B06-023/X	По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Незабуференный формалин HistoSafe® ФСУ - 20 л					
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:		
	мм.гггг		_____		
	мм.гггг		_____		
РУ №xxxxxx			Масса нетто:		

			Масса брутто:		

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Незабуференный формалин HistoSafe® FAA - 1 л

Первичная упаковка: бутылка

Лицевая этикетка

IVD	REF	B06-024/S	
Bi Vitrum			
Незабуференный формалин HistoSafe® FAA - 1 л			
По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию. РУ № xxxxxx			
LOT	xxxxxxx	Состав: формалин, вода, спирт изопропиловый, уксусная кислота	
	ММ.ГГГГ		
	ММ.ГГГГ		
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Оборотная этикетка

IVD	REF	B06-024/S	
Bi Vitrum			
Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.			
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Транспортная этикетка на групповую упаковку

IVD	REF	B06-024/S	По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Незабуференный формалин HistoSafe® FAA - 1 л					
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:		
	ММ.ГГГГ		_____		
	ММ.ГГГГ		_____		
РУ №xxxxxx		Масса нетто:	_____		
			Масса брутто:		

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Незабуференный формалин HistoSafe® FAA - 2,5 л

Первичная упаковка: канистра

IVD REF B06-024/Q	По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Bi Vitrum			
Незабуференный формалин HistoSafe® FAA - 2,5 л			
LOT xxxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.	
MM.гггг			
MM.гггг			
РУ № xxxxxx			
Состав: формалин, вода, спирт изопропиловый, уксусная кислота			
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD REF B06-024/Q	По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Незабуференный формалин HistoSafe® FAA - 2,5 л			
LOT xxxxxxxx			
MM.гггг			
MM.гггг			
РУ №xxxxxxx	Кол-во штук: _____		
	Масса нетто: _____		
	Масса брутто: _____		
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Незабуференный формалин HistoSafe® FAA - 3,8 л

Первичная упаковка: канистра

IVD	REF	B06-024/R	По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Bi Vitrum					
Незабуференный формалин HistoSafe® FAA - 3,8 л					
LOT	xxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
	MM.ГГГГ				
	MM.ГГГГ				
РУ №	xxxxxx				
Состав: формалин, вода, спирт изопропиловый, уксусная кислота					
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку:


IVD	REF	B06-024/R	По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Незабуференный формалин HistoSafe® FAA - 3,8 л					
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:		
	MM.ГГГГ		_____		
	MM.ГГГГ		_____		
РУ №	xxxxxxx		Масса нетто:		

			Масса брутто:		



ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Незабуференный формалин HistoSafe® FAA - 5 л

Первичная упаковка: канистра

IVD REF B06-024/M	По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Bi Vitrum			
Незабуференный формалин HistoSafe® FAA - 5 л			
LOT xxxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.	
 ММ.ГГГГ			
 ММ.ГГГГ			
РУ № xxxxxx			
Состав: формалин, вода, спирт изопропиловый, уксусная кислота			
 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD REF B06-024/M	По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Незабуференный формалин HistoSafe® FAA - 5 л			
LOT xxxxxxxx			
 ММ.ГГГГ			
 ММ.ГГГГ			
РУ №xxxxxxx			
Кол-во штук: _____			
Масса нетто: _____			
Масса брутто: _____			
 ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Незабуференный формалин HistoSafe® FAA - 10 л

Первичная упаковка: канистра

IVD REF B06-024/L	По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Bi Vitrum			
Незабуференный формалин HistoSafe® FAA - 10 л			
LOT xxxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.	
MM.гггг			
MM.гггг			
РУ № xxxxxx			
Состав: формалин, вода, спирт изопропиловый, уксусная кислота			
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD REF B06-024/L	По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Незабуференный формалин HistoSafe® FAA - 10 л			
LOT xxxxxxxx			
MM.гггг			
MM.гггг			
РУ № xxxxxx			
Кол-во штук: _____			
Масса нетто: _____			
Масса брутто: _____			
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru			

Незабуференный формалин HistoSafe® FAA - 20 л

Первичная упаковка: канистра

IVD	REF	B06-024/X	По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Bi Vitrum					
Незабуференный формалин HistoSafe® FAA - 20 л					
LOT	xxxxxxx		Краткая инструкция: Внимание: соотношение ткань/фиксатор не менее 1:20. Фиксацию проводить при комнатной температуре. Максимальная допустимая толщина образца 1 см. При толщине образцов менее 3 мм - время фиксации должно составлять не менее 5 ч, при толщине образцов 3 мм и более - время фиксации от 12 до 48 ч. При загрязнении формалина кровью и другими физиологическими жидкостями, фиксатор необходимо заменить. Описание метода: Поместить биологический материал в фиксирующий раствор на 5-48 ч в зависимости от размера образца.		
	ММ.ГГГГ				
	ММ.ГГГГ				
РУ № xxxxxx					
Состав: формалин, вода, спирт изопропиловый, уксусная кислота					
ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

Транспортная этикетка на групповую упаковку:

IVD	REF	B06-024/X	По ТУ 21.20.23-006-89079081-2017 Для профессионального применения. Реагент готов к использованию		
Незабуференный формалин HistoSafe® FAA - 20 л					
LOT	xxxxxxx		Кол-во штук:		
	ММ.ГГГГ		_____		
	ММ.ГГГГ		_____		
РУ №xxxxxxx			Масса нетто:		

			Масса брутто:		

ООО "ЭргоПродакшн". РФ, 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, кор. 39, лит. Н. Тел. +7 (812) 305-06-06. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "БиоВитрум", РФ, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А, тел./факс +7 (812) 305-06-06. www.biovitrum.ru					

прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 22 лист(ов)

Генеральный директор
ООО «ЭргоПродакшн»

Р.В. Аносов
2019 г.

