

СДЕНА

и Росздравнадзора

09 2009 г № 7123-11/08

Начальник Управления
регистрации и обеспечения
качества лекарственных средств
ФГУП «НПО «Микроген»

С.А.Коровкин

« 26 » 09 2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

гидролизата казеина средней степени расщепления кислотного сухого»

НАЗНАЧЕНИЕ

Гидролизат казеина средней степени расщепления кислотный сухой»
назначен для использования в качестве белковой основы при изготовле-
нии питательных сред.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидролизат казеина средней степени расщепления кислотного сухого»
используется при изготовлении различных питательных сред на основе гидролизата
казеина средней степени расщепления кислотного сухого. Его количественное
количество определяется рецептурой конкретной питательной среды.

УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты роста бактерий на питательных средах, содержащих
гидролизат казеина средней степени расщепления кислотный сухой» прово-
дятся в соответствии с требованиями.

ФОРМА ВЫПУСКА

Гидролизат казеина средней степени расщепления кислотного сухого»
выпускается в полиэтиленовых банках по 110 г.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

ение - в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 в герметично закрытой упаковке, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 °С.

портирование - в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре С.

годности – 3 года. По истечению срока годности «Гидролизат ка-ней степени расщепления кислотный сухой» использованию не под-

вия отпуска – для лечебно-профилактических и санитарно-ических учреждений.

ации на качество препарата в течение срока годности направлять в УИ Государственный научно-исследовательский институт стандар-контроля медицинских биологических препаратов им. Л.А. Тарасе-требнадзора: 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 41, 1-39-22, факс: (499) 241-92-38 и в адрес предприятия - про-ФГУП «НПО «Микроген», Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-ая Ду-15, тел (495) 710-37-87.

ный за производство:

ехнолог филиала
Ю «Микроген»
сала

Э. Б. Омарова

Э. Б. Омарова

« » 200 г.



В. Смачков

Гидролизат казеина средней степени расщепления кислотный сухой

Маркировка на этикетке банки:

Способ приготовления: При изготовлении различных питательных сред на основе гидролизата казеина средней степени расщепления кислотного сухого следует руководствоваться рецептурой конкретной питательной среды. Дополнительная информация в Инструкции по применению С Дата изготовления Годен до Масса нетто г	МИКРОХИТЕН ФГУП «НПО «Микротен» Россия, 115088, г. Москва ул. 1-ая Дубровская, д. 15 тел. (495) 710-37-87 Адрес производства: Россия, 367025, г. Махачкала ул. Леваневского, д. 24 тел. (8722) 62-47-79	Гидролизат казеина средней степени расщепления кислотный сухой Гигроскопичен. Хранить в герметично закрытой упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 °С ТУ 9385-097-14237183-09 Р. № Дата регистрации	Для диагностики in vitro Для лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждений
--	---	---	---

