


СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор


ООО «МИРУС МЕДИКАЛ»


Никосилов М.Б.
« 28 » мая 20 21 г.



Фотографии медицинского изделия «Карта выявления антител и белков системы комплемента на эритроцитах человека методом колоночной агглютинации «Селлбайнд Дайрект (IgG,C3d,контроль)», 48x2 тестов (Cellbind Direct (IgG,C3d,ctr.))»

Производства «Санквин Реагентс Б.В.» (Sanquin Reagents B.V.), Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam, Нидерланды



Sanguin Plemanlaan 125 1066 CX Amsterdam NL

Cellbind Direct

48 x 6
0035

IVD 2-8°C REF K7011
LOT 40218 2019-07-22

CE

- (en) Please store the cards in an upright position! Replace lid after use. This side up!
- (bg) Моля, съхранявайте картите в изправено положение! Заменете капачка след употреба. Тази страна нагоре!
- (cs) Karty ukládajte ve zvislé poloze. Po použití znovu uzavřete krytem. Touto stranou nahoru!
- (da) Opbevar venligst kortene i opret stilling! Sæt låget på igen efter brug. Denne side op!
- (de) Die Karten in senkrechter Position aufbewahren! Deckel nach Gebrauch wieder anbringen. Oben!
- (el) Παράκαλεστε να αποθηκεύετε τις κάρτες σε όρθια θέση! Βάλτε το καπάκι μετά από τη χρήση. Τα τοίχεύστε με αυτήν τη φάση!
- (es) Guardar las tarjetas en posición vertical! Volver a colocar la tapa antes de usar. Este lado hacia arriba!
- (fr) Veuillez conserver les cartes en position verticale! Remplacez le couvercle après usage. Ce côté-ci doit être en haut!
- (hu) Kérjük a kártyákat álló helyzetben tárolni! Használat után helyezze vissza a doboz fedelét. A nyíl a doboz oldalán fölfelé mutat!
- (it) Conservare le schede in posizione verticale! Dopo l'uso rimettere a posto il coperchio. Alto!
- (lv) Līdzu, uzglabāiet kārtis vertikālā stāvoklī. Pēc lietošanas, nomainiet vāciņu. Šī puse augšup!
- (no) Vennligst oppbevar kortene i stående stilling! Sett på lokket etter bruk. Denne siden opp!
- (pl) Proszę przechowywać karty w pozycji pionowej! Po użyciu wymienić pokrywę. Ta strona u góry!
- (pt) Manterha por favor os cartões na posição vertical! Volte a colocar a tampa após a utilização. Este lado deve ficar voltado para cima!
- (ro) Păstrați cardurile în poziție verticală! Puneți capacul la loc după utilizare. Cu partea aceasta în sus!
- (sk) Karty uchovávať vo zvislej polohe. Po použití znova uzavrite krytom. Touto stranou hore!
- (sr) Čuvajte kartice u uspravnom položaju! Vratite poklopac nakon upotrebe. Ova strana treba da bude okrenuta prema gore!
- (sv) Förvara korten i upprätt position! Sätt på locket efter användning. Denna sida uppåt!
- (tr) Lütfen kartları dik şekilde saklayın! Kullanımdan sonar kapağını tekrar kapatın. Bu taraf yukarı gelecek!

Содержимое потребительской упаковки Изделия

Важно!
 Лекарственное средство в виде таблеток предназначено для приема внутрь. Таблетки принимают по 1-2 таблетки 3-4 раза в день, запивая достаточным количеством воды. Курс лечения составляет 14 дней. Если симптомы не исчезли, необходимо обратиться к врачу.

Способ применения и дозы:
 Взрослым и подросткам старше 16 лет: по 1-2 таблетки 3-4 раза в день, запивая достаточным количеством воды.

1. Взрослым и подросткам старше 16 лет: по 1-2 таблетки 3-4 раза в день, запивая достаточным количеством воды.
2. Детям в возрасте от 6 до 15 лет: по 1 таблетке 3-4 раза в день, запивая достаточным количеством воды.
3. Детям в возрасте от 3 до 5 лет: по 1/2 таблетки 3-4 раза в день, запивая достаточным количеством воды.
4. Детям в возрасте от 1 до 3 лет: по 1/4 таблетки 3-4 раза в день, запивая достаточным количеством воды.
5. Детям в возрасте до 1 года: по 1/8 таблетки 3-4 раза в день, запивая достаточным количеством воды.

Противопоказания:
 Гиперчувствительность к компонентам препарата, заболевания желудочно-кишечного тракта, беременность, период лактации.

Побочные действия:
 Головная боль, головокружение, тошнота, рвота, диарея, запор, метеоризм, диспепсия, боль в животе, аллергические реакции.

Важно!
 Лекарственное средство в виде таблеток предназначено для приема внутрь. Таблетки принимают по 1-2 таблетки 3-4 раза в день, запивая достаточным количеством воды. Курс лечения составляет 14 дней. Если симптомы не исчезли, необходимо обратиться к врачу.

Способ применения и дозы:
 Взрослым и подросткам старше 16 лет: по 1-2 таблетки 3-4 раза в день, запивая достаточным количеством воды.

1. Взрослым и подросткам старше 16 лет: по 1-2 таблетки 3-4 раза в день, запивая достаточным количеством воды.
2. Детям в возрасте от 6 до 15 лет: по 1 таблетке 3-4 раза в день, запивая достаточным количеством воды.
3. Детям в возрасте от 3 до 5 лет: по 1/2 таблетки 3-4 раза в день, запивая достаточным количеством воды.
4. Детям в возрасте от 1 до 3 лет: по 1/4 таблетки 3-4 раза в день, запивая достаточным количеством воды.
5. Детям в возрасте до 1 года: по 1/8 таблетки 3-4 раза в день, запивая достаточным количеством воды.

Противопоказания:
 Гиперчувствительность к компонентам препарата, заболевания желудочно-кишечного тракта, беременность, период лактации.

Побочные действия:
 Головная боль, головокружение, тошнота, рвота, диарея, запор, метеоризм, диспепсия, боль в животе, аллергические реакции.


Важно!
 Лекарственное средство в виде таблеток предназначено для приема внутрь. Таблетки принимают по 1-2 таблетки 3-4 раза в день, запивая достаточным количеством воды. Курс лечения составляет 14 дней. Если симптомы не исчезли, необходимо обратиться к врачу.

Способ применения и дозы:
 Взрослым и подросткам старше 16 лет: по 1-2 таблетки 3-4 раза в день, запивая достаточным количеством воды.

1. Взрослым и подросткам старше 16 лет: по 1-2 таблетки 3-4 раза в день, запивая достаточным количеством воды.
2. Детям в возрасте от 6 до 15 лет: по 1 таблетке 3-4 раза в день, запивая достаточным количеством воды.
3. Детям в возрасте от 3 до 5 лет: по 1/2 таблетки 3-4 раза в день, запивая достаточным количеством воды.
4. Детям в возрасте от 1 до 3 лет: по 1/4 таблетки 3-4 раза в день, запивая достаточным количеством воды.
5. Детям в возрасте до 1 года: по 1/8 таблетки 3-4 раза в день, запивая достаточным количеством воды.

Противопоказания:
 Гиперчувствительность к компонентам препарата, заболевания желудочно-кишечного тракта, беременность, период лактации.

Побочные действия:
 Головная боль, головокружение, тошнота, рвота, диарея, запор, метеоризм, диспепсия, боль в животе, аллергические реакции.





IgG C3d Ctrl. IgG C3d Ctrl.

01923

LOT

40218



2019-07-22




КОПИЯ ВЕРНА.

Прошито, пронумеровано

5 (млсб) листов

Генеральный директор

ООО «МИРУС МЕДИКАЛ»



М.Б. Покотилов