


«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель отдела регистрации
ООО «Дельта Медикел»


Т.В. Прохорова
«11» февраля 2022 г.
М.П.



**МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Пластырь обезболивающий «Салонпас», размер: 12,35~13,65 см x 7,98~8,82 см; 6,18~6,83 см x 3,99~4,41 см

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. (Хисамитсу Фармасьютикал Ко., Инк.)
408 Tashirodaikan-machi, Tosu, Saga, Japan (Япония)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Дельта Медикел» (ООО «Дельта Медикел»)
123001, г. Москва, Трёхпрудный пер., д.4, стр.1

1-Макет маркировки упаковки (единственная, пакетик)
 медицинского изделия: Пластырь обезболивающий «Салонпас», размер: 13,0 см х 8,4 см



← РАЗРЕЗАТЬ И ВСКРЫТЬ ЗДЕСЬ → ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПЕРЕГНУТЬ ДВАЖДЫ	
Меры предосторожности Использовать строго по назначению. Избегать контакта с глазами и слизистыми оболочками. Не применять на поврежденных участках кожи и раневых поверхностях, на участках кожи с высыпаниями, при аллергических реакциях на аспирин и салицилаты, совместно с грелкой.	
Необходима предварительная консультация специалиста - при сверхчувствительности на средства наружного применения, - детям до 12 лет, - при беременности и кормлении грудью.	
Прекратить использование и обратиться к специалисту при ухудшении состояния, при сохранении симптомов в течение 7 дней, появлении сыпи, зуда или сильного раздражения кожи.	
Немедленно обратиться за медицинской помощью в случае случайного проглатывания. Упаковка не защищена от случайного вскрытия детьми.	
Условия хранения хранить при температуре не выше 30°C, в защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте.	Серия _____ Дата изготовления _____ Годен до _____
Активные вещества Метилсалицилат6,3% Камфора1,2% Левоментол5,7% Альфа-токоферола ацетат.....2,0%	
® Зарегистрированный товарный знак Рег. уд.: ФСЗ 2009/03799 от XX.XX.XXXX 3L709T-38	
СДЕЛАНО В ЯПОНИИ 10 ПЛАСТЫРЕЙ 6,5см х 4,2см	
	
Показания к применению Только для наружного применения! острых и хронических болей и воспалительных реакций в мышцах, спине; при малоподвижности плечевого сустава, ушибах, растяжениях, вывихах, артрите, переломах, при незначительных обморожениях.	
Способ применения Взрослым и детям с 12 лет пластырь наклеивается на предварительно очищенный и сухой участок пораженной не чаще 3-4 раз в день. Держать не более 8 часов. Детям до 12 лет перед применением необходима консультация специалиста.	
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПЕРЕГНУТЬ ДВАЖДЫ ← РАЗРЕЗАТЬ И ВСКРЫТЬ ЗДЕСЬ →	

3-Макет маркировки потребительской упаковки (коробка)
 медицинского изделия: Пластырь обезболивающий «Салонпас», размер: 6,5 см х 4,2 см



Прошито пронумеровано и скреплено
печатью 4 листа(ов).

Руководитель отдела регистрации ООО
«Дельта Медикел» Прохорова Л.В.

(подпись)

« 14 » февраля 2022 года

