



Фотографические изображения

Реагент для количественного определения фибриногена в плазме клоттинговым методом по Clauss (STA[®] - Liquid Fib), в составе:


1. Титрованный кальциевый тромбин человека, содержащий специфический ингибитор гепарина – 12 фл.
2. Лист значений со штрих-кодом – 1 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: DIAGNOSTICA STAGO S.A.S. / «ДИАГНОСТИКА СТАГО С.А.С.», Франция



1. Титрованный кальциевый тромбин человека, содержащий специфический ингибитор гепарина – 12 фл.





STA[®] - LIQUID FIB

REF



A3258900008730223A

A41



A000740A

LOT

258909

Code Réactif
Reagent Code

12322



2023-02-26

Etalonnage/Assay Calibration

1.001

000001 - 2010.05

Stago

2. Лист значений со штрих-кодом – 1 шт.

3. Инструкция по применению — 1 шт.

ВВЕДЕНИЕ

Данная инструкция предназначена для использования в качестве справочного материала при работе с препаратом. В ней содержатся основные сведения о препарате, его свойствах, способах применения, мерах безопасности и т.д.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Препарат предназначен для лечения заболеваний, вызванных бактериями. Он обладает широким спектром действия и применяется в виде таблеток.

2. СОСТАВ

Активное вещество: 100 мг.

Вспомогательные вещества: лактоза, целлюлоза, крахмал, тальк, стеарат кальция.

3. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Взрослым: по 1 таблетке 3-4 раза в день после еды.

Детям: по 1/2 таблетки 3-4 раза в день после еды.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

5. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Возможны аллергические реакции, диарея, тошнота, рвота.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Препарат несовместим с алкоголем и некоторыми другими лекарствами.

7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

8. СРОК ГОДНОСТИ

3 года.

9. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат следует принимать в соответствии с инструкцией. Не превышать рекомендуемую дозу.

10. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегать употребления алкоголя и других препаратов, которые могут взаимодействовать с данным препаратом.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат не содержит сахара и не вызывает привыкания.

12. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО ЦИРМИ, г. Москва.

13. АДРЕС

г. Москва, ул. Ленина, д. 1.

14. ТЕЛЕФОН

+7 (495) 123-45-67.

15. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

info@cirmi.ru

16. САЙТ

www.cirmi.ru

17. ПРОЦЕДУРА ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат следует принимать в соответствии с инструкцией. Не превышать рекомендуемую дозу.

18. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегать употребления алкоголя и других препаратов, которые могут взаимодействовать с данным препаратом.

19. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат не содержит сахара и не вызывает привыкания.

20. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат следует принимать в соответствии с инструкцией. Не превышать рекомендуемую дозу.

21. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегать употребления алкоголя и других препаратов, которые могут взаимодействовать с данным препаратом.

22. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат не содержит сахара и не вызывает привыкания.

23. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО ЦИРМИ, г. Москва.

24. АДРЕС

г. Москва, ул. Ленина, д. 1.

25. ТЕЛЕФОН

+7 (495) 123-45-67.

26. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

info@cirmi.ru

27. САЙТ

www.cirmi.ru

28. ПРОЦЕДУРА ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат следует принимать в соответствии с инструкцией. Не превышать рекомендуемую дозу.

29. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегать употребления алкоголя и других препаратов, которые могут взаимодействовать с данным препаратом.

30. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат не содержит сахара и не вызывает привыкания.

31. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат следует принимать в соответствии с инструкцией. Не превышать рекомендуемую дозу.

32. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегать употребления алкоголя и других препаратов, которые могут взаимодействовать с данным препаратом.

33. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат не содержит сахара и не вызывает привыкания.

34. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО ЦИРМИ, г. Москва.

35. АДРЕС

г. Москва, ул. Ленина, д. 1.

36. ТЕЛЕФОН

+7 (495) 123-45-67.

37. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

info@cirmi.ru

38. САЙТ

www.cirmi.ru

39. ПРОЦЕДУРА ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат следует принимать в соответствии с инструкцией. Не превышать рекомендуемую дозу.

40. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегать употребления алкоголя и других препаратов, которые могут взаимодействовать с данным препаратом.

41. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат не содержит сахара и не вызывает привыкания.

42. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат следует принимать в соответствии с инструкцией. Не превышать рекомендуемую дозу.

43. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегать употребления алкоголя и других препаратов, которые могут взаимодействовать с данным препаратом.

44. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат не содержит сахара и не вызывает привыкания.

45. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО ЦИРМИ, г. Москва.

46. АДРЕС

г. Москва, ул. Ленина, д. 1.

47. ТЕЛЕФОН

+7 (495) 123-45-67.

48. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

info@cirmi.ru

49. САЙТ

www.cirmi.ru

50. ПРОЦЕДУРА ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат следует принимать в соответствии с инструкцией. Не превышать рекомендуемую дозу.



Instructions For Use (IFU)
and
Safety Data Sheets (SDS)

STAG - LIQUID FIB
(REF 00673)

e-code: 0067307201905

IFU version 07 - May 2019

www.stago.com/IFU



Select your country

Country:

Type your e-code

E-code:

Select the language

Language:

Australia +61 1800 984 422
Austria +43 125 3030 340
Belgium +32 (0)2 512 30 32
Brazil +55 11 4410 4622
Canada +1 888 283 0175
China 800 8109 796
France +33 1 46 88 20 02
Germany +49 211 913237-77

Italy +39 02 49588523

Netherlands +31 (0)71 890 04 63

New Zealand +64 0508 984 422

Portugal +351 800 91 36 94

Spain +34 900 87 87 15

Switzerland 0800 22 99 88



UK +44 800 008 7786

US 800-725-0607 or 800-222-COAG

Other countries please contact your local representative

Reagent preparation & Storage

• STA Line ☐ § 7



10 days on STA-S*,
STA Compact* &
STA Sotellita*

2 months
18°C



• Manual / Semi-automatic method ☐ § 14.1



Stago

ООО «ГЕМОСТАТИКА»
Прошито и пронумеровано,
скреплено печатью на 7 л.
Генеральный директор
_____ Карапетян В.К.

