

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия и
фотографические изображения упаковок в развернутом виде.

**Лейкопластырь медицинский бактерицидный
в вариантах исполнения**

Уполномоченный
представитель на
территории РФ

ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва,
вн.тер.г. Муниципальный округ Басманный,
ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64,
помещ. 3Н/6

8 (495) 665-80-58, info@spectrumnutrition.ru.

Генеральный директор ООО «СПЕКТРУМ»

Федюнина Мария Александровна

11.06.2024

М.П.



(Подпись)

Пример фотографического изображения варианта исполнения:
CONSUMED лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
CONSUMED

consumed

CONSUMED лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе.
Кол-во: 20 шт. в упаковке. Размер: 7,2 см x 1,9 см.

Для защиты раны от попадания загрязнений при ссадинах, порезах и мелких повреждениях кожи;

Для дезинфекции и последующему быстрому заживлению раны без образования рубцов. Применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях, при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи).

Для наружного применения. Рекомендуется менять ежедневно или при намокании подушечки. Антисептик: бензалкония хлорид.

Состав: нетканая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, антисептик: бензалкония хлорид, пористая пленка, защитная бумага.

Способ применения: 1. Вымыть руки перед использованием изделия; 2. Открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря; 3. После извлечения лейкопластыря из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей); 4. Приложить повязку к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Побочные действия: Возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия.

Правила хранения: Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Стерильно. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Не использовать по истечению срока годности (5 лет).




Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

Стерилизация оксидом этилена.

Регистрационное удостоверение № XXX от дд.мм.гггг

PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброничка 1257, Кунратце, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. 8 (495) 665-80-58, info@spectrumnutrition.ru.



Дата изготовления: / Mfg date:

Годеи до: / Use before:

Партия №: / LOT:

LOT	

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
 CONSUMED лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе



Пример фотографического изображения варианта исполнения:
CONSUMED лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной
основе



consumed

CONSUMED лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе.
Кол-во: 20 шт. в упаковке. Размер: 3,8 см x 3,8 см - 5 шт.; 7,2 см x 1,9 см - 15 шт.
Для защиты раны от попадания загрязнений при ссадинах, порезах и мелких повреждениях кожи;

Для дезинфекции и последующему быстрому заживлению раны без образования рубцов. Применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях, при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи).

Для наружного применения. Рекомендуется менять ежедневно или при намокании подушечки. Антисептик: бензалкония хлорид.

Состав: полимерная основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, антисептик: бензалкония хлорид, пористая пленка, защитная бумага.

Способ применения: 1. Вымыть руки перед использованием изделия; 2. Открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря; 3. После извлечения лейкопластыря из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей); 4. Приложить повязку к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Побочные действия: Возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия.

Правила хранения: Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Стерильно. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Не использовать по истечению срока годности (5 лет).

Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

Стерилизация оксидом этилена.


Регистрационное удостоверение № XXX от дд.мм.гггг

PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 /
Фармлайн ООО, Доброничка 1257, Кунратиче, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.:
+420608196035. Сделано в Чехии.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г.
Муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6.
8 (495) 665-80-58, info@spectrumnutrition.ru.



Дата изготовления: / Mfg date:
Годен до: / Use before:
Партия №: / LOT:



МФ	
С	
ЛОТ	

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
CONSUMED

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
CONSUMED лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе



Пример фотографического изображения варианта исполнения:
CONSUMED лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе



consumed

CONSUMED лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе.
Кол-во: 20 шт. в упаковке. Размер: 5,6 см x 1,9 см - 5 шт.; 7,2 см x 1,9 см - 10 шт.;
ø2,2 см - 5 шт. Для защиты раны от попадания загрязнений при ссадинах, порезах и
мелких повреждениях кожи;

Для дезинфекции и последующему быстрому заживлению раны без образования
рубцов. Применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических
учреждениях, при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин,
порезов и иных мелких повреждений кожи).

Для наружного применения. Рекомендуется менять ежедневно или при намокании
подушечки. Антисептик: бензалкония хлорид.

Состав: тканевая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, антисептик:
бензалкония хлорид, пористая пленка, защитная бумага.

Способ применения: 1. Вымыть руки перед использованием изделия; 2. Открыть
индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря; 3. После извлечения
лейкопластыря из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу,
защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно
соприкасается с кожей); 4. Приложить повязку к ране и легко прижать края
лейкопластыря к коже вокруг раны.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Побочные действия: Возможна аллергическая реакция при индивидуальной
непереносимости компонентов, входящих в состав изделия.

Правила хранения: Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C
и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Стерильно. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие
после использования. Не использовать по истечению срока годности (5 лет).

Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

Стерилизация оксидом этилена.



Регистрационное удостоверение № XXX от дд.мм.гггг

PharmLine s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 /
Фармлайн ООО, Доброничка 1257, Кунратиче, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.:
+420608196035. Сделано в Чехии.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г.
Муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6.
8 (495) 665-80-58, info@spectrumnutrition.ru.



Дата изготовления: / Mfg date:
Годен до: / Use before:
Партия №: / LOT:



DATE	
EXP	
LOT	

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
CONSUMED

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
 CONSUMED лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе



Пример фотографического изображения варианта исполнения:
Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе



ДОКТОР ПЛАСТ®

Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе.
Кол-во: 20 шт. в упаковке. Размер: 2,2 см x 7,2 см.

Для защиты раны от попадания загрязнений при ссадинах, порезах и мелких повреждениях кожи;

Для дезинфекции и последующему быстрому заживлению раны без образования рубцов. Применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях, при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи).

Для наружного применения. Рекомендуется менять ежедневно или при намокании подушечки. Антисептик: бензалкония хлорид.

Состав: нетканая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, антисептик: бензалкония хлорид, пористая пленка, защитная бумага.

Способ применения: 1. Вымыть руки перед использованием изделия; 2. Открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря; 3. После извлечения лейкопластыря из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей); 4. Приложить повязку к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Побочные действия: Возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия.

Правила хранения: Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Стерильно. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Не использовать по истечению срока годности (5 лет).

Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

Стерилизация оксидом этилена.

Регистрационное удостоверение № XXX от дд.мм.гггг


PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 /
Фармлайн ООО, Доброничка 1257, Кунратиче, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.:
+420608196035. Сделано в Чехии.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г.
Муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6.
8 (495) 665-80-58, info@spectrumnutrition.ru.



0 000000 000000

Дата изготовления: / Mfg date:
Годен до: / Use before:
Партия №: / LOT:



MD	
LOT	

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
ДОКТОР ПЛАСТ

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
 Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе



Пример фотографического изображения варианта исполнения:

Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе



ДОКТОР ПЛАСТ®

Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе.
Кол-во: 20 шт. в упаковке. Размер: 5,6 см х 1,9 см.

Для защиты раны от попадания загрязнений при ссадинах, порезах и мелких повреждениях кожи;

Для дезинфекции и последующему быстрому заживлению раны без образования рубцов. Применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях, при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи).

Для наружного применения. Рекомендуется менять ежедневно или при намокании подушечки. Антисептик: бензалкония хлорид.

Состав: полимерная основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, антисептик: бензалкония хлорид, пористая пленка, защитная бумага.

Способ применения: 1. Вымыть руки перед использованием изделия; 2. Открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря; 3. После извлечения лейкопластыря из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей); 4. Приложить повязку к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Побочные действия: Возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия.

Правила хранения: Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Стерильно. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Не использовать по истечению срока годности (5 лет).

Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

Стерилизация оксидом этилена.


Регистрационное удостоверение № XXX от дд.мм.гггг

PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 /
Фармлайн ООО, Доброничка 1257, Кунратиче, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.:
+420608196035. Сделано в Чехии.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г.
Муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6.
8 (495) 665-80-58, info@spectrumnutrition.ru.



Дата изготовления: / Mfg date:
Годен до: / Use before:
Партия №: / LOT:



LOT	

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
ДОКТОР ПЛАСТ

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
 Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе



Пример фотографического изображения варианта исполнения:

Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе



ДОКТОР ПЛАСТ

Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе.
Кол-во: 10 шт. в упаковке. Размер: 7,6 см x 1,9 см.

Для защиты раны от попадания загрязнений при ссадинах, порезах и мелких повреждениях кожи;

Для дезинфекции и последующему быстрому заживлению раны без образования рубцов. Применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях, при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи).

Для наружного применения. Рекомендуется менять ежедневно или при намокании подушечки. Антисептик: бензалкония хлорид.

Состав: тканевая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, антисептик: бензалкония хлорид, пористая пленка, защитная бумага.

Способ применения: 1. Вымыть руки перед использованием изделия; 2. Открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря; 3. После извлечения лейкопластыря из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей); 4. Приложить повязку к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Побочные действия: Возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия.

Правила хранения: Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Стерильно. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Не использовать по истечению срока годности (5 лет).

Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

Стерилизация оксидом этилена.


Регистрационное удостоверение № XXX от дд.мм.гггг

PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 /
Фармлайн ООО, Доброничка 1257, Кунратиче, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.:
+420608196035. Сделано в Чехии.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г.
Муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6.
8 (495) 665-80-58, info@spectrumnutrition.ru.



Дата изготовления: / Mfg date:
Годен до: / Use before:
Партия №: / LOT:



MFG	
EXP	
LOT	

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
ДОКТОР ПЛАСТ

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
 Доктор Пласт лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе



Пример фотографического изображения варианта исполнения:
FineLife лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе





FineLife лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе.
Кол-во: 20 шт. в упаковке. Размер: 7,2 см x 1,9 см.

Для защиты раны от попадания загрязнений при ссадинах, порезах и мелких повреждениях кожи;

Для дезинфекции и последующему быстрому заживлению раны без образования рубцов. Применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях, при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи).

Для наружного применения. Рекомендуется менять ежедневно или при намокании подушечки. Антисептик: бензалкония хлорид.

Состав: полимерная основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, антисептик: бензалкония хлорид, пористая пленка, защитная бумага.

Способ применения: 1. Вымыть руки перед использованием изделия; 2. Открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря; 3. После извлечения лейкопластыря из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей); 4. Приложить повязку к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Побочные действия: Возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия.

Правила хранения: Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Стерильно. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Не использовать по истечению срока годности (5 лет).

Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3.684-21.

Стерилизация оксидом этилена.

Регистрационное удостоверение № XXX от дд.мм.гггг

PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 /
Фармлайн ООО, Доброницка 1257, Кунратиче, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.:
+420608196035. Сделано в Чехии.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г.
Муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6.
8 (495) 665-80-58, info@spectrumnutrition.ru.




0 000000 000000

Дата изготовления: / Mfg date:

Годен до: / Use before:

Партия №: / LOT:



MD	STERILE	EO	2
0123			
4°C			
25°C			
PAP			

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
FineLife лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе



Пример фотографического изображения варианта исполнения:
Firstaid лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе





Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения Firstaid лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе для комплектации в количестве 20 шт., размер, см: 1,9x7,2.



Пример фотографического изображения варианта исполнения:
 Firstaid лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе
 для комплектации в количестве 6 шт., размер, см: 1,9х7,2.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ВАШЕМ ДОМЕ



6
ШТУК

Firstaid лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе. **Кол-во:** 6 шт. в упаковке. **Размер, см:** 1,9 х 7,2. Для защиты раны от попадания загрязнений при ссадинах, порезах и мелких повреждениях кожи; для дезинфекции и последующего быстрого заживления раны без образования рубцов. Применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях, при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи). Для наружного применения. Рекомендуется менять ежедневно или при намокании подушечки. **Антисептик:** бензалкония хлорид. **Состав:** полимерная основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, антисептик: бензалкония хлорид, пористая пленка, защитная бумага. **Способ применения:** вымыть руки перед использованием изделия; открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря; после извлечения пластыря из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей); приложить повязку к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость. **Побочные действия:** возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия. **Правила хранения:** хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерильно. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Стерилизация оксидом этилена.

РУ №

■ **Производитель:** PharmLine s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / «Фармлайн ООО», Доброничка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035.

■ **Место производства:** Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., LTD, (Джедзианг Хонгу Медикал Коммодити Ко, ЛТД) NO.668 ChangHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, People's Republic of China.

■ **Уполномоченный представитель на территории РФ:** ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: + 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.

БУДЬ ЗДОРОВ!

Размеры:

6 шт.

72х19 мм

Дата изготовления:/Mfg date:

Годен до:/Use before:

Партия №:/LOT:



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ВАШЕМ ДОМЕ

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

БАКТЕРИЦИДНЫЙ
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМЫЙ

СТАНДАРТНЫЙ
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ









Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения Firstaid лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе для комплектации в количестве 6 шт., размер, см: 1,9х7,2.



Пример фотографического изображения варианта исполнения:
Firstaid лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе
для комплектации в количестве 10 шт., размер, см: 2,5х5,6.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ВАШЕМ ДОМЕ

FIRST AID

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ

10 ШТУК

FIRST AID

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ВАШЕМ ДОМЕ

Firstaid лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе. **Кол-во:** 10 шт. в упаковке. **Размер, см:** 2,5 x 5,6. Для защиты раны от попадания загрязнений при ссадинах, порезах и мелких повреждениях кожи; для дезинфекции и последующего быстрого заживления раны без образования рубцов. Применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях, при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи). Для наружного применения. Рекомендуется менять ежедневно или при намокании подушечки. **Антисептик:** бензалкония хлорид. **Состав:** полимерная основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, антисептик: бензалкония хлорид, пористая пленка, защитная бумага. **Способ применения:** вымыть руки перед использованием изделия; открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря; после извлечения пластыря из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей); приложить повязку к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость. **Побочные действия:** возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия. **Правила хранения:** хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °C до +25 °C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерильно. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21. Стерилизация оксидом этилена.

РУ №

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / «Фармлайн ООО», Доброничка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Tel.: +420608196035.

Место производства: Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., LTD, (Джедзианг Хонгу Медикал Коммодити Ко, ЛТД) NO.668 ChanHua Road, Fotang Town Industrial Functional Area 322002 Yiwu City, Zhejiang Province, People's Republic of China.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.


Размеры:

10 шт.

56x25 мм

БУДЬ ЗДОРОВ!

STERILE EO



FIRST AID ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ВАШЕМ ДОМЕ	FIRST AID ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ВАШЕМ ДОМЕ	FIRST AID ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ВАШЕМ ДОМЕ
ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ	ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ	FIRST AID ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ВАШЕМ ДОМЕ
10 ШТУК	10 ШТУК	РАЗМЕРЫ: 10 шт. 56x25 мм БУДЬ ЗДОРОВ! STERILE EO CE 0123 0 000000 000000 Дата изготовления/Mfg date: Годен до:/Use before: Партия №/LOT:

Пример фотографического изображения варианта исполнения:

Firstaid лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе
для комплектации в количестве 20 шт., размер, см: 1,9х7,2 – 8 шт., 2,2х7,5 – 6
шт., 4х1 – 4 шт., диаметр 2,3 – 2 шт.





Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения Firstaid лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе для комплектации в количестве 20 шт., размер, см: 1,9х7,2 – 8 шт., 2,2х7,5 – 6 шт., 4х1 – 4 шт., диаметр 2,3 – 2 шт.



Пример фотографического изображения варианта исполнения:
Firstaid лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе







Пример фотографического изображения варианта исполнения:

MASTER UNI лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе






МАСТЕР ЮНИ СЕНСИТИВ

**Впитывающая
подушечка**
сохраняет рану сухой

**Атравматичная
сеточка***
не прилипает к ране

**Гипоаллергенный
клей**
не вызывает аллергии

**Дышащая
и мягкая основа**



Для защиты раны от попадания загрязнений при ссадинах, порезах и мелких повреждениях кожи. Для дезинфекции и последующего быстрого заживления раны без образования рубцов. Применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях, при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждениях кожи). Для наружного применения. Рекомендуется менять ежедневно или при намокании подушечки.

Антисептик: бензалкония хлорид.

Состав: нетканая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, антисептик: бензалкония хлорид, пористая пленка, защитная бумага.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Побочные действия: Возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия.

* Пористая пленка

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

А. Вымыть руки перед использованием изделия.

Б. Открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря.

В. После извлечения пластыря из единичной упаковки устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей).

Г. Приложить повязку к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.

Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерильно. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования.

Утилизация в соответствии с СанПин 21.3684-21. Стерилизация оксидом этилена.

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
MASTER UNI лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе
для комплектации в количестве 20 шт., размер, см: 7,2x1,9



Пример фотографического изображения варианта исполнения:
MASTER UNI лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе
для комплектации в количестве 20 шт., размер, см: 7,2х1,9





Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
 MASTER UNI лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе
 для комплектации в количестве 20 шт., размер, см: 7,2x1,9.



МАСТЕР ЮНИ СЕМЕЙНЫЙ

Впитывающая подушечка сохраняет рану сухой

Атравматичная сеточка* не прилипает к ране

Гипоаллергенный клей не вызывает аллергии

Дышащий и мягкий

MASTER UNI лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе, см: 7,2x1,9. Кол-во: 20 шт.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для защиты раны от попадания загрязнений при создании пореза и мелких порезах кожи.

Для дезинфекции и последующего быстрого заживления раны без образования рубца.

Применяется в домашних условиях, как в лечебно-профилактических учреждениях, при оказании неотложной медицинской помощи (создав повязку и минимальное повреждение кожи).

Для наружного применения. Рекомендуется мочить, вазелином или при намокании подушечки.

Антисептик: безалкогольный хлоргексидин.

Состав: нетканая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, антисептический барьерный слой, перфорация, защитная сетка.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Побочные действия: Возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия.

* Перфорация сетки.

РУ № _____ ОТ _____

Пример фотографического изображения варианта исполнения:
MASTER UNI лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной
основе



20

лейкопластырей

7,2 x 1,9 см

20 шт.

реальный размер

STERILE EO

Стерильно до момента вскрытия

МАСТЕР ЮНИ

ТРАВЕЛ КИТ

Впитывающая подушечка
сохраняет рану сухой

Атравматичная сеточка*
не прилипает к ране

Гипоаллергенный клей
не вызывает аллергии

Защита от влаги
защищает рану от попадания воды



Для защиты раны от попадания загрязнений при ссадинах, порезах и мелких повреждениях кожи;
Для дезинфекции и последующего быстрого заживления раны без образования рубцов.
Применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи).
Для наружного применения. Рекомендуется менять ежедневно или при намокании подушечки.
Антисептик: бензалкония хлорид.
Состав: полимерная основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, антисептик: бензалкония хлорид, пористая пленка, защитная бумага.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.
Побочные действия: Возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия.
*** Пористая пленка**

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
А. Вымыть руки перед использованием изделия;
Б. Открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря;
В. После извлечения пластыря из единичной упаковки устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей);
Г. Приложить повязку к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.
Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерильно. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Утилизация в соответствии с СанПин 21.368-4-21. Стерилизация оксидом этилена.

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
MASTER UNI лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной
основе

для комплектации в количестве 20 шт., размер, см: 7,2x1,9.

20
лейкопластырей

MASTER UNI

000000-000000-0

Дата изготовления: Mfg date:
Годен до: Use before:
Партия № LOT:

CE 0123

20
лейкопластырей

TRAVEL KIT
ПОЛИМЕРНАЯ ОСНОВА

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

20
лейкопластырей

7,2 x 1,9 см
20 шт.
реальный размер

STERILE EO
(стерильно до момента вскрытия)

20
лейкопластырей

МАСТЕР ЮНИ
ТРАВЕЛ КИТ

Впитывающая подушечка
сохраняет рану сухой

Атравматичная сеточка*
не прилипает к ране

Гипоаллергенный клей
не вызывает аллергии

Защита от влаги
защищает рану от попадания воды

Для защиты раны от попадания загрязнений при ссадинах, порезах и мелких повреждениях кожи. Для дезинфекции и последующего быстрого заживления раны без образования рубцов. Применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях, при появлении хирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи). Для наружного применения. Рекомендуется менять ежедневно или при намокании подушечки. Антисептик: бензалкония хлорид.
Состав: полимерная основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, антисептик: бензалкония хлорид, пористая пленка, защитная бумага.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Побочные действия: Возможно аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия.
* Пористая пленка

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
А. Вымыть руки перед использованием изделия.
Б. Открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря.
В. После извлечения пластыря из единичной упаковки устранить первичную оболочку (бумагу, защищающую клеевую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей).
Г. Приложить повязку к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.
Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °C до +25 °C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерильно. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Утилизация в соответствии с СанПиН 21.3894-21. Стерилизация окислом этилена.

Пример фотографического изображения варианта исполнения:
MASTER UNI лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе

для комплектации в количестве 20 шт., размер, см: 7,2х1,9.



20
лейкопластырей

STERILE EO
стерильно до момента вскрытия

7,2 x 1,9 см
20 шт.


МАСТЕР ЮНИ ДОРОЖНЫЙ

**Впитывающая
подушечка**
сохраняет рану сухой

**Атравматичная
сеточка***
не прилипает к ране

**Гипоаллергенный
клей**
не вызывает аллергии

Защита от влаги
защищает рану
от попадания воды



MASTER UNI лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе, см: 7,2x1,9. Кол-во: 20 шт.

Для защиты раны от попадания загрязнений при ссадинах, порезах и мелких повреждениях кожи; Для дезинфекции и последующего быстрого заживления раны без образования рубцов. Применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи).

Для наружного применения. Рекомендуется менять ежедневно или при намокании подушечки.

Антисептик: бензалкония хлорид.

Состав: полимерная основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, антисептик: бензалкония хлорид, пористая пленка, защитная бумага.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Побочные действия: Возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия.

* Пористая пленка

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

А. Вымыть руки перед использованием изделия; Б. Открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря;

В. После извлечения пластыря из единичной упаковки устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей);

Г. Приложить повязку к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.

Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65% в недоступном для детей месте. Стерильно.

Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования.

Утилизация в соответствии с СанПин 21.3684-21. Стерилизация оксидом этилена.

РУ № _____ ОТ _____

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
MASTER UNI лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной
основе

для комплектации в количестве 20 шт., размер, см: 7,2x1,9.



Пример фотографического изображения варианта исполнения:
MASTER UNI лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе

для комплектации в количестве 20 шт., размер, см: 5,6х1,9



20
лейкопластырей

5,6 x 7,9 см
20 шт
реальный размер

STERILE EO

стерильно до момента вскрытия

**МАСТЕР ЮНИ
КИДС**

Впитывающая подушечка
сохраняет рану сухой

Атравматичная сеточка*
не прилипает к ране

Гипоаллергенный клей
не вызывает аллергии

Защита от влаги
защищает рану от попадания воды

Для защиты раны от попадания загрязнений при ссадинах, порезах и мелких повреждениях кожи; Для дезинфекции и последующего быстрого заживления раны без образования рубцов. Применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи). Для наружного применения. Рекомендуется менять ежедневно или при намокании подушечки.

Антисептик: бензалкония хлорид.

Состав: полимерная основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, антисептик: бензалкония хлорид, пористая пленка, защитная бумага.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Побочные действия: Возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия.

* Пористая пленка

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

А. Вымыть руки перед использованием изделия; Б. Открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря; В. После извлечения пластыря из единичной упаковки устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей); Г. Приложить повязку к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.

Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65% в недоступном для детей месте. Стерильно. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.36.94-21. Стерилизация оксидом этилена.

Для комплектации в количестве 20 шт., размер, см: 5,6х1,9.

**МАСТЕР ЮНИ
КИДС**



Защита от влаги —
защищает рану
от попадания воды

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

А. Вымыть руки перед использованием изделия.

Б. Обработать индивидуальную упаковку асептическим лейкопластырем.

В. После извлечения пластики из единичной упаковки устранить первичную обертку (пачку), загнув заднюю кляпозу стороны лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей.

Г. Приложить повязку к ране и легко прокатать края лейкопластыря к коже вокруг раны.

Применение: хранить адгезив от источника тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65% в недоступном для детей месте. Стерильно. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Утилизация в соответствии с СанПиН 12.3.684-21. Стерилизация оксидом этилена.

* Пористая пленка

20
лейкопластырей

KIDS
ПОЛИМЕРНАЯ ОСНОВА

СНИМАЕТСЯ БЕЗ БОЛИ
НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ

20
лейкопластырей




5,6 x 1,9 см
20 шт
реальный размер

STERILE EO

СТЕРИЛЬНО ДО МОМЕНТА ВСКРЫТТЯ


MASTER UNI®

20
лейкопластырей

[illegible]

BY Уполномоченный организатор в РБ 000 «КАНТЕРАНИ

Дата изготовления: 
Mfg date:
Годен до: 
Use before:
Партия № 
LOT:



Пример фотографического изображения варианта исполнения:
MASTER UNI лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе



МАСТЕР ЮНИ

MASTER UNI лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе.
Кол-во: 20 шт. в упаковке. Размер: 5,6 см х 1,9 см - 5 шт.; 7,2 см х 1,9 см - 10 шт.;
ø2,2 см - 5 шт. Для защиты раны от попадания загрязнений при ссадинах, порезах и
мелких повреждениях кожи;

Для дезинфекции и последующему быстрому заживлению раны без образования
рубцов. Применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических
учреждениях, при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин,
порезов и иных мелких повреждений кожи).

Для наружного применения. Рекомендуется менять ежедневно или при намокании
подушечки. Антисептик: бензалкония хлорид.

Состав: тканевая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, антисептик:
бензалкония хлорид, пористая пленка, защитная бумага.

Способ применения: 1. Вымыть руки перед использованием изделия; 2. Открыть
индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря; 3. После извлечения лейкопластыря
из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую
сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей); 4. Приложить
повязку к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Побочные действия: Возможна аллергическая реакция при индивидуальной
непереносимости компонентов, входящих в состав изделия.

Правила хранения: Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C
и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Стерильно. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие
после использования. Не использовать по истечению срока годности (5 лет).


Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

Стерилизация оксидом этилена.

Регистрационное удостоверение № XXX от дд.мм.гггг

PharmLine s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 /
Фармлайн ООО, Доброничка 1257, Кунратиче, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.:
+420608196035. Сделано в Чехии.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 129626, г. Москва, ул. Павла
Корчагина, дом 2, эт. 3, пом. III, ком. 4. 8 (495) 665-80-58, info@spectrumnutrition.ru.



Дата изготовления: / Mfg date:
Годен до: / Use before:
Партия №: / LOT:

07.2019
07.2024
LOT

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МАСТЕР ЮНИ

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
MASTER UNI лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой
основе



Пример фотографического изображения варианта исполнения:
TENERIS лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе



TENERIS
ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ
НА НЕТКАНОЙ
ОСНОВЕ

20
ШТУК

РАЗМЕР
76x19 мм

20
ШТУК



ТЕНЕРИС

СИЛВЕР ТЕХНОЛОДЖИ

СЕНСИТИВ


для чувствительной кожи



Впитывающая подушечка
с атравматичной сеткой*
не прилипает к ране



Комфортное
удаление
без боли



Серебряная сетка
на поверхности
впитывающей
подушечки



Микропористая
перфорация
для дыхания кожи

RU TENERIS лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе, см: 7,6x1,9. Кол-во: 20 шт. в упаковке. РУ №

ВУ Лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе TENERIS Sensitive, 20 шт., размер, мм: 76x19. Артикул 0208-003.

РУ №

Для защиты раны от попадания загрязнений при ссадинах, порезах и мелких повреждениях кожи для дезинфекции и последующего быстрого заживления раны без образования рубцов. Применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях, при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи). Для наружного применения. Рекомендуется менять ежедневно или при намокании подушечки. Антисептик: серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки. Состав: нетканая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, антимикробная серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки, пористая пленка, защитная бумага. Способ применения: вымыть руки перед использованием изделия, открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря; после извлечения пластыря из единичной упаковки устранить порочную обертку (бумагу, защищающую клеевую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей); приложить пластырь к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Побочные действия: возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия. Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °C до +25 °C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерильно. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Стерилизация оксидом этилена.

* пористая пленка

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
TENERIS лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе



Пример фотографического изображения варианта исполнения:
TENERIS лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе



ТЕНЕРИС
СИЛЬВЕР ТЕХНОЛОДЖИ
УНИВЕРСАЛ

Впитывающая подушечка с атравматичной сеткой* не прилипает к ране

Ультрадышащая основа

Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки

Эластичный — принимает форму любого изгиба тела

Повышенная защита от воды

20 ШТУК

РАЗМЕР 76x19 мм

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

RU TENERIS лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе, см 7,6x1,9. Кол-во: 20 шт. в упаковке. РУ №

BY Лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе Teneris Universal, 20 шт., размер, мм: 76x19. Артикул 0208-006. РУ №

Для защиты раны от попадания загрязнений при ссадинах, порезах и мелких повреждениях кожи; для дезинфекции и последующего быстрого заживления раны без образования рубцов. Применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях, при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи). Для наружного применения. Рекомендуется менять ежедневно или при намокании подушечки. Антисептик: серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки. Состав: полимерная основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, антисептик: серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки, пористая пленка, защитная бумага. Способ применения: вынуть рулон перед использованием изделия; открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря; после извлечения пластыря из единичной упаковки устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеевую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей); приложить повязку к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Побочные действия: возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия. Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °C до +25 °C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерильно. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Стерилизация оксидом этилена.

* пористая пленка

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
TENERIS лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе



Пример фотографического изображения варианта исполнения:
TENERIS лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе



**Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
TENERIS лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе**



Пример фотографического изображения варианта исполнения:
TENERIS лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе







Пример фотографического изображения варианта исполнения:
TENERIS лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе






ТЕНЕРИС

СИЛЬВЕР ТЕХНОЛОДЖИ

ФАН КИДС

Впитывающая подушечка с атравматичной сеткой* не прилипает к ране



Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки



Надежная защита от воды



Краситель не контактирует с кожей



Снимаются без боли, не оставляя следов на коже

20 ШТУК

РАЗМЕР 56x19 мм

разные цвета
разные герои

20 ШТУК



RU TENERIS лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе, с/с: 5,6x1,9. Кол-во: 20 шт. в упаковке. РУ № BY Лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе с рисунками TENERIS Fun Kids, 20 шт., размер, мм: 56x19. Артикул 0208-001. РУ №

Для защиты раны от попадания загрязнений при ссадинах, порезах и мелких повреждениях кожи; для дезинфекции и последующего быстрого заживления раны без образования рубцов. Применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях, при получении неосложненных незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи). Для наружного применения. Рекомендуется менять ежедневно или при намокании подушечки. Антисептик: серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки. Состав: полимерная основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, антисептик: серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки, пористая пленка, защитная бумага. Способ применения: вынуть рулон перед использованием изделия; открыть индивидуальную упаковку впитывающего лейкопластыря; после извлечения пластыря из единичной упаковки устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей); приложить повязку к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Побочные действия: возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия. Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °C до +25 °C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерильно. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21. Стерилизация оксидом этилена.

* пористая пленка

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
TENERIS лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе

SILVER TECHNOLOGY

ТЕНЕРИС

СИЛВЕР ТЕХНОЛОДЖИ

ФАН КИДС

Впитывающая подушечка с атравматичной сеткой* не прилипает к ране

Серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки

Надежная защита от воды

Краситель не контактирует с кожей

Снимается без боли, не оставляя следов на коже

ВУ ТЕНЕРИС лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе, окс. 5,6х19,8. Кол-во: 20 шт., упаковка, РУ 19. ВУ Лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе с рисунком TENERIS Fun Kids, 20 шт., размер, мм: 56х19. Артикул 9208-001. РУ № _____

Для защиты раны от попадания загрязнений при содранях, порезах и мелких повреждениях кожи: для дезинфекции и последующего быстрого заживления раны без образования рубца. Применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях, при появлении хирургических незначительных ран (ссадим, порезов и мелких надрывов поврежденной кожи). Для хирургического применения. Раскрывается только поперечным или продольным разрывом. Антибактериальная серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки. Система полимерная основа, впитывающая подушечка, антибактериальная серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки, пористая пленка, защитная бумага. Способ применения: вынуть руки перед использованием изделия, открыть индивидуальную упаковку с помощью линейки-разделителя; после извлечения пластыря из внешней упаковки устроить перпендикулярно обороту (бумажную закладку) между сторонами лейкопластыря, который непосредственно соприкасается с кожей; приложить пластырь к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Побочные действия: возможно раздражение кожи при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия. Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °C до +25 °C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерильно. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21. Стерилизация окислом этилена.

* пористая пленка

TENERIS®

SILVER TECHNOLOGY

TENERIS®

SILVER TECHNOLOGY

TENERIS®

SILVER TECHNOLOGY**

FUN KIDS

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ

Защита от бактерий с Ag⁺ ионами серебра

Защита от бактерий с Ag⁺ ионами серебра

Действие серебра основано на выделении положительно заряженных частиц, которые проникают через мембрану бактерии и вызывают ее разрушение.

STERILE EO

Стерильно до момента вскрытия

**Сильвер Технологии

20 ШТУК

РАЗМЕР 56x19 мм

Разные цвета
Разные герои

20 ШТУК

ЦВЕТНАЯ ДЫШАЩАЯ ОСНОВА

СНИМАЕТСЯ БЕЗ БОЛИ


НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobruška 1257, Kunešova 148/10 Praha 4, Czech Republic. / Импортер: ООО «Доброслав», Добрушка 1257, Кунешова 148/10 Прага 4, Чехия. Республиканский представитель на территории РФ: ООО «СТЕРИЛМ», 105066, г. Москва, ул. пер. г. им. Мухоморова, д. 10, стр. 1, 10-й этаж. Контактный центр: 8 (800) 100-100-100, 8 (495) 565-56-56, info@sterilm.ru. ВУ: Исполнительная организация в РФ: ООО «СТЕРИЛМ», Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Я. Коласа 41, офис 410. E-mail: ag@sterilm.by, тел: +375 447 723333.

Дата изготовления / Mfg date: _____

Срок годности / Shelf life: _____

Партия № / Lot: _____



Пример фотографического изображения варианта исполнения:
TENERIS лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе





ТЕНЕРИС

СИЛЬВЕР ТЕХНОЛОДЖИ

ЭЛАСТИК

TENERIS
ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ
НА ТКАНЕВОЙ
ОСНОВЕ

**20
ШТУК**

**РАЗМЕР
76x19 мм**

Впитывающая подушечка
с атравматичной сеткой*
не прилипает к ране

Комфортное
удаление
без боли

Серебряная сетка
на поверхности
впитывающей
подушечки

Мягкая
ультрадышащая
основа

Эластичный —
принимает форму
любого изгиба тела



RU TENERIS лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе, см: 7,6x1,9. Кол-во: 20 шт. в упаковке. РУ №

ВУ Лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе TENERIS Elastic, 20 шт., размер, мм: 76x19. Артикул 0208-005.

РУ №

Для защиты раны от попадания загрязнений при ссадинах, порезах и мелких повреждениях кожи. Для дезинфекции и последующего быстрого заживления раны без образования рубцов. Применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях, при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи). Для наружного применения. Рекомендуется менять ежедневно или при намокании подушечки. Антисептик: серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки. Состав: тканевая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, антисептик: серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки, пористая пленка, защитная бумага. **Способ применения:** вымыть руки перед использованием изделия; открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря; после извлечения пластыря из единичной упаковки устранить первичную обортку (бумагу, защищающую клеевую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей); приложить повязку к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость. **Побочные действия:** возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия. **Правила хранения:** хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерильно. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Стерилизация оксидом этилена.

* пористая пленка

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
TENERIS лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе



Пример фотографического изображения варианта исполнения:
Vitativ лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе





Vitativ

Vitativ лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе.

Кол-во: 20 шт. в упаковке. Размер: 5,6 см x 1,9 см - 5 шт.; 7,2 см x 1,9 см - 10 шт.; 9,2 см - 5 шт. Для защиты раны от попадания загрязнений при ссадинах, порезах и мелких повреждениях кожи;

Для дезинфекции и последующему быстрому заживлению раны без образования рубцов. Применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях, при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи).

Для наружного применения. Рекомендуется менять ежедневно или при намокании подушечки. Антисептик: бензалкония хлорид.

Состав: тканевая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, антисептик: бензалкония хлорид, пористая пленка, защитная бумага.

Способ применения: 1. Вымыть руки перед использованием изделия; 2. Открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря; 3. После извлечения лейкопластыря из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей); 4. Приложить повязку к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Побочные действия: Возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия.

Правила хранения: Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Стерильно. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Не использовать по истечению срока годности (5 лет).



Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

Стерилизация оксидом этилена.

Регистрационное удостоверение № XXX от дд.мм.гггг

PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброничка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. 8 (495) 665-80-58, info@spectrumnutrition.ru.



Дата изготовления: / Mfg date:
Годен до: / Use before:
Партия №: / LOT:

МФ	
Г	
ЛОТ	

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
VITATIV

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
Vitativ лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе



Пример фотографического изображения варианта исполнения:
Вкусвилл лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе



ВКУСВИЛЛ

Вкусвилл лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе.
Кол-во: 20 шт. в упаковке. Размер: 7,2 см x 1,9 см.

Для защиты раны от попадания загрязнений при ссадинах, порезах и мелких повреждениях кожи;

Для дезинфекции и последующему быстрому заживлению раны без образования рубцов. Применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях, при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи). Для наружного применения. Рекомендуется менять ежедневно или при намокании подушечки. Антисептик: серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки. Состав: тканевая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, антисептик: серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки, пористая пленка, защитная бумага.

Способ применения: 1. Вымыть руки перед использованием изделия; 2. Открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря; 3. После извлечения лейкопластыря из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей); 4. Приложить повязку к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Побочные действия: Возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия.

Правила хранения: Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Стерильно. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Не использовать по истечению срока годности (5 лет).

Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

Стерилизация оксидом этилена.

Регистрационное удостоверение № XXX от дд.мм.гггг

PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброничка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. 8 (495) 665-80-58, info@spectrumnutrition.ru.





0 000000 000000

Дата изготовления: / Mfg date:

Годеи до: / Use before:

Партия №: / LOT:




МФ	
ГД	
ЛОТ	

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
Вкусвилл лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе



Пример фотографического изображения варианта исполнения:
WELLFIX лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе



WELLFIX

WELLFIX лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе.

Кол-во: 20 шт. в упаковке. Размер: 7,6 см x 1,9 см.

Для защиты раны от попадания загрязнений при ссадинах, порезах и мелких повреждениях кожи;

Для дезинфекции и последующему быстрому заживлению раны без образования рубцов. Применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях, при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи). Для наружного применения. Рекомендуется менять ежедневно или при намокании подушечки. Антисептик: серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки. Состав: нетканая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, антисептик: серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки, пористая пленка, защитная бумага.

Способ применения: 1. Вымыть руки перед использованием изделия; 2. Открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря; 3. После извлечения лейкопластыря из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей); 4. Приложить повязку к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Побочные действия: Возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия.

Правила хранения: Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Стерильно. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Не использовать по истечению срока годности (5 лет).

Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

Стерилизация оксидом этилена.



Регистрационное удостоверение № XXX от дд.мм.гггг

PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброничка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. 8 (495) 665-80-58, info@spectrumnutrition.ru.



Дата изготовления: / Mfg date:
Годен до: / Use before:
Партия №: / LOT:



МФ	
И	
ЛОТ	

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
WELLFIX

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
WELLFIX лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе



Пример фотографического изображения варианта исполнения:
WELLFIX лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе



WELLFIX

WELLFIX лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе.
Кол-во: 20 шт. в упаковке. Размер: 7,6 см x 1,9 см.

Для защиты раны от попадания загрязнений при ссадинах, порезах и мелких повреждениях кожи;

Для дезинфекции и последующему быстрому заживлению раны без образования рубцов. Применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях, при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи). Для наружного применения. Рекомендуется менять ежедневно или при намокании подушечки. Антисептик: серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки. Состав: полимерная основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, антисептик: серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки, пористая пленка, защитная бумага.

Способ применения: 1. Вымыть руки перед использованием изделия; 2. Открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря; 3. После извлечения лейкопластыря из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей); 4. Приложить повязку к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Побочные действия: Возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия.

Правила хранения: Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Стерильно. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Не использовать по истечению срока годности (5 лет).

Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

Стерилизация оксидом этилена.

Регистрационное удостоверение № XXX от дд.мм.гггг

PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 /
Фармлайн ООО, Доброничка 1257, Кунратиче, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.:
+420608196035. Сделано в Чехии.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г.
Муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6.
8 (495) 665-80-58, info@spectrumnutrition.ru.





0 000000 000000

Дата изготовления: / Mfg date:


Годен до: / Use before:

Партия №: / LOT:



☞	
🕒	
📦	

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
WELLFIX лейкопластырь медицинский бактерицидный на полимерной основе



Пример фотографического изображения варианта исполнения:
WELLFIX лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе



WELLFIX

WELLFIX лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе.
Кол-во: 20 шт. в упаковке. Размер: 7,6 см x 1,9 см.

Для защиты раны от попадания загрязнений при ссадинах, порезах и мелких повреждениях кожи;

Для дезинфекции и последующему быстрому заживлению раны без образования рубцов. Применяется в домашних условиях или в лечебно-профилактических учреждениях, при появлении нехирургических незначительных ран (ссадин, порезов и иных мелких повреждений кожи). Для наружного применения. Рекомендуется менять ежедневно или при намокании подушечки. Антисептик: серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки. Состав: тканевая основа, клеевой слой, впитывающая подушечка, антисептик: серебряная сетка на поверхности впитывающей подушечки, пористая пленка, защитная бумага.

Способ применения: 1. Вымыть руки перед использованием изделия; 2. Открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря; 3. После извлечения лейкопластыря из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей); 4. Приложить повязку к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Побочные действия: Возможна аллергическая реакция при индивидуальной непереносимости компонентов, входящих в состав изделия.

Правила хранения: Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Стерильно. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Не использовать по истечению срока годности (5 лет).

Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

Стерилизация оксидом этилена.


Регистрационное удостоверение № XXX от дд.мм.гггг

PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 /
Фармлайн ООО, Доброничка 1257, Кунратиче, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.:
+420608196035. Сделано в Чехии.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г.
Муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6.
8 (495) 665-80-58, info@spectrumnutrition.ru.



Дата изготовления: / Mfg date:
Годен до: / Use before:
Партия №: / LOT:




LOT	

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде для исполнения
WELLFIX лейкопластырь медицинский бактерицидный на тканевой основе



Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью на 87 листах

Генеральный директор ООО «СПЕКТРУМ»

 / Федюнина М.А.

