

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОФИТ ФАРМ»**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ПРОФИТ ФАРМ»

А.Ю. Осинцев

«03» декабря 2018 г.



Фотографические изображения общего вида

Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное ЛИОКСАЗИН® ПФ-
Гель по ТУ 21.20.24-002-18833344-2018 в вариантах исполнения:

в индивидуальной упаковке (пакеты-саше) по 5 г, 10 г, 15 г, 30 г;

в индивидуальной упаковке (диспенсер) по 15 мл, 30 мл, 50 мл, 100 мл, 150 мл.

2018 г.

ПРОТИВООЖГОВЫЙ

**Лео
кса
зин** **01**

5 г

ГЕЛЬ

ЛИОКСАЗИН® ПФ-гель

Средство перевязочное гидрогелевое,
противоожоговое, стерильное ЛИОКСАЗИН® ПФ-Гель
по ТУ 21.20.24-002-18833344-2018

Состав: Средство перевязочное представляет собой биологически активный гидрогель на основе гидроксипропилцеллюлозы с иммобилизованными 2-аллилоксистанолом и лидокаином.

Назначение: Предназначено для оказания первой помощи и лечения ожогов (I-III степени), в том числе радиационных и солнечных, гранулирующих ран различной этиологии, заболеваний, связанными с кожными воспалениями и высыпаниями, сопровождающиеся зудом, а также для обработки мест укуса насекомых.

Стерильно, нетоксично внутри.

Условия хранения: Хранить при температуре от -5 °С до +40 °С в защищенном от света, недоступном для детей месте.

Порядок применения: вскрыть упаковку по насечкам; выдавить гель ЛИОКСАЗИН® ПФ-Гель и распределить по всей площади пораженного участка кожи (ожог, рана). При ожогах I-IIIa в том числе радиационных, а также для обработки мест укуса насекомых, применяют ЛИОКСАЗИН® ПФ-Гель: сразу после возникновения – обработать пораженный участок; через 6 часов повторить обработку пораженного участка, затем ежедневно 1 раз в день до эпителизации.

Показания к применению: для оказания первой помощи и лечения ожогов (I-III степени), в том числе радиационных и солнечных, гранулирующих ран различной этиологии, заболеваний, связанными с кожными воспалениями и высыпаниями, сопровождающиеся зудом, а также для обработки мест укуса насекомых. Не применять по истечении срока годности.

Противопоказания: гиперчувствительность к одному из компонентов средства перевязочного.

Возможные побочные действия: Аллергическая реакция.

Утилизация: средство перевязочное использованное или излеченное подлежит утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.7.2790-10.

Срок годности: 3 года с даты изготовления.


РУ № _____ от _____
Производитель: ООО «ПРОФИТ ФАРМ»,
123154, г. Москва, бул. Генерала
Карбышева, д. 8, стр. 4.
Тел: +7 (495) 363-69-38
Сайт: www.profitpharm.ru
E-mail: info@profitpharm.ru

Адрес места производства:
ЗАО «Лаборатория ЭМАНСИ»,
115201, город Москва, 1-й Котляковский
перулок, дом 3, этаж № 4.

Код партии:

Дата изготовления:

Использовать до:



ПРОТИВООЖГОВЫЙ

Лео кса зин

10 г

01

пф

ГЕЛЬ

ЛИОКСАЗИН® ПФ-гель

Средство перевязочное гидрогелевое,
противоожоговое, стерильное ЛИОКСАЗИН® ПФ-Гель
по ТУ 21.20.24-002-18833344-2018

Состав: Средство перевязочное представляет собой биологически активный гидрогель на основе гидроксипропилцеллюлозы с иммобилизованными 2-аллилоксиэтанолом и лидокаином.

Назначение: Предназначено для оказания первой помощи и лечения ожогов (I-III степени), в том числе радиационных и солнечных, гранулирующих ран различной этиологии, заболеваний, связанными с кожными воспалениями и высыпаниями, сопровождающиеся зудом, а также для обработки мест укуса насекомых.

Стерильно, нетоксично внутри.

Условия хранения: Хранить при температуре от -5 °С до +40 °С в защищенном от света, недоступном для детей месте.

Порядок применения: вскрыть упаковку по насечкам; выдавить гель ЛИОКСАЗИН® ПФ-Гель и распределить по всей площади пораженного участка кожи (ожог, рана). При ожогах I-IIIa в том числе радиационных, а также для обработки мест укуса насекомых, применяют ЛИОКСАЗИН® ПФ-Гель: сразу после возникновения – обработать пораженный участок; через 6 часов повторить обработку пораженного участка, затем ежедневно 1 раз в день до эпителизации. Не применять по истечении срока годности.

Показания к применению: для оказания первой помощи и лечения ожогов (I-III степени), в том числе радиационных и солнечных, гранулирующих ран различной этиологии, заболеваний, связанными с кожными воспалениями и высыпаниями, сопровождающиеся зудом, а также для обработки мест укуса насекомых.

Противопоказания: гиперчувствительность к одному из компонентов средства перевязочного.

Возможные побочные действия: Аллергическая реакция.

Утилизация: средство перевязочное использованное или извлеченное подлежат утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.7.2790-10.

Срок годности: 3 года с даты изготовления.

РУ № _____ от _____


Производитель: ООО «ПРОФИТ ФАРМ», 123154,
г. Москва, бул. Генерала Карбышева, д. 8, стр. 4.
Тел.: +7 (495) 363-69-38; **Сайт:** www.profitpharm.ru;
E-mail: info@profitpharm.ru

Адрес места производства:
ЗАО «Лаборатория ЭМАНСИ», 115201, город Москва,
1-й Котляковский переулок, дом 3, этаж № 4.

Код партии: _____

Дата изготовления: _____

Использовать до: _____



ПРОТИВООЖГОВЫЙ

Лео кса зин

15 г

01

пф

ГЕЛЬ

ЛИОКСАЗИН® ПФ-гель

Средство перевязочное гидрогелевое,
противоожоговое, стерильное ЛИОКСАЗИН® ПФ-Гель
по ТУ 21.20.24-002-18833344-2018

Состав: Средство перевязочное представляет собой биологически активный гидрогель на основе гидроксипропилцеллюлозы с иммобилизованными 2-аллилуксизтанолом и лидокаином.

Назначение: Предназначено для оказания первой помощи и лечения ожогов (I-III степени), в том числе радиационных и солнечных, гранулирующих ран различной этиологии, заболеваний, связанных с кожными воспалениями и высыпаниями, сопровождающиеся зудом, а также для обработки мест укуса насекомых.

Стерильно, нетоксично внутри.

Условия хранения: Хранить при температуре от -5 °С до +40 °С в защищенном от света, недоступном для детей месте.

Порядок применения: вскрыть упаковку по насечкам; выдавить гель ЛИОКСАЗИН® ПФ-Гель и распределить по всей площади пораженного участка кожи (ожог, рана). При ожогах I-IIIa в том числе радиационных, а также для обработки мест укуса насекомых, применяют ЛИОКСАЗИН® ПФ-Гель: сразу после возникновения – обработать пораженный участок; через 6 часов повторить обработку пораженного участка, затем ежедневно 1 раз в день до эпителизации. Не применять по истечении срока годности.

Показания к применению: для оказания первой помощи и лечения ожогов (I-III степени), в том числе радиационных и солнечных, гранулирующих ран различной этиологии, заболеваний, связанных с кожными воспалениями и высыпаниями, сопровождающиеся зудом, а также для обработки мест укуса насекомых.

Противопоказания: гиперчувствительность к одному из компонентов средства перевязочного.

Возможные побочные действия: Аллергическая реакция.

Утилизация: средство перевязочное использованное или извлеченное подлежат утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.7.2790-10.

Срок годности: 3 года с даты изготовления.

РУ №

от

Производитель: ООО «ПРОФИТ ФАРМ», 123154, г. Москва, бул. Генерала Карбышева, д. 8, стр. 4.

Тел.: +7 (495)363-69-38. **Сайт:** www.profitpharm.ru;

E-mail: info@profitpharm.ru

Адрес места производства:

ЗАО «Лаборатория ЭМАНСИ», 115201, город Москва, 1-й Котляковский переулок, дом 3, этаж № 4.

Код партии:

Дата изготовления:

Использовать до:



STERILE R

штриховой код

ПРОТИВООЖГОВЫЙ

Лео кса зин ПФ

30 г

01

ГЕЛЬ

ЛИОКСАЗИН® ПФ-гель

Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное
ЛИОКСАЗИН® ПФ-Гель
по ТУ 21.20.24-002-18833344-2018

Состав: Средство перевязочное представляет собой биологически активный гидрогель на основе гидроксипропилцеллюлозы с иммобилизованными 2-аллилоксизтанолом и лидокаином.
Назначение: Предназначено для оказания первой помощи и лечения ожогов (I-III степени), в том числе радиационных и солнечных, гранулирующих ран различной этиологии, заболеваний, связанных с кожными воспалениями и высыпаниями, сопровождающиеся зудом, а также для обработки мест укуса насекомых.
Стерильно, нетоксично внутри.

Условия хранения: Хранить при температуре от -5 °С до +40 °С в защищенном от света, недоступном для детей месте.

Порядок применения: вскрыть упаковку по насечкам; выдавить гель ЛОКСАЗИН® ПФ-Гель и распределить по всей площади пораженного участка кожи (ожог, рана). При ожогах I-IIIa в том числе радиационных, а также для обработки мест укуса насекомых, применяют ЛОКСАЗИН® ПФ-Гель: сразу после возникновения – обработать пораженный участок; через 6 часов повторить обработку пораженного участка, затем ежедневно 1 раз в день до эпителизации. Не применять по истечении срока годности.

Показания к применению: для оказания первой помощи и лечения ожогов (I-III степени), в том числе радиационных и солнечных, гранулирующих ран различной этиологии, заболеваний, связанных с кожными воспалениями и высыпаниями, сопровождающиеся зудом, а также для обработки мест укуса насекомых.

Противопоказания: гиперчувствительность к одному из компонентов средства перевязочного.

Возможные побочные действия: Аллергическая реакция.

Утилизация: средство перевязочное использованное или извлеченное подлежат утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.7.2790-10.

Срок годности: 3 года с даты изготовления.

РУ № от

Производитель: ООО «ПРОФИТ ФАРМ», 123154, г. Москва, бул. Генерала Карбышева, д. 8, стр. 4.

Тел.: +7 (495) 363-69-38. **Сайт:** www.profitpharm.ru;

E-mail: info@profitpharm.ru

Адрес места производства: ЗАО «Лаборатория ЗМАНСИ», 115201, город Москва, 1-й Котляковский переулок, дом 3, этаж № 4.

Код партии:

Дата изготовления:

Использовать до:





Этикетка групповой упаковки для ЛИОКСАЗИН® ПФ-Гель в индивидуальной упаковке (пакет-саше)

**Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое,
стерильное ЛИОКСАЗИН® ПФ-Гель
по ТУ 21.20.24-002-18833344-2018**

Выпуск по ТУ 21.20.24-002-18833344-2018

РУ № _____ от _____

Производитель: ООО «ПРОФИТ ФАРМ»,


123154, г. Москва, бул. Генерала Карбышева, д. 8, стр. 4.

Тел.: +7 (495)363-69-38; Сайт: www.profitpharm.ru; E-mail: info@profitpharm.ru

Адрес места производства: ЗАО "Лаборатория ЭМАНСИ",
115201, г. Москва, 1-й Котляковский переулок, д. 3, этаж №4.

ПАКЕТ-САШЕ 30 Г

Кол-во изделий, шт	
Код партии:	
Дата изготовления:	
Годен до (использовать до):	
Срок годности:	3 года с даты изготовления
Не применять по истечению срока годности	
Условия хранения:	Хранить при температуре от -5 °С до +40 °С, в недоступном для детей месте



ШК

**Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое,
стерильное ЛИОКСАЗИН® ПФ-Гель
по ТУ 21.20.24-002-18833344-2018**

Выпуск по ТУ 21.20.24-002-18833344-2018

РУ № _____ от _____


Производитель: ООО «ПРОФИТ ФАРМ», 123154, г. Москва, бул. Генерала Карбышева, д. 8, стр. 4.

Тел.: +7 (495)363-69-38; Сайт: www.profitpharm.ru; E-mail: info@profitpharm.ru

Адрес места производства: ЗАО "Лаборатория ЭМАНСИ", 115201, г. Москва, 1-й Котляковский переулок, д. 3, этаж №4.

ПАКЕТ-САШЕ 30 г

Кол-во изделий, шт	
Кол-во групповых упаковок, шт	
Масса нетто, кг	
Масса брутто, кг	
Код партии:	
Дата изготовления:	
Годен до (использовать до):	
Срок годности:	3 года с даты изготовления
Дата упаковки:	
Не применять по истечению срока годности	
Условия хранения:	Хранить при температуре от -5 °С до +40 °С, в недоступном для детей месте
Условия транспортирования:	при температуре -5 и +40°С



ш/к

ЛЮ КСА ЗИН ПФ

ГЕЛЬ

15 мл

ЛИОКСАЗИН® ПФ-гель

Средство перевязочное гидрогелевое, противожоговое, стерильное ЛЮКСАЗИН® ПФ-гель по ТУ 21.20.24-002-1883344-2018.

Состав: Средство перевязочное представляет собой биологически активный гидрогель на основе гидроксиэтилпропиленцеллюлозы с иммобилизованными 2-аллилоксиксантоном и лидокаином. Назначение: Предназначено для оказания первой помощи и лечения ожогов (I-III степени), в том числе радиационных и солнечных, гранулирующих ран различной этиологии, заболеваний, связанных с кожными воспалениями и высыпаниями, сопровождающиеся зудом, а также для обработки мест укуса насекомых. Стерильно, нетоксично внутри. **Условия хранения:** Хранить при температуре от -5 °С до +40 °С в защищенном от света, недоступном для детей месте. Рекомендовано хранение только в вертикальном положении. **Порядок применения:** вскрыть упаковку по насечкам, выдвинуть гель ЛЮКСАЗИН® ПФ-гель и распределить по всей площади пораженного участка кожи (ожог, рана). При ожогах I-III в том числе радиационных, а также для обработки мест укуса насекомых, применяют ЛЮКСАЗИН® ПФ-гель сразу после возникновения – обработать пораженный участок; через 6 часов повторить обработку пораженного участка, затем ежедневно 1 раз в день до эпителизации. Не применять по истечении срока годности. **Показания к применению:** для оказания первой помощи и лечения ожогов (I-III степени), в том числе радиационных и солнечных, гранулирующих ран различной этиологии, заболеваний, связанных с кожными воспалениями и высыпаниями, сопровождающиеся зудом, а также для обработки мест укуса насекомых. **Противопоказания:** гиперчувствительность к одному из компонентов средства перевязочного. **Возможные побочные действия:** Аллергическая реакция. **Утилизация:** средство перевязочное использованное или извлеченное подлежащее утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями СанПин 2.1.7.2790-10. **Срок годности:** 3 года с даты изготовления. РУ № от

Производитель: ООО «ПРОФИТ ФАРМ», 23154, г. Москва, бул. Генерала Карбышева, д. 8, стр. 4. **Тел:** +7 (495) 363-69-38; **Сайт:** www.profitpharm.ru; **E-mail:** info@profitpharm.ru **Адрес места производства:** ЗАО «Лаборатория ЭМАНСИ», 115201, город Москва, 1-й Котляковский переулок, дом 3, этаж № 4.

Код партии: _____ **Дата изготовления:** _____

Использовать до: _____



STERILE R



штриховой код

ПРОТИВООЖГОВЫЙ

30 мл

**Лео
кса
зин** **пф**

ГЕЛЬ

ЛИОКСАЗИН® ПФ-гель

Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное
ЛИОКСАЗИН® ПФ-Гель по ТУ 21.20.24-002-18833344-2018

Состав: Средство перевязочное представляет собой биологически активный гидрогель на основе гидроксипропилцеллюлозы с иммобилизованными 2-аллилоксизтанолом и лидокаином. **Назначение:** Предназначено для оказания первой помощи и лечения ожогов (I-III степени), в том числе радиационных и солнечных, гранулирующих ран различной этиологии, заболеваний, связанными с кожными воспалениями и высыпаниями, сопровождающиеся зудом, а также для обработки мест укуса насекомых. Стерильно, нетоксично внутри. **Условия хранения:** Хранить при температуре от -5 °C до +40 °C в защищенном от света, недоступном для детей месте. Рекомендовано хранение только в вертикальном положении. **Порядок применения:** вскрыть упаковку по насечкам; выдавить гель **ЛИОКСАЗИН® ПФ-Гель** и распределить по всей площади пораженного участка кожи (ожог, рана). При ожогах I-IIIa в том числе радиационных, а также для обработки мест укуса насекомых, применяют **ЛИОКСАЗИН® ПФ-Гель**: сразу после возникновения – обработать пораженный участок; через 6 часов повторить обработку пораженного участка, затем ежедневно 1 раз в день до эпителизации. Не применять по истечении срока годности. **Показания к применению:** для оказания первой помощи и лечения ожогов (I-III степени), в том числе радиационных и солнечных, гранулирующих ран различной этиологии, заболеваний, связанными с кожными воспалениями и высыпаниями, сопровождающиеся зудом, а также для обработки мест укуса насекомых. **Противопоказания:** гиперчувствительность к одному из компонентов средства перевязочного. **Возможные побочные действия:** аллергическая реакция. **Утилизация:** средство перевязочное использованное или извлеченное подлежат утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.7.2790-10.

Срок годности: 3 года с даты изготовления.
РУ № _____ от _____

Производитель: ООО «ПРОФИТ ФАРМ», 123154, г. Москва, бул. Генерала Карбышева, д. 8, стр. 4.
Тел.: +7 (495) 363-69-38; **Сайт:** www.profitpharm.ru;

E-mail: info@profitpharm.ru

Адрес места производства:
ЗАО «Лаборатория ЭМАНСИ», 115201, город Москва,
1-й Котляковский переулок, дом 3, этаж № 4.

Код партии:
Дата изготовления:
Использовать до:



STERILE R

штриховой код

ПРОТИВООЖГОВЫЙ

50 мл

**Лео
кса
зин** **ПФ**
ГЕЛЬ

ЛИОКСАЗИН® ПФ-гель

Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное
ЛИОКСАЗИН® ПФ-Гель по ТУ 21.20.24-002-18833344-2018

Состав: Средство перевязочное представляет собой биологически активный гидрогель на основе гидроксипропилцеллюлозы с иммобилизованными 2-аллилоксиэтанолом и лидокаином. **Назначение:** Предназначено для оказания первой помощи и лечения ожогов (I-III степени), в том числе радиационных и солнечных, гранулирующих ран различной этиологии, заболеваний, связанных с кожными воспалениями и высыпаниями, сопровождающиеся зудом, а также для обработки мест укуса насекомых. Стерильно, нетоксично внутри. **Условия хранения:** Хранить при температуре от -5 °С до +40 °С в защищенном от света, недоступном для детей месте. Рекомендовано хранения только в вертикальном положении. **Порядок применения:** вскрыть упаковку по насечкам; выдавить гель **ЛИОКСАЗИН® ПФ-Гель** и распределить по всей площади пораженного участка кожи (ожог, рана). При ожогах I-IIIa в том числе радиационных, а также для обработки мест укуса насекомых, применяют **ЛИОКСАЗИН® ПФ-Гель**: сразу после возникновения – обработать пораженный участок; через 6 часов повторить обработку пораженного участка, затем ежедневно 1 раз в день до эпителизации. Не применять по истечении срока годности. **Показания к применению:** для оказания первой помощи и лечения ожогов (I-III степени), в том числе радиационных и солнечных, гранулирующих ран различной этиологии, заболеваний, связанных с кожными воспалениями и высыпаниями, сопровождающиеся зудом, а также для обработки мест укуса насекомых. **Противопоказания:** гиперчувствительность к одному из компонентов средства перевязочного. **Возможные побочные действия:** Аллергическая реакция. **Утилизация:** средство перевязочное использованное или извлеченное подлежат утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПин 2.1.7.2790-10. **Срок годности:** 3 года с даты изготовления.

РУ № от

Производитель: ООО «ПРОФИТ ФАРМ», 123154, г. Москва, бул. Генерала Карбышева, д. 8, стр. 4.

Тел.: +7 (495) 363-69-38; Сайт: www.profitpharm.ru; E-mail: info@profitpharm.ru

Адрес места производства: ЗАО «Лаборатория ЭМАНСИ», 115201, город Москва, 1-й Котляковский переулок, дом 3, этаж № 4.

Код партии:

Дата изготовления:

Использовать до:



STERILE R



ПРОТИВООЖГОВЫЙ

100 мл

Лео кса зин



пф

ГЕЛЬ

ЛИОКСАЗИН® ПФ-гель

Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное
ЛИОКСАЗИН® ПФ-Гель по ТУ 21.20.24-002-18833344-2018

Состав: Средство перевязочное представляет собой биологически активный гидрогель на основе гидроксипропилцеллюлозы с иммобилизованными 2-аллилоксиэтанолом и лидокаином. **Назначение:** Предназначено для оказания первой помощи и лечения ожогов (I-III степени), в том числе радиационных и солнечных, гранулирующих ран различной этиологии, заболеваний, связанными с кожными воспалениями и высыпаниями, сопровождающиеся зудом, а также для обработки мест укуса насекомых. Стерильно, нетоксично внутри. **Условия хранения:** Хранить при температуре от -5 °С до +40 °С в защищенном от света, недоступном для детей месте. Рекомендовано хранение только в вертикальном положении. **Порядок применения:** вскрыть упаковку по насечкам; выдавить гель **ЛИОКСАЗИН® ПФ-Гель** и распределить по всей площади пораженного участка кожи (ожог, рана). При ожогах I-IIIa в том числе радиационных, а также для обработки мест укуса насекомых, применяют **ЛИОКСАЗИН® ПФ-Гель**: сразу после возникновения – обработать пораженный участок; через 6 часов повторить обработку пораженного участка, затем ежедневно 1 раз в день до эпителизации. Не применять по истечении срока годности. **Показания к применению:** для оказания первой помощи и лечения ожогов (I-III степени), в том числе радиационных и солнечных, гранулирующих ран различной этиологии, заболеваний, связанными с кожными воспалениями и высыпаниями, сопровождающиеся зудом, а также для обработки мест укуса насекомых. **Противопоказания:** гиперчувствительность к одному из компонентов средства перевязочного. **Возможные побочные действия:** Аллергическая реакция. **Утилизация:** средство перевязочное использованное или извлеченное подлежат утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.7.2790-10. **Срок годности:** 3 года с даты изготовления.

РУ № _____ от _____
 Производитель: ООО «ПРОФИТ ФАРМ», 123154, г. Москва, бул. Генерала Карбышева, д. 8, стр. 4.
 Тел.: +7 (495) 363-69-38; Сайт: www.profitpharm.ru; E-mail: info@profitpharm.ru
 Адрес места производства: ЗАО «Лаборатория ЭМАНСИ», 115201, город Москва, 1-й Котляковский переулок, дом 3, этаж № 4.
 Код партии: _____
 Дата изготовления: _____
 Использовать до: _____



STERILE R



штриховой код

ПРОТИВООЖГОВЫЙ

150 мл

Лео кса зин



пф

ГЕЛЬ

ЛИОКСАЗИН® ПФ-гель

Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное
ЛИОКСАЗИН® ПФ-Гель по ТУ 21.20.24-002-18833344-2018

Состав: Средство перевязочное представляет собой биологически активный гидрогель на основе гидроксипропилцеллюлозы с иммобилизованными 2-аллилоксиэтанолом и лидокаином. **Назначение:** Предназначено для оказания первой помощи и лечения ожогов (I-III степени), в том числе радиационных и солнечных, гранулирующих ран различной этиологии, заболеваний, связанными с кожными воспалениями и высыпаниями, сопровождающиеся зудом, а также для обработки мест укуса насекомых. Стерильно, нетоксично внутри. **Условия хранения:** Хранить при температуре от -5 °С до +40 °С в защищенном от света, недоступном для детей месте. Рекомендовано хранение только в вертикальном положении. **Порядок применения:** вскрыть упаковку по насечкам; выдавить гель ЛОКСАЗИН® ПФ-Гель и распределить по всей площади пораженного участка кожи (ожог, рана). При ожогах I-IIIa в том числе радиационных, а также для обработки мест укуса насекомых, применяют ЛОКСАЗИН® ПФ-Гель: сразу после возникновения – обработать пораженный участок; через 6 часов повторить обработку пораженного участка, затем ежедневно 1 раз в день до эпителизации. Не применять по истечении срока годности. **Показания к применению:** для оказания первой помощи и лечения ожогов (I-III степени), в том числе радиационных и солнечных, гранулирующих ран различной этиологии, заболеваний, связанными с кожными воспалениями и высыпаниями, сопровождающиеся зудом, а также для обработки мест укуса насекомых. **Противопоказания:** гиперчувствительность к одному из компонентов средства перевязочного. **Возможные побочные действия:** Аллергическая реакция. **Утилизация:** средство перевязочное использованное или извлеченное подлежат утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.7.2790-10. **Срок годности:** 3 года с даты изготовления.

РУ № _____ от _____
Производитель: ООО «ПРОФИТ ФАРМ», 123154, г. Москва, бул. Генерала Карбышева, д. 8, стр. 4.
Тел.: +7 (495)363-69-38; **Сайт:** www.profitpharm.ru;
E-mail: info@profitpharm.ru
Адрес места производства: ЗАО «Лаборатория ЭМАНСИ», 115201, город Москва, 1-й Котляковский переулок, дом 3, этаж № 4.
Код партии: _____
Дата изготовления: _____
Использовать до: _____





Вторичная потребительская упаковка – картонный короб для ЛИОКСАЗИН® ПФ-Гель в индивидуальной упаковке (диспенсер).



Этикетка групповой упаковки для ЛИОКСАЗИН® ПФ-Гель в индивидуальной упаковке (диспенсер).

**Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое,
стерильное ЛИОКСАЗИН® ПФ-Гель
по ТУ 21.20.24-002-18833344-2018**

Выпуск по ТУ 21.20.24-002-18833344-2018

РУ № _____ от _____

Производитель: ООО «ПРОФИТ ФАРМ».

123154, г. Москва, бул. Генерала Карбышева, д. 8, стр. 4.

Тел.: +7 (495)363-69-38; Сайт: www.profitpharm.ru; E-mail: info@profitpharm.ru

Адрес места производства: ЗАО "Лаборатория ЭМАНСИ",

115201, г. Москва, 1-й Котляковский переулок, д. 3, этаж №4.

ДИСПЕНСЕР 50 МЛ

Кол-во изделий, шт	
Код партии:	
Дата изготовления:	
Годен до (использовать до):	
Срок годности:	3 года с даты изготовления
не применять по истечению срока годности	
Условия хранения:	хранить при температуре от -5 °С до +40 °С, в недоступном для детей месте
рекомендовано хранение только в вертикальном положении	



ШК

Транспортная этикетка для ЛИОКСАЗИН® ПФ-Гель в индивидуальной упаковке (диспенсер).

**Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое,
стерильное ЛИОКСАЗИН® ПФ-Гель
по ТУ 21.20.24-002-18833344-2018**

Выпуск по ТУ 21.20.24-002-18833344-2018


РУ № _____ от _____

Производитель: ООО «ПРОФИТ ФАРМ», 123154, г. Москва, бул. Генерала Карбышева, д. 8, стр. 4.

Тел.: +7 (495)363-69-38; Сайт: www.profitpharm.ru; E-mail: info@profitpharm.ru

Адрес места производства: ЗАО "Лаборатория ЭМАНСИ", 115201, г. Москва, 1-й Котляковский переулок, д. 3, этаж №4.

ДИСПЕНСЕР 50 МЛ	
Кол-во изделий, шт	
Кол-во групповых упаковок, шт	
Масса нетто, кг	
Масса брутто, кг	
Код партии:	
Дата изготовления:	
Годен до (использовать до):	
Срок годности:	3 года с даты изготовления
Дата упаковки:	
Не применять по истечению срока годности	
Условия хранения:	Хранить при температуре от -5 °С до +40 °С, в недоступном для детей месте
Условия транспортирования:	при температуре -5 и +40°С
Рекомендовано хранение только в вертикальном положении	



Ш/К

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 16 лист(ов)

Генеральный директор
"ПРОФИТ ФАРМ"

ООО

Осипцев А.Ю.

"14" июля 2018 г.

