

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ИНТЕЛБИО»

А.Л. Галин



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
«Раствор для местного нанесения на кожу для удаления
контагиозного моллюска СТОПМОЛЛЮСК
по ТУ 9398-001-03127020-2016»

Код партии:

XXXXXX

Дата изготовления:

XXXXXX

Использовать до:

XXXXXX



РАСТВОР ДЛЯ МЕСТНОГО НАНЕСЕНИЯ НА КОЖУ

Назначение:
Раствор для местного
нанесения на кожу
для удаления
контагиозного моллюска
СТОПМОЛЛЮСК®
предназначен
для нанесения
на поверхность кожных
поражений, вызванных
контагиозным
моллюском.

Перед использованием
необходимо внимательно
ознакомиться
с инструкцией
по применению.

Претензии и пожелания
отправлять по адресу:
ООО «ИНТЕЛБИО», Россия,
142821, Московская обл.,
г.о. Ступино, д. Шматово,
ул. Индустриальная, влд. 2,
тел. 8 (495) 924-15-99.

Раствор для местного
нанесения на кожу
для удаления
контагиозного моллюска
СТОПМОЛЛЮСК®

в составе:

- флакон с раствором - 1 шт.,
- крышка с аппликатором -
1 шт.,
- инструкция
по применению – 1 шт.

Объем 5 мл

ТУ 9398-001-03127020-2016

РУ №РЗН 2017/5986


от XX.XX.XXXX





МОЛЛЮСК®

ГИДРОКСИД КАЛИЯ 5%



Для удаления контагиозного
моллюска без боли и рубцов

РАСТВОР ДЛЯ МЕСТНОГО НАНЕСЕНИЯ НА КОЖУ

ФЛАКОН С АППЛИКАТОРОМ

5 мл



ИнтелБИО

Способ применения: откройте флакон и удалите излишки раствора с аппликатора о край горлышка флакона, чтобы не допустить падения капель раствора. С помощью аппликатора нанесите небольшое количество раствора на участок, пораженный contagiозным моллюском, не допуская попадания его излишков на здоровую кожу. Дайте раствору впитаться и высохнуть 1-2 минуты. Аппликатор следует повторно погружать в раствор после каждых 2-3 применений (аппликаций). Наносите раствор на участки пораженные contagiозным моллюском, в течение нескольких дней, до появления на этих участках воспаления (покраснения). Обычно для этого требуется от 2 до 10 дней. После появления воспаления (покраснения), прекратите нанесение раствора СТОПМОЛЛЮСК®. Воспаление указывает на то, что через 2-6 недель contagiозный моллюск исчезнет.

Запрещено использовать раствор после истечения срока годности, указанного на флаконе. Надежно закрывайте флакон после каждого использования. Храните флакон с раствором в вертикальном положении. Храните в недоступном для детей месте. Используйте раствор в течение месяца после вскрытия флакона. Храните раствор при температуре от 15 до 25°C.

Производитель:

ООО «ИНТЕЛБИО», Россия, 142821, Московская обл., г.о. Ступино, д. Шматово, ул. Индустриальная, влд. 2, тел. 8 (495) 924-15-99.

Место производства (см. маркировку на упаковке):

1. ООО «КоролёвФарм», Россия, 141074, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4.
2. ООО «ИНТЕЛБИО», Россия, 142821, Московская обл., г.о. Ступино, д. Шматово, ул. Индустриальная, влд. 2.

Подробнее на сайте



stopmollusk.ru











СТОП МОЛЛЮСК®

ГИДРОКСИД КАЛИЯ 5%



Для удаления контагиозного моллюска без боли и рубцов

РАСТВОР ДЛЯ МЕСТНОГО НАНЕСЕНИЯ НА КОЖУ

ФЛАКОН С АППЛИКАТОРОМ

5 мл



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Раствор для местного нанесения на кожу. СТОПМОЛЛЮСК®

1. Назначение. Раствор для местного нанесения на кожу. СТОПМОЛЛЮСК®, далее по тексту - раствор, предназначен для удаления контагиозного моллюска. Механизм действия медицинского гидроксида калия в центр папулы контактного моллюска. 5% раствор гидроксида калия осуществляет посредством химического воздействия растворять кератин и проникать вглубь. Потенциальными потребителями являются пациенты с кожными поражениями, вызванными контагиозным моллюском.

2. Основные технические характеристики. Раствор прозрачный бесцветный жидкий.

2.1. Состав медицинского изделия.

Вещество	Концентрация
Гидроксид калия	5%
Очищенная вода	до 100%

2.2. Медицинское изделие соответствует

№ п/п	Параметр
1	Внешний вид и запах
2	Массовая доля гидроксида калия
3	Водородный показатель pH
4	Микробиологическая чистота: общее число всех микроорганизмов, дрожжи и плесень, КОЕ/г
5	Объем раствора во флаконе, мл
6	Герметичность флакона

2.3. Упаковка и маркировка медицинского изделия
в стеклянные флаконы из коричневого стекла
закрыт крышкой с аппликатором. Флакон
коробку вместе с инструкцией по применению.

stopmoyku.ru




Получите на сайте

Производитель:
ООО «ИНТЕЛБИО», Россия, 142821, Московская обл., г.о. Ступино, ул. Индустриальная, влд. 2, тел. 8 (495) 924-15-99.
Место производства (для маркировки на упаковке):
1,000 «Корневфарм», Россия, 141074, Московская область, г. Королёв, ул. Ломоносова, д. 4, 2, 000 «ИНТЕЛБИО», Россия, 142821, Московская обл., г.о. Ступино, д. Шматова, ул. Индустриальная, влд. 2, ул. Индустриальная, влд. 2.

Способ применения: откройте флакон и удалите этикетку раствора с аппликатора о края горлышка флакона, чтобы не допустить попадания капель раствора. С помощью аппликатора нанесите небольшое количество раствора на участок, пораженный контактным моллюском, не допуская попадания его илишкови на здоровую кожу. Дайте раствору впитаться и высохнуть 1-2 минуты. Аппликатор повторно погружать в раствор после каждого 2-3 применения (аппликаций). Наносите раствор на участки поражения контактным моллюском, в течение нескольких дней, до появления на этих участках воспаления (покраснения). Обычно для этого требуется от 2 до 10 дней. После появления воспаления (покраснения), прекратите нанесение раствора «СТОМОПЛОСК». Воспаление указывает на то, что через 2-6 недель контактный моллюск исчезнет.

Запрещено использовать раствор после истечения срока годности, указанного на флаконе. Нежно закрывайте флакон после каждого использования. Храните флакон с раствором в вертикальном положении. Храните в недоступном для детей месте. Используйте раствор в течение месяца после вскрытия флакона. Храните раствор при температуре от 15 до 25°C.





14
пронумеровано
и прикреплено на
листах
(копия)
Генеральный директор
ООО "ИнтелБИО"
Галин А.Л.