


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МОЗОЛЬНЫЙ

по ТУ 21.20.24-008-44241667-2021


Производитель:

АО «Валента Фарм», Россия



Внешний вид

Лейкопластырь мозольный (на ткани хлопчатобумажной белого цвета), размером 6×10 см с защитным покрытием



Лейкопластырь мозольный
по ТУ 21.30.24-008-44241647-2021
Показания и применение: для размягчения, разрыхления и удаления утолщенного рогового слоя (сухих мозолей, натоптышей).

Состав: материал основы мозольного лейкопластыря: ткань хлопчатобумажная белого цвета; мозольная масса: поливинилбутилен, воск, ланолин безводный, саломасовая кислота; защитное покрытие: материал антиадгезионный.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря. Наличие пигментных невусов (родимок) в месте наклеивания лейкопластыря.

Способ применения: только для одностороннего наружного применения. Ногу распарить и вытереть досуха. Отрезать лейкопластырь необходимого размера, согнуть его в руке для лучшей фиксации, затем снять защитное покрытие лейкопластыря и наклеить лейкопластырь таким образом, чтобы мозольная масса закрывала поверхность кожного дефекта, не соприкасаясь со здоровой кожей. Через 1-2 дня лейкопластырь снимается и удаляет отслоившийся эпидермис. Для лучшего удаления эпидермиса допускается предварительное размягчение кожи в месте удаления. Для надежности фиксации и исключения случайного смещения и отслаивания лейкопластыря мозольный следует дополнительно закрывать фиксирующим лейкопластырем.

Меры предосторожности: не рекомендуется использовать лейкопластырь на поврежденных участках кожи, в области открытых ран и травм. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности.

Побочное действие: возможны аллергические реакции, контактный дерматит в месте аппликации (покраснение, зуд, жжение).

Указания: использование лейкопластыря относится к уходу за кожей. Для утилизации в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Полный текст инструкции по применению см. www.valentpharm.com
РФ 734

АО «Валента Фарм»
630018, Россия, г. Новосибирск,
ул. Демисова, д. 213.
Средства производства:
АО «Валента Фарм»
141-146, Россия, Московская область,
г. Мытищи, ул. Фабричная, д. 2.
Тел.: +7 (495) 332-40-02
e-mail: info@valentpharm.com



30921
2021-09
2023-10

Лейкопластырь мозольный
по ТУ 21.30.24-008-44241647-2021


Показания и применение: для размягчения, разрыхления и удаления утолщенного рогового слоя (сухих мозолей, натоптышей).

Состав: материал основы мозольного лейкопластыря: ткань хлопчатобумажная белого цвета; мозольная масса: поливинилбутилен, воск, ланолин безводный, саломасовая кислота; защитное покрытие: материал антиадгезионный.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря. Наличие пигментных невусов (родимок) в месте наклеивания лейкопластыря.

Способ применения: только для одностороннего наружного применения. Ногу распарить и вытереть досуха. Отрезать лейкопластырь необходимого размера, согнуть его в руке для лучшей фиксации, затем снять защитное покрытие лейкопластыря и наклеить лейкопластырь таким образом, чтобы мозольная масса закрывала поверхность кожного дефекта, не соприкасаясь со здоровой кожей. Через 1-2 дня лейкопластырь снимается и удаляет отслоившийся эпидермис. Для лучшего удаления эпидермиса допускается предварительное размягчение кожи в месте удаления. Для надежности фиксации и исключения случайного смещения и отслаивания лейкопластыря мозольный следует дополнительно закрывать фиксирующим лейкопластырем.

Лейкопластырь мозольный (на ткани хлопчатобумажной белого цвета), размером 6 × 10 см
в индивидуальной потребительской упаковке



Внешний вид

Лейкопластырь мозольный (на ткани эластичной телесного цвета), размером 6×10 см с защитным покрытием



мультипласт®

Лейкопластырь МОЗОЛЬНЫЙ

Быстро и безболезненно
размягчает и удаляет
сухие мозоли

Обеспечивает быстрое и
эстетичное заживление

6x10 см

Лейкопластырь мозольный
по ТУ 21.20.24-008-44241667-2021

Показания к применению: для размягчения, разрыхления и удаления утолщенного рогового слоя (сухие мозоли, натоптыши).

Состав: материал основы мозольного лейкопластыря: ткань эластичная телесного цвета; мозольная масса: полиизобутилен, воск, ланолин безводный, салициловая кислота; защитное покрытие: материал антиадгезионный.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря. Наличие пигментных новообразований в месте наложения лейкопластыря.

Способ применения: только для однократного наружного применения. Листу распарить и вытереть досуха. Отрезать лейкопластырь необходимого размера, согнуть его в руке для лучшей фиксации, затем снять защитное покрытие лейкопластыря и наложить лейкопластырь таким образом, чтобы мозольная масса закрывала поверхность кожного дефекта, не соприкасаясь со здоровой кожей. Через 1-2 дня лейкопластырь снимается и удаляется отслоившийся эпидермис. Для лучшего заживления эпидермиса допускается предосторожное распаривание кожи в месте удаления. Для надежности фиксации и исключения случайного смещения и отслаивания лейкопластыря мозольный следует дополнительно закрепить фиксирующим лейкопластырем.

Меры предосторожности: не рекомендуется использовать лейкопластырь на поврежденных участках кожи, в области открытых ран и трещин. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности.

Побочное действие: возможны аллергические реакции, контактный дерматит в месте наложения (покраснение, зуд, жжение).

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Полный текст инструкции по применению см. www.kaleplast.ru
RU RU PZN



АО «Калепласт»
610000, Россия, г. Новосибирск,
ул. Дембрынская, 37Е
Средствами индивидуальной защиты
АО «Калепласт»
140 100, Россия, Московская область,
г. Коломна, ул. Индустриальная, 2
Тел.: (7 31 02) 813-00-02,
e-mail: info@kaleplast.ru




Вс



10921
2021-09
2023-10

Лейкопластырь мозольный (на ткани эластичной телесного цвета), размером 6 × 10 см
в индивидуальной потребительской упаковке



Внешний вид

Лейкопластырь мозольный (на ткани хлопчатобумажной белого цвета), размером 2×10 см в комплекте с фиксирующим лейкопластырем (на ткани хлопчатобумажной телесного цвета), размером 4×10 см с защитным покрытием



мультипласт®

Лейкопластырь МОЗОЛЬНЫЙ

Быстро и безболезненно
размягчает и удаляет
сухие мозоли

Обеспечивает быстрое и
эстетичное заживление

2x10 см

в комплекте с фиксирующим лейкопластырем 4x10 см

Лейкопластырь мозольный по ТУ 21.20.24-008-44241867-2021
Назначение и применение: для размягчения, разрыхления и удаления утолщенного рогового слоя (сухих мозолей, натоптышей).
Состав: материал основы мозольного лейкопластыря: ткань хлопчатобумажная белого цвета; мозольная масса: полиизобутилен, воск, глицерин безводный, салициловая кислота; защитное покрытие: материал антиадгезионный.

Лейкопластырь фиксирующий: материал основы: ткань хлопчатобумажная телесного цвета; клеевой слой: термостойкий клей.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря. Наличие пигментных невусов (родимок) в месте наклеивания лейкопластыря.

Способ применения: только для однократного наружного применения. Ногу распарить и вытереть досуха. Отрезать лейкопластырь необходимого размера, согнуть его в руке для лучшей фиксации, затем снять защитное покрытие лейкопластыря и наложить лейкопластырь таким образом, чтобы мозольная масса закрывала поверхность кожного дефекта, не соприкасаясь со здоровой кожей. Через 1-2 дня лейкопластырь снимает и удаляет утолщенный эпидермис. Для лучшего удаления эпидермиса допускается предварительное распаривание ноги в месте удаления. Для надежности фиксации и исключения случайного смещения и отклеивания лейкопластыря мозольный следует дополнительно зафиксировать фиксирующим лейкопластырем.

Меры предосторожности: не рекомендуется использовать лейкопластырь на поврежденных участках кожи, в области открытых ран и трещин. Хранить недоступно для детей места.

Не применять по истечении срока годности.

Побочное действие: возможны аллергические реакции, контактный дерматит в месте аппликации (покраснение, зуд, жжение).

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21.

Полный текст инструкции по применению
см. www.muльтипласт.ru
РЗН РЗН



АО «Валент Фарм»
150008, Россия, г. Ярославль,
ул. Дзержинский, д. 37/3

Валент Фарм, производственный филиал

АО «Валент Фарм»

151188, Россия, Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Фабричная, д. 3

Тел. (79) (79) 993-48-60

e-mail: info@valentpharm.ru

Лейкопластырь мозольный по ТУ 21.20.24-008-44241867-2021

Назначение и применение: для размягчения, разрыхления и удаления утолщенного рогового слоя (сухих мозолей, натоптышей).

Состав: материал основы мозольного лейкопластыря: ткань хлопчатобумажная белого цвета; мозольная масса: полиизобутилен, воск, глицерин безводный, салициловая кислота; защитное покрытие: материал антиадгезионный.

Лейкопластырь фиксирующий: материал основы: ткань хлопчатобумажная телесного цвета; клеевой слой: термостойкий клей.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря. Наличие пигментных невусов (родимок) в месте наклеивания лейкопластыря.

Способ применения: только для однократного наружного применения. Ногу распарить и вытереть досуха. Отрезать лейкопластырь необходимого размера, согнуть его в руке для лучшей фиксации, затем снять защитное покрытие лейкопластыря и наложить лейкопластырь таким образом, чтобы мозольная масса закрывала поверхность кожного дефекта, не соприкасаясь со здоровой кожей. Через 1-2 дня лейкопластырь снимает и удаляет утолщенный эпидермис. Для лучшего удаления эпидермиса допускается предварительное распаривание ноги в месте удаления. Для надежности фиксации и исключения случайного смещения и отклеивания лейкопластыря мозольный следует дополнительно зафиксировать фиксирующим лейкопластырем.




+4 °C

-15 °C



40921
2021-09
2023-10

Лейкопластырь мозольный (на ткани хлопчатобумажной белого цвета), размером 2 × 10 см в комплекте с фиксирующим лейкопластырем (на ткани хлопчатобумажной телесного цвета), размером 4 × 10 см в индивидуальной потребительской упаковке



Внешний вид

Лейкопластырь мозольный (на ткани эластичной телесного цвета), размером 2×10 см в комплекте с фиксирующим лейкопластырем

ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru ткани хлопчатобумажной белого цвета), размером 4×10 см с защитным покрытием



мультипласт®

Лейкопластырь МОЗОЛЬНЫЙ

Быстро и безболезненно
размягчает и удаляет
сухие мозоли

Обеспечивает быстрое и
эстетичное заживление

2x10 см

в комплекте с фиксирующим лейкопластырем 4x10 см

Лейкопластырь мозольный по ТУ 21.20.24-008-44241667-2021

Показания к применению: для размягчения, разрыхления и удаления утолщенного рогового слоя (сухие мозоли, натоптыши).

Состав: материал основы мозольного лейкопластыря: ткань эластичная телесного цвета; мозольная масса: полиизобутилен, воск, ланолин безводный, сорбиновая кислота; защитное покрытие: материал антиадгезивный.

Лейкопластырь фиксирующий: материал основы: ткань хлопчатобумажная белого цвета; клеевой слой: термочувствительный клей.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря. Наличие пигментных невусов (радикул) в месте наложения лейкопластыря.

Способ применения: только для однократного наружного применения.

Ногу распарить и вытереть досуха. Отрезать лейкопластырь необходимого размера, согнуть его в руло для лучшей фиксации, затем снять защитное покрытие лейкопластыря и наложить лейкопластырь таким образом, чтобы мозольная масса закрывала поверхность кожного дефекта, не соприкасаясь со здоровой кожей. Через 1-2 дня лейкопластырь снимают и удаляют отслоившийся эпидермис. Для лучшего удаления эпидермиса допускается предварительное распаривание ноги в месте удаления. Для надежности фиксации и исключения случайного смещения и отпадания лейкопластыря мозольный следует дополнительно закрепить фиксирующим лейкопластырем.

Меры предосторожности: не рекомендуется использовать лейкопластырь на поврежденных участках кожи, в области открытых ран и трещин. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять со средствами сроднородности.

Побочное действие: возможны аллергические реакции, контактный дерматит в месте аппликации (покраснение, зуд, жжение).

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А (утилизируются согласно с СанПиН 2.1.3.684-21).

Полный текст инструкции по применению см. www.valentapharm.com
PZM-RON



АО Валента Фарма
600028, Россия, г. Пермь, ул. Давыдова, д. 175.
Средствами производства продукции АО Валента Фарма
161108, Россия, Московская область, г. Истринское, д. 3.
Тел: +7 (800) 410-0042.
e-mail: info@valentapharm.com



20921
2021-09
2023-10



Лейкопластырь мозольный по ТУ 21.20.24-008-44241667-2021

Показания к применению: для размягчения, разрыхления и удаления утолщенного рогового слоя (сухие мозоли, натоптыши).

Состав: материал основы мозольного лейкопластыря: ткань эластичная телесного цвета; мозольная масса: полиизобутилен, воск, ланолин безводный, сорбиновая кислота; защитное покрытие: материал антиадгезивный.

Лейкопластырь фиксирующий: материал основы: ткань хлопчатобумажная белого цвета; клеевой слой: термочувствительный клей.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав лейкопластыря. Наличие пигментных невусов (радикул) в месте наложения лейкопластыря.

Способ применения: только для однократного наружного применения. Ногу распарить и вытереть досуха. Отрезать лейкопластырь необходимого размера, согнуть его в руло для лучшей фиксации, затем снять защитное покрытие лейкопластыря и наложить лейкопластырь таким образом, чтобы мозольная масса закрывала поверхность кожного дефекта, не соприкасаясь со здоровой кожей. Через 1-2 дня лейкопластырь снимают и удаляют отслоившийся эпидермис. Для лучшего удаления эпидермиса допускается предварительное распаривание ноги в месте удаления. Для надежности фиксации и исключения случайного смещения и отпадания лейкопластыря мозольный следует дополнительно закрепить фиксирующим лейкопластырем.

Лейкопластырь мозольный (на ткани эластичной телесного цвета), размером 2 × 10 см в комплекте с фиксирующим лейкопластырем (на ткани хлопчатобумажной белого цвета), размером 4 × 10 см в индивидуальной потребительской упаковке

Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 9 листа (ов).

Должность Советник по регистрации и
лицензированию АО «Валента Фарм»
ФИО Биккенин А.А.



(подпись)

М.П.

30.11.2022г.

Лейкопластырь мозольный

макет первичной упаковки (6x10 см)




Pantone7403 M Pantone7510 M Pantone7511 M Pantone476 M

Лейкопластырь мозольный

Макет первичной упаковки (6x10 см)

основа мозольного лейкопластыря: ткань хлопчатобумажная белого цвета



Место нанесения

информации:

-серия 101 xxxxxx


-дата выпуска 11/11 xxx-xx

-срок годности 12/12 xxx-xx

Лейкопластырь мозольный

Макет первичной упаковки (6x10 см)

основа мозольного лейкопластыря: ткань эластичная телесного цвета



Место нанесения информации:

-серия xxxxxxx

-дата выпуска xxxx-xx

-срок годности xxxx-xx

Лейкопластырь мозольный

Этикетка групповой упаковки



Этикетка транспортной упаковки



Лейкопластырь мозольный

Групповая упаковка: этикетка-бандероль

Лейкопластырь мозольный 6 x 10 см 20 шт.

материал основы мозольного лейкопластыря: ткань хлопчатобумажная белого цвета



Лейкопластырь мозольный 6 x 10 см 20 шт.

материал основы мозольного лейкопластыря: ткань эластичная телесного цвета



Лейкопластырь мозольный

Этикетка транспортной упаковки



Лейкопластырь мозольный


макет первичной упаковки
(2x10 см в комплекте с фиксирующим лейкопластырем 4x10 см)



Pantone 7403 M Pantone 7510 M Pantone 7511 M Pantone 476 M

Лейкопластырь мозольный

Макет первичной упаковки (2x10 см в комплекте с фиксирующим лейкопластырем 4x10 см)
 основа мозольного лейкопластыря: ткань хлопчатобумажная белого цвета;
 основа фиксирующего лейкопластыря: ткань хлопчатобумажная телесного цвета




Место нанесения информации:
 -серия xxxxxx
 -дата выпуска xxxx-xx
 -срок годности xxxx-xx

92+₁₀

Лейкопластырь мозольный

Макет первичной упаковки (2x10 см в комплекте с фиксирующим лейкопластырем 4x10 см)
 основа мозольного лейкопластыря: ткань эластичная телесного цвета;
 основа фиксирующего лейкопластыря: ткань хлопчатобумажная белого цвета



Место нанесения информации:
 -серия xxxxxx
 -дата выпуска xxxx-xx
 -срок годности xxxx-xx

92+¹₀

Лейкопластырь мозольный

Этикетка групповой упаковки

(М)
мультипласт®

Лейкопластырь мозольный

материал основы мозольного лейкопластыря: ткань хлопчатобумажная белого цвета, материал основы лейкопластыря фиксирующего: ткань хлопчатобумажная телесного цвета

2 x 10 см
в комплекте с фиксирующим лейкопластырем 4x10 см

Количество 220 штук

TU 21.20.24-008-44241667-2021 РУ № РЗН

Организация, принимающая претензии: АО «Валента Фарм»
141108, Россия, Московская обл., г. Щелково,
ул. Фабричная, д. 2, тел. +7 (495) 933 48 62,
e-mail: info@valentapharm.com

АО «Валента Фарм», 630028, Россия,
г. Новосибирск, ул. Декабристов, д. 275



LOT


+5°C


+25°C





(М)
мультипласт®

Лейкопластырь мозольный

материал основы мозольного лейкопластыря: ткань эластичная телесного цвета, материал основы лейкопластыря фиксирующего: ткань хлопчатобумажная белого цвета

2 x 10 см
в комплекте с фиксирующим лейкопластырем 4x10 см

Количество 220 штук

TU 21.20.24-008-44241667-2021 РУ № РЗН

Организация, принимающая претензии: АО «Валента Фарм»
141108, Россия, Московская обл., г. Щелково,
ул. Фабричная, д. 2, тел. +7 (495) 933 48 62,
e-mail: info@valentapharm.com

АО «Валента Фарм», 630028, Россия,
г. Новосибирск, ул. Декабристов, д. 275



LOT


+5°C


+25°C





Этикетка транспортной упаковки

(М)
мультипласт®

Лейкопластырь мозольный

материал основы мозольного лейкопластыря: ткань хлопчатобумажная белого цвета, материал основы лейкопластыря фиксирующего: ткань хлопчатобумажная телесного цвета

2 x 10 см
в комплекте с фиксирующим лейкопластырем 4x10 см

4 упаковки по 220 шт
880 штук

TU 21.20.24-008-44241667-2021 РУ № РЗН

Организация, принимающая претензии: АО «Валента Фарм»
141108, Россия, Московская обл., г. Щелково,
ул. Фабричная, д. 2, тел. +7 (495) 933 48 62,
e-mail: info@valentapharm.com

АО «Валента Фарм», 630028, Россия,
г. Новосибирск, ул. Декабристов, д. 275



LOT


+5°C


+25°C





(М)
мультипласт®

Лейкопластырь мозольный

материал основы мозольного лейкопластыря: ткань эластичная телесного цвета, материал основы лейкопластыря фиксирующего: ткань хлопчатобумажная белого цвета


2 x 10 см
в комплекте с фиксирующим лейкопластырем 4x10 см

4 упаковки по 220 шт
880 штук

TU 21.20.24-008-44241667-2021 РУ № РЗН

Организация, принимающая претензии: АО «Валента Фарм»
141108, Россия, Московская обл., г. Щелково,
ул. Фабричная, д. 2, тел. +7 (495) 933 48 62,
e-mail: info@valentapharm.com

АО «Валента Фарм», 630028, Россия,
г. Новосибирск, ул. Декабристов, д. 275



LOT


+5°C


+25°C





Лейкопластырь мозольный

Групповая упаковка: этикетка-бандероль

Лейкопластырь мозольный 2 x 10 см в комплекте с 4 x 10 см 20 шт.

материал основы мозольного лейкопластыря: ткань хлопчатобумажная белого цвета,
материал основы лейкопластыря фиксирующего: ткань хлопчатобумажная телесного цвета



Лейкопластырь мозольный 2 x 10 см в комплекте с 4 x 10 см 20 шт.

материал основы мозольного лейкопластыря: ткань эластичная телесного цвета,
материал основы лейкопластыря фиксирующего: ткань хлопчатобумажная белого цвета



Лейкопластырь мозольный

Этикетка транспортной упаковки

(М)
мультипласт®

Организация, принимающая претензии: АО «Валента Фарм»
141108, Россия, Московская обл., г. Щелково,
ул. Фабричная, д. 2, тел. +7 (495) 933 48 62,
e-mail: info@valentapharm.com

АО «Валента Фарм», 630028, Россия,
г. Новосибирск, ул. Дембистов, д. 275

Лейкопластырь мозольный

материал основы мозольного лейкопластыря: ткань хлопчатобумажная белого цвета,
материал основы лейкопластыря фиксирующего: ткань хлопчатобумажная телесного цвета

2 x 10 см
в комплекте с фиксирующим лейкопластырем 4x10 см

ТУ 21.20.24-008-44241667-2021 РУ № РЗН

**20 упаковок по 20 шт
400 штук**

LOT

Иконки: влажность, температура +5°C, температура +25°C, запрет огня, запрет солнца

(М)
мультипласт®

Организация, принимающая претензии: АО «Валента Фарм»
141108, Россия, Московская обл., г. Щелково,
ул. Фабричная, д. 2, тел. +7 (495) 933 48 62,
e-mail: info@valentapharm.com

АО «Валента Фарм», 630028, Россия,
г. Новосибирск, ул. Дембистов, д. 275

Лейкопластырь мозольный

материал основы мозольного лейкопластыря: ткань эластичная телесного цвета,
материал основы лейкопластыря фиксирующего: ткань хлопчатобумажная белого цвета

2 x 10 см
в комплекте с фиксирующим лейкопластырем 4x10 см

ТУ 21.20.24-008-44241667-2021 РУ № РЗН

**20 упаковок по 20 шт
400 штук**

LOT

Иконки: влажность, температура +5°C, температура +25°C, запрет огня, запрет солнца

Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 12 листа (ов).
Должность Советник по регистрации и
лицензированию АО «Валента Фарм»
ФИО Биккенин А.А.



(подпись)
М.П.

30 11 2022г.