

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

«ООО «Мирролла»

И.Ю. Степанова

« 22 » мая 2023г.



**Инструкции по применению
(вкладыш)
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**«Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых,
спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019»**

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019, вариант исполнения:

Спрей «Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2) в составе с инструкцией по применению, 50 мл:

Торговые наименования:

- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АкваСол® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АкваБаланс® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Lekstore® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «ЗДРАВСИТИ® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Vitateka® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Эмокап® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АКВАНОРМИН Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «А® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Consumed® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл.

АКВАСОЛ

Средство для орошения и промывания полости носа для
детей и взрослых, спрей «АкваСол® Морская вода»
(распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл
по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Рег. уд. № _____ от _____

1. Назначение медицинского изделия

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

2. Описание и технические характеристики

Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

2.1. Характеристики и состав изделия:

Наименование показателя	Характеристика и норма
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный
Запах	Без запаха
Вкус	Соленый
Массовая доля соли, %	0,9
Массовая доля бензалкония хлорид, %	0,01
Массовая доля вода очищенная, %	99,09
Водородный показатель, pH	3,5-5,5
Осмолярность	270-350 мОсм/л
Объем	50 мл

3. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АкваСол® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019	1
2	Инструкция по применению	1

4. Показания к применению

- для профилактики и использования в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических), в период подъема простудных заболеваний, для детей с 3-х лет и взрослых;

- острые и хронические риниты (насморк);
- острые и хронические синуситы (в т.ч. гайморит);
- острые и хронические аденоидиты;
- аллергические и вазомоторные риниты;
- при изменении слизистой при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов;
- людям пожилого возраста для профилактики возрастных атрофических изменений слизистой оболочки носа;
- субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки);
- профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (ОРВИ и др.);
- ежедневная гигиена полости носа и носоглотки;
- ежедневное применение лицам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лицам, проживающим в условиях сурового климата, нахождения в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением, воздействие загрязненного воздуха (пыли, краски и т.д.).

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.

6. Противопоказания к применению

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к любым опухолям в носоглотке;
- воспаление в улитке или полукружных каналах уха;
- острый отит и обострение хронического отита.

7. Указания по применению

Перед эксплуатацией ознакомиться с инструкцией по применению.

Детям до 14 лет применять средство под наблюдением взрослых.

Средство можно применять при беременности и кормлении грудью.

Средство не вызывает привыкания.

Средство не относится к изделиям, способным влиять на психомоторное состояние человека.

7.1. Меры предосторожности при применении медицинского изделия

Осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена.

Избегайте попадания средства в глаза.

Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

7.2. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Сочетается со всеми средствами для интраназального применения и физиотерапевтическими процедурами.

7.3. Взаимодействие с лекарственными средствами

Взаимодействие с лекарственными средствами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами для интраназального введения. В этом случае полость носа в первую очередь промывается Средством для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей.

8. Побочные эффекты

Возможно: аллергические реакции.

9. Порядок применения

9.1. Подготовка к применению

Подготовку к применению следует проводить при использовании спрея в первый раз. Правильная подготовка к применению обеспечит впрыскивание необходимой дозы средства.

9.1.1. Снять колпачок, плавно потянув его большим и указательным пальцами, придерживая флакон другой рукой.

9.1.2. Держать флакон вертикально и направить наконечник от себя.

9.1.3. Нажать на кнопку распылителя двумя пальцами, произвести несколько нажатий (минимум 4), пока из наконечника не появится небольшое облачко.

9.1.4. Спрей готов к применению.

9.2. Дозировка

По 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в сутки.

Общее количество доз во флаконе – 320. 1 доза – 0,15г. Продолжительность применения средства не ограничена.

9.3 Применение назального спрея

Интраназально.

9.3.1. Снять защитный колпачок с насадки-распылителя.



9.3.2. При вертикальном положении головы ввести наконечник распылителя в каждый носовой ход и произвести распыление нажатием.



9.3.3. Следует избегать попадания спрея в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промыть их теплой водой.

9.4. Уход за распылителем

После каждого применения:

9.4.1. Промокнуть наконечник распылителя и внутреннюю поверхность колпачка сухой чистой салфеткой. Избегать попадания воды.

9.4.2. Следует всегда закрывать флакон и хранить его закрытым. Колпачок защищает распылитель от пыли и засорения.

9.5. В случае, если распылитель не работает

9.5.1. Проверить уровень оставшегося средства во флаконе.

9.5.2. Проверить флакон на наличие повреждений.

9.5.3. Проверить, не засорилось ли отверстие наконечника распылителя. Не пытаться прочистить отверстие наконечника булавкой или другими острыми предметами.

9.5.4. Попытаться привести устройство в действие, повторив процедуру подготовки назального спрея к применению.

10. Упаковка (форма выпуска)

В качестве индивидуальной упаковки изделий используются полиэтиленовые флаконы емкостью 50 мл (первичная упаковка) с распылителем и защитным колпачком, изготовленные по документации предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке. На каждый флакон наносится этикетка.

Каждый флакон и инструкцию по применению медицинских изделий помещают в пачку из картона коробочного (вторичная упаковка).

11. Транспортировка и хранение

11.1. Спрей перевозят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

11.2. Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Беречь от нагрева.

11.3. Хранить в недоступном для детей месте.

12. Утилизация

По степени опасности средство относится к классу А эпидемиологически безопасным отходам по СанПиН 2.1.3684-21 и подлежит утилизации как бытовые отходы.

13. Гарантии изготовителя

Данное изделие разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований. Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения срока его годности при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдены условия хранения.

14. Срок годности

3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности.

После начала использования – 6 мес.

15. Правила представления рекламаций

При выявлении особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, нежелательных реакций при применении и эксплуатации указанного изделия, в случае возникновения вопросов, связанных с применением медицинского изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться в уполномоченную организацию в сфере здравоохранения, а также по адресу производителя:

ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Тел.: +7 (812) 389-21-21.
www.mirrolla.ru

16. Расшифровка символов

и манипуляционных знаков:

P2

символ P2 – обозначает вариант исполнения распылителя, а именно распылитель №2 (производство NANJING RINCHEN INTERNATIONAL TRADING COMPANY Китай). Вариант исполнения с распылителем №1 (производство NINGBO CENTER PACKAGING CO., LTD, Китай) – обозначение отсутствует.



обратиться к инструкции по применению.



срок годности после начала использования.



картон. Подлежит вторичной переработке.



полиэтилен низкой плотности. Подлежит вторичной переработке.



полиэтилен терефталат. Подлежит вторичной переработке.



полипропилен. Подлежит вторичной переработке.

17. Сведения о производителе

Производитель: ООО «Мирролла»
Юридический адрес: Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, 6/н, кор. 271/1.
Тел.: +7 (812) 389-21-21.
www.mirrolla.ru

АКВАБАЛАНС

Средство для орошения и промывания полости носа для
детей и взрослых, спрей «АкваБаланс® Морская вода»
(распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по
ТУ 32.50.50-001-63056800-2019.

Рег. уд. № _____ от _____

1. Назначение медицинского изделия

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

2. Описание и технические характеристики

Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

2.1. Характеристики и состав изделия:

Наименование показателя	Характеристика и норма
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный
Запах	Без запаха
Вкус	Соленый
Массовая доля соли, %	0,9
Массовая доля бензалкония хлорид, %	0,01
Массовая доля воды очищенной, %	99,09
Водородный показатель, pH	3,5-5,5
Осмолярность	270-350 мОсм/л
Объем	50 мл

3. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АкваБаланс® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019	1
2	Инструкция по применению	1

4. Показания к применению

- для профилактики и использования в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических), в период подъема простудных заболеваний, для детей с 3-х лет и взрослых;

- острые и хронические риниты (насморк);

- острые и хронические синуситы (в т. ч. гайморит);

- острые и хронические аденоидиты;

- аллергические и вазомоторные риниты;

- при изменении слизистой при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов;

- людям пожилого возраста для профилактики возрастных атрофических изменений слизистой оболочки носа;

- субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки);

- профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (ОРВИ и др.);

- ежедневная гигиена полости носа и носоглотки;

- ежедневное применение лицам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лицам, проживающим в условиях неблагоприятной окружающей среды (в условиях сурового климата, нахождение в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением, воздействие загрязненного воздуха (пыли, краски и т. д.).

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.

6. Противопоказания к применению

- детский возраст до 3 лет;

- повышенная чувствительность к компонентам средства;

- индивидуальная непереносимость компонентов средства;

- полная непроходимость носовых ходов;

- предрасположенность к любым опухолям в носоглотке;

- воспаление в улитке или полукружных каналах уха;

- острый отит и обострение хронического отита.

7. Указания по применению

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Детям до 14 лет применять средство под наблюдением взрослых.

Средство можно применять при беременности и кормлении грудью.

Средство не вызывает привыкания.

Средство не относится к изделиям, способным влиять на психомоторное состояние человека.

7.1. Меры предосторожности при применении медицинского изделия

Осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена.

Избегайте попадания средства в глаза.

Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

7.2. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Сочетается со всеми средствами для интраназального применения и физиотерапевтическими процедурами.

7.3. Взаимодействие с лекарственными средствами

Взаимодействие с лекарственными средствами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами для интраназального введения. В этом случае полость носа в первую очередь промывается Средством для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей.

8. Побочные эффекты

Возможно: аллергические реакции.

9. Порядок применения

9.1. Подготовка к применению

Подготовку к применению следует проводить при использовании спрея в первый раз. Правильная подготовка к применению обеспечит впрыскивание необходимой дозы средства.

9.1.1. Снять колпачок, плавно потянув его большим и указательным пальцами, придерживая флакон другой рукой.

9.1.2. Держать флакон вертикально и направить наконечник от себя.

9.1.3. Нажать на кнопку распылителя двумя пальцами, произвести несколько нажатий (минимум 4), пока из наконечника не появится небольшое облачко.

9.1.4. Спрей готов к применению.

9.2. Дозировка

По 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в сутки.
Общее количество доз во флаконе – 320, 1 доза – 0,15г.
Продолжительность применения средства не ограничена.

9.3. Применение назального спрея

Интраназально.

9.3.1. Снять защитный колпачок с насадки-распылителя.



9.3.2. При вертикальном положении головы ввести наконечник распылителя в каждый носовой ход и произвести распыление нажатием.



9.3.3. Следует избегать попадания спрея в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промыть их теплой водой.

9.4. Уход за распылителем

После каждого применения:

9.4.1. Промокнуть наконечник распылителя и внутреннюю поверхность колпачка сухой чистой салфеткой. Избегать попадания воды.

9.4.2. Следует всегда закрывать флакон и хранить его закрытым. Колпачок защищает распылитель от пыли и засорения.

9.5. В случае, если распылитель не работает

9.5.1. Проверить уровень оставшегося средства во флаконе.

9.5.2. Проверить флакон на наличие повреждений.

9.5.3. Проверить, не засорилось ли отверстие наконечника распылителя. Не пытаться прочистить отверстие наконечника булавкой или другими острыми предметами.

9.5.4. Попытаться привести устройство в действие, повторив процедуру подготовки назального спрея к применению.

10. Упаковка (форма выпуска)

В качестве индивидуальной упаковки изделий используются полиэтиленовые флаконы емкостью 50 мл (первичная упаковка) с распылителем и защитным колпачком, изготовленные по документации предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке. На каждый флакон наносится этикетка. Каждый флакон и инструкцию по применению медицинских изделий помещают в пачку из картона коробочного (вторичная упаковка).

11. Транспортировка и хранение

11.1. Спрей перевозят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

11.2. Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Беречь от нагрева.

11.3. Хранить в недоступном для детей месте.

12. Утилизация

По степени опасности средство относится к классу А эпидемиологически безопасным отходам по СанПиН 2.1.3684-21 и подлежит утилизации как бытовые отходы.

13. Гарантии изготовителя

Данное изделие разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований. Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения срока его годности при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдены условия хранения.

14. Срок годности

3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности.
После начала использования – 6 мес.

15. Правила представления рекламаций

При выявлении особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, нежелательных реакций при применении и эксплуатации указанного изделия, в случае возникновения вопросов, связанных с применением медицинского изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться в уполномоченную организацию в сфере здравоохранения, а также по адресу производителя: ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н. Тел.: +7 (812) 389-21-21. www.mirrolla.ru

16. Расшифровка символов и манипуляционных знаков:

P2 символ P2 - обозначает вариант исполнения распылителя, а именно распылитель №2 (производство NANJING RINCHEN INTERNATIONAL TRADING COMPANY, Китай). Вариант исполнения с распылителем №1 (производство NINGBO CENTER PACKAGING CO., LTD, Китай) – обозначение отсутствует.

 обратитесь к инструкции по применению.

 срок годности после начала использования.

 картон. Подлежит вторичной переработке.

 полиэтилен низкой плотности. Подлежит вторичной переработке.

 полиэтилентерефталат. Подлежит вторичной переработке.

 полипропилен. Подлежит вторичной переработке.

17. Сведения о производителе

Производитель: ООО «Мирролла»
Юридический адрес: Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, гп. Кузьмоловский, 6/4, кор. 271/1. Тел.: +7 (812) 389-21-21. www.mirrolla.ru

Lekstore®

**Средство для орошения и промывания полости
носа для детей и взрослых, спрей «Lekstore®
Морская вода» (распылитель №1 или распылитель
№2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019**

Рег. уд. № _____ от _____

1. Назначение медицинского изделия

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

2. Описание и технические характеристики

Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

2.1. Характеристики и состав изделия:

Наименование показателя	Характеристика и норма
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный
Запах	Без запаха
Вкус	Соленый
Массовая доля соли, %	0,9
Массовая доля бензалкония, хлорид %	0,01
Массовая доля вода очищенная, %	99,09
Водородный показатель, pH	3,5-5,5
Осмолярность	270-350 мОсм/л
Объем	50 мл

3. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Lekstore® Морская вода»-распылитель №1 или распылитель №2, 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019	1
2	Инструкция по применению	1

4. Показания к применению

- для профилактики и использования в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических), в период подъема простудных заболеваний, для детей с 3-х лет и взрослых;

- острые и хронические риниты (насморк);

- острые и хронические синуситы (в т. ч. гайморит);

- острые и хронические аденоидиты;

- аллергические и вазомоторные риниты;

- при изменении слизистой при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов;

- людям пожилого возраста для профилактики возрастных атрофических изменений слизистой оболочки носа;

- субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки);

- профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (ОРВИ и др.);

- ежедневная гигиена полости носа и носоглотки;

- ежедневное применение лицам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лицам, проживающим в условиях неблагоприятной окружающей среды (в условиях сурового климата, нахождение в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением, воздействие загрязненного воздуха (пыли, краски и т. д.).

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.

6. Противопоказания к применению

- детский возраст до 3 лет;

- повышенная чувствительность к компонентам средства;

- индивидуальная непереносимость компонентов средства;

- полная непроходимость носовых ходов;

- предрасположенность к любым опухолям в носоглотке;

- воспаление в улитке или полукружных каналах уха;

- острый отит и обострение хронического отита.

7. Указания по применению

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Детям до 14 лет применять средство под наблюдением взрослых.

Средство можно применять при беременности и кормлении грудью.

Средство не вызывает привыкания.

Средство не относится к изделиям, способным влиять на психомоторное состояние человека.

7.1. Меры предосторожности при применении медицинского изделия

Осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена.

Избегайте попадания средства в глаза.

Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

7.2. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Сочетается со всеми средствами для интраназального применения и физиотерапевтическими процедурами.

7.3. Взаимодействие с лекарственными средствами

Взаимодействие с лекарственными средствами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами для интраназального введения. В этом случае полость носа в первую очередь промывается Средством для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей.

8. Побочные эффекты

Возможно: аллергические реакции.

9. Порядок применения

9.1. Подготовка к применению

Подготовку к применению следует проводить при использовании спрея в первый раз. Правильная подготовка к применению обеспечит впрыскивание необходимой дозы средства.

9.1.1. Снять колпачок, плавно потянув его большим и указательным пальцами, придерживая флакон другой рукой.

9.1.2. Держать флакон вертикально и направить наконечник от себя.

9.1.3. Нажать на кнопку распылителя двумя пальцами, произвести несколько нажатий (минимум 4), пока из наконечника не появится небольшое облачко.

9.1.4. Спрей готов к применению.

9.2. Дозировка

По 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в сутки.
Общее количество доз во флаконе – 320. 1 доза – 0,15 г.
Продолжительность применения средства не ограничена.

9.3. Применение назального спрея

Интраназально.

9.3.1. Снять защитный колпачок с насадки-распылителя.



9.3.2. При вертикальном положении головы ввести наконечник распылителя в каждый носовой ход и произвести распыление нажатием.



9.3.3. Следует избегать попадания спрея в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промыть их теплой водой.

9.4. Уход за распылителем

После каждого применения:

9.4.1. Промокнуть наконечник распылителя и внутреннюю поверхность колпачка сухой чистой салфеткой. Избегать попадания воды.

9.4.2. Следует всегда закрывать флакон и хранить его закрытым. Колпачок защищает распылитель от пыли и засорения.

9.5. В случае, если распылитель не работает

9.5.1. Проверить уровень оставшегося средства во флаконе.

9.5.2. Проверить флакон на наличие повреждений.

9.5.3. Проверить, не засорилось ли отверстие наконечника распылителя. Не пытаться прочистить отверстие наконечника булавкой или другими острыми предметами.

9.5.4. Попытаться привести устройство в действие, повторить процедуру подготовки назального спрея к применению.

10. Упаковка (форма выпуска)

В качестве индивидуальной упаковки изделий используются полиэтиленовые флаконы емкостью 50 мл (первичная упаковка) с распылителем и защитным колпачком, изготовленные по документации предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке. На каждый флакон наносится этикетка.

Каждый флакон и инструкцию по применению медицинских изделий помещают в пачку из картона коробочного (вторичная упаковка).

11. Транспортировка и хранение

11.1. Спрей перевозят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

11.2. Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Беречь от нагрева.

11.3. Хранить в недоступном для детей месте.

12. Утилизация

По степени опасности средство относится к классу А эпидемиологически безопасным отходам по СанПиН 2.1.3684-21 и подлежит утилизации как бытовые отходы.

13. Гарантии изготовителя

Данное изделие разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований. Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения срока его годности при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдены условия хранения.

14. Срок годности

3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности.

После начала использования – 6 мес.

15. Правила представления рекламаций

При выявлении особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, нежелательных реакций при применении и эксплуатации указанного изделия, в случае возникновения вопросов, связанных с применением медицинского изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться в уполномоченную организацию в сфере здравоохранения, а также по адресу производителя:

ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Тел.: +7 (812) 389-21-21.
www.mirrolla.ru

16. Расшифровка символов и манипуляционных знаков:

P2 символ P2 - обозначает вариант исполнения распылителя, а именно распылитель №2 (производство NANJING RINCHEN INTERNATIONAL TRADING COMPANY, Китай). Вариант исполнения с распылителем №1 (производство NINGBO CENTER PACKAGING CO., LTD, Китай) – обозначение отсутствует.

 обратитесь к инструкции по применению.

 срок годности после начала использования.

 картон. Подлежит вторичной переработке.

 полиэтилен низкой плотности. Подлежит вторичной переработке.

 полиэтилентерефталат. Подлежит вторичной переработке.

 полипропилен. Подлежит вторичной переработке.

17. Сведения о производителе

Производитель: ООО «Мирролла»
Юридический адрес: Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, б/н, кор. 271/1.
Тел.: + 7 (812) 389-21-21, www.mirrolla.ru

здравсити ♥ ру

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «ЗДРАВСИТИ® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Рег. уд. № _____ от _____

1. Назначение медицинского изделия

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее – спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

2. Описание и технические характеристики

Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

2.1. Характеристики и состав изделия:

Наименование показателя	Характеристика и норма
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость.
Цвет	Бесцветный
Запах	Без запаха
Вкус	Солёный
Массовая доля соли, %	0,9
Массовая доля бензалкония хлорид, %	0,01
Массовая доля воды очищенная, %	99,09
Водородный показатель, pH	3,5-5,5
Осмотическая	270-350 мОсм/л
Объем	50 мл

3. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «ЗДРАВСИТИ® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019	1
2	Инструкция по применению	1

4. Показания к применению

- для профилактики и использования в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических), в период подъема простудных заболеваний, для детей с 3-х лет и взрослых;
- острые и хронические риниты (насморк);
- острые и хронические синуситы (в т. ч. гайморит);
- острые и хронические аденоидиты;
- аллергические и вазомоторные риниты;
- при изменении слизистой при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов;
- людям пожилого возраста для профилактики возрастных атрофических изменений слизистой оболочки носа;
- субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки);
- профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (ОРВИ и др.);
- ежедневная гигиена полости носа и носоглотки;
- ежедневное применение лицам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лицам, проживающим в условиях неблагоприятной окружающей среды (в условиях сурового климата, нахождение в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением, воздействие загрязненного воздуха (пыли, краски и т. д.)

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.

6. Противопоказания к применению

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к любым опухолям в носоглотке;
- воспаление в улитке или полукружных каналах уха;
- острый отит и обострение хронического отита.

7. Указания по применению

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией по применению. Детям до 14 лет применять средство под наблюдением взрослых. Средство можно применять при беременности и кормлении грудью. Средство не вызывает привыкания. Средство не относится к изделиям, способным влиять на психомотормное состояние человека.

7.1. Меры предосторожности при применении медицинского изделия

Осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

7.2. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Сочетается со всеми средствами для интраназального применения и физиотерапевтическими процедурами.

7.3. Взаимодействие с лекарственными средствами

Взаимодействие с лекарственными средствами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами для интраназального введения. В этом случае полость носа в первую очередь промывается Средством для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей.

8. Побочные эффекты

Возможно: аллергические реакции.

9. Порядок применения

9.1. Подготовка к применению

Подготовку к применению следует проводить при использовании спрея в первый раз. Правильная подготовка к применению обеспечит впрыскивание необходимой дозы средства.

9.1.1. Снять колпачок, плавно потянув его большим и указательным пальцами, придерживая флакон другой рукой.

9.1.2. Держать флакон вертикально и направить наконечник от себя.

9.1.3. Нажать на кнопку распылителя двумя пальцами, произвести несколько нажатий (минимум 4), пока из наконечника не появится небольшое облачко.

9.1.4. Спрей готов к применению.

9.2. Дозировка

По 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в сутки.

Общее количество доз во флаконе – 320. 1 доза – 0,15г.
Продолжительность применения средства не ограничена.

9.3. Применение назального спрея

Интраназально.
9.3.1. Снять защитный колпачок с насадкой-распылителя.



9.3.2. При вертикальном положении головы ввести наконечник распылителя в каждый носовой ход и произвести распыление нажатием.



9.3.3. Следует избегать попадания спрея в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промыть их теплой водой.

9.4. Уход за распылителем

После каждого применения:
9.4.1. Протереть наконечник распылителя и внутреннюю поверхность колпачка сухой чистой салфеткой. Избегать попадания воды.
9.4.2. Следует всегда закрывать флакон и хранить его закрытым. Колпачок защищает распылитель от пыли и засорения.

9.5. В случае, если распылитель не работает

9.5.1. Проверить уровень оставшегося средства во флаконе.
9.5.2. Проверить флакон на наличие повреждений.
9.5.3. Проверить, не засорилось ли отверстие наконечника распылителя. Не пытаться прочистить отверстие наконечника булавкой или другими острыми предметами.
9.5.4. Попытайся привести устройство в действие, повторив процедуру подготовки назального спрея к применению.

10. Упаковка (форма выпуска)

В качестве индивидуальной упаковки изделий используются полиэтиленовые флаконы емкостью 50 мл (первичная упаковка), с распылителем и защитным колпачком, изготовленные по документации предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке. На каждый флакон наносится этикетка.
Каждый флакон и инструкцию по применению медицинских изделий помещают в пачку из картона коробочного (вторичная упаковка).

11. Транспортировка и хранение

11.1. Спреи перевозят всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

11.2. Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Беречь от нагрева.

11.3. Хранить в недоступном для детей месте.

12. Утилизация

По степени опасности средство относится к классу А эпидемиологически безопасным отходам по СанПиН 2.1.3684-21 и подлежит утилизации как бытовые отходы.

13. Гарантии изготовителя

Данное изделие разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований. Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения срока его годности при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдены условия хранения.

14. Срок годности

3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности.
После начала использования – 6 мес.

15. Правила представления рекламаций

При выявлении особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, нежелательных реакций при применении и эксплуатации указанного изделия, в случае возникновения вопросов, связанных с применением медицинского изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться в уполномоченную организацию в сфере здравоохранения, а также по адресу производителя: ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Тел.: +7 (812) 389-21-21
www.mirrola.ru

16. Расшифровка символов и манипуляционных знаков:

P2 символ P2 - обозначает вариант исполнения распылителя, а именно распылитель №2 (производство NANJING RINCHEN INTERNATIONAL TRADING COMPANY, Китай). Вариант исполнения с распылителем №1 (производство HINGBO CENTER PACKAGING CO., LTD, Китай) – обозначение отсутствует.

 обратитесь к инструкции по применению.

 срок годности после начала использования.

 картон. Подлежит вторичной переработке.

 полиэтилен низкой плотности. Подлежит вторичной переработке.

 полиэтилентерефталат. Подлежит вторичной переработке.

 полипропилен. Подлежит вторичной переработке.

17. Сведения о производителе

Производитель: ООО «Мирролла»
Юридический адрес: Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, 6/н, кор. 27/1.
Тел.: +7 (812) 389-21-21
www.mirrola.ru



Средство для орошения и промывания полости
носа для детей и взрослых, спрей «Vitateka®
Морская вода» (распылитель №1 или
распылитель №2), 50 мл
по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019
Рег. уд. № _____ от _____

1. Назначение медицинского изделия

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

2. Описание и технические характеристики

Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

2.1. Характеристики и состав изделия:

Наименование показателя	Характеристика и норма
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный
Запах	Без запаха
Вкус	Соленый
Массовая доля соли, %	0,9
Массовая доля бензалкония хлорид, %	0,01
Массовая доля воды очищенной, %	99,09
Водородный показатель, pH	3,5-5,5
Осмолярность	270-350 мОсм/л
Объем	50 мл

3. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Vitateka® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019	1
2	Инструкция по применению	1

4. Показания к применению

- для профилактики и использования в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических), в период подъема простудных заболеваний, для детей с 3-х лет и взрослых;

- острые и хронические риниты (насморк);

- острые и хронические синуситы (в т. ч. гайморит);

- острые и хронические аденоидиты;

- аллергические и вазомоторные риниты;

- при изменении слизистой при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов;

- людям пожилого возраста для профилактики возрастных атрофических изменений слизистой оболочки носа;

- субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки);

- профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (ОРВИ и др.);

- ежедневная гигиена полости носа и носоглотки;

- ежедневное применение лицам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лицам, проживающим в условиях неблагоприятной окружающей среды (в условиях сурового климата, нахождение в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением, воздействие загрязненного воздуха (пыль, краски и т. д.).

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.

6. Противопоказания к применению

- детский возраст до 3 лет;

- повышенная чувствительность к компонентам средства;

- индивидуальная непереносимость компонентов средства;

- полная непроходимость носовых ходов;

- предрасположенность к любым спухолем в носоглотке;

- воспаление в улитке или полукружных каналах уха;

- острый отит и обострение хронического отита.

7. Указания по применению

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Детям до 14 лет применять средство под наблюдением взрослых.

Средство можно применять при беременности и кормлении грудью.

Средство не вызывает привыкания.

Средство не относится к изделиям, способным влиять на психомоторное состояние человека.

7.1. Меры предосторожности при применении медицинского изделия

Осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена.

Избегайте попадания средства в глаза.

Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

7.2. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Сочетается со всеми средствами для интраназального применения и физиотерапевтическими процедурами.

7.3. Взаимодействие с лекарственными средствами

Взаимодействие с лекарственными средствами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами для интраназального введения. В этом случае полость носа в первую очередь промывается Средством для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей.

8. Побочные эффекты

Возможно: аллергические реакции.

9. Порядок применения

9.1. Подготовка к применению

Подготовку к применению следует проводить при использовании спрея в первый раз. Правильная подготовка к применению обеспечит впрыскивание необходимой дозы средства.

9.1.1 Снять колпачок, плавно потянув его большим и указательным пальцами, придерживая флакон другой рукой.

9.1.2. Держать флакон вертикально и направить наконечник от себя.

9.1.3. Нажать на кнопку распылителя двумя пальцами, произвести несколько нажатий (минимум 4), пока из наконечника не появится небольшое облачко.

9.1.4. Спрей готов к применению.


9.2 Дозировка

По 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в сутки.
Общее количество доз во флаконе – 320. 1 доза – 0,15г.
Продолжительность применения средств не ограничена.

9.3 Применение назального спрея

Интраназально.

9.3.1. Снять защитный колпачок с насадки-распылителя.



9.3.2. При вертикальном положении головы ввести наконечник распылителя в каждый носовой ход и произвести распыление нажатием.



9.3.3. Следует избегать попадания спрея в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промыть их теплой водой.

9.4. Уход за распылителем

После каждого применения:

9.4.1. Промокнуть наконечник распылителя и внутреннюю поверхность колпачка сухой чистой салфеткой. Избегать попадания воды.

9.4.2. Следует всегда закрывать флакон и хранить его закрытым. Колпачок защищает распылитель от пыли и засорения.

9.5. В случае, если распылитель не работает

9.5.1. Проверить уровень оставшегося средства во флаконе.

9.5.2. Проверить флакон на наличие повреждений.

9.5.3. Проверить, не засорилось ли отверстие наконечника распылителя. Не пытаться прочистить отверстие наконечника булавкой или другими острыми предметами.

9.5.4. Попытаться привести устройство в действие, повторив процедуру подготовки назального спрея к применению.

10. Упаковка (форма выпуска)

В качестве индивидуальной упаковки изделий используются полиэтиленовые флаконы емкостью 50 мл (первичная упаковка) с распылителем и защитным колпачком, изготовленные по документации предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке. На каждый флакон наносится этикетка.

Каждый флакон и инструкцию по применению медицинских изделий помещают в пачку из картона коробочного (вторичная упаковка).

11. Транспортировка и хранение

11.1. Спрей перевозят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

11.2. Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Беречь от нагрева.

11.3. Хранить в недоступном для детей месте.

12. Утилизация

По степени опасности средство относится к классу А эпидемиологически безопасным отходам по СанПиН 2.1.3684-21 и подлежит утилизации как бытовые отходы.

13. Гарантии изготовителя

Данное изделие разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований. Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения срока его годности при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдены условия хранения.

14. Срок годности

3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности.

После начала использования – 6 мес.

15. Правила представления рекламаций

При выявлении особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, нежелательных реакций при применении и эксплуатации указанного изделия, в случае возникновения вопросов, связанных с применением медицинского изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться в уполномоченную организацию в сфере здравоохранения, а также по адресу производителя:

ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Тел.: +7 (812) 389-21-21.
www.mirrolla.ru

16. Расшифровка символов и манипуляционных знаков:

P2

символ P2 - обозначает вариант исполнения распылителя, а именно распылитель №2 (производство NANJING RINCHEN INTERNATIONAL TRADING COMPANY, Китай). Вариант исполнения с распылителем №1 (производство NINGBO CENTER PACKAGING CO., LTD, Китай) – обозначение отсутствует.



обратиться к инструкции по применению.



срок годности после начала использования.



картон. Подлежит вторичной переработке.



полиэтилен низкой плотности. Подлежит вторичной переработке.



полиэтилентерефталат. Подлежит вторичной переработке.



полипропилен. Подлежит вторичной переработке.

17. Сведения о производителе

Производитель: ООО «Мирролла»

Юридический адрес: Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.

Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, б/н, кор. 271/1.

Тел.: + 7 (812) 389-21-21.

www.mirrolla.ru

ЭМОКАП

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Эмокап® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Рег. уд. № _____ от _____

1. Назначение медицинского изделия

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

2. Описание и технические характеристики

Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

2.1. Характеристики и состав изделия:

Наименование показателя	Характеристика и норма
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный
Запах	Без запаха
Вкус	Соленый
Массовая доля соли, %	0,9
Массовая доля бензалкония хлорид, %	0,01
Массовая доля вода очищенная, %	99,09
Водородный показатель, pH	3,5-5,5
Осмолярность	270-350 мОсм/л
Объем	50 мл

3. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Эмокап® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019	1
2	Инструкция по применению	1

4. Показания к применению

- для профилактики и использования в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических), в период подъема простудных заболеваний, для детей с 3-х лет и взрослых:

- острые и хронические риниты (насморк);
- острые и хронические синуситы (в т. ч. гайморит);
- острые и хронические аденоидиты;
- аллергические и вазомоторные риниты;
- при изменении слизистой при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов;
- людям пожилого возраста для профилактики возрастных атрофических изменений слизистой оболочки носа;
- субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки);
- профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (ОРВИ и др.);
- ежедневная гигиена полости носа и носоглотки;
- ежедневное применение лицам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лицам, проживающим в условиях неблагоприятной окружающей среды (в условиях сурового климата, нахождение в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением, воздействие загрязненного воздуха (пыли, краски и т. д.).

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.

6. Противопоказания к применению

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к любым опухолям в носоглотке;
- воспаление в улитке или полукружных каналах уха;
- острый отит и обострение хронического отита.

7. Указания по применению

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Детям до 14 лет применять средство под наблюдением взрослых.

Средство можно применять при беременности и кормлении грудью.

Средство не вызывает привыкания.

Средство не относится к изделиям, способным влиять на психомоторное состояние человека.

7.1. Меры предосторожности при применении медицинского изделия

Осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена.

Избегайте попадания средства в глаза.

Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

7.2. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Сочетается со всеми средствами для интраназального применения и физиотерапевтическими процедурами.

7.3. Взаимодействие с лекарственными средствами

Взаимодействие с лекарственными средствами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами для интраназального введения. В этом случае полость носа в первую очередь промывается Средством для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей.

8. Побочные эффекты

Возможно: аллергические реакции.

9. Порядок применения

9.1. Подготовка к применению

Подготовку к применению следует проводить при использовании спрея в первый раз. Правильная подготовка к применению обеспечит впрыскивание необходимой дозы средства.

9.1.1. Снять колпачок, плавно потянув его большим и указательным пальцами, придерживая флакон другой рукой.

9.1.2. Держать флакон вертикально и направить наконечник от себя.

9.1.3. Нажать на кнопку распылителя двумя пальцами, произвести несколько нажатий (минимум 4), пока из наконечника не появится небольшое облачко.

9.1.4. Спрей готов к применению.

9.2. Дозировка

По 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в сутки.

Общее количество доз во флаконе — 320. 1 доза — 0,15г.

Продолжительность применения средства не ограничена.

9.3. Применение назального спрея

Интраназально.

9.3.1. Снять защитный колпачок с насадки-распылителя.



9.3.2. При вертикальном положении головы ввести наконечник распылителя в каждый носовой ход и произвести распыление нажатием.



9.3.3. Следует избегать попадания спрея в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промыть их теплой водой.

9.4. Уход за распылителем

После каждого применения:

9.4.1. Промокнуть наконечник распылителя и внутреннюю поверхность колпачка сухой чистой салфеткой. Избегать попадания воды.

9.4.2. Следует всегда закрывать флакон и хранить его закрытым. Колпачок защищает распылитель от пыли и засорения.

9.5. В случае, если распылитель не работает:

9.5.1. Проверить уровень оставшегося средства во флаконе.

9.5.2. Проверить флакон на наличие повреждений.

9.5.3. Проверить, не засорилось ли отверстие наконечника распылителя. Не пытаться прочистить отверстие наконечника булавкой или другими острыми предметами.

9.5.4. Попытаться привести устройство в действие, повторив процедуру подготовки назального спрея к применению.

10. Упаковка (форма выпуска)

В качестве индивидуальной упаковки изделий используются полиэтиленовые флаконы емкостью 50 мл (первичная упаковка) с распылителем и защитным колпачком, изготовленные по документации предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке. На каждый флакон наносится этикетка.

Каждый флакон и инструкцию по применению медицинских изделий помещают в пачку из картона коробочного (вторичная упаковка).

11. Транспортировка и хранение

11.1. Спрей перевозят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида при температуре от плюс 5 °C до плюс 25 °C.

11.2. Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от плюс 5 °C до плюс 25 °C. Беречь от нагрева.

11.3. Хранить в недоступном для детей месте.

12. Утилизация

По степени опасности средство относится к классу А эпидемиологически безопасным отходам по СанПиН 2.1.3684-21 и подлежит утилизации как бытовые отходы.

13. Гарантии изготовителя

Данное изделие разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований. Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения срока его годности при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдены условия хранения.

14. Срок годности

3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности.

После начала использования — 6 мес.

15. Правила представления рекламаций

При выявлении особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, нежелательных реакций при применении и эксплуатации указанного изделия, в случае возникновения вопросов, связанных с применением медицинского изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться в уполномоченную организацию в сфере здравоохранения, а также по адресу производителя:

ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Тел.: +7 (812) 389-21-21.
www.mirrrola.ru

16. Расшифровка символов и манипулционных знаков:

P2 символ P2 - обозначает вариант исполнения распылителя, а именно распылитель №2 (производство NANJING RINCHEN INTERNATIONAL TRADING COMPANY, Китай). Вариант исполнения с распылителем №1 (производство NINGBO CENTER PACKAGING CO., LTD, Китай) — обозначение отсутствует.

 обратитесь к инструкции по применению.

 срок годности после начала использования.

 картон. Подлежит вторичной переработке.

 полиэтилен низкой плотности. Подлежит вторичной переработке.

 полиэтилентерефталат. Подлежит вторичной переработке.

 полипропилен. Подлежит вторичной переработке.

17. Сведения о производителе

Производитель: ООО «Мирролла»
Юридический адрес: Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, б/н, кор. 271/1.
Тел.: +7 (812) 389-21-21.
www.mirrrola.ru



Средство для орошения и промывания полости носа
для детей и взрослых, спрей «АКВАНОРМИН
Морская вода» (распылитель №1 или распылитель
№2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019
Рег. уд. № _____ от _____

1. Назначение медицинского изделия

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

2. Описание и технические характеристики

Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

2.1. Характеристики и состав изделия:

Наименование показателя	Характеристика и норма
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный
Запах	Без запаха
Вкус	Сопеный
Массовая доля соли, %	0,9
Массовая доля бензалкония хлорид, %	0,01
Массовая доля воды очищенной, %	99,09
Водородный показатель, pH	3,5-5,5
Осмолярность	270-350 мОсм/л
Объем	50 мл

3. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АКВАНОРМИН Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019	1
2	Инструкция по применению	1

4. Показания к применению

- для профилактики и использования в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических), в период подъема простудных заболеваний, для детей с 3-х лет и взрослых;

- острые и хронические риниты (насморк);
- острые и хронические синуситы (в т. ч. гайморит);
- острые и хронические аденоидиты;
- аллергические и вазомоторные риниты;
- при изменении слизистой при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов;
- людям пожилого возраста для профилактики возрастных изменений слизистой оболочки носа;
- субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки);
- профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (ОРВИ и др.);
- ежедневная гигиена полости носа и носоглотки;
- ежедневное применение лицам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лицам, проживающим в условиях неблагоприятной окружающей среды (в условиях сурового климата, нахождение в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением, воздействие загрязненного воздуха (пыли, краски и т. д.).

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.

6. Противопоказания к применению

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к любым опухолям в носоглотке;
- воспаление в улитке или полукружных каналах уха;
- острый отит и обострение хронического отита.

7. Указания по применению

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией по применению. Детям до 14 лет применять средство под наблюдением взрослых. Средство можно применять при беременности и кормлении грудью. Средство не вызывает привыкания. Средство не относится к изделиям, способным влиять на психомотивное состояние человека.

7.1. Меры предосторожности при применении медицинского изделия

Осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

7.2. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Сочетается со всеми средствами для интраназального применения и физиотерапевтическими процедурами.

7.3. Взаимодействие с лекарственными средствами

Взаимодействие с лекарственными средствами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами для интраназального введения. В этом случае полость носа в первую очередь промывается Средством для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей.

8. Побочные эффекты

Возможно: аллергические реакции.

9. Порядок применения

9.1. Подготовка к применению

Подготовку к применению следует проводить при использовании спрея в первый раз. Правильная подготовка к применению обеспечит впрыскивание необходимой дозы средства.

9.1.1. Снять колпачок, плавно потянув его большим и указательным пальцами, придерживая флакон другой рукой.

9.1.2. Держать флакон вертикально и направить наконечник от себя.

9.1.3. Нажать на кнопку распылителя двумя пальцами, произвести несколько нажатий (минимум 4), пока из наконечника не появится небольшое облачко.

9.1.4. Спрей готов к применению.

9.2. Дозировка

По 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в сутки.

Общее количество доз во флаконе — 320. 1 доза — 0,15г.
Продолжительность применения средства не ограничена.

9.3. Применение назального спрея

Интраназально.

9.3.1. Снять защитный колпачок с насадки-распылителя.



9.3.2. При вертикальном положении головы ввести наконечник распылителя в каждый носовой ход и произвести распыление нажатием.



9.3.3. Следует избегать попадания спрея в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промыть их теплой водой.

9.4. Уход за распылителем

После каждого применения:

9.4.1. Промокнуть наконечник распылителя и внутреннюю поверхность колпачка сухой чистой салфеткой. Избегать попадания воды.

9.4.2. Следует всегда закрывать флакон и хранить его закрытым. Колпачок защищает распылитель от пыли и засорения.

9.5. В случае, если распылитель не работает

9.5.1. Проверить уровень оставшегося средства во флаконе.

9.5.2. Проверить флакон на наличие повреждений.

9.5.3. Проверить, не засорилось ли отверстие наконечника распылителя. Не пытаться прочистить отверстие наконечника булавкой или другими острыми предметами.

9.5.4. Попытаться привести устройство в действие, повторив процедуру подготовки назального спрея к применению.

10. Упаковка (форма выпуска)

В качестве индивидуальной упаковки изделий используются полиэтиленовые флаконы емкостью 50 мл (первичная упаковка) с распылителем и защитным колпачком, изготовленные по документации предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке. На каждый флакон наносится этикетка. Каждый флакон и инструкцию по применению медицинских изделий помещают в пачку из картона коробочного (вторичная упаковка).

11. Транспортировка и хранение

11.1. Спреи перевозят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

11.2. Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Беречь от нагрева.

11.3. Хранить в недоступном для детей месте.

12. Утилизация

По степени опасности средство относится к классу А эпидемиологически безопасным отходам по СанПиН 2.1.3684-21 и подлежит утилизации как бытовые отходы.

13. Гарантии изготовителя

Данное изделие разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований. Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения срока его годности при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдены условия хранения.

14. Срок годности

3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности.

После начала использования — 6 мес.

15. Правила представления рекламаций

При выявлении особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, нежелательных реакций при применении и эксплуатации указанного изделия, а также возникновения вопросов, связанных с применением медицинского изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться в уполномоченную организацию в сфере здравоохранения, а также по адресу производителя:

ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Тел.: +7 (812) 389-21-21.
www.mirrolla.ru

16. Расшифровка символов и манипуляционных знаков:

P2 символ P2 - обозначает вариант исполнения распылителя, а именно распылитель №2 (производство NANJING RINCHEN INTERNATIONAL TRADING COMPANY, Китай). Вариант исполнения с распылителем №1 (производство NINGBO CENTER PACKAGING CO., LTD, Китай) — обозначение отсутствует.

 обратится к инструкции по применению.

 срок годности после начала использования.

 картон. Подлежит вторичной переработке.

 полиэтилен низкой плотности. Подлежит вторичной переработке.

 полиэтилен-тереофатал. Подлежит вторичной переработке.

 полипропилен. Подлежит вторичной переработке.

17. Сведения о производителе

Производитель: ООО «Мирролла»
Юридический адрес: Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, б/н, кор. 271/1.
Тел.: +7 (812) 389-21-21.
www.mirrolla.ru

МОРСКАЯ ВОДА

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «А® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Пер. уд. № _____ от _____

1. Назначение медицинского изделия

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

2. Описание и технические характеристики

Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

2.1. Характеристики и состав изделия:

Наименование показателя	Характеристика и норма
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный
Запах	Без запаха
Вкус	Соленый
Массовая доля соли, %	0,9
Массовая доля бензалкония хлорид, %	0,01
Массовая доля воды очищенная, %	99,09
Водородный показатель, pH	3,5-5,5
Осмолярность	270-350 мОсм/л
Объем	50 мл

3. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «А® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019	1
2	Инструкция по применению	1

4. Показания к применению

- для профилактики и использования в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических), в период подъема простудных заболеваний, для детей с 3-х лет и взрослых;
- острые и хронические риниты (насморк);
- острые и хронические синуситы (в т. ч. гайморит);
- острые и хронические аденоидиты;
- аллергические и вазомоторные риниты;
- при изменении слизистой при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов;
- людям пожилого возраста для профилактики возрастных атрофических изменений слизистой оболочки носа;
- субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки);
- профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (ОРВИ и др.);
- ежедневная гигиена полости носа и носоглотки;
- ежедневное применение лицам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лицам, проживающим в условиях неблагоприятной окружающей среды (в условиях сурового климата, нахождение в помещениях с кондиционированным воздухом и/или цент-

ральным отоплением, воздействие загрязненного воздуха (пыли, краски и т. д.).

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.

6. Противопоказания к применению

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к любым опухолям в носоглотке;
- воспаление в улитке или полукружных каналах уха;
- острый отит и обострение хронического отита.

7. Указания по применению

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Детям до 14 лет применять средство под наблюдением взрослых.

Средство можно применять при беременности и кормлении грудью.

Средство не вызывает привыкания.

Средство не относится к изделиям, способным влиять на психомоторное состояние человека.

7.1. Меры предосторожности при применении медицинского изделия

Осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена.

Избегайте попадания средства в глаза.

Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

7.2. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Сочетается со всеми средствами для интраназального применения и физиотерапевтическими процедурами.

7.3. Взаимодействие с лекарственными средствами

Взаимодействие с лекарственными средствами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами для интраназального введения. В этом случае полость носа в первую очередь промывается Средством для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей.

8. Побочные эффекты

Возможно: аллергические реакции.

9. Порядок применения

9.1. Подготовка к применению

Подготовку к применению следует проводить при использовании спрея в первый раз. Правильная подготовка к применению обеспечит впрыскивание необходимой дозы средства.

9.1.1 Снять колпачок, плавно потянув его большим и указательным пальцами, придерживая флакон другой рукой.

9.1.2. Держать флакон вертикально и направить наконечник от себя.

9.1.3. Нажать на кнопку распылителя двумя пальцами, произвести несколько нажатий (минимум 4), пока из наконечника не появится небольшое облачко.

9.1.4. Спрей готов к применению.

9.2. Дозировка

По 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в сутки.
Общее количество доз во флаконе - 320. 1 доза - 0,15г.
Продолжительность применения средства не ограничена.

9.3. Применение назального спрея

Интраназально.

9.3.1. Снять защитный колпачок с насадки-распылителя.



9.3.2. При вертикальном положении головы ввести наконечник распылителя в каждый носовой ход и произвести распыление нажатием.



9.3.3. Следует избегать попадания спрея в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промыть их теплой водой.

9.4. Уход за распылителем

После каждого применения:

9.4.1. Промокнуть наконечник распылителя и внутреннюю поверхность колпачка сухой чистой салфеткой. Избегать попадания воды.
9.4.2. Следует всегда закрывать флакон и хранить его закрытым. Колпачок защищает распылитель от пыли и засорения.

9.5. В случае, если распылитель не работает

9.5.1. Проверить уровень оставшегося средства во флаконе.
9.5.2. Проверить флакон на наличие повреждений.
9.5.3. Проверить, не засорилось ли отверстие наконечника распылителя. Не пытаться прочистить отверстие наконечника булавкой или другими острыми предметами.
9.5.4. Попытаться привести устройство в действие, повторив процедуру подготовки назального спрея к применению.

10. Упаковка (форма выпуска)

В качестве индивидуальной упаковки изделий используются полиэтиленовые флаконы емкостью 50 мл (первичная упаковка) с распылителем и защитным колпачком, изготовленные по документации предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке. На каждый флакон наносится этикетка. Каждый флакон и инструкцию по применению медицинских изделий помещают в пачку из картона коробочного (вторичная упаковка).

11. Транспортировка и хранение

11.1. Спреи перевозят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.
11.2. Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Беречь от нагрева.
11.3. Хранить в недоступном для детей месте.

12. Утилизация

По степени опасности средство относится к классу А эпидемиологически безопасным отходам по СанПин 2.1.3684-21 и подлежит утилизации как бытовые отходы.

13. Гарантии изготовителя

Данное изделие разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований. Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения срока его годности при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдены условия хранения.

14. Срок годности

3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности.
После начала использования - 6 мес.

15. Правила представления рекламаций

При выявлении особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, нежелательных реакций при применении и эксплуатации указанного изделия, в случае возникновения вопросов, связанных с применением медицинского изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться в уполномоченную организацию в сфере здравоохранения, а также по адресу производителя:

ООО «Мирролла», Россия, 188663,
Ленинградская область, р-н Всеволожский,
гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А,
помещ. 1Н.
Тел.: +7 (812) 389-21-21.

16. Расшифровка символов и манипуляционных знаков:

P2

символ P2 - обозначает вариант исполнения распылителя, а именно распылитель №2 (производство NANJING RINCHEN INTERNATIONAL TRADING COMPANY, Китай). Вариант исполнения с распылителем №1 (производство NINGBO CENTER PACKAGING CO., LTD, Китай) - обозначение отсутствует.



обратиться к инструкции по применению.



срок годности после начала использования.



картон. Подлежит вторичной переработке.



полиэтилен низкой плотности. Подлежит вторичной переработке.



полиэтилентерефталат. Подлежит вторичной переработке.



полипропилен. Подлежит вторичной переработке.

17. Сведения о производителе

Производитель: ООО «Мирролла»
Юридический адрес: Россия, 188663,
Ленинградская область, р-н Всеволожский,
гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А,
помещ. 1Н.
Адрес производства: Россия, 188663,
Ленинградская область, Всеволожский
муниципальный район, Кузьмоловское
городское поселение, г.п. Кузьмоловский,
б/н, кор. 271/1.
Тел.: + 7 (812) 389-21-21.
www.mirrola.ru

consumed

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Consumed® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Рег. уд. № _____ от _____

1. Назначение медицинского изделия

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

2. Описание и технические характеристики

Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

2.1. Характеристики и состав изделия:

Наименование показателя	Характеристика и норма
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный
Запах	Без запаха
Вкус	Соленый
Массовая доля соли, %	0,9
Массовая доля бензалкония хлорид, %	0,01
Массовая доля вода очищенная, %	99,09
Водородный показатель, pH	3,5-5,5
Осмолярность	270-350 мОсм/л
Объем	50 мл

3. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Consumed® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019	1
2	Инструкция по применению	1

4. Показания к применению

- для профилактики и использования в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических), в период подъема простудных заболеваний, для детей с 3-х лет и взрослых;

- острые и хронические риниты (насморк);

- острые и хронические синуситы (в т.ч. гайморит);

- острые и хронические аденоидиты;

- аллергические и вазомоторные риниты;

- при изменении слизистой при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов;

- людям пожилого возраста для профилактики возрастных атрофических изменений слизистой оболочки носа;

- субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки);

- профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (ОРВИ и др.);

- ежедневная гигиена полости носа и носоглотки;

- ежедневное применение лицам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лицам, проживающим в условиях неблагоприятной окружающей среды (в условиях сурового климата, нахождение в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением, воздействие загрязненного воздуха (пыли, краски и т.д.).

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.

6. Противопоказания к применению

- детский возраст до 3 лет;

- повышенная чувствительность к компонентам средства;

- индивидуальная непереносимость компонентов средства;

- полная непроходимость носовых ходов;

- предрасположенность к любым опухолям в носоглотке;

- воспаление в улитке или полукружных каналах уха;

- острый отит и обострение хронического отита.

7. Указания по применению

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Детям до 14 лет применять средство под наблюдением взрослых.

Средство можно применять при беременности и кормлении грудью.

Средство не вызывает привыкания.

Средство не относится к изделиям, способным влиять на психомоторное состояние человека.

7.1. Меры предосторожности при применении медицинского изделия

Осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена.

Избегайте попадания средства в глаза.

Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

7.2. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Сочетается со всеми средствами для интраназального применения и физиотерапевтическими процедурами.

7.3. Взаимодействие с лекарственными средствами

Взаимодействие с лекарственными средствами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами для интраназального введения. В этом случае полость носа в первую очередь промывается Средством для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей.

8. Побочные эффекты

Возможно: аллергические реакции.

9. Порядок применения

9.1. Подготовка к применению

Подготовку к применению следует проводить при использовании спрея в первый раз. Правильная подготовка к применению обеспечит впрыскивание необходимой дозы средства.

9.1.1. Снять колпачок, плавно потянув его большим и указательным пальцами, придерживая флакон другой рукой.

9.1.2. Держать флакон вертикально и направить наконечник от себя.

9.1.3. Нажать на кнопку распылителя двумя пальцами, произвести несколько нажатий (минимум 4), пока из наконечника не появится небольшое облачко.

9.1.4. Спрей готов к применению.

9.2. Дозировка

По 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в сутки.
Общее количество доз во флаконе – 320.1 доза – 0.15с.
Продолжительность применения средства не ограничена.

9.3. Применение назального спрея

Интраназально.

9.3.1. Снять защитный колпачок с насадки-распылителя.



9.3.2. При вертикальном положении головы ввести наконечник распылителя в каждый носовой ход и произвести распыление **молочком**.



9.3.3. Следует избегать попадания спрея в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промыть их теплой водой.

9.4. Уход за распылителем

После каждого применения:

9.4.1. Промокнуть наконечник распылителя и внутреннюю поверхность колпачка сухой чистой салфеткой. Избегать попадания воды.

9.4.2. Следует всегда закрывать флакон и хранить его закрытым. Колпачок защищает распылитель от пыли и засорения.

9.5. В случае, если распылитель не работает:

9.5.1. Проверить уровень оставшегося средства во флаконе.

9.5.2. Проверить флакон на наличие повреждений.

9.5.3. Проверить, не засорилось ли отверстие наконечника распылителя. Не пытаться прочистить отверстие наконечника булавкой или другими острыми предметами.

9.5.4. Попытаться привести устройство в действие, повторив процедуру подготовки назального спрея к применению.

10. Упаковка (форма выпуска)

В качестве индивидуальной упаковки изделий используются полиэтиленовые флаконы емкостью 50 мл (первичная упаковка), с распылителем и защитным колпачком, изготовленные по документации предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке. На каждый флакон наносится этикетка.

Каждый флакон и инструкцию по применению медицинских изделий помещают в пачку из картона коробочного (вторичная упаковка).

11. Транспортировка и хранение

11.1. Спрей перевозят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

11.2. Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Беречь от нагрева.

11.3. Хранить в недоступном для детей месте.

12. Утилизация

По степени опасности средство относится к классу А эпидемиологически безопасным отходам по СанПиН 2.1.3684-21 и подлежит утилизации как бытовые отходы.

13. Гарантии изготовителя

Данное изделие разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований. Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения срока его годности, при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдены условия хранения.

14. Срок годности

3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности.

После начала использования – 6 мес.

15. Правила представления рекламаций

При выявлении особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, нежелательных реакций при применении и эксплуатации указанного изделия, в случае возникновения вопросов, связанных с применением медицинского изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться в уполномоченную организацию в сфере здравоохранения, а также по адресу производителя:

ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.

Тел.: +7 (812) 389-21-21.

www.mirtolla.ru

16. Расшифровка символов

и манипуляционных знаков:

P2

символ P2 - обозначает вариант исполнения распылителя, а именно распылитель №2 (производство NANJING RINCHEN INTERNATIONAL TRADING COMPANY, Китай). Вариант исполнения с распылителем №1 (производство NINGBO CENTER PACKAGING CO., LTD, Китай) – обозначение отсутствует.



обратиться к инструкции по применению.



срок годности после начала использования.



картон. Подлежит вторичной переработке.



полиэтилен низкой плотности. Подлежит вторичной переработке.



полиэтилентерефталат. Подлежит вторичной переработке.



полипропилен. Подлежит вторичной переработке.

17. Сведения о производителе

Производитель: ООО «Мирролла»

Юридический адрес: Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.

Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, с.п. Кузьмоловский, б/н, кор. 271/1.

Тел.: + 7 (812) 389-21-21.

www.mirtolla.ru

ООО «МИРРОЛ»
Итого в настоящем до
до *Степанова И. И.*
Генеральный дире
Степанова И. И.
«Mirolla»
Co. Ltd
Всероссийский-И. Г. Куз

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Мирролла»
Н.Ю. Степанова
«22» мая 2023 г.



Инструкция по применению медицинского изделия

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей

по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

(*) Инструкция по применению медицинского изделия предоставляется потребителю в сокращенном виде на упаковке медицинского изделия на основании п.8 раздел 3 Приказа Минздрава РФ от 20 ноября 2020 года N 11н, объем предоставляемой информации достаточен для применения медицинского изделия по назначению и такое применение безопасно для потребителя."

СОДЕРЖАНИЕ

1. Наименование медицинского изделия	3
2. Сведения о производителе	3
3. Назначение медицинского изделия	3
4. Показание к применению	3
5. Область применения	3
6. Противопоказания к применению	3
7. Указания по применению	4
8. Побочные эффекты	4
9. Комплект поставки	4
10. Описание и технические характеристики	4
11. Порядок применения	6
12. Упаковка (форма выпуска)	7
13. Транспортировка и хранение	7
14. Утилизация	7
15. Гарантии изготовителя	7
16. Срок годности	7
17. Перечень применяемых стандартов	8
18. Маркировка	8
19. Расшифровка символов и манипуляционных знаков	9
20. Правила представления рекламаций	10
Приложение 1	11

1. Наименование медицинского изделия

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (см. Приложение 1).

2. Сведения о производителе

Производитель: ООО «Мирролла»

Юридический адрес: Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.

Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, б/н, кор. 271/1.

тел.: + 7 (812) 389-21-21, www.mirrolla.ru

3. Назначение медицинского изделия

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

4. Показания к применению

- для профилактики и использования в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических), в период подъема простудных заболеваний, для детей с 3-х лет и взрослых:

- острые и хронические риниты (насморк);
- острые и хронические синуситы (в т.ч. гайморит);
- острые и хронические аденоидиты;
- аллергические и вазомоторные риниты;
- при изменении слизистой при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов;
- людям пожилого возраста для профилактики возрастных атрофических изменений слизистой оболочки носа.
- субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки).
- профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (ОРВИ и др.)
- ежедневная гигиена полости носа и носоглотки.
- ежедневное применение лицам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лицам, проживающим в условиях неблагоприятной окружающей среды (в условиях сурового климата, нахождение в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением, воздействие загрязненного воздуха (пыли, краски и т.д.).

5. Область применения - изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.

6. Противопоказания к применению

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;

- предрасположенность к любым опухолям в носоглотке;
- воспаление в улитке или полукружных каналов уха;
- острый отит и обострение хронического отита.

7. Указания по применению

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Детям до 14 лет применять средство под наблюдением взрослых.

Средство можно применять при беременности и кормлении грудью.

Средство не вызывает привыкания.

Средство не относится к изделиям, способным влиять на психомоторное состояние человека.

7.1 Меры предосторожности при применении медицинского изделия

Осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена.

Избегайте попадания средства в глаза.

Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

7.2 Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Сочетается со всеми средствами для интраназального применения и физиотерапевтическими процедурами.

7.3 Взаимодействие с лекарственными средствами

Взаимодействие с лекарственными средствами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами для интраназального введения. В этом случае полость носа в первую очередь промывается **Средством для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей**.

8. Побочные эффекты

Возможно: аллергические реакции.

9. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019*	1
2	Инструкция по применению	1

*-исполнение выбирается из числа представленных в приложении 1.

10. Описание и технические характеристики

Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

10.1 Характеристики и состав изделия

Для исполнения «Морская вода»

Наименование показателя	Характеристика и норма
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный
Запах	Без запаха
Вкус	Соленый
Массовая доля соли %	0,9
Массовая доля бензалкония хлорид %	0,01
Массовая доля вода очищенная%	99,09
Водородный показатель, pH	3,5-5,5
Осмолярность	270-350 мОсм/л
Объем	50 мл

11. Порядок применения

11.1 Подготовка к применению

Подготовку к применению следует проводить при использовании спрея в первый раз. Правильная подготовка к применению обеспечит впрыскивание необходимой дозы средства.

11.1.1 Снять колпачок, плавно потянув его большим и указательным пальцами, придерживая флакон другой рукой.

11.1.2. Держать флакон вертикально и направить наконечник от себя.

11.1.3. Нажать на кнопку распылителя двумя пальцами, произвести несколько нажатий (минимум 4), пока из наконечника не появится небольшое облачко.

11.1.4. Спрей готов к применению.

11.2 Дозировка

По 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в сутки.

Общее количество доз во флаконе – 320.1 доза – 0,15г

Продолжительность применения средства не ограничена.

11.3 Применение назального спрея

Интраназально.

11.3.1. Снять защитный колпачок с насадки – распылителя.



11.3.2. При вертикальном положении головы ввести наконечник распылителя в каждый носовой ход и произвести распыление нажатием.



11.3.3. Следует избегать попадания спрея в глаза. При попадании средства в глаза, тщательно промыть их теплой водой.

11.4 Уход за распылителем

После каждого применения:

11.4.1. Промокнуть наконечник распылителя и внутреннюю поверхность колпачка сухой чистой салфеткой. Избегать попадания воды.

11.4.2. Следует всегда закрывать флакон и хранить его закрытым. Колпачок защищает распылитель от пыли и засорения.

11.5 В случае, если распылитель не работает:

11.5.1. Проверить уровень оставшегося средства во флаконе.

11.5.2. Проверить флакон на наличие повреждений.

11.5.3. Проверить, не засорилось ли отверстие наконечника распылителя. Не пытаться прочистить отверстие наконечника булавкой или другими острыми предметами.

11.5.4. Попытаться привести устройство в действие, повторив процедуру подготовки назального спрея к применению.

12. Упаковка (форма выпуска)

В качестве индивидуальной упаковки изделий используются полиэтиленовые флаконы емкостью 50 мл (первичная упаковка), с распылителем и защитным колпачком, изготовленные по документации предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке. На каждый флакон наносится этикетка.

Каждый флакон и инструкцию по применению медицинских изделий помещают в пачку из картона коробочного (вторичная упаковка).

13. Транспортировка и хранение

13.1 Спреи перевозят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида при температуре от плюс 5⁰С до плюс 25⁰С.

13.2 Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от плюс 5⁰С до плюс 25⁰С. Беречь от нагрева.

13.3 Хранить в недоступном для детей месте.

14. Утилизация

По степени опасности средство относится к классу А эпидемиологически безопасным отходам по СанПиН 2.1.3684-21 и подлежит утилизации как бытовые отходы.

15. Гарантии изготовителя

Данное изделие разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований. Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения срока его годности, при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдены условия хранения.

16.Срок годности

3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности.

После начала использования – 6 мес.

17. Перечень применяемых стандартов

Обозначение	Наименование
ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1 общие требования
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами

18. Маркировка

18.1 На каждую картонную упаковку (вторичную упаковку) наносится маркировка. Маркировка наносится типографским методом следующего содержания:

- наименование продукции с указанием исполнения;
- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак (при его наличии);
- адрес предприятия-изготовителя;
- адрес производства;
- состав, с указанием ингредиентного состава в порядке, соответствующем их убыванию в весовом или процентном выражении;
- назначение;
- номинальный объем (или масса) нетто;
- номер и дату регистрационного удостоверения;
- обозначение настоящих технических условий;
- дата изготовления (число/месяц/год);
- серия;
- срок годности, исчисляемый в количестве месяцев (лет) с даты изготовления;
- условия хранения;
- меры предосторожности;
- противопоказания;
- штрих- код;
- символ P2 – вариант исполнения, распылитель №2;

- символ «обратитесь к инструкции по применению»  ;
- символ «срок годности после начала использования»  ;

- символ «код переработки»  .

18.2 Маркировка флакона (этикетка) должна содержать:

- наименование продукции с указанием исполнения;
- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак (при его наличии);
- номинальный объем (или масса) нетто;
- обозначение настоящих технических условий
- дата изготовления (число/месяц/год);
- серия;
- срок годности, исчисляемый в количестве месяцев (лет) с даты изготовления;
- условия хранения;

- символ «срок годности после начала использования»  ;

- символ «код переработки»  ;

- символ «код переработки»  ;

- символ «код переработки»  ;

18.3 Символы, используемые при маркировке транспортной упаковки:

Беречь от влаги 

Беречь от солнечных лучей 

Хрупко 

Ограничение температуры 

Вверх 

19. Расшифровка символов и манипуляционных знаков:

символ P2 — обозначает вариант исполнения распылителя, а именно распылитель №2 (производство NANJING RINCHEN INTERNATIONAL TRADING COMPANY, Китай).

Вариант исполнения с распылителем №1 (производство NINGBO CENTER PACKAGING CO., LTD, Китай) – обозначение отсутствует.

обратитесь к инструкции по применению



срок годности после начала использования



картон. Подлежит вторичной переработке.



полиэтилен низкой плотности. Подлежит вторичной переработке.



полиэтилентерефталат. Подлежит вторичной переработке.



полипропилен. Подлежит вторичной переработке.



20. Правила представления рекламаций:

При выявлении особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, нежелательных реакций при применении и эксплуатации указанного изделия, в случае возникновения вопросов, связанных с применением медицинского изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться в уполномоченную организацию в сфере здравоохранения, а также по адресу производителя:

ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмолковский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.

Тел.: +7 (812) 389-21-21, www.mirrolla.ru

Данная редакция инструкции по применению
выпущена в мае 2023 г.

Приложение 1

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019, вариант исполнения:

Спрей «Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2) в составе с инструкцией по применению, 50 мл:

Торговые наименования:

- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АкваСол® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АкваБаланс® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Lekstore® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «ЗДРАВСИТИ® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Vitataka® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Эмокап® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АКВАНОРМИН Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «А® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Consumed® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл.

Генеральный директор
Степанов Н. Ю.

Генеральный директор
Степанова Н. Ю.