

Макет маркировки на медицинское изделие
Раствор пре-триггера для подготовки хемилюминесцентной реакции при
проведении исследований на иммунохимических анализаторах
ARCHITECT «Пре-Триггер Раствор (ARCHITECT Pre-Trigger Solution)»



6E23-68



Раствор пре-триггера для подготовки хемилюминесцентной реакции при проведении исследований на иммунохимических анализаторах ARCHITECT «Пре-Триггер Раствор (ARCHITECT Pre-Trigger Solution)»,

В составе:

1. Пре-Триггер Раствор (ARCHITECT Pre-Trigger Solution) - 4 флакона х 975 мл.
2. Инструкция по применению

Производитель: Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение, Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park Sligo, Ireland, Ирландия

Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park Sligo, Ireland, Ирландия

Страна происхождения: Ирландия/ РУ № ____ / ____ от ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя: ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16а, стр. 1, 6 этаж;
Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

ARCHITECT

PRE-TRIGGER
SOLUTION

プレトリガー (発光開始液①)

4 x 975 mL



6E23-68



Contains 1.32% (w/v) hydrogen peroxide. Once opened, place on board the system no longer than 28 days, then discard. **WARNING:** Contains hydrogen peroxide. May be harmful if inhaled. * IF INHALED: Call a POISON CENTER / doctor if you feel unwell. * (*Not applicable where regulations EC 1272/2008 (CLP) or OSHA Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012 have been implemented.)

ca Contiene 1,32 % (p/v) di perossido di idrogeno. Una volta aperto, il flacone può essere conservato nel sistema per un massimo di 28 giorni, dopodiché deve essere eliminato. **ATTENZIONE:** Contiene perossido di idrogeno. Può essere nocivo se inalato. * IN CASO DI INALAZIONE: Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico in caso di malessere. * (*Non applicabile dove il regolamento CE 1272/2008 (CLP) o l'OSHA Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012 sono stati implementati.)

en Contains 1.32% (w/v) hydrogen peroxide. Once opened, place on board the system no longer than 28 days, then discard. **WARNING:** Contains hydrogen peroxide. May be harmful if inhaled. * IF INHALED: Call a POISON CENTER / doctor if you feel unwell. * (*Not applicable where regulations EC 1272/2008 (CLP) or OSHA Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012 have been implemented.)

fr Contient 1,32 % (m/v) d'eau oxygénée. Une fois ouvert, le flacon peut être conservé dans le système pendant 28 jours au maximum puis doit être jeté. **ATTENTION:** Contient du peroxyde d'hydrogène. Peut être nocif par inhalation. * EN CAS D'INHALATION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malessere. * (*Ne s'applique pas dans les pays où le règlement CE n° 1272/2008 (CLP) ou l'OSHA Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012 ont été mis en œuvre.)

de Enthält 1,32 % (w/v) Wasserstoffperoxid. Geöffnet nicht länger als 28 Tage im Gerät aufbewahren, danach verworfen. **ACHTUNG:** Enthält Wasserstoffperoxid. Kann bei Einatmen gesundheitsschädlich sein. * BEI ERNATHMEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONZENTRUM oder Arzt anrufen. * (*Nicht anwendbar in Ländern, in denen die Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) oder die OSHA Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012 umgesetzt wurden.)

pt Contém peróxido de hidrogénio a 1,32% (p/v). Uma vez aberto, o frasco pode ser conservado no sistema por um máximo de 28 dias, depois, eliminar. **ATENÇÃO:** contém peróxido de hidrogénio. Pode ser nocivo em caso de inalação. * EM CASO DE INALAÇÃO: Caso sinta mal-estar, contatar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. * (*Não aplicável onde o Regulamento CE 1272/2008 (CLP) ou a norma de comunicação de perigo da OSHA 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012 tenham sido implementados.)

it Inneholder 1,32% (w/v) hydrogenperoxid. Efter åbning må flasken opbevares i systemet i maks. 28 dage, hvorefter den skal bortskaffes. **ADVARSEL:** Inneholder hydrogenperoxid. Kan være farlig ved indånding. * VED INDÅNDING: Kontakt til GIFTINFORMATIONSCENTRUM eller læge. * (*Gælder ikke, hvor EF-forordning 1272/2008 (CLP) eller OSHA's Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012 er blevet implementeret.)

es Contiene peróxido de hidrógeno al 1,32% (p/v). Una vez abierto, se puede almacenar en el sistema hasta un máximo de 28 días, pasados los cuales, se debe desechar. **ADVERTENCIA:** contiene peróxido de hidrógeno. Puede ser nocivo en caso de inhalación. * EN CASO DE INHALACIÓN: llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN ANTIVENENOS o a un médico. * (*No aplicable onde o Regulamento CE 1272/2008 (CLP) ou a norma de comunicação de perigo da OSHA 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012 tenham sido implementados.)

sv Innehåller 1,32 % (vikt/volym) väteperoxid. En öppnad flaska får förvaras i instrumentet i högst 28 dagar. Därefter ska den kasseras. **VARNING:** innehåller väteperoxid. Kan vara skadlig vid inandning. * VID INANDNING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRUM eller läkare. * (*Gäller inte där förordningen EC 1272/2008 (CLP) eller OSHA's Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012 har implementerats.)

pl Zawiera 1,32% (w/v) nadlenek wodoru. Po otwarciu przechowywać na podstawie analizy nie dłużej niż 28 dni, a następnie wyrzucić. **UWAGA:** Zawiera nadlenek wodoru. Może działać szkodliwie w przypadku wdychania. * W PRZYPADKU DZIAŁANIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. * (*Nie dotyczy w przypadku wdrożenia rozporządzenia WE 1272/2008 (CLP) lub normy OSHA Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012.)

tr İçerir 1,32% (w/v) hidrojen peroksit. Açıldıktan sonra sistemde en fazla 28 gün süreyle tutulmalıdır. 28 günden fazla tutulmamalıdır. Sonrasında atılmalıdır. **UYARI:** İçerir hidrojen peroksit. Solunum yoluyla zararlı olabilir. * ENFEYİLMESİ: Solunum yoluyla rahatsızlık hissederseniz, ZEHİR MERKEZİNE / doktorunuza başvurun. * (*Bu talimatlar, EC 1272/2008 (CLP) veya OSHA Tehlike İletim Standardı 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012'nin uygulanmadığı bölgelerde geçerli değildir.)

ru Содержит 1,32% (w/v) перекиси водорода. После вскрытия флакона использовать не более 28 дней, после чего флакон необходимо утилизировать. **ВНИМАНИЕ:** Содержит перекись водорода. Может быть вредно при вдыхании. * ПРИ ВДЫХАНИИ: Обратиться в ЦЕНТР ПО ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ или к врачу, если почувствуете недомогание. * (*Не применяется при применении Регламента ЕС 1272/2008 (CLP) или Стандарта по коммуникации при опасности OSHA Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012.)

uk Містить 1,32% (w/v) надленку водню. Після відкриття флакона використовувати не більше 28 днів, після чого флакон необхідно утилізувати. **УВАГА:** Містить надленок водню. Може діяти шкідливо при вдиханні. * ПРИ ВДІХАННІ: Обратитися до ЦЕНТРУ ТОКСИКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ або до лікаря, якщо відчуєте нездужання. * (*Не застосовується при застосуванні Регламенту ЄС 1272/2008 (CLP) або Стандарту по комунікації при небезпечності OSHA Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012.)

zh 含有 1.32% (w/v) 过氧化氢。一旦打开，请将系统放在板上，最长不超过 28 天，然后丢弃。 **警告：** 含有过氧化氢。吸入可能有害。* 如果吸入：如果感到不适，请立即拨打中毒中心/医生电话。* (*不适用于已实施 EC 1272/2008 (CLP) 或 OSHA 危险沟通标准 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012 的地区。)

ko 1.32% (w/v) 과산화수소 용액을 함유하고 있습니다. 개봉 후, 용기를 시스템에 최대 28일간 보관한 후 폐기하십시오. **주의:** 과산화수소를 함유하고 있습니다. 흡입 시 건강에 해로울 수 있습니다. * 흡입 시: 불편함을 느끼면, 독극물 센터/의사에게 연락하십시오. * (*이 지침은 EC 1272/2008 (CLP) 또는 OSHA 위험 커뮤니케이션 표준 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012가 적용되지 않는 지역에서만 유효합니다.)*

he מכיל 1.32% (w/v) חמצן דו-חמצני. לאחר פתיחת הפקודה, יש להשתמש במכשיר עד 28 ימים בלבד, ולאחר מכן לזרוק את הפקודה. **אזהרה:** מכיל חמצן דו-חמצני. עלול להיות מסוכן אם נש্বת. * בנשימה: אם אתם מרגישים אי-נוחות, קראו למרכז מידע רעילים / רופא. * (*לא חלים על מדינות בהן תקנה EC 1272/2008 (CLP) או תקן OSHA לניהול סיכונים 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012 יושמו.)*

vi Chứa 1,32% (w/v) nước oxy già. Sau khi mở nắp, bình có thể được giữ trong hệ thống tối đa 28 ngày, sau đó phải loại bỏ. **CẢNH BÁO:** Chứa nước oxy già. Có thể gây hại nếu hít phải. * TRONG TRƯỜNG HỢP HÍT PHẢI: Nếu cảm thấy khó chịu, hãy gọi trung tâm chống độc / bác sĩ. * (*Không áp dụng ở những nơi mà quy định EC 1272/2008 (CLP) hoặc tiêu chuẩn OSHA về truyền đạt mối nguy hiểm 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012 đã được áp dụng.)*

th Chứa 1,32% (w/v) nước oxy già. Sau khi mở nắp, bình có thể được giữ trong hệ thống tối đa 28 ngày, sau đó phải loại bỏ. **CẢNH BÁO:** Chứa nước oxy già. Có thể gây hại nếu hít phải. * TRONG TRƯỜNG HỢP HÍT PHẢI: Nếu cảm thấy khó chịu, hãy gọi trung tâm chống độc / bác sĩ. * (*Không áp dụng ở những nơi mà quy định EC 1272/2008 (CLP) hoặc tiêu chuẩn OSHA về truyền đạt mối nguy hiểm 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012 đã được áp dụng.)*

no Inneholder 1,32% (w/v) hydrogenperoxid. Etter åpning må flasken oppbevares i systemet i maks. 28 dager, hvorefter den skal bortskaffes. **ADVARSEL:** Inneholder hydrogenperoxid. Kan være farlig ved inndring. * VED INNDING: Kontakt til GIFTINFORMATIONSCENTRUM eller lege. * (*Gælder ikke, hvor EF-forordning 1272/2008 (CLP) eller OSHA's Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012 er blevet implementeret.)

da Inneholder 1,32% (w/v) hydrogenperoxid. Efter åbning må flasken opbevares i systemet i maks. 28 dage, hvorefter den skal bortskaffes. **ADVARSEL:** Inneholder hydrogenperoxid. Kan være farlig ved indånding. * VED INDÅNDING: Kontakt til GIFTINFORMATIONSCENTRUM eller læge. * (*Gælder ikke, hvor EF-forordning 1272/2008 (CLP) eller OSHA's Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012 er blevet implementeret.)

fi Sisältää 1,32% (w/v) vetyperoksidia. Avoinna pidettävä enintään 28 päivää, sen jälkeen se on hävitettävä. **VAROITUS:** Sisältää vetyperoksidia. Voimakas hengitys voi olla vaarallista. * JOS HENGITYSVAIVAT: Jos tuntuu huonolta, soita myrkytystietokeskukseen / kutsu lääkäriä. * (*Ei sovelleta alueilla, joissa EU-direktiivi 1272/2008 (CLP) tai OSHA:n vaaratiedon väläytysstandardi 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012 on otettu käyttöön.)*

se Innehåller 1,32 % (vikt/volym) väteperoxid. En öppnad flaska får förvaras i instrumentet i högst 28 dagar. Därefter ska den kasseras. **VARNING:** innehåller väteperoxid. Kan vara skadlig vid inandning. * VID INANDNING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRUM eller läkare. * (*Gäller inte där förordningen EC 1272/2008 (CLP) eller OSHA's Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012 har implementerats.)

is Inneholder 1,32% (w/v) hydrogenperoxid. Efter åpning må flasken opbevares i systemet i maks. 28 dage, hvorefter den skal bortskaffes. **ADVARSEL:** Inneholder hydrogenperoxid. Kan være farlig ved indånding. * VED INDÅNDING: Kontakt til GIFTINFORMATIONSCENTRUM eller læge. * (*Gælder ikke, hvor EF-forordning 1272/2008 (CLP) eller OSHA's Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012 er blevet implementeret.)

lv Satur 1,32% (w/v) ūdeperoksīdu. Pēc atvēršanas iepakojumu jāglabā sistēmā ne ilgāk kā 28 dienas, pēc tam jāizmet. **UPIEBŪDZĒJUMS:** Satur ūdeperoksīdu. Var būt kaitīgi ieelpojot. * PĒDĒKĀRĒJUMS: Ja jūtat nepatīkamus simptomus, zvaniet uz ĶĒMĒRĒJUMS CENTRU / ārstu, ja jums ir sāpes vai citas problēmas. * (*Nav piemērojams, kur spēkā ir Regula EK 1272/2008 (CLP) vai Darbības drošības un veselības aizsardzības aģentūras (OSHA) standarta par bīstamību (Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012).*)

et Sisältää 1,32% (w/v) vetyperoksidia. Avoinna pidettävä enintään 28 päivää, sen jälkeen se on hävitettävä. **VAROITUS:** Sisältää vetyperoksidia. Voimakas hengitys voi olla vaarallista. * JOS HENGITYSVAIVAT: Jos tuntuu huonolta, soita myrkytystietokeskukseen / kutsu lääkäriä. * (*Ei sovelleta alueilla, joissa EU-direktiivi 1272/2008 (CLP) tai OSHA:n vaaratiedon väläytysstandardi 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012 on otettu käyttöön.)*

hu Tartalmaz 1,32% (w/v) hidrogén-peroxidot. Azonnal fel kell használni a készülékbe, legfeljebb 28 napig, majd el kell dobni. **FIGYELMEZTETÉS:** Tartalmaz hidrogén-peroxidot. Levegőbe kerülés esetén káros lehet. * HA BELEHEGÜNK: Ha rossz érzést tapasztalunk, forduljunk a mérgezési központhoz / orvoshoz. * (*Nem alkalmazható ott, ahol az EU 1272/2008 (CLP) vagy az OSHA Biztonsági Kommunikációs Standard 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012 érvényben van.)*

sk Obsahuje 1,32% (w/v) peroxid vodíku. Po otvorení skladovať v prístroji maximálne 28 dní, potom zlikvidovať. **Upozornenie:** Obsahuje peroxid vodíku. Po otvorení skladovať v prístroji maximálne 28 dní, potom zlikvidovať. * PO VÝCHOVĚ: Při zdravotních problémech, voláte NÁROČNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM nebo lékaře. * (*Neplatí tam, kde je použitelný předpis EC 1272/2008 (CLP) ani Standard pro komunikaci při nebezpečnosti OSHA Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012.)*

sl Vsebuje 1,32% (w/v) vodikovega peroksida. Po odprtju shraniti v napravo največ 28 dni, nato pa uničiti. **OPAZORILO:** Vsebuje vodikov peroksid. Pri vdihavanju lahko škoduje. * PRI VDIHANJU: Če občutite težave, pokličite TOXIKOLOŠKI INFORMACIJSKI CENTRUM ali zdravnika. * (*Ne velja tam, kjer velja uredba EC 1272/2008 (CLP) ali Standard za komunikacijo pri nevarnosti OSHA Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012.)*

hr Sadržuje 1,32% (w/v) vodikovog peroksida. Nakon otvaranja, držati u uređaju najviše 28 dana, a zatim odbaciti. **OPREZ:** Sadržuje vodikov peroksid. Može biti opasan pri udisanju. * U DISANJU: U slučaju zdravstvenih problema, nazovite NAGLO TOXIKOLŠKI INFORMACIJSKI CENTAR ili liječnika. * (*Ne primjenjuje se tamo gdje je na snazi uredba EC 1272/2008 (CLP) ili Standard za komunikaciju pri opasnosti OSHA Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012.)*

lt Turinchi 1,32% (w/v) vandenio peroksido. Atidarius, butelį reikia laikyti sistemoje ne ilgiau kaip 28 dienas, po to jį reikia išmesti. **Dėmesio:** Turinchi vandenio peroksido. Galima būti pavojinga įkvėpus. * ĮKVĖPUS: Jei jaučiate nemalonią būklę, paskambinkite į POISONO CENTRĄ / gydytoją. * (*Netaikoma ten, kur taikoma Europos Sąjungos direktyva 1272/2008 (CLP) arba OSHA pavojų pranešimo standartas 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012.)*

lv Satur 1,32% (w/v) ūdeperoksīdu. Pēc atvēršanas iepakojumu jāglabā sistēmā ne ilgāk kā 28 dienas, pēc tam jāizmet. **UPIEBŪDZĒJUMS:** Satur ūdeperoksīdu. Var būt kaitīgi ieelpojot. * PĒDĒKĀRĒJUMS: Ja jūtat nepatīkamus simptomus, zvaniet uz ĶĒMĒRĒJUMS CENTRU / ārstu, ja jums ir sāpes vai citas problēmas. * (*Nav piemērojams, kur spēkā ir Regula EK 1272/2008 (CLP) vai Darbības drošības un veselības aizsardzības aģentūras (OSHA) standarta par bīstamību (Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012).*)

lv Satur 1,32% (w/v) ūdeperoksīdu. Pēc atvēršanas iepakojumu jāglabā sistēmā ne ilgāk kā 28 dienas, pēc tam jāizmet. **UPIEBŪDZĒJUMS:** Satur ūdeperoksīdu. Var būt kaitīgi ieelpojot. * PĒDĒKĀRĒJUMS: Ja jūtat nepatīkamus simptomus, zvaniet uz ĶĒMĒRĒJUMS CENTRU / ārstu, ja jums ir sāpes vai citas problēmas. * (*Nav piemērojams, kur spēkā ir Regula EK 1272/2008 (CLP) vai Darbības drošības un veselības aizsardzības aģentūras (OSHA) standarta par bīstamību (Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012).*)

lv Satur 1,32% (w/v) ūdeperoksīdu. Pēc atvēršanas iepakojumu jāglabā sistēmā ne ilgāk kā 28 dienas, pēc tam jāizmet. **UPIEBŪDZĒJUMS:** Satur ūdeperoksīdu. Var būt kaitīgi ieelpojot. * PĒDĒKĀRĒJUMS: Ja jūtat nepatīkamus simptomus, zvaniet uz ĶĒMĒRĒJUMS CENTRU / ārstu, ja jums ir sāpes vai citas problēmas. * (*Nav piemērojams, kur spēkā ir Regula EK 1272/2008 (CLP) vai Darbības drošības un veselības aizsardzības aģentūras (OSHA) standarta par bīstamību (Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012).*)

lv Satur 1,32% (w/v) ūdeperoksīdu. Pēc atvēršanas iepakojumu jāglabā sistēmā ne ilgāk kā 28 dienas, pēc tam jāizmet. **UPIEBŪDZĒJUMS:** Satur ūdeperoksīdu. Var būt kaitīgi ieelpojot. * PĒDĒKĀRĒJUMS: Ja jūtat nepatīkamus simptomus, zvaniet uz ĶĒMĒRĒJUMS CENTRU / ārstu, ja jums ir sāpes vai citas problēmas. * (*Nav piemērojams, kur spēkā ir Regula EK 1272/2008 (CLP) vai Darbības drošības un veselības aizsardzības aģentūras (OSHA) standarta par bīstamību (Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012).*)

lv Satur 1,32% (w/v) ūdeperoksīdu. Pēc atvēršanas iepakojumu jāglabā sistēmā ne ilgāk kā 28 dienas, pēc tam jāizmet. **UPIEBŪDZĒJUMS:** Satur ūdeperoksīdu. Var būt kaitīgi ieelpojot. * PĒDĒKĀRĒJUMS: Ja jūtat nepatīkamus simptomus, zvaniet uz ĶĒMĒRĒJUMS CENTRU / ārstu, ja jums ir sāpes vai citas problēmas. * (*Nav piemērojams, kur spēkā ir Regula EK 1272/2008 (CLP) vai Darbības drošības un veselības aizsardzības aģentūras (OSHA) standarta par bīstamību (Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012).*)

lv Satur 1,32% (w/v) ūdeperoksīdu. Pēc atvēršanas iepakojumu jāglabā sistēmā ne ilgāk kā 28 dienas, pēc tam jāizmet. **UPIEBŪDZĒJUMS:** Satur ūdeperoksīdu. Var būt kaitīgi ieelpojot. * PĒDĒKĀRĒJUMS: Ja jūtat nepatīkamus simptomus, zvaniet uz ĶĒMĒRĒJUMS CENTRU / ārstu, ja jums ir sāpes vai citas problēmas. * (*Nav piemērojams, kur spēkā ir Regula EK 1272/2008 (CLP) vai Darbības drošības un veselības aizsardzības aģentūras (OSHA) standarta par bīstamību (Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012).*)

lv Satur 1,32% (w/v) ūdeperoksīdu. Pēc atvēršanas iepakojumu jāglabā sistēmā ne ilgāk kā 28 dienas, pēc tam jāizmet. **UPIEBŪDZĒJUMS:** Satur ūdeperoksīdu. Var būt kaitīgi ieelpojot. * PĒDĒKĀRĒJUMS: Ja jūtat nepatīkamus simptomus, zvaniet uz ĶĒMĒRĒJUMS CENTRU / ārstu, ja jums ir sāpes vai citas problēmas. * (*Nav piemērojams, kur spēkā ir Regula EK 1272/2008 (CLP) vai Darbības drošības un veselības aizsardzības aģentūras (OSHA) standarta par bīstamību (Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012).*)

lv Satur 1,32% (w/v) ūdeperoksīdu. Pēc atvēršanas iepakojumu jāglabā sistēmā ne ilgāk kā 28 dienas, pēc tam jāizmet. **UPIEBŪDZĒJUMS:** Satur ūdeperoksīdu. Var būt kaitīgi ieelpojot. * PĒDĒKĀRĒJUMS: Ja jūtat nepatīkamus simptomus, zvaniet uz ĶĒMĒRĒJUMS CENTRU / ārstu, ja jums ir sāpes vai citas problēmas. * (*Nav piemērojams, kur spēkā ir Regula EK 1272/2008 (CLP) vai Darbības drošības un veselības aizsardzības aģentūras (OSHA) standarta par bīstamību (Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012).*)

lv Satur 1,32% (w/v) ūdeperoksīdu. Pēc atvēršanas iepakojumu jāglabā sistēmā ne ilgāk kā 28 dienas, pēc tam jāizmet. **UPIEBŪDZĒJUMS:** Satur ūdeperoksīdu. Var būt kaitīgi ieelpojot. * PĒDĒKĀRĒJUMS: Ja jūtat nepatīkamus simptomus, zvaniet uz ĶĒMĒRĒJUMS CENTRU / ārstu, ja jums ir sāpes vai citas problēmas. * (*Nav piemērojams, kur spēkā ir Regula EK 1272/2008 (CLP) vai Darbības drošības un veselības aizsardzības aģentūras (OSHA) standarta par bīstamību (Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012).*)

lv Satur 1,32% (w/v) ūdeperoksīdu. Pēc atvēršanas iepakojumu jāglabā sistēmā ne ilgāk kā 28 dienas, pēc tam jāizmet. **UPIEBŪDZĒJUMS:** Satur ūdeperoksīdu. Var būt kaitīgi ieelpojot. * PĒDĒKĀRĒJUMS: Ja jūtat nepatīkamus simptomus, zvaniet uz ĶĒMĒRĒJUMS CENTRU / ārstu, ja jums ir sāpes vai citas problēmas. * (*Nav piemērojams, kur spēkā ir Regula EK 1272/2008 (CLP) vai Darbības drošības un veselības aizsardzības aģentūras (OSHA) standarta par bīstamību (Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012).*)

lv Satur 1,32% (w/v) ūdeperoksīdu. Pēc atvēršanas iepakojumu jāglabā sistēmā ne ilgāk kā 28 dienas, pēc tam jāizmet. **UPIEBŪDZĒJUMS:** Satur ūdeperoksīdu. Var būt kaitīgi ieelpojot. * PĒDĒKĀRĒJUMS: Ja jūtat nepatīkamus simptomus, zvaniet uz ĶĒMĒRĒJUMS CENTRU / ārstu, ja jums ir sāpes vai citas problēmas. * (*Nav piemērojams, kur spēkā ir Regula EK 1272/2008 (CLP) vai Darbības drošības un veselības aizsardzības aģentūras (OSHA) standarta par bīstamību (Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012).*)

lv Satur 1,32% (w/v) ūdeperoksīdu. Pēc atvēršanas iepakojumu jāglabā sistēmā ne ilgāk kā 28 dienas, pēc tam jāizmet. **UPIEBŪDZĒJUMS:** Satur ūdeperoksīdu. Var būt kaitīgi ieelpojot. * PĒDĒKĀRĒJUMS: Ja jūtat nepatīkamus simptomus, zvaniet uz ĶĒMĒRĒJUMS CENTRU / ārstu, ja jums ir sāpes vai citas problēmas. * (*Nav piemērojams, kur spēkā ir Regula EK 1272/2008 (CLP) vai Darbības drošības un veselības aizsardzības aģentūras (OSHA) standarta par bīstamību (Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012).*)

lv Satur 1,32% (w/v) ūdeperoksīdu. Pēc atvēršanas iepakojumu jāglabā sistēmā ne ilgāk kā 28 dienas, pēc tam jāizmet. **UPIEBŪDZĒJUMS:** Satur ūdeperoksīdu. Var būt kaitīgi ieelpojot. * PĒDĒKĀRĒJUMS: Ja jūtat nepatīkamus simptomus, zvaniet uz ĶĒMĒRĒJUMS CENTRU / ārstu, ja jums ir sāpes vai citas problēmas. * (*Nav piemērojams, kur spēkā ir Regula EK 1272/2008 (CLP) vai Darbības drošības un veselības aizsardzības aģentūras (OSHA) standarta par bīstamību (Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012).*)

lv Satur 1,32% (w/v) ūdeperoksīdu. Pēc atvēršanas iepakojumu jāglabā sistēmā ne ilgāk kā 28 dienas, pēc tam jāizmet. **UPIEBŪDZĒJUMS:** Satur ūdeperoksīdu. Var būt kaitīgi ieelpojot. * PĒDĒKĀRĒJUMS: Ja jūtat nepatīkamus simptomus, zvaniet uz ĶĒMĒRĒJUMS CENTRU / ārstu, ja jums ir sāpes vai citas problēmas. * (*Nav piemērojams, kur spēkā ir Regula EK 1272/2008 (CLP) vai Darbības drošības un veselības aizsardzības aģentūras (OSHA) standarta par bīstamību (Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012).*)

lv Satur 1,32% (w/v) ūdeperoksīdu. Pēc atvēršanas iepakojumu jāglabā sistēmā ne ilgāk kā 28 dienas, pēc tam jāizmet. **UPIEBŪDZĒJUMS:** Satur ūdeperoksīdu. Var būt kaitīgi ieelpojot. * PĒDĒKĀRĒJUMS: Ja jūtat nepatīkamus simptomus, zvaniet uz ĶĒMĒRĒJUMS CENTRU / ārstu, ja jums ir sāpes vai citas problēmas. * (*Nav piemērojams, kur spēkā ir Regula EK 1272/2008 (CLP) vai Darbības drošības un veselības aizsardzības aģentūras (OSHA) standarta par bīstamību (Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012).*)

lv Satur 1,32% (w/v) ūdeperoksīdu. Pēc atvēršanas iepakojumu jāglabā sistēmā ne ilgāk kā 28 dienas, pēc tam jāizmet. **UPIEBŪDZĒJUMS:** Satur ūdeperoksīdu. Var būt kaitīgi ieelpojot. * PĒDĒKĀRĒJUMS: Ja jūtat nepatīkamus simptomus, zvaniet uz ĶĒMĒRĒJUMS CENTRU / ārstu, ja jums ir sāpes vai citas problēmas. * (*Nav piemērojams, kur spēkā ir Regula EK 1272/2008 (CLP) vai Darbības drošības un veselības aizsardzības aģentūras (OSHA) standarta par bīstamību (Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012).*)

lv Satur 1,32% (w/v) ūdeperoksīdu. Pēc atvēršanas iepakojumu jāglabā sistēmā ne ilgāk kā 28 dienas, pēc tam jāizmet. **UPIEBŪDZĒJUMS:** Satur ūdeperoksīdu. Var būt kaitīgi ieelpojot. * PĒDĒKĀRĒJUMS: Ja jūtat nepatīkamus simptomus, zvaniet uz ĶĒMĒRĒJUMS CENTRU / ārstu, ja jums ir sāpes vai citas problēmas. * (*Nav piemērojams, kur spēkā ir Regula EK 1272/2008 (CLP) vai Darbības drošības un veselības aizsardzības aģentūras (OSHA) standarta par bīstamību (Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012).*)

lv Satur 1,32% (w/v) ūdeperoksīdu. Pēc atvēršanas iepakojumu jāglabā sistēmā ne ilgāk kā 28 dienas, pēc tam jāizmet. **UPIEBŪDZĒJUMS:** Satur ūdeperoksīdu. Var būt kaitīgi ieelpojot. * PĒDĒKĀRĒJUMS: Ja jūtat nepatīkamus simptomus, zvaniet uz ĶĒMĒRĒJUMS CENTRU / ārstu, ja jums ir sāpes vai citas problēmas. * (*Nav piemērojams, kur spēkā ir Regula EK 1272/2008 (CLP) vai Darbības drošības un veselības aizsardzības aģentūras (OSHA) standarta par bīstamību (Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012).*)

lv Satur 1,32% (w/v) ūdeperoksīdu. Pēc atvēršanas iepakojumu jāglabā sistēmā ne ilgāk kā 28 dienas, pēc tam jāizmet. **UPIEBŪDZĒJUMS:** Satur ūdeperoksīdu. Var būt kaitīgi ieelpojot. * PĒDĒKĀRĒJUMS: Ja jūtat nepatīkamus simptomus, zvaniet uz ĶĒMĒRĒJUMS CENTRU / ārstu, ja jums ir sāpes vai citas problēmas. * (*Nav piemērojams, kur spēkā ir Regula EK 1272/2008 (CLP) vai Darbības drošības un veselības aizsardzības aģentūras (OSHA) standarta par bīstamību (Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012).*)

lv Satur 1,32% (w/v) ūdeperoksīdu. Pēc atvēršanas iepakojumu jāglabā sistēmā ne ilgāk kā 28 dienas, pēc tam jāizmet. **UPIEBŪDZĒJUMS:** Satur ūdeperoksīdu. Var būt kaitīgi ieelpojot. * PĒDĒKĀRĒJUMS: Ja jūtat nepatīkamus simptomus, zvaniet uz ĶĒMĒRĒJUMS CENTRU / ārstu, ja jums ir sāpes vai citas problēmas. * (*Nav piemērojams, kur spēkā ir Regula EK

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
3 листов

Подпись




Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Раствор пре-триггера для подготовки хемилюминесцентной реакции при проведении исследований на иммунохимических анализаторах ARCHITECT «Пре-Триггер Раствор (ARCHITECT Pre-Trigger Solution)»

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)







Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 листов

Подпись

