



Комплект изделий для внутривенного введения инфузионных растворов однократного применения, стерильный
ТУ 9398-017-00480201-2015




Комплект изделий для внутривенного введения инфузионных растворов однократного применения, стерильный
ТУ 9398-017-00480201-2015



Комплект изделий для внутривенного введения инфузионных растворов однократного применения, стерильный
ТУ 9398-017-00480201-2015




Комплект изделий для внутривенного введения инфузионных растворов однократного применения, стерильный
ТУ 9398-017-00480201-2015




Комплект изделий для внутривенного введения инфузионных растворов однократного применения, стерильный
ТУ 9398-017-00480201-2015




Комплект изделий для внутривенного введения инфузионных растворов однократного применения, стерильный
ТУ 9398-017-00480201-2015



Комплект изделий для внутривенного введения инфузионных растворов однократного применения, стерильный
ТУ 9398-017-00480201-2015



Комплект изделий для внутривенного введения инфузионных растворов однократного применения, стерильный
ТУ 9398-017-00480201-2015




Комплект изделий для внутривенного введения инфузионных растворов однократного применения, стерильный
ТУ 9398-017-00480201-2015



Комплект изделий для внутривенного введения инфузионных растворов однократного применения, стерильный
ТУ 9398-017-00480201-2015




Комплект изделий для внутривенного введения инфузионных растворов однократного применения, стерильный
ТУ 9398-017-00480201-2015



Комплект изделий для внутривенного введения инфузионных растворов однократного применения, стерильный
ТУ 9398-017-00480201-2015



Комплект изделий для внутривенного введения инфузионных растворов однократного применения, стерильный
ТУ 9398-017-00480201-2015




Комплект изделий для внутривенного введения инфузионных растворов однократного применения, стерильный
ТУ 9398-017-00480201-2015




Комплект изделий для внутривенного введения инфузионных растворов однократного применения, стерильный
ТУ 9398-017-00480201-2015



Комплект изделий для внутривенного введения инфузионных растворов однократного применения, стерильный
ТУ 9398-017-00480201-2015



Комплект изделий для внутривенного введения инфузионных растворов однократного применения, стерильный
ТУ 9398-017-00480201-2015



НАТРИЯ ХЛОРИД
раствор для инфузий 0,9 % 2000 мл
Регидратирующее средство Р N002491/01
Состав: натрия хлорид - 9 г, вода для инъекций - до 1 л
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИВЕННО
Раствор использовать однократно
В случае изменения окраски или появления взвеси раствор
не пригоден к употреблению.
Хранить в сухом, защищенном от света и агрессивных сред
месте при температуре от 5 до 25 °С. Применять по назначению врача.

2540715 до 0817

СПИТЕЗ

ОАО «Спитез», 640008, Россия
г. Курган, пр. Конституции, 7
Тел/факс: (3522) 48-16-80

**Образцы этикеток на Комплект изделий для внутривенного введения
инфузионных растворов однократного применения, стерильного по
ТУ 9398-017-00480201-2015**

НЕОГЕМОДЕЗ раствор для инфузий 500 мл

Дезинтоксикационное средство Р N003499/01
Состав на 1 л. Активные вещества: повидон-8 тыс. - 60,00 г,
натрия хлорид - 5,50 г, калия хлорид - 0,42 г, кальция хлорида гексагидрат - 0,50 г,
магния хлорида гексагидрат - 0,005 г, натрия гидрокарбонат - 0,23 г.
Вспомогательное вещество: вода для инъекций - до 1,0 л.
Теоретическая осмоляльность 225 мОсм/л
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИВЕННО КАПЕЛЬНО

30715 до 0817



ОАО «Синтез», 640008, Россия
г. Курган, пр. Конституции, 7
Тел/факс: (3522) 48-16-89

НЕОГЕМОДЕЗ раствор для инфузий 250 мл

Дезинтоксикационное средство Р N003499/01
Состав на 1 л. Активные вещества: повидон-8 тыс. - 60,00 г,
натрия хлорид - 5,50 г, калия хлорид - 0,42 г, кальция хлорида гексагидрат - 0,50 г,
магния хлорида гексагидрат - 0,005 г, натрия гидрокарбонат - 0,23 г.
Вспомогательное вещество: вода для инъекций - до 1,0 л.
Теоретическая осмоляльность 225 мОсм/л
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИВЕННО КАПЕЛЬНО

20715 до 0817



ОАО «Синтез», 640008, Россия
г. Курган, пр. Конституции, 7
Тел/факс: (3522) 48-16-89

НЕОГЕМОДЕЗ раствор для инфузий 200 мл

Дезинтоксикационное средство Р N003499/01
Состав на 1 л. Активные вещества: повидон-8 тыс. - 60,00 г,
натрия хлорид - 5,50 г, калия хлорид - 0,42 г, кальция хлорида гексагидрат - 0,50 г,
магния хлорида гексагидрат - 0,005 г, натрия гидрокарбонат - 0,23 г.
Вспомогательное вещество: вода для инъекций - до 1,0 л.
Теоретическая осмоляльность 225 мОсм/л
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИВЕННО КАПЕЛЬНО

310615 до 0717



ОАО «Синтез», 640008, Россия
г. Курган, пр. Конституции, 7
Тел/факс: (3522) 48-16-89

НЕОГЕМОДЕЗ раствор для инфузий 400 мл

Дезинтоксикационное средство Р N003499/01
Состав на 1 л. Активные вещества: повидон-8 тыс. - 60,00 г,
натрия хлорид - 5,50 г, калия хлорид - 0,42 г, кальция хлорида гексагидрат - 0,50 г,
магния хлорида гексагидрат - 0,005 г, натрия гидрокарбонат - 0,23 г.
Вспомогательное вещество: вода для инъекций - до 1,0 л.
Теоретическая осмоляльность 225 мОсм/л
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИВЕННО КАПЕЛЬНО

10715 до 0817



ОАО «Синтез», 640008, Россия
г. Курган, пр. Конституции, 7
Тел/факс: (3522) 48-16-89

ГЛЮКОЗА
раствор для инфузий 5 % 400 мл
Декстроза

Средство углеводного питания Р N000209/02
Состав на 1 л. Активное вещество: декстрозы моногидрат (в пересчете на декстрозу) - 50 г.
Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 0,26 г,
0,1 М Хлористоводородной кислоты раствор - до pH 3,0 - 4,1, вода для инъекций - до 1 л.
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИВЕННО КАПЕЛЬНО СТРУЙНО
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 5 до 25°C

300715 до 0817



ОАО «Синтез»,
640008, Россия
г. Курган, пр. Конституции, 7
Тел/факс: (3522) 48-16-89

ГЛЮКОЗА
раствор для инфузий 5 % 500 мл
Декстроза

Средство углеводного питания Р N000209/02
Состав на 1 л. Активное вещество: декстрозы моногидрат (в пересчете на декстрозу) - 50 г.
Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 0,26 г,
0,1 М Хлористоводородной кислоты раствор - до pH 3,0 - 4,1, вода для инъекций - до 1 л.
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИВЕННО КАПЕЛЬНО СТРУЙНО
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 5 до 25°C

200615 до 0717



ОАО «Синтез»,
640008, Россия
г. Курган, пр. Конституции, 7
Тел/факс: (3522) 48-16-89

ГЛЮКОЗА
раствор для инфузий 5 % 250 мл
Декстроза

Средство углеводного питания Р N000209/02
Состав на 1 л. Активное вещество: декстрозы моногидрат (в пересчете на декстрозу) - 50 г.
Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 0,26 г,
0,1 М Хлористоводородной кислоты раствор - до pH 3,0 - 4,1, вода для инъекций - до 1 л.
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИВЕННО КАПЕЛЬНО СТРУЙНО
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 5 до 25°C

310715 до 0817



ОАО «Синтез»,
640008, Россия
г. Курган, пр. Конституции, 7
Тел/факс: (3522) 48-16-89

ГЛЮКОЗА
раствор для инфузий 5 % 200 мл
Декстроза

Средство углеводного питания Р N000209/02
Состав на 1 л. Активное вещество: декстрозы моногидрат (в пересчете на декстрозу) - 50 г.
Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 0,26 г,
0,1 М Хлористоводородной кислоты раствор - до pH 3,0 - 4,1, вода для инъекций - до 1 л.
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИВЕННО КАПЕЛЬНО СТРУЙНО
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 5 до 25°C

290615 до 0717



ОАО «Синтез»,
640008, Россия
г. Курган, пр. Конституции, 7
Тел/факс: (3522) 48-16-89

ГЛЮКОЗА
раствор для инфузий 5 % 1000 мл
Декстроза

Средство углеводного питания Р N000209/02
Состав на 1 л. Активное вещество: декстрозы моногидрат (в пересчете на декстрозу) - 50 г.
Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 0,26 г,
0,1 М Хлористоводородной кислоты раствор - до pH 3,0 - 4,1, вода для инъекций - до 1 л.
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИВЕННО КАПЕЛЬНО СТРУЙНО
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 5 до 25°C

210615 до 0717



ОАО «Синтез»,
640008, Россия
г. Курган, пр. Конституции, 7
Тел/факс: (3522) 48-16-89

Образцы этикеток на Комплект изделий для внутривенного введения инфузионных растворов однократного применения, стерильного по ТУ 9398-017-00480201-2015

НАТРИЯ ХЛОРИД
раствор для инфузий 0,9 % 250 мл
Регидратирующее средство Р N002491/01
Состав: натрия хлорид - 9 г, вода для инъекций - до 1 л
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИВЕННО
Раствор использовать однократно
В случае изменения окраски или появления взвеси раствор не пригоден к употреблению.
Хранить в сухом, защищенном от света и агрессивных сред месте при температуре от 5 до 25 °С. Применять по назначению врача.

2300715 до 0817



ОАО «Синтез», 640008, Россия
г. Курган, пр. Конституции, 7
Тел/факс: (3522) 48-16-89

НАТРИЯ ХЛОРИД
раствор для инфузий 0,9 % 200 мл
Регидратирующее средство Р N002491/01
Состав: натрия хлорид - 9 г, вода для инъекций - до 1 л
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИВЕННО
Раствор использовать однократно
В случае изменения окраски или появления взвеси раствор не пригоден к употреблению.
Хранить в сухом, защищенном от света и агрессивных сред месте при температуре от 5 до 25 °С. Применять по назначению врача.

2260715 до 0817



ОАО «Синтез», 640008, Россия
г. Курган, пр. Конституции, 7
Тел/факс: (3522) 48-16-89

НАТРИЯ ХЛОРИД
раствор для инфузий 0,9 % 100 мл
Регидратирующее средство Р N002491/01
Состав: натрия хлорид - 9 г, вода для инъекций - до 1 л
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИВЕННО
Раствор использовать однократно
В случае изменения окраски или появления взвеси раствор не пригоден к употреблению.
Хранить в сухом, защищенном от света и агрессивных сред месте при температуре от 5 до 25 °С. Применять по назначению врача.

2250715 до 0817



ОАО «Синтез», 640008, Россия
г. Курган, пр. Конституции, 7
Тел/факс: (3522) 48-16-89

НАТРИЯ ХЛОРИД
раствор для инфузий 0,9 % 500 мл
Регидратирующее средство Р N002491/01
Состав: натрия хлорид - 9 г, вода для инъекций - до 1 л
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИВЕННО
Раствор использовать однократно
В случае изменения окраски или появления взвеси раствор не пригоден к употреблению.
Хранить в сухом, защищенном от света и агрессивных сред месте при температуре от 5 до 25 °С. Применять по назначению врача.

2500715 до 0817



ОАО «Синтез», 640008, Россия
г. Курган, пр. Конституции, 7
Тел/факс: (3522) 48-16-89

НАТРИЯ ХЛОРИД
раствор для инфузий 0,9 % 400 мл
Регидратирующее средство Р N002491/01
Состав: натрия хлорид - 9 г, вода для инъекций - до 1 л
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИВЕННО
Раствор использовать однократно
В случае изменения окраски или появления взвеси раствор не пригоден к употреблению.
Хранить в сухом, защищенном от света и агрессивных сред месте при температуре от 5 до 25 °С. Применять по назначению врача.

2510715 до 0817



ОАО «Синтез», 640008, Россия
г. Курган, пр. Конституции, 7
Тел/факс: (3522) 48-16-89

НАТРИЯ ХЛОРИД
раствор для инфузий 0,9 % 800 мл
Регидратирующее средство Р N002491/01
Состав: натрия хлорид - 9 г, вода для инъекций - до 1 л
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИВЕННО
Раствор использовать однократно
В случае изменения окраски или появления взвеси раствор не пригоден к употреблению.
Хранить в сухом, защищенном от света и агрессивных сред месте при температуре от 5 до 25 °С. Применять по назначению врача.

2520715 до 0817



ОАО «Синтез», 640008, Россия
г. Курган, пр. Конституции, 7
Тел/факс: (3522) 48-16-89

НАТРИЯ ХЛОРИД
раствор для инфузий 0,9 % 1000 мл
Регидратирующее средство Р N002491/01
Состав: натрия хлорид - 9 г, вода для инъекций - до 1 л
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИВЕННО
Раствор использовать однократно
В случае изменения окраски или появления взвеси раствор не пригоден к употреблению.
Хранить в сухом, защищенном от света и агрессивных сред месте при температуре от 5 до 25 °С. Применять по назначению врача.

2530715 до 0817













ОАО «Синтез», 640008, Россия
г. Курган, пр. Конституции, 7
Тел/факс: (3522) 48-16-89

НАТРИЯ ХЛОРИД
раствор для инфузий 0,9 % 2000 мл
Регидратирующее средство Р N002491/01
Состав: натрия хлорид - 9 г, вода для инъекций - до 1 л
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИВЕННО
Раствор использовать однократно
В случае изменения окраски или появления взвеси раствор не пригоден к употреблению.
Хранить в сухом, защищенном от света и агрессивных сред месте при температуре от 5 до 25 °С. Применять по назначению врача.

2540715 до 0817



ОАО «Синтез», 640008, Россия
г. Курган, пр. Конституции, 7
Тел/факс: (3522) 48-16-89



НАТРИЯ ХЛОРИД
раствор для инфузий 0,9 % 800 мл
Регидратирующее средство Р N002491/01
Состав: натрия хлорид - 9 г, вода для инъекций - до 1 л
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИВЕННО
Раствор использовать однократно
В случае изменения окраски или появления взвеси раствор не пригоден к употреблению.
Хранить в сухом, защищенном от света и агрессивных сред месте при температуре от 5 до 25 °С. Применять по назначению врача.

2520715 до 0817

ОАО «Синтез» 540005, Россия
г. Курган, пр. Коммунаров, 7
Телефон: (3522) 45-15-30

НАТРИЯ ХЛОРИД
раствор для инфузий 0,9 % 1000 мл
Регидратирующее средство Р N002491/01
Состав: натрия хлорид - 9 г, вода для инъекций - до 1 л
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИВЕННО
Раствор использовать однократно
В случае изменения окраски или появления взвеси раствор не пригоден к употреблению.
Хранить в сухом, защищенном от света и агрессивных сред месте при температуре от 5 до 25 °С. Применять по назначению врача.

2530715 до 0817

ОАО «Синтез» 540005, Россия
г. Курган, пр. Коммунаров, 7
Телефон: (3522) 45-15-30

НАТРИЯ ХЛОРИД
раствор для инфузий 0,9 % 2000 мл
Регидратирующее средство Р N002491/01
Состав: натрия хлорид - 9 г, вода для инъекций - до 1 л
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИВЕННО
Раствор использовать однократно
В случае изменения окраски или появления взвеси раствор не пригоден к употреблению.
Хранить в сухом, защищенном от света и агрессивных сред месте при температуре от 5 до 25 °С. Применять по назначению врача.

2540715 до 0817

ОАО «Синтез» 540005, Россия
г. Курган, пр. Коммунаров, 7
Телефон: (3522) 45-15-30

НЕОГЕМОДЕЗ раствор для инфузий 200 мл
Дезинтоксикационное средство Р N003499/01
Состав на 1 л. Активные вещества: повидон-8 тыс. - 60,00 г, натрия хлорид - 5,50 г, калия хлорид - 0,42 г, кальция хлорида гексагидрат - 0,50 г, магния хлорида гексагидрат - 0,005 г, натрия гидрокарбонат - 0,23 г.
Вспомогательное вещество: вода для инъекций - до 1,0 л.
Теоретическая осмоляльность 225 мОсм/л
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИВЕННО КАПЕЛЬНО

310615 до 0717

ОАО «Синтез» 540005, Россия
г. Курган, пр. Коммунаров, 7
Телефон: (3522) 45-15-30

НЕОГЕМОДЕЗ раствор для инфузий 250 мл
Дезинтоксикационное средство Р N003499/01
Состав на 1 л. Активные вещества: повидон-8 тыс. - 60,00 г, натрия хлорид - 5,50 г, калия хлорид - 0,42 г, кальция хлорида гексагидрат - 0,50 г, магния хлорида гексагидрат - 0,005 г, натрия гидрокарбонат - 0,23 г.
Вспомогательное вещество: вода для инъекций - до 1,0 л.
Теоретическая осмоляльность 225 мОсм/л
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИВЕННО КАПЕЛЬНО

20715 до 0817

ОАО «Синтез» 540005, Россия
г. Курган, пр. Коммунаров, 7
Телефон: (3522) 45-15-30

НЕОГЕМОДЕЗ раствор для инфузий 400 мл
Дезинтоксикационное средство Р N003499/01
Состав на 1 л. Активные вещества: повидон-8 тыс. - 60,00 г, натрия хлорид - 5,50 г, калия хлорид - 0,42 г, кальция хлорида гексагидрат - 0,50 г, магния хлорида гексагидрат - 0,005 г, натрия гидрокарбонат - 0,23 г.
Вспомогательное вещество: вода для инъекций - до 1,0 л.
Теоретическая осмоляльность 225 мОсм/л
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИВЕННО КАПЕЛЬНО

10715 до 0817

ОАО «Синтез» 540005, Россия
г. Курган, пр. Коммунаров, 7
Телефон: (3522) 45-15-30

НЕОГЕМОДЕЗ раствор для инфузий 500 мл
Дезинтоксикационное средство Р N003499/01
Состав на 1 л. Активные вещества: повидон-8 тыс. - 60,00 г, натрия хлорид - 5,50 г, калия хлорид - 0,42 г, кальция хлорида гексагидрат - 0,50 г, магния хлорида гексагидрат - 0,005 г, натрия гидрокарбонат - 0,23 г.
Вспомогательное вещество: вода для инъекций - до 1,0 л.
Теоретическая осмоляльность 225 мОсм/л
СТЕРИЛЬНО ВНУТРИВЕННО КАПЕЛЬНО

30715 до 0817

ОАО «Синтез» 540005, Россия
г. Курган, пр. Коммунаров, 7
Телефон: (3522) 45-15-30

Образцы этикеток к комплекту изделий для внутривенного введения инфузионных растворов