

Лейкопластырь перцовый перфорированный, размерами 10 x 15 см, 10 x 18 см



Пакет изделия, лицевая сторона: Лейкопластырь перцовый перфорированный, размерами 10 x 15 см

НЕСТОКСИЧНО



Лейкопластырь перцовый перфорированный 10x15 см

Местнораздражающее и обезболивающее средство при лечении радикулитов, миозитов, невралгий, люмбаго, ревматизма, простудных заболеваний.

Способ применения: открыть пакет, достать пластырь, снять с его поверхности защитную пленку и приложить на сухую и чистую кожу в месте болевого ощущения. Пластырь может оставаться на коже до 2 суток. В случае появления ощущения жжения пластырь снимают раннее. Лечение пластырем при необходимости можно повторить несколько раз, каждый раз используя новое изделие. Повторно на одно и то же место пластыря рекомендуется использовать только после двух дней перерыва.

Условия хранения: перед использованием хранить в потребительской упаковке в сухом, защищенном от света и обогревателей места, при температуре от 5°C до 40°C, с относительной влажностью воздуха до 80%.

Срок годности - 5 лет от даты изготовления.

ООО "АП САРПТА-МЕДИПЛАСТ"

ул. Коммунальная 18 г. Донецк, Украина тел. +38 062 388 10 07
e-mail: info@ap-sarpta-mediplast.com

Регистрационные удостоверения:

РД № ФСЗ 2010-06654 от 26.04.2010 г.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «АПЗ «САРЕПТА» 346780, Россия

Ростовская область, г. Азов, пер. Социалистический,

д. 54/56, пом. 3

тел.: +7 (863) 285-10-95


«С-РАПТОР»




LOT 161019

Серия включает дату изготовления

НЕСТОКСИЧНО



Лицевая сторона изделия: Лейкопластырь перцовый перфорированный, размерами 10 x 15 см.



Оборотная сторона изделия: Лейкопластырь перцовый перфорированный, размерами 10 x 15 см.



Упаковка изделия, лицевая сторона: Лейкопластырь перцовый перфорированный, размерами 10 x 18 см

Лейкопластырь C-мощ перцовый перфорированный 10x18 см

Использовать только в виде пластыря для прижигания, обезболивания, снятия отека, воспаления, улучшения кровообращения.

Способ применения: Пластырь наклеивают на чистую, сухую кожу. Пластырь должен быть полностью закрыт. Пластырь наклеивают на чистую, сухую кожу. Пластырь должен быть полностью закрыт. Пластырь наклеивают на чистую, сухую кожу. Пластырь должен быть полностью закрыт.

Курс лечения: Пластырь наклеивают на 1-2 суток. Пластырь наклеивают на 1-2 суток. Пластырь наклеивают на 1-2 суток. Пластырь наклеивают на 1-2 суток.

Противопоказания: Не использовать на открытых ранах, ожогах, обморожениях, инфекционных заболеваниях.

Производитель: ООО ЦИРМИ, г. Москва, ул. Давыдовская, 18. Контакт: +7 (495) 285-2445. Сайт: info@cirmi-medical.ru

LOT 181019

Лейкопластырь C-мощ перцовый перфорированный 10x18 см

Использовать только в виде пластыря для прижигания, обезболивания, снятия отека, воспаления, улучшения кровообращения.

Способ применения: Пластырь наклеивают на чистую, сухую кожу. Пластырь должен быть полностью закрыт. Пластырь наклеивают на чистую, сухую кожу. Пластырь должен быть полностью закрыт. Пластырь наклеивают на чистую, сухую кожу. Пластырь должен быть полностью закрыт.

Курс лечения: Пластырь наклеивают на 1-2 суток. Пластырь наклеивают на 1-2 суток. Пластырь наклеивают на 1-2 суток. Пластырь наклеивают на 1-2 суток.

Противопоказания: Не использовать на открытых ранах, ожогах, обморожениях, инфекционных заболеваниях.

Производитель: ООО ЦИРМИ, г. Москва, ул. Давыдовская, 18. Контакт: +7 (495) 285-2445. Сайт: info@cirmi-medical.ru

LOT 181019

Лейкопластырь C-мощ перцовый перфорированный 10x18 см

Использовать только в виде пластыря для прижигания, обезболивания, снятия отека, воспаления, улучшения кровообращения.

Способ применения: Пластырь наклеивают на чистую, сухую кожу. Пластырь должен быть полностью закрыт. Пластырь наклеивают на чистую, сухую кожу. Пластырь должен быть полностью закрыт. Пластырь наклеивают на чистую, сухую кожу. Пластырь должен быть полностью закрыт.

Курс лечения: Пластырь наклеивают на 1-2 суток. Пластырь наклеивают на 1-2 суток. Пластырь наклеивают на 1-2 суток. Пластырь наклеивают на 1-2 суток.

Противопоказания: Не использовать на открытых ранах, ожогах, обморожениях, инфекционных заболеваниях.

Производитель: ООО ЦИРМИ, г. Москва, ул. Давыдовская, 18. Контакт: +7 (495) 285-2445. Сайт: info@cirmi-medical.ru

LOT 181019

Лейкопластырь C-мощ перцовый перфорированный 10x18 см

Использовать только в виде пластыря для прижигания, обезболивания, снятия отека, воспаления, улучшения кровообращения.

Способ применения: Пластырь наклеивают на чистую, сухую кожу. Пластырь должен быть полностью закрыт. Пластырь наклеивают на чистую, сухую кожу. Пластырь должен быть полностью закрыт. Пластырь наклеивают на чистую, сухую кожу. Пластырь должен быть полностью закрыт.


Курс лечения: Пластырь наклеивают на 1-2 суток. Пластырь наклеивают на 1-2 суток. Пластырь наклеивают на 1-2 суток. Пластырь наклеивают на 1-2 суток.

Противопоказания: Не использовать на открытых ранах, ожогах, обморожениях, инфекционных заболеваниях.


Производитель: ООО ЦИРМИ, г. Москва, ул. Давыдовская, 18. Контакт: +7 (495) 285-2445. Сайт: info@cirmi-medical.ru

LOT 181019

аковка изделия, обратная сторона: Лейкопластырь перцовый перфорированный, размерами 10 x 18 см



цевая сторона медицинского изделия: Лейкопластырь перцовый перфорированный, размерами 10 x 18 см



Внутренняя сторона медицинского изделия: Лейкопластырь перцовый перфорированный, размерами 10 x 18 см

Лейкопластырь перцовый перфорированный, размерами 10 x 15 см, 10 x 18 см



Пакетировка изделия, лицевая сторона: Лейкопластырь перцовый перфорированный, размерами 10 x 15 см

НТОКСИЧНО



Лейкопластырь **Стеласт** перцовый перфорированный 10x15 см

Местнораздражающее и обезболивающее средство при лечении радикулитов, миозитов, невралгий, люмбаго, ревматизма, простудных заболеваний

Способ применения: открыть пакет, достать пластырь, снять с его поверхности защитную пленку и приложить на сухую и чистую кожу в месте болевого ощущения. Пластырь может оставаться на коже до 2 суток. В случае появления ощущения жжения пластырь снимают раньше. Лечение пластырем, при необходимости, можно повторить несколько раз, каждый раз используя новое изделие. Повторно на одно и то же место пластырь рекомендуется использовать только после двух дней перерыва.

Условия хранения: перед использованием хранить в потребительской упаковке в сухом, защищенном от света и обогревателей месте, при температуре от 5°C до 40°C, с относительной влажностью воздуха до 80%.

Срок годности - 5 лет от даты изготовления.

ООО "АЛТ САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ"

ул. Политехническая, 18 г. Донецк, Украина. тел. +38 062 368 10 87

e-mail: info@altp-sarepta-mediplast.com

Регистрационные удостоверения:

РД № ФСЗ 2010/06554 от 26.04.2010 г.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «АЛТ «САРЕПТА», 3465780, Россия,

Ростовская область, г. Азов, пер. Социалистический,

д. 54/56, пом. 3

тел.: +7 (863) 285-10-95


«С-РАПЛАСТ»

LOT 161019


Серия указывает дату изготовления



паковка изделия, обратная сторона: Лейкопластырь перцовый перфорированный, размерами 10 x 15 см



Лицевая сторона изделия: Лейкопластырь перцовый перфорированный, размерами 10 x 15 см.



Оборотная сторона изделия: Лейкопластырь перцовый перфорированный, размерами 10 x 15 см.



ЛЕЙКО

П

ластырь
ЕРЦОВЫЙ
ЕРФОРИРОВАННЫЙ



ООО "АРТ САЙНТ-МЕДИКАЛ"
С-пласт

10 x 18 см



ЛЕЙКО

П

ластырь
ЕРЦОВЫЙ
ЕРФОРИРОВАННЫЙ



ООО "АРТ САЙНТ-МЕДИКАЛ"
С-пласт

10 x 18 см



ЛЕЙКО

П

ластырь
ЕРЦОВЫЙ
ЕРФОРИРОВАННЫЙ



ООО "АРТ САЙНТ-МЕДИКАЛ"
С-пласт

10 x 18 см



ЛЕЙКО

П

ластырь
ЕРЦОВЫЙ
ЕРФОРИРОВАННЫЙ



ООО "АРТ САЙНТ-МЕДИКАЛ"
С-пласт

10 x 18 см

упаковка изделия, лицевая сторона: Лейкопластырь перцовый перфорированный, размерами 10 x 18 см



Лейкопластырь **C-mocm** перцовый перфорированный 10x18 см

Местнораздражающее и обезболивающее средство при лечении радикулитов, миозитов, невралгий, остеохондрозов, простудных заболеваний.

Способ применения: открыть пакет, достать пластырь, снять с его поверхности защитную пленку и приложить на сухую и чистую кожу в месте бокового защемления. Пластырь может оставаться на коже до 2 суток. В случае появления раздражения кожи пластырь снимается раньше. Лейкопластырь, при необходимости, можно повторить несколько раз, каждый раз используя новую пленку. Повторно на одно и то же место пластырь рекомендуется использовать только после двух дней перерыва.

Условия хранения: после использования хранить в потребительской упаковке в сухом, защищенном от света и облучения месте, при температуре от 5 °C до 40 °C, с относительной влажностью воздуха до 80 %.

Срок годности – 5 лет от даты изготовления. Серия включает дату изготовления.

Регистрационное удостоверение
РР № ФСЗ 2010/06954 от 26.04.2010 г.
Полномоченный представитель производителя в РФ
ООО «АИЗ-САРЕТТА» 346180, Россия
Ростовская область, г.Азов, пер. Союзно-технический
д. 54-56, пом. 3, тел. +7 863 285 10-95

ООО «АИЗ-САРЕТТА-МЕДИКАСТ»
г. Полтава, перекресток 18, Днепропетровская обл., Украина, 53054
тел. +38 062 385 10-87
e-mail: info@almaz-medplast.com



XCAP LDPE LOT 181019



Лейкопластырь **C-mocm** перцовый перфорированный 10x18 см

Местнораздражающее и обезболивающее средство при лечении радикулитов, миозитов, невралгий, остеохондрозов, простудных заболеваний.

Способ применения: открыть пакет, достать пластырь, снять с его поверхности защитную пленку и приложить на сухую и чистую кожу в месте бокового защемления. Пластырь может оставаться на коже до 2 суток. В случае появления раздражения кожи пластырь снимается раньше. Лейкопластырь, при необходимости, можно повторить несколько раз, каждый раз используя новую пленку. Повторно на одно и то же место пластырь рекомендуется использовать только после двух дней перерыва.

Условия хранения: после использования хранить в потребительской упаковке в сухом, защищенном от света и облучения месте, при температуре от 5 °C до 40 °C, с относительной влажностью воздуха до 80 %.

Срок годности – 5 лет от даты изготовления. Серия включает дату изготовления.

Регистрационное удостоверение
РР № ФСЗ 2010/06954 от 26.04.2010 г.
Полномоченный представитель производителя в РФ
ООО «АИЗ-САРЕТТА» 346180, Россия
Ростовская область, г.Азов, пер. Союзно-технический
д. 54-56, пом. 3, тел. +7 863 285 10-95

ООО «АИЗ-САРЕТТА-МЕДИКАСТ»
г. Полтава, перекресток 18, Днепропетровская обл., Украина, 53054
тел. +38 062 385 10-87
e-mail: info@almaz-medplast.com



XCAP LDPE LOT 181019



Лейкопластырь **C-mocm** перцовый перфорированный 10x18 см

Местнораздражающее и обезболивающее средство при лечении радикулитов, миозитов, невралгий, остеохондрозов, простудных заболеваний.

Способ применения: открыть пакет, достать пластырь, снять с его поверхности защитную пленку и приложить на сухую и чистую кожу в месте бокового защемления. Пластырь может оставаться на коже до 2 суток. В случае появления раздражения кожи пластырь снимается раньше. Лейкопластырь, при необходимости, можно повторить несколько раз, каждый раз используя новую пленку. Повторно на одно и то же место пластырь рекомендуется использовать только после двух дней перерыва.

Условия хранения: после использования хранить в потребительской упаковке в сухом, защищенном от света и облучения месте, при температуре от 5 °C до 40 °C, с относительной влажностью воздуха до 80 %.

Срок годности – 5 лет от даты изготовления. Серия включает дату изготовления.

Регистрационное удостоверение
РР № ФСЗ 2010/06954 от 26.04.2010 г.
Полномоченный представитель производителя в РФ
ООО «АИЗ-САРЕТТА» 346180, Россия
Ростовская область, г.Азов, пер. Союзно-технический
д. 54-56, пом. 3, тел. +7 863 285 10-95

ООО «АИЗ-САРЕТТА-МЕДИКАСТ»
г. Полтава, перекресток 18, Днепропетровская обл., Украина, 53054
тел. +38 062 385 10-87
e-mail: info@almaz-medplast.com



XCAP LDPE LOT 181019



Лейкопластырь **C-mocm** перцовый перфорированный 10x18 см

Местнораздражающее и обезболивающее средство при лечении радикулитов, миозитов, невралгий, остеохондрозов, простудных заболеваний.

Способ применения: открыть пакет, достать пластырь, снять с его поверхности защитную пленку и приложить на сухую и чистую кожу в месте бокового защемления. Пластырь может оставаться на коже до 2 суток. В случае появления раздражения кожи пластырь снимается раньше. Лейкопластырь, при необходимости, можно повторить несколько раз, каждый раз используя новую пленку. Повторно на одно и то же место пластырь рекомендуется использовать только после двух дней перерыва.

Условия хранения: после использования хранить в потребительской упаковке в сухом, защищенном от света и облучения месте, при температуре от 5 °C до 40 °C, с относительной влажностью воздуха до 80 %.

Срок годности – 5 лет от даты изготовления. Серия включает дату изготовления.


Регистрационное удостоверение
РР № ФСЗ 2010/06954 от 26.04.2010 г.
Полномоченный представитель производителя в РФ
ООО «АИЗ-САРЕТТА» 346180, Россия
Ростовская область, г.Азов, пер. Союзно-технический
д. 54-56, пом. 3, тел. +7 863 285 10-95

ООО «АИЗ-САРЕТТА-МЕДИКАСТ»
г. Полтава, перекресток 18, Днепропетровская обл., Украина, 53054
тел. +38 062 385 10-87
e-mail: info@almaz-medplast.com




XCAP LDPE LOT 181019

упаковка изделия, обратная сторона: Лейкопластырь перцовый перфорированный, размерами 10 x 18 см



левая сторона медицинского изделия: Лейкопластырь перцовый перфорированный, размерами 10 x 18 см



ронтная сторона медицинского изделия: Лейкопластырь перцовый перфорированный, размерами 10 x 18 см



Лейкопластырь

Лейкопластырь



С-пласт

С-пласт

Условия хранения лейкопластырей по группе условий хранения 1 в соответствии с ГОСТ 15150:
- температура (5-40)°С,
- относительная влажность до 80% при температуре 25°С.
Срок годности - 5 лет от даты изготовления.


ООО «АУП САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ»
ул. Полиграфическая, 18, г. Донецк, 83054, Украина
тел./факс +38 062 388 0087
e-mail: info@sarepta-mediplast.com
Уполномоченный представитель производителя:
ООО АЛЗ «Сарепта», 3-5782, г. Азов
пер. Социалистический, 54/56, пом.3
тел. +7 (863) 424 47 05
рег.уд. РФ _____ от _____

ШТРИХ-КОД

ЛОГ	Год изготовления	Упаковщик
-----	------------------	-----------

Количество лейкопластырей: _____ шт.

Вторичная упаковка медицинского изделия с этикеткой, обеспечивающей контроль периферического кровообращения:
Лейкопластырь перцовый перфорированный, размерами 10 x 15 см




Вторичная упаковка медицинского изделия с этикеткой, обеспечивающей контроль первого вскрытия:
Лейкопластырь перцовый перфорированный, размерами 10 x 18 см




транспортная упаковка медицинского изделия «Лейкопластырь перцовый перфорированный, размерами 10 x 15 см, 10 x 18 см»

· Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
Лейкопластырь перцовый перфорированный, размерами 10 x 15 см, 10 x 18 см
(в части обновленной маркировки медицинского изделия)
производства ООО АУП «САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ», Украина



Маркировка изделия: Лейкопластырь перцовый перфорированный, размерами 10 x 15 см.
Лицевая сторона.


НЕСТОКСИЧНО



миозиты



простудные заболевания



люмбаго, невралгия, радикулит



невралгия

НЕСТОКСИЧНО

Лейкопластырь перцовый перфорированный 10x15 см

Местнораздражающее и обезболивающее средство при лечении радикулитов, миозитов, невралгии, люмбаго, ревматизма, острого трахеобронхита, хронического бронхита.

Способ применения: открыть пакет, достать пластырь, снять с его поверхности защитную плёнку и приложить на сухую и чистую кожу в месте болевого ощущения, а в случае лечения простудных заболеваний (острый трахеобронхит, хронический бронхит) - на центральную область грудной клетки, как показано на втором рисунке слева. Пластырь может оставаться на коже до 2 суток. В случае появления ощущения жжения пластырь снимают раньше. Лечение пластырем, при необходимости, можно повторить несколько раз, каждый раз используя новое изделие. Повторно на одно и то же место пластырь рекомендуется использовать только после двух дней перерыва.

Условия хранения: перед использованием хранить в потребительской упаковке в сухом, защищенном от света и обогревателей месте, при температуре от 5°C до 40°C, с относительной влажностью воздуха до 80%.

Срок годности - 5 лет от даты изготовления.

ООО "АУП САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ"

ул. Полиграфическая, 18 г. Донецк, Украина, тел. +38 062 388 10 87

e-mail: info@sarepta-mediplast.com

Регистрационные удостоверения:

РФ № ФСЗ 2010/06654 от 26.04.2010 г.

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО «АЛЗ «САРЕПТА», 346780, Россия,

Ростовская область, г. Азов, пер. Социалистический,

д. 54/56, пом. 3

тел.: +7 (863) 285-10-95

LOT


161019

Серия включает дату изготовления

>C-PAP/LDPE<



Маркировка изделия: Лейкопластырь перцовый перфорированный, размерами 10 x 15 см.
Оборотная сторона.



Маркировка варианта исполнения: Лейкопластырь перцовый перфорированный, размерами 10 x 18 см. Лицевая сторона.

30



5