

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Мир-Фарм»
Давыдова Е.В.




2022 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«Средство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX,
варианты исполнения»**

производства
LifeScience PLUS, Inc. (ЛайфСайнс Плюс, Инк.)

2022 г.

Средство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, размер 5 см х 5 см



Средство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, размер 5 см х 5 см, внутренний пакет индивидуальной упаковки, передняя поверхность

Tear Open Here

BloodSTOP® iX
CONTROLS BLEEDING FAST

**Advanced
Hemostat**

WoundHEAL®

100% purified, water soluble, etherified
natural sodium carboxymethyl cellulose

- Acts fast and reduces blood loss
- Transforms to a transparent gel to seal the wound
- Sticks to wound
- Creates moist environment to promote healing
- Water soluble, easily removed with sterile saline
- Biocompatible, non-irritating

1 Piece

STERILE

2" X 2"

SIZE (5 cm X 5 cm)

Средство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, размер 5 см x 5 см, внутренний пакет индивидуальной упаковки, задняя поверхность

Tear Open Here


STERILE: Sterility guaranteed unless package is opened or damaged.

WARNING: In case of swelling or redness, discontinue use.
COMPLETE INSTRUCTIONS ENCLOSED.


DIRECTIONS: Use dry instruments to apply. Cover cleaned wound with BloodSTOP® iX. Apply pressure and additional layers of BloodSTOP® iX depending on the degree of hemorrhage. Moisten with sterile saline if necessary for adherence to the wound surface.

STORAGE: For maximum shelf life, storage temperature of 15-30 °C (59-86 °F) is recommended.

Rx Only



WellKang, Ltd.
The Black Church, St. Mary's Place
Dublin 7, D07 P4AX, Ireland




 **LifeScience PLUS, Inc.**
2520A Wyandotte St., Mountain View, CA 94043, USA
P.O. Box 60783, Palo Alto, CA 94306, USA
Toll Free: 1-877-587-5433 - USA
Tel: +1-650-565-8172 - International
www.LifeSciencePlus.com
Manufactured in the USA



LifeScience PLUS
REVOLUTIONARY WOUND CARE

Rev. 2019-05

средство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, размер 5 см х 10 см, внутренний пакет индивидуальной упаковки, передняя поверхность



Средство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, размер 5 см x 10 см, внутренний пакет индивидуальной упаковки, задняя поверхность

Tear Open Here

STERILE: Sterility guaranteed unless package is opened or damaged.


WARNING: In case of swelling or redness, discontinue use.

COMPLETE INSTRUCTIONS ENCLOSED.


DIRECTIONS: Use dry instruments to apply. Cover cleaned wound with BloodSTOP® iX. Apply pressure and additional layers of BloodSTOP® iX depending on the degree of hemorrhage. Moisten with sterile saline if necessary for adherence to the wound surface.

STORAGE: For maximum shelf life, storage temperature of 15-30 °C (59-86 °F) is recommended.

Rx Only



WellKong, Ltd.
The Black Church, St. Mary's Place
Dublin 7, D07 P4AX, Ireland




 **LifeScience PLUS, Inc.**
2520A Wyandotte St., Mountain View, CA 94043, USA
P.O. Box 60783, Palo Alto, CA 94306, USA
Toll Free: 1-877-587-5433 - USA
Tel: +1-650-565-8172 - International
www.LifeSciencePlus.com
Manufactured in the USA



LifeScience PLUS
REVOLUTIONARY WOUND CARE

Rev. 2019-05

Средство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, размер 1,3 см X 5 см, внутренний пакет индивидуальной упаковки, передняя поверхность



Средство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, размер 1,3 см x 5 см, внутренний пакет индивидуальной упаковки, задняя поверхность

Tear Open Here

STERILE: Sterility guaranteed unless package is opened or damaged.

WARNING: In case of swelling or redness, discontinue use.
COMPLETE INSTRUCTIONS ENCLOSED.

DIRECTIONS: Use dry instruments to apply. Cover cleaned wound with BloodSTOP® iX. Apply pressure and additional layers of BloodSTOP® iX depending on the degree of hemorrhage. Moisten with sterile saline if necessary for adherence to the wound surface.

STORAGE: For maximum shelf life, storage temperature of 15-30 °C (59-86 °F) is recommended.

Rx Only

EC REP

WellKang, Ltd.
The Black Church, St. Mary's Place
Dublin 7, D07 P4AX, Ireland




LifeScience PLUS, Inc.
2520A Wyandotte St., Mountain View, CA 94043, USA
P.O. Box 60783, Palo Alto, CA 94306, USA
Toll Free: 1-877-587-5433 - USA
Tel: +1-650-565-8172 - International
www.LifeSciencePlus.com
Manufactured in the USA




LifeScience PLUS
REVOLUTIONARY WOUND CARE

Rev. 2019-05

средство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, размер 1,3 см
5 см, наружный пакет индивидуальной упаковки, передняя поверхность



средство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, размер 1,3 см
5 см, наружный пакет индивидуальной упаковки, задняя поверхность



...ство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, размер 10 см x 8 см, внутренний пакет индивидуальной упаковки, передняя поверхность

Tear Open Here

BloodSTOP® iX
CONTROLS BLEEDING FAST

Advanced
Hemostat

WoundHEAL®

100% purified, water soluble, etherified
natural sodium carboxymethyl cellulose

- Acts fast and reduces blood loss
- Transforms to a transparent gel to seal the wound
- Sticks to wound
- Creates moist environment to promote healing
- Water soluble, easily removed with sterile saline
- Biocompatible, non-irritating

1 Piece

STERILE

4" X 8"

SIZE (10 cm X 20 cm)

...ство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, размер 10 см х 10 см, внутренний пакет индивидуальной упаковки, задняя поверхность

Tear Open Here

STERILE: Sterility guaranteed unless package is opened or damaged.


WARNING: In case of swelling or redness, discontinue use.

COMPLETE INSTRUCTIONS ENCLOSED.


DIRECTIONS: Use dry instruments to apply. Cover cleaned wound with BloodSTOP® iX. Apply pressure and additional layers of BloodSTOP® iX depending on the degree of hemorrhage. Moisten with sterile saline if necessary for adherence to the wound surface.

STORAGE: For maximum shelf life, storage temperature of 15-30 °C (59-86 °F) is recommended.

Rx Only



WellKang, Ltd.
The Black Church, St. Mary's Place
Dublin 7, D07 P4AX, Ireland




LifeScience PLUS, Inc.
2520A Wyandolfe St., Mountain View, CA 94043, USA
P.O. Box 60783, Palo Alto, CA 94306, USA
Toll Free: 1-877-587-5433 - USA
Tel: +1-650-565-8172 - International
www.LifeSciencePlus.com
Manufactured in the USA



LifeScience PLUS
REVOLUTIONARY WOUND CARE

Rev. 2019-05

Средство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, размер 5 см х 35 см, внутренний пакет индивидуальной упаковки, передняя поверхность



средство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, размер 5 см x 5 см, внутренний пакет индивидуальной упаковки, задняя поверхность

Tear Open Here

STERILE: Sterility guaranteed unless package is opened or damaged.


WARNING: In case of swelling or redness, discontinue use.

COMPLETE INSTRUCTIONS ENCLOSED.


DIRECTIONS: Use dry instruments to apply. Cover cleaned wound with BloodSTOP® iX. Apply pressure and additional layers of BloodSTOP® iX depending on the degree of hemorrhage. Moisten with sterile saline if necessary for adherence to the wound surface.

STORAGE: For maximum shelf life, storage temperature of 15-30 °C (59-86 °F) is recommended.

Rx Only



WellKong, Ltd.
The Black Church, St. Mary's Place
Dublin 7, D07 P4AX, Ireland




LifeScience PLUS, Inc.
2520A Wyandotte St., Mountain View, CA 94043, USA
P.O. Box 60783, Palo Alto, CA 94306, USA
Toll Free: 1-877-587-5433 - USA
Tel: +1-650-565-8172 - International
www.LifeSciencePlus.com
Manufactured in the USA




LifeScience PLUS
REVOLUTIONARY WOUND CARE

Rev. 2019-05

средство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, размер 5 см х 3,5 см, наружный пакет индивидуальной упаковки, передняя поверхность



...ство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, размер 5 см х .
...см, наружный пакет индивидуальной упаковки, задняя поверхность



...ство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, размер 7,5 см
...см, внутренний пакет индивидуальной упаковки, передняя поверхность

BloodSTOP® iX
CONTROLS BLEEDING FAST

TRAUMA MATRIX
Hemostatic Dressing
Power to Control Bleeding
For Traumatic Wounds

Trauma Matrix absorbs blood
and turns into an adhesive
gel to seal the wound
Made of 100% purified, water
soluble natural nanocellulose

One (1) Sterile Z-folded

WHEN
EVERY
SECOND
COUNTS

BloodSTOP® iX is a registered trademark
of LifeSciencePLUS, Inc.
Patents: US 7,262,181 PCT/CN01/00681, WO02/087643

LifeScience PLUS
ADVANCED WOUND CARE
©2018 LifeScience PLUS, Inc.
All Rights Reserved

...ство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, размер 7,5 см
...см, внутренний пакет индивидуальной упаковки, задняя поверхность

BloodSTOP[®] iX

CONTROL BLEEDING FAST

Trauma Matrix

Instructions:



1. Pack Trauma Matrix into wound with direct pressure using dry or gloved hand. (More than one Trauma Matrix may be required.)



2. Cover and apply direct pressure on wound for about 2-3 minutes, until bleeding has stopped.



3. Wrap to maintain pressure. Evacuate patient to definitive care. Keep product package with patient.



4. To remove, wet Trauma Matrix with saline and irrigate. Peel gently without disturbing clot(s).

REF BM-IX-24 **SIZE** 3" x 24" (7.5cm x 60cm)

LOT 622-24 **EXP** 2027-06-01

WARNINGS:

- Seek medical attention as soon as possible, within 24 hours.
- Any contaminated and/or penetrating wound requires medical evaluation.
- As the sticky gel may adhere to fingers during application, be careful when removing hand, rolling fingers.
- Do not pull off dry BloodSTOP[®] iX from wound without generous moistening to avoid re-bleeding.
- Potential risk for embolism if used near areas of exposed large vasculature. Avoid use in this area.
- For use by trained emergency responders.
- For maximum shelf life, storage temperature of 15-30 °C (59-86 °F) is recommended.
- Do not reuse, as device will no longer be sterile after initial use. Use of non-sterile device could result in infection.
- External use only.
- Seek medical attention in case of tingling, loss of sensation, swelling or redness.
- Remove within 24 hours.

For external temporary control of minor to moderate bleeding of traumatic wounds

Manufactured by:
EliLincence PLLC, Inc.
Mailing Address: P.O. Box 80723, Palo Alto, CA 94308
www.eliLincence.com
Email: info@eliLincence.com
Manufactured in the USA from imported materials
Toll Free: 1-877-587-5433 - U.S.A.
1-650-966-8172 - International




8 507440 013901

Rev 2018-06

- Do Not Heat
- No Irrigation
- Do Not Pinch
- Do Not Traction
- Do Not Dry
- Do Not Reuse
- Do Not Sterilize

Do Not Use If:
- Damaged or Expired
- Contaminated

средство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, размер 7,5 см
60 см, наружный пакет индивидуальной упаковки, передняя поверхность



средство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, размер 7,5 см
60 см, наружный пакет индивидуальной упаковки, задняя поверхность



A 907440 012801


ITEM: BM-IX-24

LOT: 622-24

EXP: 2027-06-01

SIZE: 3" x 24" (7.5cm x 60cm)

средство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, размер 30 см х 10 см, внутренний пакет индивидуальной упаковки, передняя поверхность



средство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, размер 30 см x 30 см, внутренний пакет индивидуальной упаковки, задняя поверхность



Средство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, размер 30 см x 30 см, наружный пакет индивидуальной упаковки, передняя поверхность



...ство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, размер 30 см х 30 см, наружный пакет индивидуальной упаковки, задняя поверхность



(01)00850744001586
(17)280501
(10)521-25

ITEM#: BM-IX-25
LOT#: 521-25
EXP: 2026-05-01

SIZE: 12" x 12" (30cm x 30cm)

средство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, отдельная упаковка, на примере варианта исполнения повязки 5 см x 10 см, передняя поверхность

BloodSTOP® iX

CONTROLS BLEEDING FAST

**Advanced
Hemostat**

WoundHEAL

- Acts fast and reduces blood loss
- Transforms to a sticky gel to seal the wound
- Creates moist environment to promote healing
- Water soluble, easily removed with sterile saline
- Leaves no residue behind

STERILE R

...ство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, отдельная
...робка, на примере варианта исполнения повязки 5 см x 10 см, задняя поверхность

BloodSTOP®

ix


CONTROLS BLEEDING FAST

- Translucent gel, easy to monitor wound
- 100% natural, biocompatible, non-irritating

Ingredients:

100% purified, water soluble, etherified natural sodium carboxymethyl cellulose.

Rx Only



WellKang, Ltd.
Enterprise Hub, NW Business Complex,
1 Beraghmore Rd. Derry, BT48 8SE,
Northern Ireland, UK



CE 2460



Not made with natural rubber latex



LifeScience PLUS, Inc.
2520A Wyandotte St., Mountain View, CA 94043, U.S.A.
Mailing: P.O. Box 60783, Palo Alto, CA 94306, U.S.A.
Toll Free: 1-877-587-5433 - U.S.A.
Tel: +1-650-565-8172 - International
www.lifescienceplus.com
Manufactured in the USA

LifeScience PLUS
REVOLUTIONARY WOUND CARE

...ство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, отдельная
...обка, на примере варианта исполнения повязки 5 см x 10 см, правая боковая поверхность

BloodSTOP®
CONTROLS BLEEDING FAST



©2021 LifeScience Plus Inc.
All Rights Reserved



средство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, отдельная
коробка, на примере варианта исполнения повязки 5 см x 10 см, левая боковая поверхность

DIRECTIONS: Use dry instruments to apply. Cover cleaned wound with BloodSTOP® iX. Apply pressure and use additional layers depending on the degree of hemorrhage. Moisten with sterile saline if necessary for adherence to the wound surface. Combine with standard non-adherent wound dressing for further protection if desired. To remove, wash away with sterile water or sterile saline solution, wipe gently if necessary.

WARNINGS: In case of swelling or redness, discontinue use. Remove within 24 hours. Do not reuse, as device will no longer be sterile after initial use, and could result in infection.

STERILE: Sterility guaranteed unless individual wrapper is opened or damaged.

STORAGE: For maximum shelf life, storage temperature of 15-30 °C (59-86 °F) is recommended.

COMPLETE INSTRUCTIONS ENCLOSED.

Rev. 2021-12

средство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, отдельная
упаковка, на примере варианта исполнения повязки 5 см x 10 см, верхняя поверхность

BloodSTOP®

CONTROLS BLEEDING FAST



средство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, отдельная
упаковка, на примере варианта исполнения повязки 5 см x 10 см, нижняя поверхность

REF

BS-IX-15

QTY

12

LOT

622-15


EXP

2027-06-01

SIZE

2" x 4" (5cm x 10cm)

...ство гемостатическое, ранозаживляющее рассасывающееся BloodSTOP iX, отдельная
...бка, на примере варианта исполнения повязки 5 см x 10 см, общий вид



ПРОШЕТО И
ПРОНУМЕРАВАНО

