



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ПнБио Фарм»


М.Д. Шарма

« 08 » апреля 2024 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**«Имплантат внутридермальный «ESTIART®» в вариантах исполнения: ESTIART®, ESTIART®
Medium, ESTIART® Kiss Volume, ESTIART® Kiss Contour, ESTIART® Deep, в составе»**



1. Имплантат внутридермальный «ESTIART®» вариант исполнения: ESTIART® (во вторичной упаковке)

MBI MAXIGEN BIOTECH INC.

MAXIGEN BIOTECH INC.

No.88, Keji 1st Rd., Gushan District, Taoyuan City 32383, Taiwan

УП в РФ: ООО "ПанБио Фарм", 143960, Московская область, г. Реутов, г. Реутов, ул. Фабричная, д. 8А, стр. 2, помещ. 14
Тел: 8 (495) 935-76-65, e-mail: info@panbio.ru



ESTIART®

Dermal implant.

Contains:

- gel implantable in a 2 ml syringe;
- one 27G x 13 mm and one 30G x 13 mm sterile needles;
- three traceability labels;
- instructions for use.

Consisting of:

Cross-linked sodium hyaluronate 20 mg/ml

Phosphate buffered saline in sufficient quantity

pH 6.8-7.5

Имплантат внутридермальный «ESTIART®»

Вариант исполнения. ESTIART®, в составе.

1. Шприц с гелевым имплантатом

(20 мг/мл гиалуроновой кислоты), объем – 2,0 мл – 1 шт.

2. Иглы инъекционные одноразовые стерильные 27G и 30G, производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия – 2 шт.

3. Комплект наклеек – 3 шт.

4. Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение №

Условия хранения:

Хранить при температуре от +2 С до +25 С


Беречь от прямого солнечного излучения, заморозки и ударов

Дата производства, срок годности и серия указаны на упаковке



Место для штрих-кода

I. Имплантат внутридермальный «ESTIART®» вариант исполнения: ESTIART® (маркировка вторичной упаковки)



1. Имплантат внутридермальный «ESTIART®» вариант исполнения: ESTIART® (в первичной упаковке)

Aseptic filling
Non-pyrogenic

REF

LOT



Contents

2 mL

Имплантат внутридермальный

ESTIART[®]

Натрия гиалуронат 2 %

2 mL

MBI MAXIGEN BIOTECH INC.

MAXIGEN BIOTECH INC.

No.88, Keji 1st Rd., Guishan District, Taoyuan City 33383, Taiwan


УП в РФ: ООО "ПанБио Фарм", 143960, Московская область, г.о. Реутов, г. Реутов,
ул. Фабричная, д. 8А, стр. 2, помещ. 14

Тел: 8 (495) 935-76-65, e-mail: info@panbio.ru

OPEN



I. Имплантат внутридермальный «ESTIART[®]» вариант исполнения: ESTIART[®] (маркировка первичной упаковки)



1. Шприц с гелевым имплантатом (20 мг/мл гиалуроновой кислоты), объем – 1,0/1,5/2,0 мл – 1 шт. (на примере объема 2,0 мл)



2.1 Иглы инъекционные одноразовые стерильные **27G** и 30G, производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия – 2 шт.



2.2 Иглы инъекционные одноразовые стерильные 27G и **30G**, производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия – 2 шт.

ESTIART®

Имплантат внутридермальный



2 mL

MBI MAXIGEN BIOTECH INC.



MAXIGEN BIOTECH INC.

No.88, Keji 1st Rd., Guishan District, Taoyuan City 33383 , Taiwan

УП в РФ: ООО "ПанБио Фарм", 143960, Московская область, г.о. Реутов, г. Реутов,
ул. Фабричная, д. 8А, стр. 2, помещ. 14

Тел: 8 (495) 935-76-65, e-mail: info@panbio.ru

3. Комплект наклеек – 3 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


Dermal Implant

ESTIART®




ESTIART®

Stabilized Hyaluronic Acid



II. Имплантат внутридермальный «ESTIART®» вариант исполнения: ESTIART® Medium (во вторичной упаковке)

MBI MAXIGEN BIOTECH INC.



MAXIGEN BIOTECH INC.
No.00, Keji 1st Rd., Guishan District, Taoyuan City 33303, Taiwan

УП в РФ: ООО "Панбио фарм", 143960, Московская область, г.о. Реутов, г. Реутов, ул. Фабричная, д. 8А, стр. 2, помещ. 1/4.
Тел: 8 (495) 935-76-65, e-mail: info@panbio.ru



ESTIART® Medium

Dermal implant.

Contains:

- gel implantable in a 2 ml syringe;
- two 27G x 13 mm sterile needles;
- three traceability labels;
- instructions for use.

Consisting of:

Cross-linked sodium hyaluronate 20 mg/ml

Phosphate buffered saline in sufficient quantity

pH 6.8-7.5

Имплантат внутридермальный «ESTIART®»

Вариант исполнения: ESTIART® Medium, в составе:

1. Шприц с гелевым имплантатом (20 мг/мл гиалуроновой кислоты), объемом – 2,0 мл – 1 шт.
2. Иглы инъекционные одноразовые стерильные 27G, производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия – 2 шт.
3. Комплект наклеек – 3 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение №

Условия хранения:

Хранить при температуре от +2 С до +25 С


Беречь от прямого солнечного излучения, заморзания и ударов.

Дата производства, срок годности и серия указаны на упаковке.



Место для штрих-кода

II. Имплантат внутридермальный «ESTIART®» вариант исполнения: ESTIART® Medium (маркировка вторичной упаковки)



II. Имплантат внутридермальный «ESTIART®» вариант исполнения: ESTIART® Medium (в первичной упаковке)

Aseptic filling
Non-pyrogenic

REF

LOT



Contents

2 mL

Имплантат внутридермальный

ESTIART[®]
Medium

Натрия гиалуронат 2 %
2 mL

MBI MAXIGEN BIOTECH INC.




MAXIGEN BIOTECH INC.

No.88, Keji 1st Rd., Guishan District, Taoyuan City 33383, Taiwan


УП в РФ: ООО "ПанБио Фарм", 143960, Московская область, г.о. Реутов, г. Реутов,
ул. Фабричная, д. 8А, стр. 2, помещ. 14

Тел: 8 (495) 935-76-65, e-mail: info@panbio.ru

OPEN



II. Имплантат внутридермальный «ESTIART[®]» вариант исполнения: ESTIART[®] Medium (маркировка первичной упаковки)



1. Шприц с гелевым имплантатом (20 мг/мл гиалуроновой кислоты), объем – 1,0/1,5/2,0 мл – 1 шт. (на примере объема 2,0 мл)



2. Иглы инъекционные одноразовые стерильные 27G, производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.»,
Бельгия – 2 шт.

ESTIART®

Medium

Имплантат внутридермальный

REF

LOT



Contents

2 mL

MBi MAXIGEN BIOTECH INC.



MAXIGEN BIOTECH INC.

No.88, Keji 1st Rd., Guishan District, Taoyuan City 33383 , Taiwan

УП в РФ: ООО "ПанБио Фарм", 143960, Московская область, г.о. Реутов, г. Реутов,
ул. Фабричная, д. 8А, стр. 2, помещ. 14

Тел: 8 (495) 935-76-65, e-mail: info@panbio.ru

3. Комплект наклеек – 3 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Dermal Implant

ESTIART® Medium



ESTIART®

Stabilized Hyaluronic Acid



III. Имплантат внутридермальный «ESTIART®» вариант исполнения: ESTIART® Kiss Volume (во вторичной упаковке)

MBI MAXIGEN BIOTECH INC.

MAXIGEN BIOTECH INC.

No.88, Keji 1st Rd., Guishan District, Taoyuan City 33383, Taiwan

УП в РФ: ООО "ПанБио Фарм", 143960, Московская область, г.о. Реутов, г. Реутов, ул. Фабричная, д. 8А, стр. 2, помещ. 14.
Тел: 8 (495) 935-76-65, e-mail: info@panbio.ru



ESTIART® Kiss Volume

Dermal implant.

Contains:

- gel implantable in a 1 ml syringe;
- one 27G x 13 mm and one 30G x 13 mm sterile needles
- three traceability labels;
- instructions for use.

Consisting of:

Cross-linked sodium hyaluronate 20 mg/ml
phosphate buffered saline in sufficient quantity
pH 6.8–7.5

Имплантат внутридермальный «ESTIART®»

Вариант исполнения: ESTIART® Kiss Volume, в составе:

1. Шприц с гелевым имплантатом (20 мг/мл гиалуроновой кислоты), объемом – 1,0 мл – 1 шт.
2. Иглы инъекционные одноразовые стерильные 27G и 30G, производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия – 2 шт.
3. Комплект наклеек – 3 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение №

Условия хранения:

Хранить при температуре от +2 С до +25 С


Беречь от прямого солнечного излучения, заморозания и деформации

Дата производства, срок годности и серия указаны на упаковке.



Место для штрих-кода

III. Имплантат внутридермальный «ESTIART®» вариант исполнения: ESTIART® Kiss Volume (маркировка вторичной упаковки)



III. Имплантат внутридермальный «ESTIART®» вариант исполнения: ESTIART® Kiss Volume (в первичной упаковке)

Aseptic filling
Non-pyrogenic

REF

LOT



Contents

1 mL

Имплантат внутридермальный

ESTIART

Kiss Volume

Натрия гиалуронат 2 %

1 mL

MBI MAXIGEN BIOTECH INC.

MAXIGEN BIOTECH INC.

No.88, Keji 1st Rd., Guishan District, Taoyuan City 33383, Taiwan


УП в РФ: ООО "ПанБио Фарм", 143960, Московская область, г.о. Реутов, г. Реутов,
ул. Фабричная, д. 8А, стр. 2, помещ. 14

Тел: 8 (495) 935-76-65, e-mail: info@panbio.ru


▲ OPEN



III. Имплантат внутридермальный «ESTIART®» вариант исполнения: ESTIART® Kiss Volume (маркировка первичной упаковки)



1. Шприц с гелевым имплантатом (20 мг/мл гиалуроновой кислоты), объем – 1,0 мл – 1 шт.



2.1 Иглы инъекционные одноразовые стерильные **27G** и 30G, производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия – 2 шт.



2.2 Иглы инъекционные одноразовые стерильные 27G и **30G**, производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия – 2 шт.

ESTIART®

Kiss Volume

Имплантат внутридермальный

REF

LOT



Contents

1 mL

MBI MAXIGEN BIOTECH INC.



MAXIGEN BIOTECH INC.

No.88, Keji 1st Rd., Guishan District, Taoyuan City 33383, Taiwan

УП в РФ: ООО "ПанБио Фарм", 143960, Московская область, г.о. Реутов, г. Реутов,
ул. Фабричная, д. 8А, стр. 2, помещ. 14

Тел: 8 (495) 935-76-65, e-mail: info@panbio.ru

3. Комплект наклеек – 3 шт.

4. Инструкция по применению – 1 шт.




IV. Имплантат внутридермальный «ESTIART[®]» вариант исполнения: ESTIART[®] Contour (во вторичной упаковке)

MAXIGEN BIOTECH INC.
No. 88, Keiji 1st Rd., Guishan

No. 88, Keji 1st Rd., Guishan District, Taoyuan City 33383, Taiwan

УП в РФ: ООО "ПанБио Фарм", 143360, Московская область, г.о. Реутов, г. Реутов, ул. Фабричная, д. 8А, стр. 2, помещ. 14
Тел: 8 (495) 935-76-65, e-mail: info@ranbio.ru



ESTIART® Kiss Contour

Dermal implant.

Contains:

- gel implantable in a 1 ml syringe;
- one 27G x 13 mm sterile needles;
- three traceability labels;
- instructions for use.

Consisting of:

Cross-linked sodium hyaluronate 20 mg/ml

Phosphate buffered saline in sufficient quantity

PH 6.8-7.5

Имплантат внутритридермальный «ESTIART»[®]

Вариант исполнения: ESTIART Kiss Contour, в составе:

1. Шприц с гелевым имплантатом (20 мг/мл гиалуроновой кислоты), объем — 1,0 мл — 1 шт.
2. Иглы инъекционные одноразовые стерильные 27G, производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия — 2 шт.
3. Комплект наклеек — 3 шт.
4. Инструкция по применению — 1 шт.

Регистрационное удостоверение №

Условия хранения:

Хранить при температуре от +2 С до +25 С


Бережь от прямого солнечного излучения, замерзания

Дата производства, срок годности и серия указаны на упаковке



Место для штрих-кода

IV. Имплантат внутридермальный «ESTIART®» вариант исполнения: ESTIART® Kiss Contour (маркировка вторичной упаковки)



IV. Имплантат внутридермальный «ESTIART®» вариант исполнения: ESTIART® Kiss Contour (в первичной упаковке)

Aseptic filling
Non-pyrogenic

REF

LOT



Contents

1 mL

Имплантат внутридермальный

ESTIART

Kiss Contour

Натрия гиалуронат 2 %

1 mL

MBI MAXIGEN BIOTECH INC.

MAXIGEN BIOTECH INC.

No.88, Keji 1st Rd., Guishan District, Taoyuan City 33383, Taiwan


УП в РФ: ООО "ПанБио Фарм", 143960, Московская область, г.о. Реутов, г. Реутов,
ул. Фабричная, д. 8А, стр. 2, помещ. 14

Тел: 8 (495) 935-76-65, e-mail: info@panbio.ru

▲ OPEN



IV. Имплантат внутридермальный «ESTIART®» вариант исполнения: ESTIART® Kiss Contour (маркировка первичной упаковки)



1. Шприц с гелевым имплантатом (20 мг/мл гиалуроновой кислоты), объем – 1,0 мл – 1 шт.



2. Иглы инъекционные одноразовые стерильные 27G, производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.»,
Бельгия – 2 шт.

ESTIART®

Kiss Contour

Имплантат внутридермальный

REF

LOT



Contents

1 mL

MBI MAXIGEN BIOTECH INC.



MAXIGEN BIOTECH INC.

No.88, Keji 1st Rd., Guishan District, Taoyuan City 33383, Taiwan

УП в РФ: ООО "ПанБио Фарм", 143960, Московская область, г.о. Реутов, г. Реутов,
ул. Фабричная, д. 8А, стр. 2, помещ. 14

Тел: 8 (495) 935-76-65, e-mail: info@panbio.ru

3. Комплект наклеек – 3 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Dermal Implant

ESTIART® Kiss Contour



ESTIART®
Stabilized Hyaluronic Acid



Dermal Implant

2 mL

ESTIART®
Deep
Stabilized Hyaluronic Acid

V. Имплантат внутридермальный «ESTIART®» вариант исполнения: ESTIART® Deep (во вторичной упаковке)

MBI MAXIGEN BIOTECH INC.

MAXIGEN BIOTECH INC.
No.88, Keji 1st Rd., Guishan District, Taoyuan City 33383, Taiwan

УП в РФ: ООО «ПанБио Фарм», 143960, Московская область, г. Реутов, г. Реутов, ул. Фабричная, д. 8А, стр. 2, помещ. 14
Тел: 8 (495) 935-76-65, e-mail: info@panbio.ru



ESTIART® Deep

Dermal implant.

Contains:

- gel implantable in a 1 ml syringe;
- three traceability labels;
- instructions for use.

Consisting of:

Cross-linked sodium hyaluronate 20 mg/ml
Phosphate buffered saline in sufficient quantity
pH 6.8–7.5

Имплантат внутридермальный «ESTIART®»

Вариант исполнения: ESTIART® Deep, в составе:

1. Шприц с гелевым имплантатом (20 мг/мл гиалуроновой кислоты), объем – 1,0 мл – 1 шт.
2. Комплект наклеек – 3 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение №

Условия хранения:


Хранить при температуре от +2 С до +25 С

Беречь от прямого солнечного излучения, заморзания и ударов.

Дата производства, срок годности и серия указаны на упаковке.



Место для штрих-кода



V. Имплантат внутридермальный «ESTIART®» вариант исполнения: ESTIART® Deer (в первичной упаковке)

Aseptic filling
Non-pyrogenic

REF

LOT



Contents

2 mL

Имплантат внутридермальный

ESTIART®

Deep

Натрия гиалуронат 2 %
2 mL

MBI MAXIGEN BIOTECH INC.

MAXIGEN BIOTECH INC.

No.88, Keji 1st Rd., Guishan District, Taoyuan City 33383, Taiwan

УП в РФ: ООО "ПанБио Фарм", 143960, Московская область, г.о. Реутов, г. Реутов,
ул. Фабричная, д. 8А, стр. 2, помещ. 14

Тел: 8 (495) 935-76-65, e-mail: info@panbio.ru

▲ OPEN



V. Имплантат внутридермальный «ESTIART®» вариант исполнения: ESTIART® Deep (маркировка первичной упаковки)



1. Шприц с гелевым имплантатом (20 мг/мл гиалуроновой кислоты), объем – 1,0/1,5/2,0 мл – 1 шт.

ESTIART®

Deer

Имплантат внутридермальный



2 mL

MBi MAXIGEN BIOTECH INC.



MAXIGEN BIOTECH INC.

No.88, Keji 1st Rd., Guishan District, Taoyuan City 33383 , Taiwan

УП в РФ: ООО "ПанБио Фарм", 143960, Московская область, г.о. Реутов, г. Реутов,
ул. Фабричная, д. 8А, стр. 2, помещ. 14

Тел: 8 (495) 935-76-65, e-mail: info@panbio.ru

2. Комплект наклеек – 3 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Dermal Implant

ESTIART[®] Deep



ESTIART[®]

Stabilized Hyaluronic Acid



Транспортная упаковка изделия

**Имплантат внутридермальный «ESTIART®» в варианте исполнения:
ESTIART®, в составе**

Объем 1.0 мл

Кол-во: 100 шт.

масса брутто: XX кг

масса нетто: XX кг




Дата изготовления: XX.202_




Использовать до: XX.202_

LOT **REF**


XXXXXXX



Хранение



Транспортировка



Хранение и транспортировка



Производитель: Maxigen Biotech Inc. (Максиген Биотех Инк.), Тайвань
88, Keji 1st Rd., Guishan District, Taiyuan City 33383, Taiwan

Уполномоченный представитель в России: ООО «Панбио Фарм»

143960, Московская область, г.о. Реутов, г. Реутов, ул. Фабричная, д. 8А, стр. 2, помещ.
14

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

ШТРИХКОД

Образец транспортной маркировки на варианте исполнения ESTIART®

Прошито и пронумеровано, и
скреплено печатью 44 листа(ов).

Должность
Генеральный директор,
ФИО Шарма Мукеш Деодутт
(подпись)

« 08 » апрель 20 24 года

