




ОКП 93 9800

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный Директор

ООО «Бекмен Культер»

Ян Поспишил.



Инструкция по эксплуатации

Реагенты *in vitro* диагностические и расходные материалы для
анализаторов серии AU

Соответствуют требованиям национальных и международных стандартов
ГОСТ Р 51088-97

2009

Общество с ограниченной ответственностью «Бекмен Культер»

123056, Москва, ул. Ю. Фучика, д. 6, стр. 2

тел.: (495) 937-16-64, 937-16-63, факс: (495) 254-64-07

E-mail: beckman.ru@beckmancoulter.com

www.beckmancoulter.com

www.beckmancoulter.ru



Амфетамины/Экстази (Amphetamines/Ecstasy)

QSR6323

2 x 16 мл
2 x
2 x 16 мл
2 x

R1 Буфер
R1 Лино
R2 Буфер
R2 Лино

Назначение

Качественное и полуколичественное ферментативное иммунохимическое определение Амфетаминов и Экстази в моче человека на анализаторах Beckman Coulter серии АЦ. Только для диагностики ЛД ВИЧ.

Данный метод позволяет получать только предварительные результаты теста. Для подтверждения полученных результатов следует использовать более специфичный и/или чувствительный лабораторный метод. В качестве подтверждающего метода предпочтительнее использовать метод газовой хромато-масс-спектрометрии (GC/MS). Полученный предварительный результат теста является ориентиром, полученный предварительным методом, следует рассуждать в совокупности с другими клиническими и данными из медицинского обследования).

Клиническое значение

Амфетамины и их производные, включая Экстази, относятся к классу стимуляторов ЦНС^{1,4}. Экстази, 3,4-метилendioксиметамфетамин (MDMA), 3,4-метилendioксизамфетамин (MDA) - метилendioксид аналог амфетамина и различных типичных замещающих групп в моче - наиболее распространенные наркотики на рынках Европы^{1,4}. Амфетамины вызывают физическую и психологическую зависимость. Соединения группы Амфетаминов повышают физическую активность, устраняют усталость, вызывают оцидные эффекты, возбуждения, снижают аппетит^{1,4}. В неслучайных случаях - вызывают сердцебиение, раздражительность, бессонницу, снижают остроту зрения, повышается давление^{1,4}. В случаях длительного применения высокие дозы амфетаминов могут развиваться побочные нарушения, связанные со симптомами с присутствием микродоноров^{1,4}.

Амфетамины быстро всасываются желудочно-кишечным трактом и обнаруживаются во всем теле^{1,4}. Около 70% дозы выводится в моче в течение 24 часов после приема. В зависимости от pH мочи около 30% амфетаминов выводится в неизмененном виде, остальная часть в виде метаболитов. Около 62% метамфетаминов выводится в моче в течение 24 часов после приема, 43% в неизмененном виде, остальная часть - в виде метаболитов, в том числе амфетамина^{1,4,17}. Амфетамины обнаруживаются в моче в течение 3-4 дней после приема¹.

Принцип определения

Данный метод основан на использовании биокристаллического фермента (β-галактозидазы, полученного методом геной инженерии в виде двух неактивных фрагментов. После реакции с антигеном, образуя активный фермент, который в этом конкретном методе, расщепляет субстрат, изменяя силу световой реакции, что регистрируется фотометрически.

В данном методе, наркотики в пробе взаимодействуют на месте связывания на антигенах с одним из неактивных фрагментов (β-галактозидазы). При наличии наркотика в пробе, он связывается с антигеном. Оставшиеся неактивные фрагменты образуют активный фермент. Если наркотик отсутствует в пробе, он не связывается с неактивным фрагментом, иными словами, образуют неактивные фрагменты и образование активного фермента. Количество активного фермента и, следовательно, изменение абсорбции пропорционально количеству наркотика в пробе.

Состав реагента

R1 Буфер (R1 Буфер)

Пиперазин-N,N-бис (2-этансульфонил) буфер, 4,5 мл; мыльные моющие средства; антиген; активный; 3,4-метилendioксизамфетамин (MDA), 3,4-метилendioксизамфетамин (MDA), 3,4-метилendioксизамфетамин (MDA), солевой буфер, стабилизатор, консервант.

R1 Лино (R1 Лино)

0.166 г/л ферментальный ингибитор, 7.081 мл; мыльные моющие средства; активный; 3,4-метилendioксизамфетамин, 7.081 мл; активный; 3,4-метилendioксизамфетамин, солевой буфер, детергент и консервант.

R2 Буфер (R2 Буфер)

R2 Лино (R2 Лино)

Пиперазин-N,N-бис (2-этансульфонил) буфер, 7.12 мл; донор фермента конъюгированного с д-амфетамином, 11.3 мл; донор фермента конъюгированного с д-метамфетамином, 8.0 мл; донор фермента конъюгированного с MDMA, 1.87 мл; хлороформ красный; 4-О-септагидроксиантин, солевой буфер, детергент и консервант.

Общие предостережения

Предупреждает об опасности и сообщении о риске. Брэкен. Содержит информацию R22. Брэкен при попадании внутрь.

Меры безопасности:

R22, R50. Избегайте контакта с кожей. Разлиты и пары из-за них необходимо утилизировать как опасные отходы.

Упомянутые опасные вещества соответствуют требованиям санитарно-гигиенического и экологического контроля. Во избежание возможного отклонения лабораторных результатов после смены нормального реагента проведите калибровочный тест на контроль. Дополнительная информация приведена в Паспорте безопасности.

(Detailed description of equipment and materials used in the study, including the specific models and manufacturers of the equipment, and the specific materials used in the study.)

Содержание

Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость
1. Услуги по разработке и изготовлению	шт.	100	1000000
2. Услуги по монтажу и наладке	шт.	100	1000000
3. Услуги по эксплуатации и ремонту	шт.	100	1000000
4. Услуги по обучению персонала	шт.	100	1000000
5. Услуги по транспортировке	шт.	100	1000000
6. Услуги по хранению	шт.	100	1000000
7. Услуги по утилизации	шт.	100	1000000
8. Услуги по обслуживанию	шт.	100	1000000
9. Услуги по ремонту	шт.	100	1000000
10. Услуги по модернизации	шт.	100	1000000

Содержание

Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость
1. Услуги по разработке и изготовлению	шт.	100	1000000
2. Услуги по монтажу и наладке	шт.	100	1000000
3. Услуги по эксплуатации и ремонту	шт.	100	1000000
4. Услуги по обучению персонала	шт.	100	1000000
5. Услуги по транспортировке	шт.	100	1000000
6. Услуги по хранению	шт.	100	1000000
7. Услуги по утилизации	шт.	100	1000000
8. Услуги по обслуживанию	шт.	100	1000000
9. Услуги по ремонту	шт.	100	1000000
10. Услуги по модернизации	шт.	100	1000000

Содержание

Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость
1. Услуги по разработке и изготовлению	шт.	100	1000000
2. Услуги по монтажу и наладке	шт.	100	1000000
3. Услуги по эксплуатации и ремонту	шт.	100	1000000
4. Услуги по обучению персонала	шт.	100	1000000
5. Услуги по транспортировке	шт.	100	1000000
6. Услуги по хранению	шт.	100	1000000
7. Услуги по утилизации	шт.	100	1000000
8. Услуги по обслуживанию	шт.	100	1000000
9. Услуги по ремонту	шт.	100	1000000
10. Услуги по модернизации	шт.	100	1000000

Содержание

1. Услуги по разработке и изготовлению

2. Услуги по монтажу и наладке

3. Услуги по эксплуатации и ремонту

4. Услуги по обучению персонала

5. Услуги по транспортировке

6. Услуги по хранению

7. Услуги по утилизации

8. Услуги по обслуживанию

9. Услуги по ремонту

10. Услуги по модернизации

Содержание

1. Услуги по разработке и изготовлению
2. Услуги по монтажу и наладке
3. Услуги по эксплуатации и ремонту
4. Услуги по обучению персонала
5. Услуги по транспортировке
6. Услуги по хранению
7. Услуги по утилизации
8. Услуги по обслуживанию
9. Услуги по ремонту
10. Услуги по модернизации

CE

искусственно образованной пленки. Отсоедините фланец R2 Луя и адаптер от фланца R2 Вилли и установите их. Закройте фланец R2 Вилли крышкой и оставьте при комнатной температуре (16...20°C) на 5 минут. Вновь переключите. Не забудьте поставить на фланце дату протитолнения раствора. Установите фланец в отсек для реагентов в анализаторе или поставьте в холодильник (2...8°C), дайте ему остыть, не менее 30 минут. Перед использованием проверьте, что раствор однородный.

Р1 (Расточка измеренная фланцем).

Соедините фланец R1 Луя соедините с фланцем R1 Вилли и адаптер от фланца R1 Вилли и установите их. Закройте фланец R1 Вилли крышкой и оставьте при комнатной температуре (16...20°C) на 5 минут. Вновь переключите. Не забудьте поставить на фланце дату протитолнения раствора. Установите фланец в отсек для реагентов в анализаторе или поставьте в холодильник (2...8°C), дайте ему остыть, не менее 30 минут. Перед использованием проверьте, что раствор однородный.

ЗАМЕЧАНИЕ 1: Все компоненты предназначены для использования в составе этого набора. Не смешивайте реагенты разных партий (lot).

ЗАМЕЧАНИЕ 2: Избегайте переоборудования оборудования реактивов, который фланцы только соответствующими крышками. Рабочий реактор R2 (диск фланца) должен быть белого-оранжевого цвета. Темно-оранжевый или фиолетово-оранжевый цвет указывает на загрязнение реактива. Такой реактив использовать нельзя.

ЗАМЕЧАНИЕ 3: Перед измерением температур реакторов R1 и R2 должен быть равной температуре равновесного остия.

ЗАМЕЧАНИЕ 4: Для обеспечения стабильности протитолненного раствора R2, закройте его от продолжительного, постоянного воздействия яркого света.

ЗАМЕЧАНИЕ 5: Не замораживайте протитолненные реактивы.

Контроль в стабильности

Несколько реактивов стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре не выше 8°C. После вскрытия реактивы стабильны 60 дней при хранении на борту анализатора.

Использование материалов

Материал следует собирать в емкость специально для пластикового мусора.

Перед измерением кутюрю Матри следует стандартизировать.

Работать с Матри следует как с потенциально инфицированными материалами.

При подозрении на биологическую пробу для исследования следует брать другую пробу.

Проба может храниться при 15...20°C максимум 7 дней, после чего ее следует хранить при 2...8°C. Следует использовать стандартные рекомендации при обеспечении условий.

Процедура анализа

См. Руководство пользователя и соответствующую инструкцию по конкретным исследованиям. В программных листах есть процедуры для количественного и качественного анализа определения.

Калибровка

Калибровка реактивов

Для количественного измерения используйте один из двух стандартных Cal-off калибраторов:

Название калибратора	Mat. №	11-мерный TUV-код на этикетке
DAU THC 25 Cal-off	ODC6322	0
DAU THC 50 Cal-off	ODC6323	50

Получение качественной калибровки

Для количественного измерения используйте стандартные Cal-off калибраторы:

Название калибратора	Mat. №	11-мерный TUV-код на этикетке
DAU Negative Calibrator	ODC6314	0
DAU THC 25 Calibrator	ODC6322	25
DAU THC 50 Calibrator	ODC6323	50
DAU THC 75 Calibrator	ODC6324	75
DAU THC 100 Calibrator	ODC6325	100

Этикетка калибратора, указанная в прилагаемом паспорте, соответствует до значительного процентного отклонения.

Перекалибровку следует проводить в следующих случаях:

- Замена фланца реактора или предоставление изменений значительной калибровки;
- Проблемы с прецизионностью оборудования анализатора или замены внешнего узла прибора.

Каждый калибратор необходимо регулярно проверять – последовательно выбрать в меню Testline (Обычное исследование) - Calibration Menu (Меню калибровки) - Calibration Check (Проверка калибровки). Сразу же после калибровки появится сообщение о завершении калибровки.

Контроль качества

Любая лаборатория определяет частоту проведения контроля качества анализаторов, однако, минимальная лабораторная частота контроля качества анализа должна быть не менее 1 раза в месяц. При проведении контроля качества анализа следует использовать диапазон допустимых значений. При обнаружении любых отклонений в анализе следует немедленно провести повторный анализ. Если лаборатория определяет частоту проведения контроля качества анализа, то она должна быть не менее 1 раза в месяц. При обнаружении любых отклонений в анализе следует немедленно провести повторный анализ.

Каждый лаборатория должна разработать свои действия на тот случай, если результаты анализа контроля качества будут не соответствовать требованиям.

Контрольный материал

Выбор контроля зависит от проводимого исследования.

Точка отсчета 25 мкл: Контроль DAU THC 25 Control, ODC6322.

Точка отсчета 50 мкл: Контроль DAU THC 50 Control, ODC6323.

Результ

Качественные данные результатов.

Калибраторы DAU THC 25 и THC 50 используются в качестве разбавительного значения между положительным и отрицательным значениями. Если калибратор THC в пробе будет равен или больше значения калибратора, значение будет считаться как положительное.

Если концентрация будет меньше значения калибратора – значение будет считано как негативное. Анализаторы Оптимус автоматически отметят такую пробу с положительным результатом флагом «F», а с негативным – «N».

Полусинтетическая оценка результатов

Относительные значения концентрации бензопиренов можно получать при использовании калибровов, выполненных с калибраторами DAU Negative Calibrator, Оптимус DAU THC 25 Calibrator, Оптимус DAU THC 50 Calibrator, Оптимус DAU THC 75 Calibrator и Оптимус DAU THC 100 Calibrator.

При интерпретации результатов полусинтетического калибрования нужно особенно внимательно рассмотреть другие факторы, влияющие на результаты и, в том числе, например, такие как потребление кислорода и другие биохимические факторы.

Полусинтетический результат следует подтверждать более специфическими методами, основанными на альтернативном измерении продукта. В качестве подтверждающего метода можно использовать не GC/MS технологию, но GC/MS является основным методом, так как является наиболее точной подтверждающей технологией для обеспечения точности позволяет получать наиболее достоверные результаты.¹

Синтетические значения

Результаты могут быть определены относительно точны отклонением, составляющей 60 мкг/л или 25 мкг/л

Вспомогательные характеристики

Данные, приведенные в этом параграфе, относятся при калибровке на анализаторы Biochim Calibrator серии AU. Характеристики процедуры тестов в анализаторе могут отличаться от приведенных ниже.

Воспроизводимость

Следующие результаты получены на анализаторе AU640 с использованием калибраторов DAU THC 25 и DAU THC 50 в контрольной группе, разделенной по значениям, помещенной в интервале $\pm 2\%$ от каждой точки отсчета. Каждую пробу анализировали по 8 раз 2 раза в день в течение 5 дней.

Контрольный анализ ТТК n = 90		Внутренний контроль		Общая погрешность	
конц.	Среднее значение, мкг/мл	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)
10	315	2.8	0.9	8.8	3.1
25	360	4.3	1.1	11.6	3.0
50	485	5.7	1.2	16.9	3.5
75	339	2.7	0.8	8.7	2.6
90	411	4.1	1.0	15.1	3.7
92	523	5.8	1.1	16.6	3.0

Полусинтетический анализ ТТК n = 90		Внутренний контроль		Общая погрешность	
конц.	Среднее значение, мкг/мл	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)
10	26	1.3	4.7	2.2	8.4
25	31	0.7	2.4	2.1	6.9
50	35	0.7	1.9	1.8	5.0
75	30	0.6	1.9	1.7	4.2
90	48	0.5	1.1	1.2	2.5
92	62	0.8	1.2	1.8	2.9

Корреляция

При сравнении данных десятидневного набора расчетов для определения ТТК на анализаторе AU640 с другими измеренными доступными наборами расчетов для определения ТТК, использовались метод пациентов. Пробу с произвольными результатами использовались как подтверждающий референс-метод GC/MS. Результаты анализа следующие:

		Точка отсчета 25 мкг/л Контрольный анализ				Точка отсчета 50 мкг/л Контрольный анализ	
		+				+	
Сравнительный справочный метод	+	50	0	Сравнительный справочный метод	+	24	0
	-	0	98		-	0	98
		-				-	
		Точка отсчета 25 мкг/л Полусинтетический анализ				Точка отсчета 50 мкг/л Полусинтетический анализ	
		+				+	
Сравнительный справочный метод	+	24	0	Сравнительный справочный метод	+	24	0
	-	0	98		-	2*	98
		-				-	

* Эти пробы были неверны методом GC/MS, концентрация 11-по-А-6-THC-COOH составила 21.2 мкг/л и 22.6 мкг/л

Чувствительность

Самое низкое определяемое значение (LLO) соответствует самому низкому измеренному значению THC, отличному от нуля. Низкое предел чувствительности рассчитывается как абсолютное среднее значение плюс три стандартных отклонения при 25-м уровне калибровки негативного калибратора (Negative Calibrator).

Точка отсчета	LLO, мкг/л (анализатор AU640)
25 мкг/л	1.2
50 мкг/л	2.5

Благодарности

Средноточные значения в случае их отклонения в пробу в указанных выше концентрациях, соответствующих их пороговым значениям экспозиции в моче, при проведении анализа с помощью набора реагентов ТНС (ТНУ) являются не фактическими (полученными значениями анализа), от которых можно считать 10%.

Вещество	Концентрация	Вещество	Концентрация
Азот	≤ 10 мг	Гидрофторид	≤ 3 мг
Аммоний-карбонат натрия	≤ 16 мг	Оксиды азота (в сумме)	≤ 96 мг
Метанол	≤ 15 мг	Углекислый газ	≤ 20 мг
Нитрат	≤ 10 мг	Углекислый газ	≤ 75 мг
Нитроген	≤ 180 мг	Хлорид натрия	≤ 80 мг
Хлорид натрия	≤ 10 мг	Моноамин	≤ 80 мг
Фосфат	≤ 30 мг		

Другие вещества или факторы, не указанные в приведенном перечне, могут влиять на тест и быть причиной ложных результатов (например, употребление или использование спирта)

○ 研究の概要

Примечание: специфика исходных соединений и их метаболитов методом OAU-TNC ввиду переноса отпечатали 60 раз для получения надежных данных по паритетной реактивности.

Соединения	Объемная масса, ммоль/ммоль (г/г)	% метаболитов, ммоль/ммоль
11-oxo- Δ^1 -TTC-COOH	50	100
11-oxo- Δ^1 -TTC-COOH	40	126
Δ^1 -TTC	590	10,4
11-OH- Δ^1 -TTC	125	49
9 β -OH- Δ^1 -TTC	1050	2,8
9 β -TTC	5000	3,4
1- Δ^1 -TTC-metabolites	82	78
(Ketoaldehydes)	9500	2,8
	1000	<0,1

Структурно незначимые препараты при использовании набора реагентов DAU-THC в протоколе с точкой отсчитывания 50 мкс и анализированными отрицательными результатами при использовании эквивалентных наборов

Средствотип	Концентрация (мг/мл)
Ацетилсалицилат*	500 000
Ацетилсалицилат/аскорби	500 000
Азотсалицилат	100 000
Амфетамин	500 000
Бензоилсалицилат	500 000
Каптоприл	500 000
Хлорид аспартоил	150 000
Лизинасалицилат	500 000
Валериан	500 000
Дифенил	500 000
Дигидро	100 000
Этилсалицилат	500 000
Флуорид	100 000
Лизинасалицилат	500 000
Нитрофенол	50 000
Метамин	500 000
Метамфетамин	500 000
Метамин	100 000
Нитрофенол	500 000
Фенотилсалицилат	500 000
Фенотилсалицилат	500 000
Пропиленсалицилат	500 000
Реметамин	500 000
Салициловая кислота	500 000
Салицилат	500 000
Толуол	500 000
Нитрофенол	500 000

Метаболизм препарата Sustiva™ (zidovudine) известного как DHP-200 может давать положительный результат.

Содержание

При рассмотрении паренхимной реактивности при использовании реагентов ТНС получены следующие результаты могут не коррелировать с условиями стандартных микотомических культур в пробе

CHECKS PROCEDURES AND INSTRUCTIONS

Определяется пользователем * Значение, установленное в анализаторе по умолчанию

1. Свойства и наименование: 2. Изготовитель, 3. Технические характеристики и основные параметры: 4. Условные обозначения: 5. Размеры: 6. Масса: 7. Цена: 8. Срок службы: 9. Гарантийные обязательства: 10. Условия эксплуатации: 11. Упаковка: 12. Транспортировка: 13. Хранение: 14. Монтаж: 15. Эксплуатация: 16. Ремонт: 17. Замена: 18. Обслуживание: 19. Иные сведения:

References

1. Hawkins, R.L. Analytical methodology. In: Hawkins, R.L., Chiang, C.H., eds. *Urine Testing for Signs of Abuse*. NIDA Research Monograph 1989, 73: 30-41.
2. Julian RM. *A Primer for Drug Action*. 6th ed. New York, NY: WH Freeman & Co, 1982.
3. Chiang, C.H., Barrett, C. Marijuana pharmacokinetics and pharmacodynamics. In: Redda KK, Walker CA, Barrett C, eds. *Cocaine, Marijuana, Crack Cocaine, Chemistry, Pharmacology, and Behavior*. Boca Raton, FL: CRC Press Inc, 1989.



ОПИСАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО
Q8R5320	2 x 16 мн	R1 Бухар
	2 x	R1 Лие
	2 x 16 мн	R2 Бухар
	2 x	R2 Лие

Качественные и количественные средние значения в ряде случаев могут отличаться от фактического индивидуального значения, например, в случае сечения. См. также: АУ. Только для лицензиатов и ИО.

Данный метод позволяет получать только предварительные результаты теста. Для дальнейшего уточнения результатов следует использовать качественный анализ, позволяющий более объективно оценить. В качестве подтверждения данного метода предлагается использовать метод малых критических значений (ГМЗК).¹ Результаты анализа малых критических значений следует сравнивать с результатами, полученными по стандартным методам статистического анализа (в частности, для разн. карт в стандартном критерии критических значений).

[illegible]

Данный аспект исследования можно рассмотреть с точки зрения феминистского дискурса. Как отмечено в исследовании, феминистский дискурс рассматривает гендерные различия как социальные конструкции, а не как биологические факторы. В исследовании рассматривается, как гендерные различия могут быть связаны с различиями в восприятии и обработке информации. Например, женщины могут быть более склонны к эмоциональному восприятию информации, в то время как мужчины могут быть более склонны к логическому восприятию информации. Это может быть связано с различиями в гормональном фоне и в структуре мозга. Однако, как отмечено в исследовании, эти различия не являются абсолютными, и они могут быть связаны с культурными и социальными факторами. Например, женщины могут быть более склонны к эмоциональному восприятию информации из-за того, что они чаще сталкиваются с эмоциональными проблемами в своей жизни. Мужчины могут быть более склонны к логическому восприятию информации из-за того, что они чаще сталкиваются с проблемами, требующими логического решения. Таким образом, гендерные различия в восприятии и обработке информации могут быть связаны с различными факторами, и они не являются абсолютными. Это исследование может быть полезно для понимания того, как гендерные различия могут влиять на восприятие и обработку информации, и как это может быть связано с различными факторами.

В данном методе, напротив, в пробе концентрируется вся масса сорбента, не вступающая с одной из реагентов флуорентное β -кетоэфирное. При нагревании сорбента в пробе, он соединяется с активным. Составленный сорбентом флуорентный образует активный фрагмент. Этот сорбент присутствует в пробе, активный сорбирован с неметаллическими фрагментами, активный, таким образом, соединяется неметаллическими фрагментами и образует активный фрагмент. Количество активного фрагмента и, следовательно, количество сорбента пропорционально количеству металла в пробе.

Рис. 6 — Схематический рисунок, иллюстрирующий механизм действия препарата «Экстракт» на организм человека.

R1 Lys фермент-дегидрог (0,171 mg), ферменты соев, дефенимент и аспартамент.
R2 Буфер фосфатный буфер, ферменты соев и аспартамент
R2 Lys фермент-дегидрог, аспартамент и аспартамент (22,3 mg), аспартамент, аспартамент-β-D-галактозидаза (1,87 mg), аспартамент и аспартамент

1. **THEORY**

Описание: Составляет одну из глав. R22 Описан при гистологическом

В.3). Это Показатель соответствующей априорной оценки. Результаты и формулы для него следует упрощать как обычные формулы.

Університет опублікував різноманітні матеріали в соціальних і професійних електронних медіа-каналах і заохочує авторів до публікації своїх робіт в інших місцях, крім журналу. Авторі не потрібно оплачувати публікацію.

Бориса Гавриловича Мещерякова (1864-1936) в Псковском государственном университете

Для приготовления следующих растворов используют стандартные реагенты и флуоры. Небулу следует хранить в холодильнике (2... 4°C), в растворе концентрированной азотной кислоты (концентрация 10%):

См. также статью: [Решение задачи №1, для тех, кто хочет сэкономить на покупке недвижимости](#)[illegible]

Содержание файлов R11 Лу и файлов R11 Вилльс с помощью одного из прилагаемых дисков. Альтернативные альтернативные файлы, предоставляемые на компакт-диске, убедитесь в том, что вы используете правильный метод для файлов R11 Лу или файлов R11 Вилльс. Не допускайте сбоев в работе. Откройте файл R11 Лу и файл R11 Вилльс и используйте их. Загрузите файл R11 Вилльс

Специфичность
Специфичные препараты в метаболиты при использовании набора реагентов Орпакт в силу наличия следующих реагентов непереносимости

Соединение	Специфичные метаболиты (мкг/мл)	% переносимости
Морфин	300	100
Кодон	300	125
Диэтилморфин	300	65
Дипрохлорид	300	50
Гидрокодон	300	48
Гидроморфин	300	97
Налтрексон	20 000	1,8
Морфин-3-глюкуронид	300	81
Морфин-6-глюкуронид	300	47
6-Метилморфин	300	81
Мепрофен	150 000	0,2
Оксикодон	20 000	1,8
Оксикобин	10 000	2,1

Высокие концентрации соединений или фракции могут вызывать ложно положительные результаты.

Структурно родственные препараты при использовании набора реагентов Орпакт демонстрируют отрицательные результаты при использовании, указанных выше.

Соединение	Концентрация (мкг/мл)
Алфентилан	500 000
Алфентилановый эфир	500 000
Амфетамин	100 000
Амфетамин	500 000
Бензилморфин	500 000
Карборан	500 000
Хлоридморфин	500 000
Циклофен	500 000
Диклофен	100 000
Диклофен	100 000
Эмфетамин	500 000
Эуфентамин	500 000
Ибупрофен	500 000
Пентрофен	50 000
Метаморфин	500 000
Метаморфин	500 000
Нифентамин	500 000
Фенотилан	500 000
Фенотилан	500 000
Прометамин	100 000
Растамин	500 000
Самбуколорин эфир	500 000
Самбуколорин	500 000
11-мор- α -THC-COOH	10 000
Беретамин	500 000
Тарбутилан	

Ограничения

В фармакологическом анализе используются препараты, поэтому в случае употребления препаратов, содержащих вещества, сходные с морфином, анализ могут быть ложноположительными.

При использовании переносимости реагентов Орпакт в силу результатов ложноположительных анализов могут не коррелировать с уровнями отдельных лекарственных веществ в крови.

Ссылки на нормативные акты

- Определение положительных результатов, установленных в анализаторе по умолчанию
- Сайт (анализатор) (пат. № 0000010)
- Сайт (анализатор) (пат. № 0000014, 0000016, 0000017 и 0000018)

Библиография

1. Heston R.L. Analytical methodology. In: Heston R.L., Chiang C.H., eds. Urine Testing for Drugs of Abuse. NIDA Research Monograph 1989; 73: 30-41.
2. Bartsch L.P., Bartsch G.A. A.E. Opium and its derivatives. Clin. Toxicol. 1982; 19: 545-548.
3. Bartsch L.P., Bartsch G.A. A.E. Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. 4th ed. Fetal City, Calif: Chemical Toxicology Institute; 1994.
4. Oles P.A., Walsh T.D. Clinical pharmacokinetics of morphine. Ther. Drug Monit. 1981; 13: 1-23.
5. Goss E.J., Walsh P., Walsh T.D., Paul R.D. Parental drug testing for opiates. I. Detection of 6-morphine in urine as an indicator of recent heroin exposure; drug and body concentrations and detection times. J. Anal. Toxicol. 1981; 15: 17.
6. Aldrich J.M., Paul R.D., Walsh P., Goss E.J. Parental drug testing for opiates. II. Metabolism and excretion of morphine in humans after morphine administration. J. Anal. Toxicol. 1981; 15: 49-55.
7. Heston R.L., J. Bartsch L.P. Morphine pharmacokinetics and metabolism in humans: Enzymatic pathways and relative contribution of metabolites to active opioid concentrations. Clin. Pharmacol. Ther. 1982; 32: 344-354.
8. Heston R.L., Friedman S.B., Harris J.D., et al. CEDIA™, a new homogeneous immunoassay system. Clin. Chem. 1988; 34: 1834-1841.
9. Notice of mandatory guidelines for federal workplace drug testing program. Fed. Register. 1988; 53(11): 11118-11120.
10. Torts R.D., Rogers J., Zander R.D., Williams J. Recommendations for the reliable detection of illicit drugs in urine in the European Union, with special attention to the workplace. Ann. Clin. Biochem. 1987; 24: 338-344.
11. Heyes D.E., Kneel W.D., Mungler P.A. Concentrations of morphine and codeine in sweat and urine ingested of poppy seeds. Clin. Chem. 1987; 33: 804-808.
12. Strempfer R.E. Excretion of codeine and morphine following ingestion of poppy seeds. J. Anal. Toxicol. 1987; 11: 87-88.

CE



**BECKMAN
COULTER.**

Metadon

Instructions

OS#0319

2 x 14 MR

24

2 x 16 mm

2x

R1 Evidencia

400

R2 Evolution

El

Назначения

Компьютерное и компьютеризированное определение методов и средств членения текстовых фрагментов на предложения Backlin Suite серия AJ. Только для длинностей 1 и 2

Данный метод позволяет получать только предварительные результаты теста. Для подтверждения полученных результатов следует использовать более специфичный аналитический лабораторный метод. В качестве подтверждающего метода рекомендуется использовать метод газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС). Положительный результат теста требует подтверждения, полученный предварительным методом, следует рассмотреть в совокупности с другими лабораторными данными и заключениями лечащего врача (10).

Summary of the findings

[illegible]

Принцип определенности

Данный метод основан на использовании бактериального фермента β -галактозидазы, полученного методом геноинженерии и еще двух ферментов: фенитина и пенициллина. Полимер состоит из соединителей, образующих линейную формулу, который в этом ферментном методе, разлагается субстратом, формируя систему реакционной среды, что способствует фотосинтезу.

В данных методах, направленных на борьбу с инвазивными видами, существуют как недостатки, так и преимущества с точки зрения экологической безопасности. При этом важно отметить, что в борьбе с инвазивными видами необходимо использовать комплексный подход, включающий как биологические, так и химические методы. В частности, использование биологических методов позволяет избежать негативных последствий для окружающей среды, связанных с применением химических препаратов. Однако, при этом необходимо учитывать возможность распространения инвазивных видов на новые территории, что может привести к еще более серьезным последствиям. Поэтому, при выборе метода борьбы с инвазивными видами, необходимо тщательно взвесить все за и против, а также проконсультироваться со специалистами в данной области.

Societal Implications

R1 Buffer (R1 Buffer) Пипетируйте 100 мкл 2-хлорсульфаниловой кислоты в буфер, 3,0 мкл мышьяковой кислоты и 100 мкл метанола в метаноле, содержащем 100 мкл 2-хлорсульфаниловой кислоты.

№1 ЛР 201 (100) 0.171 (с) «Федеральное агентство по образованию, государственному высшему учебному заведению «Всероссийский институт статистики» и издательству «Статистика»

R2 Buffer (R2 Buffer) Гипоксан-NN-фос [2-транс-фосфорил-5-фос-соединенный 5-фос-микроэлемент]

R2 Lys (R2 Glu) 0.171 г/л ферментный препарат, содержащий бифид, лактозон и конжуринт,

1.67 кл. хлоро-кл. красный, β -D-галактозилтрансфераза, солевой буфер, детектант и индикатор

Online first is a service that allows you to view the full text of articles as soon as they are accepted for publication. Online first articles are available on the journal website and are not included in the print edition of the journal.

Предупреждения об опасности и одобряющей реакции:

Браден. Сохраняет язык и нравы. R22. Браден ррн нападении отутры.

Major Contributions

SS4, SS6. Нисходящее землетрясение. Результаты в этот раз-получены неожиданные результаты: не только в

Учитываются управленческие расходы на материалы в соответствии с требованиями стандарта бухгалтерского учета и отчетности по плану. Во включении в состав затрат на производство продукции (работ, услуг) не включаются расходы на приобретение материалов, не относящихся к основным средствам, и расходы на приобретение материалов, не относящихся к основным средствам, и расходы на приобретение материалов, не относящихся к основным средствам.

Дополнительные информационные материалы в Профите безопасности

Подготовили референт

Подготовку растворов проводят, используя следующие реагенты. Доставляют набор реагентов из исходными (2...5°C) непосредственно перед началом приготовления растворов.

Copyright 1999 by Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America.

22.10.2019

[illegible]

R1 (Растительный материал)

Содержимое флакона R1 Лю соедините с буфером из R2 буфер и поместите одного из растений в аддитор. Аккуратно перемешайте до полного растворения. Разбавьте полученный материал флаконом R1 Лю. После этого полученный раствор перемешайте во флакон R1 буфер. Не допускайте образования пены. Осветлите флакон R1 Лю и аддитор от флакона R1 буфер и утилизируйте их. Завершите флакон R1 буфер прищипкой и поставьте на комнатную температуру (18...25°C) на 5 минут. После перемешивайте. Не забудьте поставить на флакон дату приготовления раствора. Установите флакон в отсек для реагентов в анализатор или поставьте в холодильный шкаф (2...8°C), дайте ему постоять не менее 30 минут. После использования препарата, что является одноразовым.

ЗАМЕЧАНИЕ 1: Все компоненты предназначены для использования в составе лунки набора. Не смешивайте реагенты разных серий (lot) одновременно. 2. Небольшое количество реактивов реагентов, мерные флаконы только соответствующим крышками. Рабочий раствор R2 (буфер, формант) должен быть желто-оранжевого цвета. Темно-красный или фиолетово-красный цвет указывает на необходимость реагента. Такой реагент использовать нельзя.

ЗАМЕЧАНИЕ 3: Перед измерением температура растворов R1 и R2 должна быть равной температуре реакционного отсека.

ЗАМЕЧАНИЕ 4: Для обеспечения стабильности реакционного раствора R2, защищайте его от прямого солнечного, постоянного воздействия яркого света.

ЗАМЕЧАНИЕ 5: Не используйте графитовые электроды.

Калибровка и стабильность

Измерения реагенты стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре не менее 2...8°C. После вскрытия реагенты стабильны 30 дней при хранении на борту анализатора.

Необходимый материал

Моча. Мочу следует собирать в чистую емкость или стерильную посуду.

Перед измерением мочу асептично отцентрифугировать.

Работать с мочой человека следует как с потенциально инфицированными материалами.

При повторении на флаконизацию пробы для исследования следует брать другую пробу.

Проба может храниться при 15...25°C не более 7 дней, после чего ее следует хранить при 2...8°C. Следует использовать недовольные рекомендации при составлении условий.

Процедура анализа

См. Руководство пользователя и соответствующую инструкцию на конкретный анализатор. В программе есть программы для калибровки постоянного и переменного мочевых соединений.

Калибровка

Калибровка анализатора.

Для автоматического измерения используйте один из двух следующих Cx-Off калибраторов:

Название калибратора	Кат. №	Материал (миллн + моча)
DAU Metadone Cx-Off Calibrator	0006319	300

Получите чистоту от калибратора.

Для ручного автоматического измерения используйте следующие Cx-Off калибраторы:

Название калибратора	Кат. №	Материал (миллн + моча)
DAU Metadone Cx-Off Calibrator	0006314	0
DAU Metadone Cx-Off Calibrator	0006319	300
DAU Metadone Intermediate Calibrator	0006320	600
DAU Metadone High Calibrator	0006321	900

Значения калибраторов, указанные в прилагаемых этикетках, соответствуют до значения порогового градиентного скачка.

Перезагрузите анализатор в следующие случаи:

- Замена флакона реагента или осуществление замены анализатора.
- Проверка профилактического обслуживания анализатора или замена внешнего узла прибора.

Новую калибровку необходимо выполнять проводить – методически выбрать в меню Routine (Обычные исследования) – Calibration (Калибровка) (Мониторинг калибровки) – Calibration Curve (Калибровочная кривая). Сразу же после калибровки следует провести калибровку контроля качества.

Контроль качества

Любой лабораторией определяет частоту проведения контроля качества самостоятельно, однако, хороший лабораторный приток в течение дня или недели измерения вместе с пробой пациента и после проведения калибровки. Размещается использовать контроль двух уровней, один со значением на 75% выше или ниже отклонения (Lo-Off), другой – на 25% ниже отклонения (Hi-Off). Измерения значений контрольной функции соответствуют установленной приемлемой допустимой значимости. При обнаружении несоответствия функций и значениях значений контроля качества или значениях отклонений от значений, проверить все калибровочные отходы измерения.

Каждый лабораторией следует разработать план действий на тот случай, если результаты измерений контроля качества выйдут за установленные пределы.

Контрольный материал

Контроль DAU Metadone Control, 0006006.

Результат

Контрольный анализ результатов:

Калибратор DAU Metadone Cx-Off Calibrator содержит 300 мкл материала, используются в качестве разделительного значения между положительным и отрицательным значениями. Если концентрация материала в пробе больше значения калибратора, значение будет оценено как положительное. Если концентрация будет меньше значения калибратора – значение будет оценено как отрицательное.

Анализатор Оптику автоматическим образом оценит каждую пробу с положительным результатом флаконом «P», а с отрицательным – «N».

Получите чистоту от калибратора.

Оценочные значения концентрации материала можно получить при использовании калибратора, выполненной с калибратором DAU Metadone Calibrator, DAU Metadone Cx-Off Calibrator, DAU Metadone Intermediate Calibrator и DAU Metadone High Calibrator.

При интерпретации результатов количественного измерения важно особенно внимательно рассмотреть другие факторы, влияющие на результаты в моче, например, такие как потребление алкоголя и другие биологические факторы.

Потенциальный результат следует подтвердить более специфическим методом, основанном на встраивании эритроцитов. В качестве подтверждающего метода можно использовать не GOMS технологию, но GOMS является основным методом, тем или является наиболее точной подтверждающей технологией для всех параметров, поэтому позволяет получить наиболее достоверные результаты.¹

Ожидаемые значения

Результаты должны быть всегда негативными относительно точек отсечения (cut-off), т.е. 300 мкг/л за исключением образца, пациентов гемодиализа Митран и терзативными циток. В этих случаях: позитивные результаты ожидаемы.

Специфические характеристики

Данные, приведенные в этом параграфе, получены при измерении на анализаторах Bechtmn Coulter серии AU. Характеристики проведения теста в нашей лаборатории могут отличаться от приведенных выше.

Воспроизводимость

Следующие результаты получены при измерении на AU640 с использованием калибратора DAU Methadone Cut-off Calibrator и 2-х уровней контроля, соответствующих $\pm 25\%$ соответствующей точки отсечения. Каждая проба анализировалась шесть раз дважды в день на протяжении 5-ти дней.

Качественная оценка метода

n = 60	Внутри серии				Общая	
анализ	Среднее значение, мкг/мл	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	
336	307	2.9	1.0	6.6	1.8	
338	371	4.3	1.2	7.3	2.0	
376	441	4.1	0.9	8.4	1.9	

Получаемые значения оценки метода

n = 60	Внутри серии				Общая	
анализ	Среднее значение, мкг/мл	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	
336	246	3.0	1.3	6.0	2.3	
338	313	3.7	1.2	7.0	2.2	
376	398	6.4	1.4	10.3	2.6	

Корреляция

При сравнении данных диагностического набора реагентов Methadone (Метадон) CDR316 для определения метода на анализаторе AU640 с другим коммерческим доступным набором реагентов для определения метода-использования метадона. Получены следующие результаты:

Точка отсечения 300 мкг/мл		Точка отсечения 300 мкг/мл	
Качественная оценка		Полученная оценка	
Сравнительный оригинальный метод	+	02	0
	-	0	71
Сравнительный серийный метод	+	02	0
	-	0	71

Чувствительность

Самое низкое определяемое значение метадона определенное анализатором AU 640 составляет 20.7 мкг/л.

Самое низкое определяемое значение (LLO) соответствует самому низкому измеренному значению метадона, отличному от нуля. Низкой предел чувствительности рассматривается как абсолютное среднее значение плюс три стандартных отклонения при 25-ти крайних измерениях негативного калибратора (Methadone Calibrator).

Влияющие факторы

Следующие вещества в случае их внесения в пробу в указанных ниже концентрациях, соответствующих их нормальным физиологическим концентрациям в моче, при проведении анализа с набором реагентов Methadone (Метадон) имели на результаты (получаемые значения) отрицательное, от нормальных значений на 10%:

Вещество	Концентрация	Вещество	Концентрация
Аспирин	≤ 10 мг	Гепарин	≤ 2 г/л
Аскорбиновая кислота	≤ 15 г/л	Сывороточный альбумин	≤ 6 г/л
Креатинин	≤ 8 мг	Центрифугат	≤ 1 г/л
Этанол	≤ 40 г/л	Гликоформин	≤ 75 мкг/л
Галактоза	≤ 100 мг/л	Хлорид натрия	≤ 60 г/л
Уробилин	≤ 6 г/л	Мочевина	≤ 50 г/л
Глюкоза	≤ 30 г/л		

Другие внешние и/или факторы, не указанные в приведенном списке, могут влиять на тест и быть причиной ложных результатов (например, гемолиз или гемоцидные осадки).

Специфичность

Следующие препараты и метаболиты при использовании набора реагентов Methadone (Метадон) показали отрицательные результаты по определению реактивности.

ЗАМЕЧАНИЕ 2 Небольшое турбулентное загрязнение реагентов, содержащих флакон, только соответствующим крышкам. Рабочий раствор R2 (жидкий реагент) должен быть желто-оранжевого цвета. Темно-красный или фиолетово-красный цвет указывает на загрязнение реагента. Такой реагент использовать нельзя.

ЗАМЕЧАНИЕ 3 Перед измерением температуры растворов R1 и R2 должен быть равной температуре реакционного стакана.

ЗАМЕЧАНИЕ 4 Для обеспечения стабильности приготовленного раствора R2, закройте его от продолжительного, постоянного воздействия яркого света.

ЗАМЕЧАНИЕ 5 Не используйте приготовленные реагенты

Упаковка и стабильность:

Исходные реагенты стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2...8°C. После вскрытия реагенты стабильны 30 дней при хранении на борту анализатора.

Исходный материал

Мат. Мат. следует собирать в чистую стерильную или гелистатическую посуду.

Перед использованием мат. следует асептизировать.

Работать с мат. чистотой следует как с потенциально инфицированными материалами.

При подозрении на фальсифицированную пробу для исследования следует брать другую пробу.

Проба может храниться при 18...25°C максимум 7 дней, после чего ее следует хранить при 2...8°C. Следует использовать надежные рефрижераторы при соответствующих условиях.

Процедура анализа

См. Руководство пользователя и соответствующую информацию по конкретным исследованиям. В прилагаемых листах есть программы для компьютеризированной и компьютеризированной обработки данных.

Калибровка

Калибровка стандартных

Для верификации измерений использовать один из двух стандартных Cu-off калибраторов.

Исходный материал	Кат. №	ЕДПД (проб и анализ)
DAU Primary Cu-off Multi-drug Calibrator	ODC8318	100
DAU Secondary Cu-off Multi-drug Calibrator	ODC8318	100

Процедура калибровки определяется

Для компьютеризированного измерения используйте следующие Cu-off калибраторы:

Исходный материал	Кат. №	ЕДПД (проб и анализ)
DAU Negative Calibrator	ODC8314	0
DAU Primary Cu-off Multi-drug Calibrator или	ODC8318 или	100
DAU Secondary Cu-off Multi-drug Calibrator	ODC8318	100
DAU Intermediate Multi-drug Calibrator	ODC8317	100
DAU High Multi-drug Calibrator	ODC8318	200

Значения калибраторов, указанные в прилагаемом листе, соответствуют до значений нормативного эталонного стандарта.

Перекалибровку следует проводить в следующих случаях:

- Замена флакона реагентов или существенное изменение значений контроля;
- Проверка адекватности обслуживания анализатора или замены внешнего узла прибора.

Новую калибровку необходимо регулярно проверять – периодически выбирать в меню Routine (Обычные исследования) - Calibration Method (Метод калибровки) - Calibration Curve (Калибровочная кривая). Сразу же после калибровки следует провести контроль качества.

Контроль качества

После лабораторной проверки частоту проведения контроля качества самостоятельно, однако, контроль калибровочной приемки считается из обязательных измерений вместе с пробой пациента и после проведения калибровки. Рекомендуется использовать контроль двух уровней: один из значений на 25% выше эталонного (out-of) другой – на 25% ниже эталонного (in-of). Измеренные значения контрольной должны соответствовать указанному диапазону допустимых значений. При обнаружении хотя бы одного из значений вне диапазона контроля качества или значения эталонной или эталонной, провести все калибровочные шаги калибровки.

Каждый лабораторный анализ должен быть действителен на тот случай, если результаты измеренных контрольных веществ выйдут за установленные пределы.

Контрольный материал

Контроль DAU Multi-drug Control, ODC8008, или Контроль DAU Specialty Control, ODC8007.

Результат

Калибровка калибровочных

Калибратор DAU Secondary Cu-off Multi-drug Calibrator или DAU Primary Cu-off Multi-drug Calibrator используется в качестве референциального значения между компьютеризированным и ручным измерениями. Если калибровка калибратора в пробе будет равна и больше значения калибратора, значение будет оценено как положительное. Если калибровка будет меньше значения калибратора – значение будет оценено как отрицательное. Анализатор Beilstein Control Series AU автоматически отменит любую пробу с положительными результатами флагов R+, а с отрицательными – R-.

Полученные значения оценки результатов

Относительные значения концентрации EDDP можно получить при использовании калибровки, выполненной с калибраторами DAU Negative Calibrator, DAU Secondary Cu-off Multi-drug Calibrator, DAU Primary Cu-off Multi-drug Calibrator, DAU Intermediate Multi-drug Calibrator и DAU High Multi-drug Calibrator.

Смешанные значения

Результаты должны быть всегда положительными относительно эталонного (out-of) 100 mg/L, за исключением пациентов, употребляющих в запрещенной программе. В этих случаях положительные результаты тестов ожидаемы.

При некорректных результатах компьютеризированного измерения нужно особенно внимательно рассмотреть другие факторы, влияющие на результаты в моче, например, время от употребления наркотика и другие биологические факторы.

Получаемый результат следует подтвердить более специфическим методом, основанным на аналитическом химическом принципе. В качестве подтверждающего метода можно использовать не GC/MS тест-систему, но GC/MS является основным методом, так как является наиболее точной подтверждающей тест-системой для всех наркотиков, поскольку позволяет получать наиболее достоверные результаты.¹

Специфические характеристики

Данные, приведенные в этом параграфе, получены при измерении на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Характеристики проведения теста в иных лабораториях могут отличаться от приведенных ниже.

Воспроизводимость

Следующие результаты получены при измерении на AU640 с использованием калибраторов DAU Primary & Secondary Cut-off Multi-drug Screeners и 2-х уровней контроля, соответствующих $\pm 25\%$ от соответствующей точки отсчета. Каждая проба анализировалась шесть раз дважды в день на протяжении 5-ти дней.

Качественная оценка EDDP

мг/мл	Среднее значение, мкг/мл	Станд. откл. (SD)	Внутри серии Коэф. вариации (CV %)	Станд. откл. (SD)	Общий Коэф. вариации (CV %)
78	289	3,4	1,3	6,4	3,2
100	289	3,4	1,2	8,5	3,0
125	317	4,6	1,4	10,0	3,1

Полученная оценка EDDP

а = 60 мкг/мл	Среднее значение, мкг/мл	Станд. откл. (SD)	Внутри серии Коэф. вариации (CV %)	Станд. откл. (SD)	Общий Коэф. вариации (CV %)
78	78	3,1	4,1	3,4	4,4
100	98	4,4	4,4	4,6	4,6
125	157	8,9	8,3	9,7	8,1

Корреляция

При сравнении данных диагностического набора реагентов для определения EDDP на анализаторе AU640 с другими коммерчески доступными наборами реагентов для определения EDDP использовались мочу калибратора Проба с противоречивыми результатами исследования, подтверждающая реактивность метода GC/MS. Результаты анализа следующие:

Точка отсчета 100 мкг/мл Качественная оценка		Точка отсчета 100 мкг/мл Полученная оценка	
Среднестатистический метод	+	44	2*
	-	0	70

Точка отсчета 100 мкг/мл Качественная оценка		Точка отсчета 100 мкг/мл Полученная оценка	
Среднестатистический метод	+	44	0
	-	0	72

* Эти пробы были измерены методом GC/MS, концентрации EDDP составляли 95 мкг/л и 97 мкг/л.

Чувствительность

Самое низкое определенное значение (LDL) получено на AU 640 составляет 6 мкг/л. Самые низкие определенные значения соответствуют самым низким калибровочным значениям, отличным от нуля. Нижний предел чувствительности рассчитывается как абсолютная средняя значение плюс три стандартных отклонения при 25-ти кратном измерении настольного калибратора (Nebrore Salivette).

Влияющие факторы

Ниже перечислены факторы, существенно не влияющие на результаты анализа (погрешность $< 10\%$)

Вещество	Концентрация	Вещество	Концентрация
Аспирин	≤ 10 мг/л	Синтетический альбумин	≤ 3 г/л
Аскорбиновая кислота	≤ 16 мг/л	Целлюлозная целлюлоза	≤ 5 мг/л
Креатинин	≤ 3 г/л	Щелочная фосфатаза	≤ 1 г/л
Этанол	≤ 30 мг/л	Гидрохинон	≤ 15 мг/л
Гликозиды	≤ 100 мг/л	Хлорид натрия	≤ 60 г/л
Углеводы	≤ 5 г/л	Моноамины	≤ 15 г/л
Гликозиды	≤ 10 г/л		

Другие вещества и/или факторы, не указанные в приведенном списке, могут влиять на тест и быть причиной ложных результатов (например, токсикозы или метаболические сдвиги).

Специфичность

Следующие препараты и метаболиты при использовании набора реагентов EDDP в протекле показали следующие результаты перекрестной реактивности, показали следующие результаты перекрестной реактивности:

Соединение	Определяемый концентрация (мкг/мл)	% перекрестной реактивности
EDDP	100	100,0
Метисон	200 000	0,004
Метисон	600 000	0,016
н-гидроксиэтилметисон	1 000 000	0,000
н-гидроксиэтилметисон	1 000 000	0,001
о-гидроксиэтилметисон	1 000 000	0,000

Структурно близкие препараты при использовании набора реагентов EDDP демонстрировали отрицательные результаты при концентрации, указанной ниже.

Соединение	Материальная стоимость (руб.)
Алупренталин ¹	500 000
Алупренталин, ионный обмен	500 000
Алупренталин	500 000
Алупренталин	100 000
Бензоилкофеин	100 000
Кетопрофен	500 000
Хлорид ампициллина	150 000
Циклофенил	850 000
Клоксан	150 000
Диклофенак	175 000
Диклофенак	150 000
Диклофенак	100 000
Дифенилметан	600 000
Дипропион	1 000 000
Дипропион	500 000
Энвипрофен	500 000
Флуокетин	600 000
Ибупрофен	600 000
Левоспирин	600 000
Метилфетанил	100 000
Морфин	100 000
Нифедипин	500 000
Фенотропидин	100 000
Пропропион	600 000
Ремитин	500 000
Салициловая кислота	500 000
Стероиды	100 000
11-нор- Δ^1 -THC-COOH	8500
Витамин	500 000
Паралитик	

Образцы

Образцы с высокой концентрацией метаболитов могут давать положительный результат по EDDP при применении методов GC/MS в соответствии с методами EDDP.¹²

Список литературы

1. Определение метаболитов в моче. — Значение, установленное в анализаторе по увеличению.
 2. Callisto, из №. ODC6316 или ODC6316.
 3. Callisto, из №. ODC6314, ODC6315 или ODC6316, ODC6317 и ODC6318.

Библиография

1. Haines RL. Analytical methodology. In: Haines RL, Chang CH, eds. Urine Testing for Drugs of Abuse. NIDA Research Monograph. 1990;73:30-41.
2. Bressi NC, Conry RH. Disposition of toxic drugs and chemicals in man. 3rd ed. Chicago: Year Book Medical Publishers; 1995.
3. AFB drug information. American Hospital Formulary Service, 1992.
4. AFB drug information. American Hospital Formulary Service, 1992.
5. Physiological drug information. 3rd ed. Montreal, NJ: Medical Economics Data Production Co; 1995.
6. Katsung RG. Basic and clinical pharmacology. 4th ed. Norwalk, CT: Appleton & Lange; 1995.
7. Haines RL. Urine drug information service. In: Lusk, MA. Facts and Figures. 1995.
8. Goldstein FR, Thiele CI. Overview of methadone. Most methadone use among applicants in two metropolitan drug abuse programs. Int J Addict. 1989;13:855-862.
9. Henderson DR, Friedman RJ, Harris JD, et al. CEDIA™, a new homogeneous immunoassay system. Clin Chem. 1995;42:1637-1641.
10. Notice of mandatory guidelines for federal workplace drug testing program. Federal Register. 1993;58 (April 15):11953.
11. Torg RDL, Begum J, Zacher RD, Williams J. Recommendations for the reliable detection of BUD drugs in urine in the European Union, with special attention to the workplace. Ann Clin Biochem. 1997;34:338-344.
12. Gifford PR, Gifford MF. Methadone conversion in EDDP during GC-MS analysis of urine samples. J Anal Toxicol. 1995;23:515-518.

CE



КОКАИН (Cocaine)			
Q5R6317	2 x 16 ml	R1 Буфер	
	2 x	R1 Лيو	
	2 x 16 ml	R2 Буфер	
	2 x	R2 Лيو	

Назначение

Качественное и полуколичественное ферментативное иммунологическое определение кокаина в моче человека на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro.

Данный метод позволяет получать только предварительные результаты теста. Для подтверждения полученных результатов следует использовать более специфичный иммунологический метод. В качестве подтверждающего метода предпочтительно использовать метод газовой хромато-масс-спектрометрии (GC/MS). Положительный результат теста любого характера, полученный приращиваемыми методами, следует рассматривать в совокупности с другими клиническими данными и эволюционными исследованиями.

Клиническое значение

Кокаин (бензоилметиллеонин) получают из растения *Erythroxylon* coca, широко распространенного в Южной Америке¹⁴. Интенсивное употребление вызывает острые эффекты: возбуждение, бессонницу, гиперэмпатичность, паранюю, иногда галлюцины и делириум¹⁵. Метболизмом кокаина активный, менее 1% неизмененного вещества выводится с мочой¹⁶. Основные метаболиты кокаина - Бензоилметиллеонин и Бензон метилметиллеонин образуются в результате ферментативного и неферментативного гидролиза¹⁷. Бензоилметиллеонин обнаруживается в моче в течение 3 недель после прекращения длительного употребления кокаина¹⁸.

Принцип определения

Данный метод основан на использовании бактериального фермента β -галактозидазы, полученного методом генной инженерии и встроении в него фрагмента фермента. Гистидин-эстераза содержится в составе активного фермента, который в эссенции катализирует расщепление субстрата, являющегося субстратом фермента, что приводит к образованию продукта. В данном методе, введенный в пробирку субстрат не взаимодействует с одним из неактивных фрагментов (гистидин-эстеразы). При наличии фермента в пробе, он соединяется с субстратом. Оставшаяся неактивная фрагментная субстрата образует активный фермент. Если фермент присутствует в пробе, активная субстрата соединяется с неактивной фрагментной субстратом, образуя активный фермент. Если фермент отсутствует в образце, активная субстрата соединяется с неактивной фрагментной субстратом, образуя активный фермент. Количество активного фермента и, следовательно, количество образцов пропорционально количеству фермента в пробе.

Для увеличения чувствительности метода добавляется фермент, катализирующий гидролиз субстрата. В результате, при наличии фермента, при добавлении субстрата, образуются продукты, содержащие бензоилметиллеонин, тем самым, увеличивая чувствительность обнаружения образца, содержащего бензоилметиллеонин.

Состав реагентов

R1 Буфер (R1 Буфер)	Гипернатрион-N, N-бис [2-гидроксиэтановая кислота] буфер, 0.54 мг/мл мылосодержащий моноклональный антител к бензоилметиллеону, солевой буфер, стабилизатор, консервант.
R1 Лيو (R1 Лيو)	0.171 г/л ферментальный субстрат, солевой буфер, детергент и консервант.
R2 Буфер (R2 Буфер)	Гипернатрион-N, N-бис [2-гидроксиэтановая кислота] буфер, солевой буфер и консервант.
R2 Лيو (R2 Лيو)	15.36 мг/мл донора фермента конъюгированного с бензоилметиллеоном, 1.67 г/л тартаровый красный- β -D-галактозидаза, солевой буфер, детергент и консервант.

Общие предостережения

Предупреждение об опасности и сведения о рисках.
Вреден. Содержит вред натрия. R22: Вреден при попадании внутрь.

Меры безопасности:

630, 640. Не вдыхайте пары. Разбавьте и сразу утилизируйте или утилизируйте на опасные отходы.

Утилизируйте использованные реактивы и материалы в соответствии с требованиями законодательства о обращении с опасными отходами и экологическими нормами. Во избежание возможного отравления при попадании реактива в глаза немедленно промойте глаза большим количеством воды.

Дополнительная информация приведена в Уставе Безопасности.

Подготовка реагентов

Подготовка растворов проводится, используя холодные реагенты. Добавьте набор реагентов на холодном (2...8°C) непосредственно перед процедурой приготовления растворов.

Сначала добавьте раствор R2A в воду R1, для того чтобы избежать образования осадка.

R2 (раствор донора фермента)

Содержимое флакона R2 Лيو соедините с буфером R2 Буфер с помощью одного из прилагаемых адаптеров. Тщательно перемешайте до полного растворения концентрированного материала флакона R2 Лيو. После этого полученный раствор перемешайте во флакон R2 Буфер. Не допускайте образования пены. Отсоедините флакон R2 Лيو и удалите от флакона R2 Буфер и утилизируйте их. Заклейте флакон R2 Буфер крышкой и оставьте при комнатной температуре (15...25°C) на 5 минут. После перемешайте. Не забудьте поставить на флакон дату приготовления раствора. Установите флакон в сток для

реактивов в анализатор или поставьте в холодильник (2...8°C), и дайте ему постоять не менее 30 минут. Перед использованием проверьте, что реагент однородный.

Дл (Раствор флуоресцентный)

Содержимое флакона R1 Луо соедините с буфером из R2 Buffer с помощью одного из прилагаемых адаптеров. Аккуратно перемешайте до полного растворения флуоресцирующего материала флакона R1 Луо. После этого полученный раствор перелейте во флакон R1 Buffer. Не допускайте образования пены. Отцентрируйте флакон R1 Луо и адаптер от флакона R1 Buffer и утилизируйте их. Загерметизируйте флакон R1 Buffer крышкой и оставьте при комнатной температуре (15...25°C) на 5 минут. Вскройте перемешиватель. Не забывайте поставять на флакон дату приготовления раствора. Установите флакон в отсек для реактивов в анализатор или поставьте в холодильник (2...8°C), дайте ему постоять не менее 30 минут. Перед использованием проверьте, что реагент однородный.

ЗАМЕЧАНИЕ 1: Все компоненты градуированы для использования в составе этого набора. Не смешивайте реактивы разных серий (lot).

ЗАМЕЧАНИЕ 2: Избегайте перекрестного загрязнения реактивов, черпая флаконы только соответствующими пробирками. Рабочий раствор R2 (красный фермент) должен быть белого-кремового цвета. Только красный или фиолетово-красный цвет указывает на загрязнение реактива. Такой реактив нельзя использовать.

ЗАМЕЧАНИЕ 3: Перед измерением температур растворов R1 и R2 должны быть равной температуре реактивного стола.

ЗАМЕЧАНИЕ 4: Для обеспечения стабильности калибровочного раствора R2, инкубируйте его от предопределенного, постоянного количества времени.

ЗАМЕЧАНИЕ 5: Не замораживайте приготовленные реактивы.

Упаковка и стабильность

Несколько реактивов стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2...8°C. После вскрытия реактивы стабильны 60 дней при хранении на борту анализатора.

Испытательный материал

Моча. Мочу следует собирать в чистую стеклянную или пластиковую посуду.

После измерения мочу можно использовать для оптимизации.

Работать с мочой человека следует как с потенциально инфицированным материалом.

При планировании на флуоресцентный пробир для исследования следует брать другую пробу.

Проба должна храниться при 15...25°C максимум 7 дней, после чего ей следует хранить при 2...8°C². Следует использовать надежные рекомендации при соответствующих условиях.

Процедура анализа

См. Руководство пользователя и соответствующую инструкцию по конкретным исследованиям. В программном пакете есть программы для количественного и качественного методов определения.

Калибровка

Качественное определение.

Для качественного измерения используйте один из двух следующих Cut-off калибров:

Имя калибровочной кривой	Ид. №	Восстановление (мг/мл = мкг/дл)
DAU Primary Cut-off Multi-drug Calibration	QDC8315	300
DAU Secondary Cut-off Multi-drug Calibration	QDC8316	150

Количественное определение

Для количественного измерения используйте следующие Cut-off калибры:

Имя калибровочной кривой	Ид. №	Восстановление (мг/мл = мкг/дл)
DAU Negative Calibration	QDC8314	0
DAU Secondary Cut-off Multi-drug Calibration	QDC8316	150
DAU Primary Cut-off Multi-drug Calibration	QDC8315	300
DAU Intermediate Multi-drug Calibration	QDC8317	2000
DAU High Multi-drug Calibration	QDC8318	5000

Значения калибровки, указанные в прилагаемом листе, соответствуют до значений первичного калибровочного стандарта.

Калибровку следует проверять в следующих случаях:

- Замена флакона реактивов или брашлетки или изменение калибровки.
- Проверка профилактического обслуживания анализатора или замена любого угла прибора.

Новую калибровку необходимо визуально проверить – последовательно выбрать в меню Runfile (Обычное исследование) - Calibration Monitor (Мониторинг калибровки) - Calibration Curve (Калибровочная кривая). Сразу же после калибровки следует провести измерения контроля качества.

Контроль качества

Лист лабораторной проверки частоту проведения контроля качества самостоятельного, четкого, хороший лабораторной практики. Проверьте на измерение измерения вместе с пробой пациентов и после проведения калибровки. Рекомендуется использовать контроль два уровня: один по значениям на 25% выше точного значения (high), другой – на 25% ниже точного значения (low). Измеренные значения контроля должны соответствовать установленной допустимой разнице. При обнаружении каких-либо отклонений в измерении значений контроля качества или в анализе системных или аномальных, проверить все анализаторные этапы измерения. Каждый лабораторный следует разработать план действий на тот случай, если результаты измерения контроля качества не будут в установленные пределы.

Контрольный материал

Выбор контроля зависит от проводимого исследования.

Точка отсчета 300 мкг/дл: Контроль DAU Multi-drug Control, QDC8005.

Точка отсчета 150 мкг/дл: Контроль DAU Secondary Control, QDC8007.

Результат

Качественная оценка результатов

Калибровочный DAU Secondary Cut-off Multi-drug Calibration или DAU Primary Cut-off Multi-drug Calibration используется в качестве референциального значения между положительным и отрицательным значениями. Если концентрация барбитуратов в пробе будет

на

вместе с
данной

на

равна и больше значения калибратора, значение будет оценено как положительное. Если концентрация будет меньше значения калибратора – значение будет оценено как негативное. Анализаторы Beckman Coulter серии AU автоматически отмечают каждую пробу с положительным результатом флагом «P», а с негативным – «N».

Полуполноценная оценка результатов

Однозначные значения концентрации барбитуратов можно получить при использовании калибров, выполненной с калибраторами DAU Negative Calibrator, DAU Secondary Cut-off Multi-drug Calibrator, DAU Primary Cut-off Multi-drug Calibrator, DAU Intermediate Multi-drug Calibrator и DAU High Multi-drug Calibrator.

При интерпретации результатов полуполноценного измерения нужно особенно внимательно рассматривать другие факторы, влияющие на результаты в моче, например, такая же потребность в моче и другие биологические факторы.

Пополнительный результат следует подтверждать, более специфическим методом, основанным на альтернативном аналитическом принципе. В качестве подтверждающего метода можно использовать не GC/MS технологию, но GC/MS является основным методом, так как является наиболее точной подтверждающей технологией для всех наркотиков поскольку позволяет получить наиболее достоверные результаты.

Ожидаемые значения

Качественный анализ

Результаты всегда должны быть отрицательными относительно точной оценки, соответствующей 300 мкг/л¹⁵ или 160 мкг/л.

Специфические характеристики

Данные, приведенные в этом параграфе, получены при измерении на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Характеристики проведения теста в вашей лаборатории могут отличаться от приведенных ниже.

Воспроизводимость

Следующие результаты получены при измерении на AU640 с использованием калибраторов DAU Primary и Secondary Cut-off Multi-drug Calibrator и 2-х уровней контроля, соответствующих $\pm 25\%$ от соответствующей точной оценки. Каждая проба анализировалась шесть раз в течение дня на протяжении 5-ти дней.

Качественный анализ мочевины		Внутренняя серия		Общая	
n = 68	Среднее значение, мкг/мл	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)
112,4	27,4	2,2	0,6	3,8	1,4
160	290	2,1	0,7	4,7	1,0
167,8	326	2,0	0,6	6,1	1,0
325	333	3,7	1,1	4,8	1,6
300	300	3,8	1,1	5,4	1,5
375	304	3,8	1,0	5,5	1,4

Полуполноценный анализ мочевины		Внутренняя серия		Общая	
n = 68	Среднее значение, мкг/л	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)
112,4	120	2,7	2,3	3,3	2,8
160	149	3,2	2,2	4,7	3,2
167,8	217	5,9	2,6	6,2	3,8
325	229	6,1	3,5	9,5	4,2
300	318	15,8	6,2	25,6	8,1
375	320	30,3	9,7	43,2	8,2

Корреляция

При сравнении данного диагностического набора реагентов для определения мочевины на анализаторе AU640 с другим коммерчески доступным набором реагентов для определения мочевины использовались мочы пациентов. Получены следующие результаты:

Точная оценка 160 мкг/л		Точная оценка 300 мкг/л	
Качественная оценка		Качественная оценка	
Сравнительный серийный метод	+	79	0
	-	0	71
Точная оценка 160 мкг/л		Точная оценка 300 мкг/л	
Полуполноценная оценка		Полуполноценная оценка	
Сравнительный серийный метод	+	79	0
	-	0	71
Точная оценка 160 мкг/л		Точная оценка 300 мкг/л	
Качественная оценка		Качественная оценка	
Сравнительный серийный метод	+	53	0
	-	0	94
Точная оценка 160 мкг/л		Точная оценка 300 мкг/л	
Полуполноценная оценка		Полуполноценная оценка	
Сравнительный серийный метод	+	53	0
	-	0	94

Чувствительность

Самое низкое определяемое значение (LLO) соответствует самому низкому измеренному значению метода, отличному от нуля. Нижний предел чувствительности рассчитывается как абсолютное среднее значение плюс при стандартных отклонениях при 25-ти кратном измерении негативного калибратора (Negative Calibrator).

Точная оценка	LLO, мкг/л (анализатор AU640)
150 мкг/л	4,3
300 мкг/л	4,9

Year	Population	Population	Population	Population
1970	5,000	5,000	5,000	5,000
1975	5,100	5,100	5,100	5,100
1980	5,200	5,200	5,200	5,200
1985	5,300	5,300	5,300	5,300
1990	5,400	5,400	5,400	5,400
1995	5,500	5,500	5,500	5,500
2000	5,600	5,600	5,600	5,600
2005	5,700	5,700	5,700	5,700
2010	5,800	5,800	5,800	5,800
2015	5,900	5,900	5,900	5,900
2020	6,000	6,000	6,000	6,000
2025	6,100	6,100	6,100	6,100
2030	6,200	6,200	6,200	6,200
2035	6,300	6,300	6,300	6,300
2040	6,400	6,400	6,400	6,400
2045	6,500	6,500	6,500	6,500
2050	6,600	6,600	6,600	6,600
2055	6,700	6,700	6,700	6,700
2060	6,800	6,800	6,800	6,800
2065	6,900	6,900	6,900	6,900
2070	7,000	7,000	7,000	7,000
2075	7,100	7,100	7,100	7,100
2080	7,200	7,200	7,200	7,200
2085	7,300	7,300	7,300	7,300
2090	7,400	7,400	7,400	7,400
2095	7,500	7,500	7,500	7,500
2100	7,600	7,600	7,600	7,600

Средства (перенос) в интернет-рекламе (по статистическим данным портала *Adwords*) в среднем составляют 300 тысяч рублей на одного пользователя. Рекламодатели платят за клики на объявление, а не за показы.

Characteristic	Nonusers (n = 100)	Users (n = 100)
Age (mean ± SD)	50.9 ± 10.9	50.9 ± 10.9
Gender		
Male	57	57
Female	43	43
Education		
High school or less	64	64
Some college	36	36
Bachelor's or more	0	0
Marital status		
Married	71	71
Single	29	29
Divorced	0	0
Widowed	0	0
Partnered	0	0
Other	0	0
Unknown	0	0
Never married	0	0
Married	0	0
Divorced	0	0
Widowed	0	0
Partnered	0	0
Other	0	0
Unknown	0	0
Never married	0	0
Married	0	0
Divorced	0	0
Widowed	0	0
Partnered	0	0
Other	0	0
Unknown	0	0
Never married	0	0
Married	0	0
Divorced	0	0
Widowed	0	0
Partnered	0	0
Other	0	0
Unknown	0	0
Never married	0	0
Married	0	0
Divorced	0	0
Widowed	0	0
Partnered	0	0
Other	0	0
Unknown	0	0
Never married	0	0
Married	0	0
Divorced	0	0
Widowed	0	0
Partnered	0	0
Other	0	0
Unknown	0	0
Never married	0	0
Married	0	0
Divorced	0	0
Widowed	0	0
Partnered	0	0
Other	0	0
Unknown	0	0
Never married	0	0
Married	0	0
Divorced	0	0
Widowed	0	0
Partnered	0	0
Other	0	0
Unknown	0	0
Never married	0	0
Married	0	0
Divorced	0	0
Widowed	0	0
Partnered	0	0
Other	0	0
Unknown	0	0
Never married	0	0
Married	0	0
Divorced	0	0
Widowed	0	0
Partnered	0	0
Other	0	0
Unknown	0	0
Never married	0	0
Married	0	0
Divorced	0	0
Widowed	0	0
Partnered	0	0
Other	0	0
Unknown	0	0
Never married	0	0
Married	0	0
Divorced	0	0
Widowed	0	0
Partnered	0	0
Other	0	0
Unknown	0	0
Never married	0	0
Married	0	0
Divorced	0	0
Widowed	0	0
Partnered	0	0
Other	0	0
Unknown	0	0
Never married	0	0
Married	0	0
Divorced	0	0
Widowed	0	0
Partnered	0	0
Other	0	0
Unknown	0	0
Never married	0	0
Married	0	0
Divorced	0	0
Widowed	0	0
Partnered	0	0
Other	0	0
Unknown	0	0
Never married	0	0
Married	0	0
Divorced	0	0
Widowed	0	0
Partnered	0	0
Other	0	0
Unknown	0	0
Never married	0	0
Married	0	0
Divorced	0	0
Widowed	0	0
Partnered	0	0
Other	0	0
Unknown	0	0
Never married	0	0
Married	0	0

Category	Item	Unit	Price
Food	1 lb. ground beef	lb.	\$1.00
Food	1 lb. hamburger	lb.	\$1.00
Food	1 lb. sausage	lb.	\$1.00
Food	1 lb. hot dogs	lb.	\$1.00
Food	1 lb. frankfurters	lb.	\$1.00
Food	1 lb. corned beef	lb.	\$1.00
Food	1 lb. ham	lb.	\$1.00
Food	1 lb. turkey	lb.	\$1.00
Food	1 lb. chicken	lb.	\$1.00
Food	1 lb. fish	lb.	\$1.00
Food	1 lb. shellfish	lb.	\$1.00
Food	1 lb. seafood	lb.	\$1.00
Food	1 lb. meat	lb.	\$1.00
Food	1 lb. poultry	lb.	\$1.00
Food	1 lb. game	lb.	\$1.00
Food	1 lb. organ meat	lb.	\$1.00
Food	1 lb. tripe	lb.	\$1.00
Food	1 lb. tongue	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00
Food	1 lb. feet	lb.	\$1.00
Food	1 lb. bones	lb.	\$1.00
Food	1 lb. skin	lb.	\$1.00
Food	1 lb. head	lb.	\$1.00

1. **Background:** This study was conducted in a community health center in a low-income urban area of New York City. The center serves a diverse population of approximately 10,000 residents, many of whom are uninsured or underinsured. The study was conducted over a 12-month period from January 2018 to December 2019. The research was approved by the Institutional Review Board (IRB) of the participating institution.

Call today for more information
1-800-368-3683
Circle 17 on Reader Service Card

[illegible]

[illegible]

Университетская библиотека
Получено 19.02.2014 г.
Университетская библиотека
Получено 19.02.2014 г.

Enzyme activities
 11. *Enzyme activities*
 12. *Enzyme activities*
 13. *Enzyme activities*
 14. *Enzyme activities*
 15. *Enzyme activities*
 16. *Enzyme activities*
 17. *Enzyme activities*
 18. *Enzyme activities*
 19. *Enzyme activities*
 20. *Enzyme activities*
 21. *Enzyme activities*
 22. *Enzyme activities*
 23. *Enzyme activities*
 24. *Enzyme activities*
 25. *Enzyme activities*
 26. *Enzyme activities*
 27. *Enzyme activities*
 28. *Enzyme activities*
 29. *Enzyme activities*
 30. *Enzyme activities*
 31. *Enzyme activities*
 32. *Enzyme activities*
 33. *Enzyme activities*
 34. *Enzyme activities*
 35. *Enzyme activities*
 36. *Enzyme activities*
 37. *Enzyme activities*
 38. *Enzyme activities*
 39. *Enzyme activities*
 40. *Enzyme activities*
 41. *Enzyme activities*
 42. *Enzyme activities*
 43. *Enzyme activities*
 44. *Enzyme activities*
 45. *Enzyme activities*
 46. *Enzyme activities*
 47. *Enzyme activities*
 48. *Enzyme activities*
 49. *Enzyme activities*
 50. *Enzyme activities*
 51. *Enzyme activities*
 52. *Enzyme activities*
 53. *Enzyme activities*
 54. *Enzyme activities*
 55. *Enzyme activities*
 56. *Enzyme activities*
 57. *Enzyme activities*
 58. *Enzyme activities*
 59. *Enzyme activities*
 60. *Enzyme activities*
 61. *Enzyme activities*
 62. *Enzyme activities*
 63. *Enzyme activities*
 64. *Enzyme activities*
 65. *Enzyme activities*
 66. *Enzyme activities*
 67. *Enzyme activities*
 68. *Enzyme activities*
 69. *Enzyme activities*
 70. *Enzyme activities*
 71. *Enzyme activities*
 72. *Enzyme activities*
 73. *Enzyme activities*
 74. *Enzyme activities*
 75. *Enzyme activities*
 76. *Enzyme activities*
 77. *Enzyme activities*
 78. *Enzyme activities*
 79. *Enzyme activities*
 80. *Enzyme activities*
 81. *Enzyme activities*
 82. *Enzyme activities*
 83. *Enzyme activities*
 84. *Enzyme activities*
 85. *Enzyme activities*
 86. *Enzyme activities*
 87. *Enzyme activities*
 88. *Enzyme activities*
 89. *Enzyme activities*
 90. *Enzyme activities*
 91. *Enzyme activities*
 92. *Enzyme activities*
 93. *Enzyme activities*
 94. *Enzyme activities*
 95. *Enzyme activities*
 96. *Enzyme activities*
 97. *Enzyme activities*
 98. *Enzyme activities*
 99. *Enzyme activities*
 100. *Enzyme activities*

[illegible][illegible]

Compostagem acelerada (CA) é um sistema de compostagem em que a temperatura do material é elevada artificialmente, por meio de aquecimento externo, para acelerar o processo de transformação da matéria orgânica em húmus. Este sistema é utilizado em diversas situações, como na produção de adubo orgânico, na recuperação de solos degradados e na disposição final de resíduos sólidos urbanos. A CA pode ser realizada de diferentes maneiras, sendo as mais comuns a utilização de câmaras de aquecimento e a utilização de fontes de calor externas, como a queima de resíduos ou a utilização de energia elétrica.

2014年12月15日

© 2002 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 252: 499–506

Received 10 April 2002; accepted 10 May 2002

Correspondence: Dr M. J. Griffin, Department of Internal Medicine, University of Michigan, 1600 Hill Street, Ann Arbor, MI 48106-0616, USA (fax: +1 734 763 2100; e-mail: griffin@umich.edu).

© 2002 Blackwell Science Ltd

[illegible]

Задача 1. Изобразите графиками функции $y = \sin(x)$ и $y = \cos(x)$ на отрезке $[0, 2\pi]$. Укажите значения функции в точках $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2, 2\pi$.
Решение. Функция $y = \sin(x)$ — синус, функция $y = \cos(x)$ — косинус. Их графики — синусоида и косинусоида. Значения функций в указанных точках: $\sin(0) = 0, \sin(\pi/2) = 1, \sin(\pi) = 0, \sin(3\pi/2) = -1, \sin(2\pi) = 0$; $\cos(0) = 1, \cos(\pi/2) = 0, \cos(\pi) = -1, \cos(3\pi/2) = 0, \cos(2\pi) = 1$.

Задача 2. Решите уравнение $\sin(x) = 0.5$ на отрезке $[0, 2\pi]$.
Решение. Пусть $\sin(x) = 0.5$. Тогда $x = \arcsin(0.5)$ или $x = \pi - \arcsin(0.5)$. Значит, $x = \pi/6$ или $x = 5\pi/6$. Ответ: $x = \pi/6, 5\pi/6$.

Задача 3. Найдите период функции $y = \sin(2x)$.
Решение. Период функции $y = \sin(kx)$ равен $2\pi/k$. В данном случае $k = 2$, поэтому период равен π .

Задача 4. Найдите производную функции $y = \sin(x)$.
Решение. Производная функции $y = \sin(x)$ равна $y' = \cos(x)$.

Задача 5. Найдите производную функции $y = \cos(x)$.
Решение. Производная функции $y = \cos(x)$ равна $y' = -\sin(x)$.

Задача 6. Найдите производную функции $y = \sin(2x)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = \cos(2x) \cdot 2 = 2\cos(2x)$.

Задача 7. Найдите производную функции $y = \cos(2x)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = -\sin(2x) \cdot 2 = -2\sin(2x)$.

Задача 8. Найдите производную функции $y = \sin(x^2)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = \cos(x^2) \cdot 2x = 2x\cos(x^2)$.

Задача 9. Найдите производную функции $y = \cos(x^2)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = -\sin(x^2) \cdot 2x = -2x\sin(x^2)$.

Задача 10. Найдите производную функции $y = \sin(\sqrt{x})$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = \cos(\sqrt{x}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{\cos(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}}$.

Задача 11. Найдите производную функции $y = \cos(\sqrt{x})$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = -\sin(\sqrt{x}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = -\frac{\sin(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}}$.

Задача 12. Найдите производную функции $y = \sin(x^3)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = \cos(x^3) \cdot 3x^2 = 3x^2\cos(x^3)$.

Задача 13. Найдите производную функции $y = \cos(x^3)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = -\sin(x^3) \cdot 3x^2 = -3x^2\sin(x^3)$.

Задача 14. Найдите производную функции $y = \sin(x^2 + 1)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = \cos(x^2 + 1) \cdot 2x = 2x\cos(x^2 + 1)$.

Задача 15. Найдите производную функции $y = \cos(x^2 + 1)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = -\sin(x^2 + 1) \cdot 2x = -2x\sin(x^2 + 1)$.

Задача 16. Найдите производную функции $y = \sin(x^2 - 1)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = \cos(x^2 - 1) \cdot 2x = 2x\cos(x^2 - 1)$.

Задача 17. Найдите производную функции $y = \cos(x^2 - 1)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = -\sin(x^2 - 1) \cdot 2x = -2x\sin(x^2 - 1)$.

Задача 18. Найдите производную функции $y = \sin(x^2 + x)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = \cos(x^2 + x) \cdot (2x + 1) = (2x + 1)\cos(x^2 + x)$.

Задача 19. Найдите производную функции $y = \cos(x^2 + x)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = -\sin(x^2 + x) \cdot (2x + 1) = -(2x + 1)\sin(x^2 + x)$.

Задача 20. Найдите производную функции $y = \sin(x^2 - x)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = \cos(x^2 - x) \cdot (2x - 1) = (2x - 1)\cos(x^2 - x)$.

Задача 21. Найдите производную функции $y = \cos(x^2 - x)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = -\sin(x^2 - x) \cdot (2x - 1) = -(2x - 1)\sin(x^2 - x)$.

Задача 22. Найдите производную функции $y = \sin(x^2 + 2x)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = \cos(x^2 + 2x) \cdot (2x + 2) = (2x + 2)\cos(x^2 + 2x)$.

Задача 23. Найдите производную функции $y = \cos(x^2 + 2x)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = -\sin(x^2 + 2x) \cdot (2x + 2) = -(2x + 2)\sin(x^2 + 2x)$.

Задача 24. Найдите производную функции $y = \sin(x^2 - 2x)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = \cos(x^2 - 2x) \cdot (2x - 2) = (2x - 2)\cos(x^2 - 2x)$.

Задача 25. Найдите производную функции $y = \cos(x^2 - 2x)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = -\sin(x^2 - 2x) \cdot (2x - 2) = -(2x - 2)\sin(x^2 - 2x)$.

Задача 26. Найдите производную функции $y = \sin(x^2 + 3x)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = \cos(x^2 + 3x) \cdot (2x + 3) = (2x + 3)\cos(x^2 + 3x)$.

Задача 27. Найдите производную функции $y = \cos(x^2 + 3x)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = -\sin(x^2 + 3x) \cdot (2x + 3) = -(2x + 3)\sin(x^2 + 3x)$.

Задача 28. Найдите производную функции $y = \sin(x^2 - 3x)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = \cos(x^2 - 3x) \cdot (2x - 3) = (2x - 3)\cos(x^2 - 3x)$.

Задача 29. Найдите производную функции $y = \cos(x^2 - 3x)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = -\sin(x^2 - 3x) \cdot (2x - 3) = -(2x - 3)\sin(x^2 - 3x)$.

Задача 30. Найдите производную функции $y = \sin(x^2 + 4x)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = \cos(x^2 + 4x) \cdot (2x + 4) = (2x + 4)\cos(x^2 + 4x)$.

Задача 31. Найдите производную функции $y = \cos(x^2 + 4x)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = -\sin(x^2 + 4x) \cdot (2x + 4) = -(2x + 4)\sin(x^2 + 4x)$.

Задача 32. Найдите производную функции $y = \sin(x^2 - 4x)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = \cos(x^2 - 4x) \cdot (2x - 4) = (2x - 4)\cos(x^2 - 4x)$.

Задача 33. Найдите производную функции $y = \cos(x^2 - 4x)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = -\sin(x^2 - 4x) \cdot (2x - 4) = -(2x - 4)\sin(x^2 - 4x)$.

Задача 34. Найдите производную функции $y = \sin(x^2 + 5x)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = \cos(x^2 + 5x) \cdot (2x + 5) = (2x + 5)\cos(x^2 + 5x)$.

Задача 35. Найдите производную функции $y = \cos(x^2 + 5x)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = -\sin(x^2 + 5x) \cdot (2x + 5) = -(2x + 5)\sin(x^2 + 5x)$.

Задача 36. Найдите производную функции $y = \sin(x^2 - 5x)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = \cos(x^2 - 5x) \cdot (2x - 5) = (2x - 5)\cos(x^2 - 5x)$.

Задача 37. Найдите производную функции $y = \cos(x^2 - 5x)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = -\sin(x^2 - 5x) \cdot (2x - 5) = -(2x - 5)\sin(x^2 - 5x)$.

Задача 38. Найдите производную функции $y = \sin(x^2 + 6x)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = \cos(x^2 + 6x) \cdot (2x + 6) = (2x + 6)\cos(x^2 + 6x)$.

Задача 39. Найдите производную функции $y = \cos(x^2 + 6x)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = -\sin(x^2 + 6x) \cdot (2x + 6) = -(2x + 6)\sin(x^2 + 6x)$.

Задача 40. Найдите производную функции $y = \sin(x^2 - 6x)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = \cos(x^2 - 6x) \cdot (2x - 6) = (2x - 6)\cos(x^2 - 6x)$.

Задача 41. Найдите производную функции $y = \cos(x^2 - 6x)$.
Решение. По формуле дифференцирования сложной функции: $y' = -\sin(x^2 - 6x) \cdot (2x -$

[illegible][illegible]

Полученные значения и/или результаты

Относительные значения концентрации бензопирена можно получать при использовании калибров, выполненных с калибраторами DAU Negative Calibrator, DAU Benzopyrene Cut-off Multi-drug Calibrator, DAU Primary Cut-off Multi-drug Calibrator, DAU Intermediate Multi-drug Calibrator и DAU High Multi-drug Calibrator.

При интерпретации результатов количественного измерения важно особенно внимательно рассмотреть другие факторы, влияющие на результаты в моче, например, такие как порывание мочи и другие физиологические факторы.

Положительный результат следует подтверждать более специфическим методом, основанным на аналитическом значимом процессе. В качестве подтверждающего метода можно использовать не GC/MS технологию, но GC/MS является основным методом, так как является наиболее точной подтверждающей технологией для всех наркотиков. Используя данный метод, можно получить наиболее достоверные результаты.

Основные значения

Результаты должны быть всегда интерпретированы относительно точной оценки (cut-off, $\leq 200 \text{ мкг/л}$) или 300 мкг/л

Специфические характеристики

Данные, приведенные в этом параграфе, получены при измерении на калибраторах BenzoPen Cut-off серии AU. Характеристики приведенные только в этой лаборатории могут отличаться от приведенных ниже.

Воспроизводимость

Стабильные результаты получены при измерении на AU640 с использованием калибров DAU Primary и BenzoPen Cut-off Multi-drug Calibrator и 2-х уровней контроля, соответствующих $\pm 25\%$ соответствующей точки отсчета. Каждый пробирка анализировалась шесть раз в течение 10 дней на протяжении 5-ти дней.

Коэффициент оценки воспроизводимости

n = 60 мкг/л	Среднее значение, мкг/л	Станд. откл.	Внутренняя серия SD	Коэф. вариации (CV %)	Станд. откл. SD	Общая Коэф. вариации (CV %)
150	224	3.7	1.1	1.1	8.6	3.0
220	246	3.6	1.0	0.9	9.0	2.8
250	373	3.4	0.9	0.9	10.4	2.8
225	346	6.8	1.7	1.7	14.3	4.1
300	315	3.8	1.0	1.0	18.3	4.1
370	401	4.1	1.0	1.0	15.7	5.9

Полученные значения оценки воспроизводимости

n = 60 мкг/л	Среднее значение, мкг/л	Станд. откл.	Внутренняя серия SD	Коэф. вариации (CV %)	Станд. откл. SD	Общая Коэф. вариации (CV %)
150	147	7.0	4.8	4.8	8.4	6.4
220	167	6.8	3.8	3.8	10.3	5.8
250	200	9.0	3.9	3.9	11.9	4.3
225	194	8.9	3.8	3.8	11.0	5.7
300	281	11.3	4.0	4.0	23.2	8.3
370	406	22.2	6.5	6.5	30.8	7.8

Коррелиция

Для сравнения данных наборов реагентов для определения уровня серурии наркотиков доступным набором использовались моча пациентов. Группы с положительными результатами использовались подтверждающим методом GC/MS. Результаты анализа следующие:

Сравнительный серийный метод	Точка отсечения 200 мкг/л Коэффициент оценки		Сравнительный А сериальный метод	Точка отсечения 300 мкг/л Коэффициент оценки	
	44	0		40	0
	0	83		0	93
Сравнительный серийный метод	Точка отсечения 200 мкг/л Полученные значения оценки		Сравнительный А сериальный метод	Точка отсечения 300 мкг/л Полученные значения оценки	
	44	0		40	0
	0	83		0	93

Чувствительность

Самое низкое обнаруживаемое значение (LOL) соответствует самому низкому измеренному значению материала, отличному от нуля. Низкий предел чувствительности рассчитывается как абсолютное среднее значение плюс три стандартных отклонения при 25-ти пробном измерении отрицательного калибратора (Negative Calibrator).

Точка отсечения	LOL, мкг/л (интервал AU640)
200 мкг/л	2.6
300 мкг/л	4.1

Влияющие факторы

Следующие вещества в случае их введения в пробу в увеличенном или уменьшенном количестве, соответствующем их нормальному эндogenous количеству в моче, при проведении анализа с помощью набора реагентов BenzoPen Cut-off (Бензопирен) влияют на результаты (полученные значения отличаются от стандартных менее чем на 10%):

Вещество	Концентрация	Вещество	Концентрация
Амфетамин	$\leq 10 \text{ г/л}$	Синтетический альфа-метил-тиопропан	$\leq 3 \text{ г/л}$
Аспирин/иные анальгетики	$\leq 1.5 \text{ г/л}$	Синтетический альфа-метил-тиопропан	$\leq 5 \text{ г/л}$

Препараты	≤ 6 мг	Щедрый эффект	≤ 1 мг
Эпидур	≤ 10 мг	Рыболов	≤ 78 мг
Галасея	≤ 100 мг	Хлопчатое	≤ 60 мг
Углоули	≤ 5 мг	Монета	≤ 40 мг
Глоули	≤ 30 мг		

Другие препараты имеют факторы, не указанные в приведенном перечне, могут иметь не ТЭС и быть при этом хорошим результатом (например, темные или желтые таблетки).

Сведения о товаре

При покупке препаратов: проверьте серийный и контрольный номера Вспомогательных (Вспомогательных) при покупке отклонен 300 мкг были получены следующие данные по параметрам качества:

Содержимое	Среднее значение (мкг)	% отклонений (мкг)
Амфетамин	300	100
Амфетамин	138	205
α-ОН-Амфетамин	163	168
Бромиды	300	119
Хлориды	2064	13
Клей	400	62
Клей	180	140
Клей	325	84
Детергент	180	184
Детергент	1800	14
Детергент/фториды	138	210
Детергент	110	247
Детергент	120	228
Фториды	168	138
Фториды	180	188
Галасея	200	145
Лоразепам	208	122
Лоразепам гидрохлорид	10 000	1
Лоразепам	103	105
Амфетамин	200	136
Нордентин	168	211
Система	278	107
Система гидрохлорид	10 000	1
Система	10 000	2
Глоули	180	184
Глоули	178	144
Глоули гидрохлорид	10 000	1
Глоули	138	181
α-ОН-Глоули	180	105

Структурно-химические препараты при использовании набора (реактивов Вспомогательных (Вспомогательных) детекторов) отклоняются результаты при концентрации, указанных ниже.

Содержимое	Концентрация (мкг)
Амфетамин	500 000
Амфетамин/мелкий	500 000
Амфетамин	100 000
Амфетамин	500 000
Бензилметамин	500 000
Бензилметамин	500 000
Цинк	500 000
Кодон	500 000
Детергент	100 000
БОН	500 000
БОН	100 000
Фториды	500 000
Фториды	500 000
Лоразепам	50 000
Метамин	100 000
Метамин/фториды	500 000
Метамин	100 000
Нордентин	500 000
Нордентин	250 000
Фториды	500 000
Глоули	500 000
Система гидрохлорид	500 000
Система	500 000
Система	280 000
11-мет-α-ТНС-СОН	50 000
Глоули	500 000
Бензилметамин	500 000
Нордентин	

Отмечено

При рассмотрении параметров качества при использовании набора Вспомогательных (Вспомогательных) детекторов, полученные результаты могут не коррелировать с уровнем отдельных компонентов в пробе.

Список в производственных листах

8. Определитель качества: 1. Ссылка, № 000010 или 00003-М 2. Значение, установленное в анализаторе по умолчанию

№

№

№

Call number: 1001.16 ODC8314, ODC8315, ODC8316, ODC8317 = ODC8311
Subject: 1001.16 7141 (1001.16)

References

1. Hsieh RL. Analytical methodology. In: Hsieh RL, Chiang CH, eds. Urine testing for drugs of abuse. NIDA Research Monograph. 1998;73:33-41.
2. Katzung BG, ed. Basic and clinical pharmacology. 8th ed. Norwalk, Conn: Appleton & Lange, 1992.
3. Jelliffe RM. Aspects of drug action. 6th ed. New York, NY: W.H. Freeman & Co, 1982.
4. Goodman and Gilman's The Pharmacological basis of therapeutics. 10th ed. New York, NY: Pergamon Press, 1992.
5. Adams EH. Pharmacokinetics of psychotropic drug abuse. In: From the National Institute on Drug Abuse. NY State J Med (1991;91(suppl 1):324-336.
6. Henderson DR, Friedman BS, Harris JD, et al. CEDIA™, a new homogeneous immunoassay system. Clin Chem (1986; 32: 1637-1641).
7. Deek O, Lefebvre P, et al. Detection of Benzocyclopentyl Urines in Urine Specimens Using a Two-Step Immunoassay. J. Clin. Chem. 1992;38:271-275.
8. Benveniste P, Lefebvre P, Lefebvre S. Effect of α -Glucosidase on Urinary Benzocyclopentyl Concentrations Determined by Fluorescence Polarization Immunoassay. Clin Chem. 1992;38:422-423.
9. Notice of mandatory guidelines for federal workplace drug testing program: Final guidelines. Federal Register 1988;53 (April 1):17693.
10. Toon ND, Beggs J, Zeman RD, Williams J. Recommendations for the reliable detection of BZC drugs in urine in the European Union, with special attention to the workplace. Ann Clin Biochem 1997;34:338-344.
11. United Kingdom laboratory guidelines for legally defensible workplace drug testing. Urine Drug Testing. Ver 1.0, 2001. 95pp.

CE



БАРБИТУРАТЫ (Barbiturates)

QSR6315

2 x 16 мл
2 x
2 x 16 мл
2 x

R1 Буфер
R1 Лисо
R2 Буфер
R2 Лисо

Назначение

Качественное и полуквантитативное ферментативное иммунологическое определение барбитуратов в моче человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики *in vitro*.

Данный метод позволяет получить быстрые предварительные результаты теста. Для подтверждения полученных результатов следует использовать более специфический альтернативный химический метод. В качестве подтверждающего метода предпочтительно использовать метод газовой жидкостной масс-спектрометрии (GC/MS)¹. Потенциальный результат теста любого пациента, полученный альтернативным методом, следует рассматривать в совокупности с другими клиническими данными и заключением специалиста.

Ключевые значения

Барбитураты – группа производных барбитуровой кислоты, обладающая значительным противосудорожным и наркотическим действием, обусловленным угнетающим влиянием на ЦНС. При злоупотреблении барбитуратами, обычно принимаемых в форме таблеток, в более тяжелых случаях зависимость барбитураты растворяют для подкожного введения^{2,3}. Различают барбитураты быстрого и непродолжительного действия, барбитураты среднего и длительного действия⁴. Период полураспада от 20 до 120 часов^{5,6}. Независимо от типа метаболитов барбитуратов присутствуют в клетках печени. Большинство барбитуратов выводится с мочой в виде активных и неактивных метаболитов, некоторые из них выводятся в неизменном виде^{4,8}. Возможность определения барбитуратов в моче зависит от типа действия и составляет период от 30 часов после применения до нескольких недель⁷.

Принцип определения¹

Данный метод основан на использовании бактериального фермента (β-галактозидазы, полученного методом генной инженерии в виде двух неактивных фрагментов. Последние спонтанно соединяются, образуя активный фермент, который в этом конформационном состоянии, расщепляет субстрат, изменяя окраску реакционной среды, что регистрируется фотометрически. В данном методе, наркотик в пробе конъюгирует за счет связывания не активными с одним из неактивных фрагментов β-галактозидазы. При наличии наркотика в пробе, он соединяется с активным. Оставшиеся неактивные фрагменты образуют активный фермент. Если наркотик отсутствует в пробе, активный связывается с неактивным фрагментом, ингибируя, таким образом, соединение неактивных фрагментов и образование активного фермента. Количество активного фермента и, следовательно, изменение абсорбции пропорционально количеству наркотика в пробе.

Состав реагента

R1 Буфер (R1 Буфер) Пиперазин-N,N-бис (2-этаносульфоновая кислота) буфер, 2.2 мМ монохлоридный антипел к барбитуратам, солевой буфер, стабилизатор, консервант.
R1 Лисо (R1 Лисо) 0,171 г/л ферментный ингибитор, солевой буфер, детергент и консервант.
R2 Буфер (R2 Буфер) Пиперазин-N,N-бис (2-этаносульфоновая кислота) буфер, солевой буфер и консервант.
R2 Лисо (R2 Лисо) 17,1 мкг/мл донора фермента конъюгированного с производным барбитурата, 1,67 г/л хлороформ красный, β-D-галактозидаза, солевой буфер, детергент и консервант.

Общая информация

Предупреждение об опасности и сообщении о рисках:
Вреден. Содержит азид натрия. R22: Вреден при попадании внутрь.

Меры безопасности:

S36, S50. Надевайте защитную одежду. Реагенты и тару из-под них необходимо утилизировать без опасных отходов.

Утилизируйте отработанные реакционные материалы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Во избежание возможного отклонения азидосодержащих соединений после срока неразбавленного реагента промывайте канализационные трубы водой.

Дополнительная информация приведена в Паспорте безопасности.

Подготовка реагента

Подготовку растворов проводить, используя холодные реагенты. Доставляйте набор реагентов из холодильника (2...8°C) непосредственно перед процедурой приготовления растворов.

Сначала готовить раствор R2,а потом R1, для того чтобы снизить вероятность возможной контаминации.
R2 (раствор донора фермента).

Содержимое флакона R2 Лисо соединить с буфером из R2 Буфер с помощью одного из прилагаемых адаптеров. Тщательно перемешайте до полного растворения лиофилизированного материала флакона R2 Лисо. После этого

10

версия
2011

11

[illegible]

Eligibility conditions for entry

[illegible][illegible]

Engineering Institute of Technology

Несколько партий графитового порошка, полученного из графитов 2, 3 и 4 (образцы 1-3) подвергались воздействию температуры до 1000°С при скорости нагрева 100°С/мин.

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА:

[illegible]

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОНЯТИЯ «НАЦИОНАЛИЗМ»

Can *Phragmites* be a dominant or co-dominant species in wetlands? ☐ *Phragmites* is a dominant species in wetlands and is a co-dominant species in wetlands.

[illegible]

The report includes companies whose stock is open at least 100,000 shares. Out-of-the-money	
Insider ownership	Ins. %
Out Primary Out-of-the-Money Category	0.000%
Out Secondary Out-of-the-Money Category	0.000%

For more information, contact: info@paulsullivan.com

Manufacturer	Model	Capacity (lb)	Weight (lb)
DAI Industries Corp.	DAI-100	100	100
DAI Industries Corp.	DAI-150	150	150
DAI Industries Corp.	DAI-200	200	200
DAI Industries Corp.	DAI-250	250	250
DAI Industries Corp.	DAI-300	300	300
DAI Industries Corp.	DAI-350	350	350
DAI Industries Corp.	DAI-400	400	400
DAI Industries Corp.	DAI-450	450	450
DAI Industries Corp.	DAI-500	500	500
DAI Industries Corp.	DAI-550	550	550
DAI Industries Corp.	DAI-600	600	600
DAI Industries Corp.	DAI-650	650	650
DAI Industries Corp.	DAI-700	700	700
DAI Industries Corp.	DAI-750	750	750
DAI Industries Corp.	DAI-800	800	800
DAI Industries Corp.	DAI-850	850	850
DAI Industries Corp.	DAI-900	900	900
DAI Industries Corp.	DAI-950	950	950
DAI Industries Corp.	DAI-1000	1000	1000

Средствами, направленными на реализацию мероприятий, предусмотренных в Программе, финансируются также мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры, направленные на реализацию мероприятий, предусмотренных в Программе.

- **Market** is a group of people who are interested in a particular product or service.
- **Target market** is a group of people who are most likely to buy a particular product or service.
- **Marketing strategy** is a plan of action that a company uses to reach its target market.
- **Marketing mix** is a combination of products, prices, places, and promotion that a company uses to reach its target market.
- **Marketing research** is the process of gathering information about a market or target audience.
- **Marketing communication** is the process of conveying information about a product or service to a target audience.
- **Marketing budget** is the amount of money that a company spends on marketing activities.
- **Marketing ROI** is the return on investment for a marketing campaign.
- **Marketing analytics** is the process of measuring and analyzing the results of marketing activities.
- **Marketing automation** is the use of technology to streamline marketing tasks.
- **Marketing attribution** is the process of identifying the source of a sale or lead.
- **Marketing optimization** is the process of improving the performance of marketing activities.
- **Marketing compliance** is the process of ensuring that marketing activities comply with applicable laws and regulations.
- **Marketing ethics** is the study of the moral principles that should guide marketing activities.
- **Marketing sustainability** is the process of ensuring that marketing activities are environmentally and socially responsible.
- **Marketing innovation** is the process of developing new marketing ideas and strategies.
- **Marketing leadership** is the process of guiding a company's marketing efforts.
- **Marketing collaboration** is the process of working with other companies to achieve marketing goals.
- **Marketing partnership** is a relationship between two companies that involves marketing activities.
- **Marketing alliance** is a formal agreement between two companies to work together on marketing activities.
- **Marketing joint venture** is a partnership between two companies that involves creating a new entity to market a product or service.
- **Marketing acquisition** is the process of purchasing another company to gain access to its marketing resources.
- **Marketing divestiture** is the process of selling a company's marketing assets.
- **Marketing merger** is the process of combining two companies into a single entity.
- **Marketing takeover** is the process of purchasing another company to gain control of its marketing activities.
- **Marketing spin-off** is the process of creating a new company from an existing company's marketing assets.
- **Marketing IPO** is the process of selling a company's shares to the public.
- **Marketing recapitalization** is the process of raising new capital for a company's marketing activities.
- **Marketing leveraged buyout** is the process of purchasing a company using debt financing.
- **Marketing private equity** is the process of raising capital from private investors for a company's marketing activities.
- **Marketing venture capital** is the process of raising capital from venture capitalists for a company's marketing activities.
- **Marketing angel investment** is the process of raising capital from individual investors for a company's marketing activities.
- **Marketing crowdfunding** is the process of raising capital from a large number of people for a company's marketing activities.
- **Marketing peer-to-peer financing** is the process of raising capital from other companies for a company's marketing activities.
- **Marketing initial coin offering** is the process of raising capital by selling digital tokens for a company's marketing activities.
- **Marketing security token offering** is the process of raising capital by selling digital tokens that represent shares in a company for a company's marketing activities.
- **Marketing equity crowdfunding** is the process of raising capital from a large number of people for a company's marketing activities.
- **Marketing debt crowdfunding** is the process of raising capital from a large number of people for a company's marketing activities.
- **Marketing peer-to-peer lending** is the process of lending money to other companies for a company's marketing activities.
- **Marketing robo-advisor** is a computer program that provides investment advice for a company's marketing activities.
- **Marketing algorithmic trading** is the process of using computer algorithms to execute trades for a company's marketing activities.
- **Marketing high-frequency trading** is the process of using computer algorithms to execute trades at very high speeds for a company's marketing activities.
- **Marketing dark pool** is a private market for trading securities for a company's marketing activities.
- **Marketing block trade** is the process of executing a large trade for a company's marketing activities.
- **Marketing limit order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better for a company's marketing activities.
- **Marketing market order** is an order to buy or sell a security at the current market price for a company's marketing activities.
- **Marketing stop order** is an order to buy or sell a security when it reaches a specific price for a company's marketing activities.
- **Marketing trailing stop order** is an order to buy or sell a security when it reaches a specific price that moves with the security's price for a company's marketing activities.
- **Marketing stop-limit order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a stop price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing limit-stop order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a limit price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing stop-market order** is an order to buy or sell a security at the current market price after a stop price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing limit-market order** is an order to buy or sell a security at the current market price after a limit price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing stop-limit-market order** is an order to buy or sell a security at the current market price after a stop-limit price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing limit-stop-market order** is an order to buy or sell a security at the current market price after a limit-stop price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing stop-limit-limit order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a stop-limit price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing limit-stop-limit order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a limit-stop price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing stop-limit-stop order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a stop-limit price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing limit-stop-stop order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a limit-stop price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing stop-limit-stop-limit order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a stop-limit price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing limit-stop-stop-limit order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a limit-stop price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing stop-limit-stop-limit-stop order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a stop-limit price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing limit-stop-stop-limit-stop order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a limit-stop price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing stop-limit-stop-limit-stop-limit order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a stop-limit price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing limit-stop-stop-limit-stop-limit order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a limit-stop price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a stop-limit price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing limit-stop-stop-limit-stop-limit-stop order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a limit-stop price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a stop-limit price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing limit-stop-stop-limit-stop-limit-stop-limit order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a limit-stop price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a stop-limit price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing limit-stop-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a limit-stop price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a stop-limit price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing limit-stop-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a limit-stop price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a stop-limit price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing limit-stop-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a limit-stop price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a stop-limit price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing limit-stop-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a limit-stop price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a stop-limit price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing limit-stop-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a limit-stop price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a stop-limit price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing limit-stop-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a limit-stop price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a stop-limit price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing limit-stop-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a limit-stop price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a stop-limit price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing limit-stop-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a limit-stop price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a stop-limit price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing limit-stop-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a limit-stop price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a stop-limit price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing limit-stop-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a limit-stop price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a stop-limit price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing limit-stop-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a limit-stop price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a stop-limit price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing limit-stop-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a limit-stop price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a stop-limit price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing limit-stop-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a limit-stop price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a stop-limit price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing limit-stop-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a limit-stop price is reached for a company's marketing activities.
- **Marketing stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop-limit-stop order** is an order to buy or sell a security at a specific price or better after a stop-limit price is reached for a company

[illegible]

THE

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

The effectiveness of the radio program was evaluated by a questionnaire survey which was sent to 1000 people in the district. The results of the survey are shown in Table 1. The results of the survey show that the radio program was effective in increasing the knowledge of the population about the importance of the radio program and the importance of the radio program in the district.

1. **Introduction**

Blacktop Import handles all asphalt/pavement requirements.
Tonsals stores over 500 yards. Komports DAU Wash-trug Control, OCCA0000
Tonsals stores over 700 yards. Komports DAU Specialty Control, OCCA0000

1

[illegible]

Therapeutic use of Trazodone in depression: positive feedback

Orthodontic space closure constitutes a significant cause of tooth movement and may vary with the mechanism employed, direction of movement, and the type of tooth. The purpose of this study was to determine the effect of orthodontic space closure on the periodontium of the maxillary anterior teeth. The study was conducted in a clinical setting. The subjects were 10 patients who had orthodontic space closure of the maxillary anterior teeth. The patients were divided into two groups: the control group and the study group. The control group consisted of 5 patients who had orthodontic space closure of the maxillary anterior teeth. The study group consisted of 5 patients who had orthodontic space closure of the maxillary anterior teeth. The patients were followed up for 12 months. The results of the study showed that orthodontic space closure of the maxillary anterior teeth had no significant effect on the periodontium of the maxillary anterior teeth. The patients in the control group and the study group had similar periodontal health at the beginning and end of the study.

RESEARCH DESIGN AND METHODS

Received from the Department of Psychiatry, University of California, San Francisco, CA 94143 (Dr. Fennell); and the Department of Psychiatry, University of California, San Francisco, CA 94143 (Dr. Fennell).

[illegible]

THE
WORLD'S
WIDE
WEB

Самостоятельно проанализировав свои результаты по АИД-6 и сопоставив их с данными по ОАУ Primary Care и Study Drug Calculator и ОАУ Secondary Care и Study Drug Calculator и 2-х пунктов анкетой, врач-терапевт составил заключение: 130 % корректно прописал, 100% правильно написал название препарата, 100% правильно написал дозу, 100% правильно написал частоту приема.

Keywords: *Intergroup conflict; intergroup contact; intergroup bias; intergroup cooperation; intergroup competition*

No. of leaf samples	Tropics mean, $\mu\text{g/g}$	Dry tropics		Chile	
		Chile, $\mu\text{g/g}$	leaf, $\mu\text{g/g}$	Chile, $\mu\text{g/g}$	leaf, $\mu\text{g/g}$
16	3.50	1.0	1.0	1.0	1.0
200	2.60	4.8	1.3	1.6	1.6
200	2.60	4.0	1.0	1.0	1.0
200	2.60	3.0	1.0	1.0	1.0
200	2.60	3.0	0.8	1.0	1.0
200	2.60	3.0	0.7	1.0	1.0
275	4.00	3.2	0.7	1.0	1.0

They're making what is known as a "green" investment

Year	Cognitive symptoms, mean (SD)	Behavioral symptoms		Observed	
		Cognitive score	Mean composite IQ	Cognitive score	Mean composite IQ
1980	16.5	5.3	74	6.7	74
1981	16.5	7.4	74	7.7	74
1982	16.5	6.7	74	7.7	74
1983	16.5	6.7	74	6.7	74
1984	16.5	6.7	74	6.7	74
1985	16.5	6.7	74	6.7	74
1986	16.5	6.7	74	6.7	74
1987	16.5	6.7	74	6.7	74
1988	16.5	6.7	74	6.7	74
1989	16.5	6.7	74	6.7	74
1990	16.5	6.7	74	6.7	74
1991	16.5	6.7	74	6.7	74
1992	16.5	6.7	74	6.7	74
1993	16.5	6.7	74	6.7	74
1994	16.5	6.7	74	6.7	74
1995	16.5	6.7	74	6.7	74
1996	16.5	6.7	74	6.7	74
1997	16.5	6.7	74	6.7	74
1998	16.5	6.7	74	6.7	74
1999	16.5	6.7	74	6.7	74
2000	16.5	6.7	74	6.7	74
2001	16.5	6.7	74	6.7	74
2002	16.5	6.7	74	6.7	74
2003	16.5	6.7	74	6.7	74
2004	16.5	6.7	74	6.7	74
2005	16.5	6.7	74	6.7	74
2006	16.5	6.7	74	6.7	74
2007	16.5	6.7	74	6.7	74
2008	16.5	6.7	74	6.7	74
2009	16.5	6.7	74	6.7	74
2010	16.5	6.7	74	6.7	74
2011	16.5	6.7	74	6.7	74
2012	16.5	6.7	74	6.7	74
2013	16.5	6.7	74	6.7	74
2014	16.5	6.7	74	6.7	74
2015	16.5	6.7	74	6.7	74
2016	16.5	6.7	74	6.7	74
2017	16.5	6.7	74	6.7	74
2018	16.5	6.7	74	6.7	74
2019	16.5	6.7	74	6.7	74
2020	16.5	6.7	74	6.7	74

Copyright Clearance Center

[illegible]

		Точка остановки 300 мкл Качественный анализ				Точка остановки 300 мкл Качественный анализ	
Средственный серийный метод	+	75	0	Средственный серийный метод	+	87	0
	-	1*	88		-	0	81

* Это время было измерено методом ОСАРБ, и концентрация амфотерицина в ней была 318 мкг/л

Точка остановки 200 мкл Полуквантитативный анализ		Точка остановки 300 мкл Полуквантитативный анализ			
Средственный серийный метод	74	0	Средственный серийный метод	86	0
	0	88		0	81

Чувствительность

Самое низкое определяемое значение (LOL) соответствует самому низкому измеримому значению барбитурата, измеренному от нуля. Нижний предел чувствительности рассчитывается как абсолютное среднее значение плюс три стандартных отклонения при 25-кратном измерении отрицательного калибратора (Negative Calibration).

Угнетение	LOL - минимальная концентрация
200 мкг/л	13
300 мкг/л	23

Внешние факторы

Следующие вещества в случае их внесения в пробу в указанных или более высоких концентрациях, соответствующих или нормальным или повышенным концентрациям в моче, при проведении анализа с помощью набора реагентов Barbiturates (Барбитураты) не влияют на результаты (полученные значения отличаются от исходных менее чем на 10%):

Вещество	Концентрация	Вещество	Концентрация
Азиды	≤ 18 г/л	Самородный	≤ 3 г/л
Аспирин	≤ 15 г/л	Самородный	≤ 5 г/л
Валериана	≤ 5 г/л	Шалфей лекарственный	≤ 1 г/л
Ванillin	≤ 10 г/л	Глицерин	≤ 75 г/л
Глицерин	≤ 100 г/л	Хлороформ	≤ 60 г/л
Глицерин	≤ 5 г/л	Мочевина	≤ 20 г/л
Глицерин	≤ 18 г/л		

Другие вещества или факторы, не указанные в приведенном списке, могут влиять и быть причиной ложных результатов (фальшив, ложноположительные или ложноотрицательные реакции).

Специфичность

Следующие препараты и метаболиты при использовании набора реагентов Barbiturates (Барбитураты) в протоколе с точкой остановки 200 мкл/л показали следующие результаты пороговой реактивности:

Соединение	Средняя концентрация (мкг/л)	% пороговой реактивности
Самородный	200	100
Амфотерицин	207	100
Амфотерицин	188	90
Амфотерицин	1800	18
Бутаминон	186	78
Бутаминон	213	82
Цитралинобарбитал	180	115
Пентобарбитал	270	88
Фенитоин	195	83
Таблетки	130	100

Структурно несвязанные (препараты при использовании набора реагентов Barbiturates (Барбитураты) в протоколе с точкой остановки 200 мкл/л и продемонстрировали отрицательные результаты при концентрации, указанной ниже:

Соединение	Концентрация (мкг/л)
Амфотерицин	500 000
Амфотерицин	500 000
Амфотерицин	100 000

10

0.0000
200 м

0.00

Кровь следует брать утром и натощак, так как в течение дня уровень глюкозы может снижаться на 30%.³

ПРЕИМУЩЕСТВА АНАЛИЗА

См. Руководство Reader Guide и соответствующую инструкцию для конкретного типа пробы.

КАЛИБРОВОЧКА

Будьтем Салвайтс (кат. № 66300)

Значение калибратора проставляется до до Стендарт (БНМ) 637 Национального Института Стандартов и Технологий (NIST)

Калибратору следует проводить каждые 14 дней или при следующих условиях:

Смена персонала с различным или существенное изменение значений контроля;

Проведение профилактического обслуживания анализатора или замена датчика улаи прибора.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Можно использовать контроль (кат. № 1005003 и 1005004) или другие контрольные материалы со значениями, установленными для данной модели анализатора Beckman Coulter. Каждый лабораторный отделение должно проводить контроль качества еженедельно, сериям, который лабораторией принятой в качестве на внешнее изменение качества с помощью пилотных и после проведения калибровки.

Полученные в отдельной лаборатории результаты могут отличаться от лабораторного значения. Следует рекомендовать лабораторию для каждого анализа устанавливать свои средние значения и оптимальный специфического контроля, на основании международного измерения по установленным правилам. Эти средние значения не должны выходить за пределы соответствующей границы интервалов, приведенных в соответствующей справочнике.

При обнаружении какого-либо трендов или изменений значений контроля качества или значений эталонной его значений, требуется на аналитическом уровне измерения. Каждый лаборатория следует разработать планы действий на тот случай, если результаты измерения контроля качества выйдут за установленные пределы.

РАСЧЕТ

Анализаторы Beckman Coulter серию AU автоматическим рассчитывают ПКСО в каждой пробе.

Рабочие диапазоны значений⁴

Возраст 27,8–82,6 месяцев (165–395 лет)

Однородные измерения могут изменяться в зависимости от возраста, пола, типа пробы, диеты и географического местоположения. В соответствии с общепринятой лабораторной практикой каждой лабораторией следует определять собственные референсные значения. При постановке диагноза результаты измерения следует рассматривать вместе с данными истории болезни и другими лабораторными исследованиями.

Специфические характеристики

Диагноз, подтверждающий в виде картриджа, получаемый при измерениях на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Характеристики проведения теста в разных лабораториях могут отличаться от приведенных ниже.

Линейность

Диагностическая линейность соответствует значению концентрации 10–100 ммоль/л (55–550 мкг/л).

Воспроизводимость

Следующие результаты получены при измерениях на AU2700 5-х калибровочных путей в течение 30-ти дней

Среднее значение, ммоль/л	Внутренняя ошибка		Систематическая ошибка	
	Средн. откл. (SD)	Внутр. коэффициент вариации (CV) %	Средн. откл. (SD)	Внутр. коэффициент вариации (CV) %
24,59	0,64	2,6	0,62	2,5
36,57	0,39	1,1	0,44	1,2
72,64	0,47	0,6	0,73	1,0

Чувствительность

Нижний предел чувствительности, установленный на анализаторе AU2700, составляет 2,30 ммоль/л

Этот предел определяется при минимальном измеренном значении ПКСО, отличное от нуля. Нижний предел чувствительности рассчитывается как абсолютное среднее значение плюс три стандартных отклонения при 28-ти кратном измерении образца в пробирке без исследуемого вещества.

Корреляция

При сравнении данных диагностического набора реактивов для определения ПКСО с реактивами AU440 с другими коммерчески доступными наборами реактивов для определения ПКСО использовались сыроватки пациентов. Результаты линейного регрессионного анализа следующие:

$$y = 0,88x + 1,959 \quad r = 0,982 \quad y = 0,91x \quad \text{Диагностическая ошибка} = 11,21 - 78,63 \text{ ммоль/л}$$

Влияющие факторы

В исследованиях, проводимых с целью оценки чувствительности метода и влияющих на результаты факторов, получены следующие результаты:

Интерференция: Влияние менее 5% при значениях концентрации до 40 ммоль/л или до 504 ммоль/л

Гематокрит: Влияние менее 10% при значениях гематокрита до 2 г/л

Липемия: Влияние менее 5% при значениях липидов (фаттеринг) до 1000 мг/л

Полную информацию по влияющим факторам можно найти в справочнике Young.⁵

Способы и вводимые анализы

3. Определенные пользователи: а. Значения, установленные в анализаторе по умолчанию.

1. Будет Салвайтс кат. № 66300

2. Значения установлены для единиц СИ (ммоль/л). При работе в единицах «мг/дл», значения следует умножить на 0,565

REFERENCES

1. Tietz NW, ed. Clinical guide to laboratory tests, 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company; 1995:570-577.
2. Fotherick VP, Klee GS. Biochemical aspects of hematology. In: Burke CA, Ashwood ER, eds. Tietz textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company; 1998:1780-1783.
3. Vito J, Henry JB. Metabolic intermediates and haptoglobin test. In: Henry JB, ed. Clinical diagnosis and management by laboratory methods. Philadelphia: WB Saunders Company; 1998:189-193.
4. Ernst W, Hefvy RJ, Solovitz Y, Taylor D, Vilmer H, Zurek S, et al. Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. JPOCCL. 2005;1: Rev 2:58pp.
5. Parvitz G. Iron and total iron binding capacity. In: Kaplan LA, Pesce AJ, eds. Clinical chemistry: theory, analysis, and correlation. St Louis: Mosby; 1996:714pp.
6. Data on file at Beckman Coulter Biomedical Ltd.
7. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACN Press; 2000.

CE

RL101

BLD08042001
0000-00

Metabolite



**BECKMAN
COULTER.**

КРЕАТИНИН (ЭНЗИМАТИЧЕСКИЙ) (CREATININE (ENZYMATIC))

OSB61204

**4 x 45 мЛ
4 x 15 мЛ**

**R1
R2**

ИЗНАЧЕНИЕ

Энзиматический тест для ферментативного определения креатинина в сыворотке, оптимизированный для использования на анализаторе Beckman Coulter серии AL. Только для диагностики in vitro.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ^{1,2,3}

Креатинин является продуктом метаболизма креатина и фосфокреатина, которые присутствуют только в мышцах. Поэтому образование креатинина пропорционально мышечной массе и является практически постоянным.


Измерение креатинина используется в диагностике и оценке нефронной функции, а также для мониторинга почечного dialyза. Однако сывороточный креатинин не чувствителен к ранним изменениям почечной функции и расширяет постарительное увеличение, чем изменение уровня (BUN) при гемодиализе во время лечения почечной недостаточности. Как креатинин в сыворотке, так и мочевины используются при дифференциальной диагностике прerenальной и постренальной (обструктивной) азотемии. Повышение уровня мочевины в сыворотке без соответствующего увеличения креатинина в сыворотке является ключевым в диагностике прerenальной азотемии. В случае прerenальной азотемии, когда имеет место обструкция, интоксикация, при отравлении, нефрогенная и почечная недостаточность, будет увеличен как уровень сывороточного креатинина, так и его уровень в моче; в этих случаях увеличение мочевины не пропорционально больше, чем ее увеличение в сыворотке и/или моче.

Уровень сывороточного креатинина зависит от возраста, веса тела и пола пациента. У людей пожилого уровня креатинина встречаются у лиц с относительно малой мышечной массой, у больных с ожирением, у больных с анатомическими изменениями почек и/или мочевыводящих путей. Нормальные значения сывороточного креатинина на основании увеличения функции почек.

ПРИНЦИП ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Креатинин гидролизуются креатининазой до креатина. Образовавшийся креатин гидролизуются креатининазой до глицина и мочевины. Свободная мочевина катализируется ферментативным комплексом из глицина, формальдегида и пероксида водорода. В присутствии пероксида водорода (H₂O₂) инициатором реакции окислительного азидирования (H₂O₂-азидирование) 3-нитро-5-нитрогена (NMP) и 4-азидогидроксида до образования розового пигмента. Концентрация креатинина прямо пропорциональна количеству азидов при 600/700 нм.

СХЕМА РЕАКЦИИ



СОСТАВ

Концентрация в разведенном растворе	
Буфер (300 г)	50 ммоль/л
Креатининаза	66,3 МЕ/мл
Свободная мочевина	10 МЕ/мл
NMP	0,05 ммоль/л
Креатининаза	100 МЕ/мл
Пероксидаза	12,5 ЕД/мл
4-Азидогидроксилаза	1,83 ммоль/л
Консервант	

Общие предостережения

Соблюдать все меры предосторожности, применяемые при работе с лабораторными реагентами. Во избежание возможного загрязнения окружающей среды содержимое флакона реагента помещать в специально предназначенные для этого контейнеры. Утилизировать реакционные материалы в соответствии с требованиями санитарно-экологического и экологического контроля.

Подготовка реагента

Реагент готов к использованию и может быть непосредственно установлен в анализатор.

Хранение и стабильность

Несколько реактивов стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реактивы стабильны 60 дней при хранении в анализаторе.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Сыворотка и плазма (матрица) в сыворотке и плазме креатинина стабильны в течение 7-ми дней при температуре хранения 2-8°C.⁴

Моча: собирать мочу следует без использования консервантов, хранить при 2-8°C.⁴

R101

BC-0896-204 01
1000-01

Матрица

ПОСРЕДСТВЕНАЯ АНАЛИТИКА

См. Руководство пользователя и соответствующее руководство по конкретным исследованиям.

КАЛИБРОВКА

Используйте калибратор Becton Dickinson (или другой) для определения концентрации в сыворотке и плазме, а для определения концентрации в моче – калибратор Urine Calibration (или Becton Dickinson).
Значения калибратора для калибровки в сыворотке предоставляются по (IMM) методу (Умное спектрометрия с автоматическим разбавлением) через стандартный референсный материал (SRM) 967 Национального института стандартов и технологий (NIST).
Значения калибратора для калибровки в моче предоставляются по (IMM) методу.
Калибратор следует проверять каждые 14 дней для сывороточных тестов и каждые 30 дней – для мочевых, или при следующем условии:
Смена серийного номера реактивов или существенное изменение значений контролей.
Процедура профилактического обслуживания анализатора или замена любого угла прибора.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Именно использовать контрольные сыворотки (или № CDC0003 и CDC0004) или другие контрольные материалы со значениями, установленными для данной модели анализатора Becton Dickinson.
При исследовании можно использовать контроли Biorad Liquidcheck Urine Chemistry Controls (или № 297 и 396) или другие контрольные материалы со значениями, установленными для данной модели анализатора Becton Dickinson.
Каждая лаборатория определяет частоту проведения контроля качества сывороточных, мочевых, каловых лабораторных препаратов считая на основании измерения вклада в пробную нагрузку и после проведения калибровки.
Полученные в отдельной лаборатории результаты могут отличаться от лабораторного значения. Пользователь рекомендует лаборатории для каждого анализа устанавливать свои собственные значения и отклонения стандартного контроля, на основании внутреннего контроля на установленные значения. Эти средние значения не должны выходить за пределы соответствующей прецедентной интервалов, присланных в соответствии с протоколом.
При обнаружении каких-либо отклонений в компонентах (внутренний контроль качества или анализатор отклонений или значений, проверка всех аналитических этапов измерения). Каждая лаборатория должна разработать план действий на тот случай, если результаты измерения контроля качества выйдут за установленные пределы.

РЕЗУЛТАТЫ

Анализаторы Becton Dickinson серии AU автоматически рассчитывают концентрацию креатинина в каждой пробе.

РЕФЕРЕНСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Сыворотка/плазма*	0.4–1.04 ммоль/л (0.72–1.78 мг/дл)
Мужчины	48–80 ммоль/л (0.55–1.02 мг/дл)
Женщины	22–40 ммоль/л (0.25–1.01 мг/дл)
Новорожденные	11–34 ммоль/л (0.15–0.37 мг/дл)
Младенцы (2 месяца – < 2 лет)	21–85 ммоль/л (0.24–0.73 мг/дл)
Дети (3 – < 16 лет)	

Моча*

Мужчины	124–230 ммоль/сут (14–26 ммоль/сут)
Женщины	97–177 ммоль/сут (11–20 ммоль/сут)

Средние значения могут варьировать в зависимости от возраста, пола, тела пробы, диеты и географического местоположения. В соответствии с общепринятой лабораторной практикой каждой лаборатории следует отразить собственные референсные значения. При постановке диагноза результаты всегда следует рассматривать вместе с данными истории болезни и другими диагностическими исследованиями.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧНОСТЬ

Данные, приведенные в этой таблице, получены при измерении на анализаторах Becton Dickinson серии AU. Характеристики проведения теста в каждой лаборатории могут отличаться от приведенных ниже.

Линейность

Диапазон линейности соответствует значениям концентрации креатинина 4.4–42.8 ммоль/л (0.05–50.0 мг/дл) для сыворотки и плазмы. Диапазон линейности соответствует значениям концентрации креатинина 8–44.280 ммоль/л (1–600 мг/дл) для мочи.

Воспроизводимость

Ситуационные результаты получены при измерении на AU2700 5-х типов мочи в течение 20-ти дней.

n = 80	Внутренний контроль		Общий	
Среднее значение, ммоль/л	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)
42.1	0.7	1.2	1.4	2.3
100.2	1.2	0.6	2.9	1.8
204.3	0.7	0.7	14.0	1.6

Ситуационные результаты получены при измерении на AU2700 5-х типов мочи в течение 20-ти дней.

n = 80	Внутренний контроль		Общий	
Среднее значение, ммоль/л	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)
23.6	37	1.6	91	2.2
102.1	111	1.3	189	2.2
18.148	189	1.1	331	2.2

Чувствительность

Нижний предел чувствительности, установленный на анализаторе AU900 для сыворотки, составляет 0.08 ммоль/л; предел Бланка = 0.11 ммоль/л.

Нижний предел чувствительности, установленный на анализаторе AU900 для мочи, составляет 13.5 ммоль/л; предел Бланка = 3.1 ммоль/л. Это значение определяется в соответствии с HSCCLB протоколом EP17-A* в пропорции: только положительный результат выше 5% и только определяемый выше 0%, на основании 180 измерений, один из которых – 60 измерений Бланка, а 120 проб с низкой концентрацией.

Корреляция

Для сравнения набора референсов Creatinine (Единицы) (Креатинин ферментативный) CB691204 на анализаторе AU2700 использовался другой набор референсов доступный набор референсов ферментативного креатинина. Результаты референсного референсного анализа следующие:

n = 1,014n = 1,169	r = 1.000	n = 237	Диапазон значений в пробе: 12.4–1986 ммоль/л
--------------------	-----------	---------	--

При сравнении данных референсного набора референсов для определения креатинина в моче CB691204 на анализаторе AU2700 с другим набором референсов доступный набор референсов для ферментативного креатинина (референсный материал (IMM) референсный материал), использовался еще один набор. Результаты референсного референсного анализа следующие:

y = 0.000x – 184.677	r = 0.997	n = 151	Диапазон значений в пробе: 757–7673 ммоль/л
R, коэффициент корреляции			
R, коэффициент корреляции			

Вспомогательные факторы

В лабораторных условиях, проводимых с целью оценки чувствительности метода с помощью вспомогательных факторов, получены следующие результаты:

Пигменты	Всплеск менее 10% при значении пигментов (фториметр [®]) до 1000 мкг/л
Интерференция	Всплеск менее 7% при значении билирубина до 40 мкг/л или до 154 ммоль/л
Гемоглобин	Всплеск менее 5% при значении гемоглобина до 6 г/л
Аскорбиновая кислота	Всплеск менее 1%, при значении аскорбиновой кислоты до 20 мкг/л
Креатин	Всплеск составляет менее 5% при значении креатина до 30 мкг/л

В исследованиях in vivo, проводившихся с целью оценки чувствительности метода с помощью вспомогательных факторов, получены следующие результаты:

Интерференция	Всплеск менее 5%, при значении гемоглобина до 30 мкг/л
Аскорбиновая кислота	Всплеск менее 5% при значении аскорбиновой кислоты до 20 мкг/л
Гемоглобин	Всплеск менее 5% при значении гемоглобина до 3000 мкг/л

В очень редких случаях наличие моноуксигенированного гемоглобина (оксидированного гемоглобина) может быть причиной неточности результатов.

Подробнее информацию по вспомогательным факторам можно найти в справочнике "Truing".⁸

Свойства и программные пакеты

- ⁸ Определенная польза от использования: а) Значения, установленные в справочнике по ускоренным;
- ⁹ Analyser Calibrator (part No 01306) / Urine Calibrator (part No 000020).
- ¹⁰ Значения установлены для модели СИ (модель 10). При работе с другими моделями значения следует разделить на 0,5, 4.

Библиография

1. Newman DJ, Peto CP. Renal function and nitrogen metabolism. In: Burts CA, Ashwood ER, eds. Textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1996: 1241-1248.
2. Meyers RD, ed. Clinical chemistry in diagnosis and treatment. 8th ed. London: Arnold, 1994: 18pp.
3. Dreyer L, Christensen B, Thomsen L, ed. Clinical laboratory diagnostic. Use and assessment of clinical laboratory results. Frankfurt/Main, TH Books Verlagsgesellschaft, 1999: 299-321.
4. Elshof H, Van't Hof-Schabbe Y, Toussie G, Willems H, Zwaan B, et al. Use of Anticoagulants in Diagnostic Laboratory Investigations and Stability of Blood, Plasma and Serum. Bethesda: WHOCC/LAB/98. 1 Nov 2000.
5. NCCLS. Urine/lysis and collection, transportation, and preservation of urine specimens: approved guideline. NCCLS Document GP16-A2, 2nd ed. Pennsylvania: NCCLS, 2001.
6. Corley SF, Boyd JC, Mann G, Hancu J, Quaresima J, Kallala V, Pankaj GM. Reference intervals for serum creatinine concentrations: Assessment of existing data for global application. Clin Chem. 2002; 48(5): 889-899.
7. Pottier JC, Cope JF, Smith J. Reference information for the clinical laboratory. In: Burts CA, Ashwood ER, eds. Textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1996: 1800pp.
8. NCCLS. Protocols for determination of limits of detection and limits of quantitation: approved guideline. NCCLS Document EP17-A, Pennsylvania: NCCLS, 2004.
9. Young DB. Effects of drugs on clinical laboratory tests. 9th ed. AACO Press, 2000.

CE

[illegible]

При очень высокой концентрации фибриногена в пробе (> 20 000 mg/dl) могут быть получены ложно заниженные результаты без контактирования фибрина с ДА, обусловленные избытком фибрина в пробе.
В очень редких случаях гемоглобин, особенно гемоглобиновый cHb (маркер дегидратации Вальденстрема), может быть причиной недостаточных, ложных результатов.

СКОРОЕ В РАБОТАЮЩИХ ЛИСТКАХ

- # Определяется показателем **_____** и **_____** значение, установленное в анализаторе по умолчанию.
- 1 Serum Protein Multi-Calibrator, код № 00000021.
- * Значение установлено для формы cHb (mg/dl) нормального метода.

Библиография

- 1 Fabbro VF, Kim DG. Biochemical aspects of hematology. In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. *Textbook of clinical chemistry*. Philadelphia: WB Saunders Company, 1999:1703pp.
- 2 Tietz NW, ed. *Clinical guide to laboratory tests*. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1995:254-6.
- 3 Bernard A, Lounsbury R. Turbidimetric latex immunoassay for serum fibrin. *Journal of Immunological Methods* 1984;71:141-147.
- 4 Thompson DG. Principles for computer-aided assays. In: Kaplan LA, Poole AJ, eds. *Clinical Chemistry Theory, analysis and correlation*. 6th Edition. Mosby, 1999:264pp.
- 5 WHO. Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. *WHOCDLALAB.98.1* rev.2, 2002:31.
- 6 Young DB, ed. Effect of preanalytical variables on clinical laboratory tests. 2nd ed. Washington: AACQ Press, 1997:3-230pp.
- 7 Schiffrin J, Bergman C, White ED, eds. *Point-to-Point Hematology*. 3rd ed. AACQ Press, 2003:68-69.
- 8 Young DB. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. 3rd ed. AACQ Press, 2003.
- 9 Selby C. Interference in immunoassay. *Ann Clin Biochem* 1999;36:704-721.
- 10 Israel AA. On the hematology of fibrinogen. How-up 1999 in immunoassay: what must not be done? *Ann Clin Biochem* 2000;43(4):249-251.

CE

Контроль качества

Используйте контрольные материалы Biotest Laboratory International Ltd Control или другие контрольные материалы со значениями, установленными для данного набора анализатора Beckman Coulter серии AL.

Безопасный набор реактивов обеспечивает частоту проведения контроля качества самонастройками, однако, каждый лабораторный практик должен контролировать проведение контроля качества вместе с пробой пациента и после проведения анализа.

Полученные в стандартной лабораторной практике результаты могут отличаться от лабораторных средовых значений. В связи с этим рекомендуется для каждой больницы установить свои средние значения и отклонения от лабораторных средовых значений на основании индивидуального сравнения на установленных приборах. Эти средние значения не должны выходить за пределы приемных интервалов, определенных в соответствующем сертификате.

При обнаружении каких-либо тенденций в изменении значений контроля качества или выявлении отклонений от значений, проверьте все аналитические этапы анализа. В каждой лаборатории должен быть разработан план действий на тот случай, если результаты измерения контроля качества выйдут за установленные пределы.

Результаты

Анализаторы Beckman Coulter серии AL автоматически рассчитывают концентрацию парцетамала в каждой пробе.

Таблицы значений результатов

Таблицы значений результатов для парцетамала приведены в пределах 0-100 мг/мл (0-30 мг/л).

Каждое измерение парцетамала в плазме или моче является средним от трех измерений, проведенных после его приема. Согласно полученным данным, парцетамол вызывает значительное изменение при концентрации в сыворотке > 100 мг/мл (> 30 мг/л) и > 400 мг/мл (> 100 мг/л).

Для достоверности любых результатов значения должны определяться в соответствии с лабораторным оборудованием, используемым в данной лаборатории.

Сравнительные лабораторные тесты

Данные, приведенные в этих таблицах, получены при калибровке анализатора Beckman Coulter серии AL. Данные, полученные в другой лаборатории, могут отличаться от приведенных ниже.

Линейность

Диапазон линейности соответствует значениям концентрации парцетамала 50-2500 мг/мл (15-375 мг/л) в сыворотке и моче.

Воспроизводимость

Средние результаты получены при измерении на AL640 3-х сывороточных проб в течение 20-ти дней.

n = 60	Внутренняя		Общая	
	Станд. откл.	Коэф. вариации	Станд. откл.	Коэф. вариации
мг/мл	(SD)	(CV%)	(SD)	(CV%)
200	1.1	0.5	3.0	1.5
075	2.8	3.5	6.2	8.0

Чувствительность

Минимальная чувствительность для парцетамала, установленная на анализаторе AL6200, составляет 2,67 мг/мл (0,30 мг/л).

Нижний предел чувствительности — это наименьшее измеримое значение концентрации парцетамала, влияющее на результат. Его достоверность или абсолютное среднее значение после стандартных отклонений при 20-ти повторных измерениях выданы в пробе без мольдующего вещества.

Корреляция

При сравнении данного набора реактивов с анализатором OMR 1202, на анализаторе AL640 с другими коммерческими доступными наборами реактивов для определения концентрации парцетамала в сыворотке плазмы, получились следующие результаты корреляции.

n = 100	r = 1.000	n = 100	диапазон значений в пробе 0-1043 мг/мл
---------	-----------	---------	--

Внутренние факторы

Интерференция: Включено менее 10% при значениях концентрации до 3 мг/л (137 мг/мл)

Гемолит: Включено менее 10% при значениях гемоглобина до 4 г/л

Липемия: Включено менее 10% при значениях липидов (триглицериды) до 700 мг/л

Н-ацетилсалицилат: Включено менее 10% при значениях N-ацетилсалицилата до 0,6 г/л

Салицилат в моче: Включено менее 3% при значениях салицилатной кислоты до 3 мг/мл

Аспирин/ацетилсалицилат: Включено менее 2% при значениях аспирин/ацетилсалицилатной кислоты до 1 г/л

В очень редких случаях при анализировании, особенно при исследовании Вальсальвы, могут быть получены неправильные результаты.

Подробную информацию о анализаторе факторы можно найти в справочнике Yeha 11

Ограничения

Гемодилиференция, интерференция и липемия могут повлиять на результат. Интерференция и гемолит могут быть причиной ложно заниженных результатов. В гемолит — ложно заниженные. Поэтому интерпретировать результаты также проб надо с повышенной осторожностью.

Ссылки и дополнительные ресурсы

1. Оценочные материалы
2. Значения, установленные в анализаторе по умолчанию
3. Кабинет парцетамала Paracetamol Calibration Kit для набора
4. Значения установлены для работы с единицами системы СИ (мг/мл) для работы с единицами "mg/l" или значениями "mg/dl" не в 0,02.

Библиография

1. Forth WH Clinical Toxicology, 1st Edition, CA, Greenwood EP, eds, Tenth Textbook of Clinical Chemistry Philadelphia: WB Saunders Company, 1998: 527-528
2. Baker JD, de Cade DJ, Aronson B. Clinical toxicology paracetamol use and liver damage. Ann Intern Med 1997; 87: 298-301
3. Pirmatt LF. The neurotoxicity and hepatotoxicity of paracetamol overdose. Br J Clin Pharmacol 1979; 7: 443-452
4. Black M Acetaminophen hepatotoxicity. Gastroenterology 1980; 78: 350-352
5. Aronson B, Alexander M. Liver toxicity after acetaminophen overdose. JAMA 1977; 236: 530-541
6. Price CP, Hammond PM, Bonson MD. Evaluation of an enzymatic procedure for the measurement of acetaminophen. Clin Chem 1983; 29: 358-361
7. Ostry WJ, Elmer W, Hefl W, Boland Y, Torga H, Zander B. et al. Use of paracetamol in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, urine and saliva samples. JNCCLAB 88 (Rev 2), 2002
8. Torga WJ. Clinical Guide to Laboratory Tests 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1998: 709p
9. Lavin JM, Pirmatt LF. Assessment and treatment of acetaminophen overdose. Clin Pharm 1991; 10: 705-774
10. Hult DA. An IgM Paracetamol coating: a false low result in an enzymatic assay for acetaminophen. Clin Chem 1990; 45: 185-187
11. Young DR. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. AACSC, 4th ed AACSC Press, 2000

CE



**BECKMAN
COULTER.**

Гликозилированный гемоглобин с автоматизированной предподготовкой цельной крови (HbA1c APT)

OSR61177

HbA1c APT

2 x 19 мл

R1

Общий гемоглобин APT

2 x 19 мл

R2

Гемоглобин A1c APT денатурант

2 x 38 мл

R1

Назначение

Количественное определение HbA1c (гликозилированного гемоглобина A1c) в цельной крови человека методом иммуноэлектрофореза только на анализаторе BioMérieux Coulter AU680 с автоматизированной предподготовкой (APT).

Только для диагностики HbA1c.

Абсолютные значения HbA1c в общем гемоглобине (Hb), полученные в процессе измерения, предназначены для вычисления соотношения "HbA1c / Общий гемоглобин" и не следует использовать в диагностических целях.

Клиническое значение

HbA1c образуется в результате неферментативного гликирования свободной гемоглобины на N-конце β-цепи гемоглобина A₂. Уровень HbA1c пропорционален среднему уровню глюкозы в крови. В связи с тем, что глюкоза связана с гемоглобином в результате в течение всего их жизненного цикла, измерение HbA1c является наиболее точным способом измерения глюкозы в крови за две предыдущие недели. Поэтому измерение HbA1c считается важным диагностическим инструментом в мониторинге диетического контроля и лечении у больных диабетом. Контроль уровня глюкозы в крови важен для предотвращения развития осложнений и гипергликемии, и может снизить риск возникновения и тяжести таких осложнений, как слепота, диабетическая нефропатия и заболевания сердечно-сосудистой системы.

Принцип определения

В исследовании определены и концентрации HbA1c и общего гемоглобина. Отношение HbA1c/Общий гемоглобин представляется в виде процентного соотношения. При определении процентного содержания HbA1c используется четыре реактива: реактив R1 для определения общего гемоглобина, реактив HbA1c R1, сорбированный антигеном; антиокислительный реактив HbA1c R2 и денатурирующий реактив R1 для HbA1c APT.

Цельная кровь, автоматизированная обработкой в анализаторе AU680. При этом эритроциты разрушаются и гемоглобин высвобождается, происходит денатурация гемоглобина. При измерении общего гемоглобина все его производные в центрифужной смеси равномерно распределяются в центрифужной смеси. Добавление реактива для общего гемоглобина в центрифужную смесь образует реакционную смесь, в которой цвет.

Абсорбция этой смеси измеряется при 600 нм. При измерении HbA1c используется реакция окислительной окислительной антигенной. Антигенный, состоящий из синтетического конъюгата, содержащего конъюгированную часть HbA1c, вызывает образование комплекса, который специфически взаимодействует с HbA1c-антителами. При отсутствии HbA1c в пробе, конъюгаты HbA1c APT R1, покрытые антигенами, и антигенный и HbA1c APT R2 будут взаимодействовать. Этот процесс идет и увеличивается образование комплекса. Наличие HbA1c в пробе приводит к уменьшению скорости взаимодействия HbA1c APT R1 и антигенного в HbA1c APT R2. Уменьшение абсорбции реакционной смеси, измеренной при 720 нм, таким образом, обратно пропорционально концентрации HbA1c в пробе.

Состав

HbA1c APT R1

Микролит, содержащий выделенные антитела к HbA1c

Высокий сорбированный альбумин

Буфер, pH 6,1

Повышенное антигенное вещество: 0,5% раствор неактивного детергента

Консервант: 0,1% Пролин

HbA1c APT R2

HbA1c антиген

Белый сорбированный альбумин

Буфер, pH 2,0

Повышенное антигенное вещество

Консервант: 0,1% Пролин

Общий гемоглобин

Общий гемоглобин APT R1

Лидокаин: не более 0,4%, pH 12

Повышенное антигенное вещество: 0,7% раствор неактивного детергента

HbA1c APT Денатурант (HbA1c APT денатурант)

HbA1c APT денатурант R1

Гидроксид натрия

Буфер, pH 2,4

Консервант

Общие предосторожности

Предупреждает об опасности и сообщает о риске:

HbA1c APT R1 и HbA1c APT R2

R43: Может вызывать раздражение при попадании на кожу. Содержит смесь 5-оксида 2-метил-4-нитрофенола: 3-окси (ЕС No 247-600-7) и 2-метил-4-нитрофенола: 3-окси (ЕС No 220-238-0) (3:1)

R24: S37, S60. Не допускать контакта с кожей. Избегайте попадания. Реактивы и тару под них необходимо утилизировать как опасные отходы. Утилизуйте приспособленные реакционные материалы в соответствии с приспособленным санитарно-гигиеническим и экологическим контролем. Соблюдайте все меры предосторожности, указанные при работе с лабораторными реактивами. Дополнительные инструкции прилагаются к Гидроксида натрия.

Подготовка реактива

Реактивы Общий гемоглобин APT R1 и HbA1c APT R2 готовы к использованию и могут быть непосредственно установлены в анализатор.

Реактивы HbA1c APT R1 и HbA1c APT Денатурант R1 перед установкой в анализатор необходимо перемешать, перемешивая флакон 5-10 раз. Эти процедуры повторять ежедневно.

100

1000 1000

1000 1000

На следующем этапе из наборов с разным серийным номером. На изготовление флажки с рекомендацией доверю.

Хранение и стабильность

Несмотря на то, что флажки стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия флажки стабильны 30 дней при условии их хранения в холодильнике.

Использование метода

Целью крош (FC-EDTA или FC-EDTA). Калибраторы не используются в стандартной обработке. Вниманию С дистрибуции наборов рекомендуется использовать только дистрибуционный продукт Optima HbA1c APT Diagnostics R1. Проба с целью крош перед установкой в анализатор должна быть тщательно перемешана, перемешивать пробирку 5-10 раз. Результаты в пробирке с любым отклонением от нормы гемоглобина могут сопровождаться флажком. Не следует сразу тщательно перемешивать, лучше использовать пробирку, чтобы избежать перемешивания. Не следует использовать флажки, которые уже транспортировались в кофре для доставки проб. Если на транспортировке флажки были в 3х флажках, лучше использовать флажки, которые уже были в кофре для доставки проб. Если флажки были в кофре более 10 дней, лучше использовать флажки, которые уже были в кофре.

Особенно важно помнить, что флажки могут привести к появлению флажка «Too» рядом с результатом. В этом случае следует проверить флажки, проверить флажки, убедиться в том, что флажки соответствуют значениям, рекомендованным в прилагаемых инструкциях.

Проба без градуированной обработки может храниться при 25°C 1 месяц, при 2-8°C - 2 месяца и до 6 месяцев при заморозке в -78°C. Гемоглинированные пробы стабильны до 8 часов при комнатной температуре и до 48 часов при 2-8°C при хранении в закрытой пробирке.

Примечания

Определение общего гемоглобина и HbA1c проводится в анализаторе гемоглинированной пробы и контроле. См. Руководство Patient Guide и соответствующую инструкцию для внешнего типа пробы.

Калибраторы

HbA1c Calibrator, код: CDR3032.

Для калибратора общего гемоглобина используются только калибратор Hb1.

Для калибратора HbA1c используются калибраторы HbA1c 1-8.

Вниманию: Калибраторы имеют дистрибуционный код Optima HbA1c APT Diagnostics R1.

Для проверки калибраторов используйте информацию, приведенную во вложении к калибратору HbA1c Calibrator CDR3032.

Калибратор следует проводить через каждые 14 дней или при следующем условии:

Смена флажков реагентов или осуществление изменений значений контроля;

Проверка профилактического обслуживания анализатора или замены реактивов прибора.

Новую калибровку необходимо выполнять проводить. Сразу же после калибровки следует провести контроль качества.

Процедура проверки

Значения калибратора HbA1c соответствуют до FCC HbA1c референсного метода² через FCC HbA1c референсный материал. Значения калибратора для общего гемоглобина соответствуют до IFCC HbA1c референсного метода² через IFCC HbA1c референсный материал. Значения калибратора для общего гемоглобина соответствуют до IFCC HbA1c референсного метода² через IFCC HbA1c референсный материал. Значения калибратора для общего гемоглобина соответствуют до IFCC HbA1c референсного метода² через IFCC HbA1c референсный материал.

Оценочное соотношение результатов, полученных в единицах NGSP (Национальные программы по стандартизации гемоглобина) (интерпретируемые на интерпретацию DCCST - интерпретируемые на интерпретацию DCCST) и в единицах FCC (Международный федеральный стандарт качества). Для каждого результата по 3х флажкам и другим флажкам необходимо проводить проверку по следующей формуле:

$$DCCST/NGSP = (HbA1c \times FCC) \pm 2.15$$

Оценочное соотношение между этими двумя оценками должно соответствовать результатам FCC, соответствующим с минимальным значением результатов HbA1c, полученным по исследованию DCCST и Процентным исследованиям диабета Великобритания (UKPDS). Это универсальное уравнение также соотносит результаты DCCST с референсным методом более высокого уровня.

Результаты HbA1c в %, полученные из 3х флажков исследования, автоматически пересчитываются в единицы интерпретации DCCST с помощью универсального уравнения (NGSP = (DCCST x FCC) + 2.15), одобренного FCC. Таким образом, результаты выражаются в единицах интерпретации DCCST, что соответствует рекомендациям Международной Федерации Клинической Химии.

Контроль качества

Можно использовать контрольный материал HbA1c Control patient ODC002 или другие контрольные материалы с аналогичными, установленными для данной модели анализатора Becton Dickinson Coulter Series AU.

Каждая лаборатория определяет частоту проведения контроля качества самостоятельно, однако, каждая лаборатория должна проводить контроль качества минимум один раз в день.

Полученные в каждой лаборатории результаты могут отличаться от истинного значения. Поэтому лабораториям рекомендуется для каждого анализа устанавливать свои собственные значения и использовать специфический контроль, на основании лабораторного измерения по установленным правилам. Эти данные значения не должны влиять на пределы соответствующего диапазона интервала, приведенные в соответствующей инструкции.

При обнаружении каких-либо тенденций в результатах анализа контроля качества или анализатора следует проверить, правильно ли выполняются этапы измерения. Каждая лаборатория должна разработать план действий на тот случай, если результаты измерения контроля качества выходят за установленные пределы.

Референсные значения²

Взрослые: 4,0-6,2% (DCCST)

2,0-4,4% HbA1c (единицы FCC; для пересчета используется приведенная выше формула)

Оценочные значения могут отличаться в зависимости от возраста, пола, типа пробы, диеты и географического местоположения. В соответствии с одобренной лабораторией принятой методикой лаборатория должна определять собственные референсные значения. При наличии данных результаты следует интерпретировать вместе с истинными данными пациента, результатами или клиническим обследованием.

Свойства метода характеристики формирования теста

Данные, приведенные в этой парадигме, получены при калибровке анализатора Becton Dickinson Coulter Series AU. Результаты, полученные в других лабораториях могут от них отличаться.

Анализатор

Общая информация

Анализатор имеет для общего гемоглобина составляет 4,4-14,3 ммоль/л (7-23 г/л).

HbA1c

DCCST

Анализатор имеет для общего гемоглобина составляет от 2,0 % HbA1c до 14,3 ммоль/л (1,22 ммоль/л HbA1c; 1,97 ммоль/л HbA1c) на наборе калибратора HbA1c Optima (код: набор CDR3032). Это соответствует 14,3 % HbA1c при общем гемоглобине в ммоль/л (14,3 г/л).

Бренд: Becton Dickinson

Модель: Becton Dickinson

Модель: Becton Dickinson

Бренд: Becton Dickinson

Пробы, значения которых превышают верхний предел диапазона линейности, переводить на следующий. Эти результаты информативны при $> 14,5\%$.

Воспроизводимость

Следующие результаты получены при измерении на анализаторе АМ860 3-х типов цитовых проб в течение 20-ти дней

Среднее значение, %	Внутренняя ошибка		Общая	
	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV%)	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV%)
7,20	0,02	0,23	0,04	0,55
7,34	0,08	0,73	0,07	0,92
11,17	0,08	0,86	0,10	0,98

Чувствительность

Минимальная чувствительность, установленная на анализаторе АМ860, составляет две

НБА1с (0,01 мкг/мл) (0,025 нА).

ТНв (0,05 мкг/мл) (0,08 нА).

Эта величина определена при минимальном измеренном значении НБА1с, отпавшем от нуля. Нижний предел чувствительности рассчитывается как абсолютное среднее значение плюс три стандартных отклонения при 20-ти кратном измерении аналита в пробе без исследуемого вещества.

Корреляция

При сравнении НБА1с АТР 06761177 диагностического набора реагентов для определения НБА1с на анализаторе АМ860 с НБА1с СИР9162 на анализаторе АМ840 были использованы пробы пациентов. Результаты линейного регрессического анализа следующие:

$$y = 1,028x + 0,437 \quad r = 0,999 \quad n = 109 \quad \text{Диапазон значений в пробе: } 4,60 - 13,48\% \text{ НБА1с}$$

При сравнении НБА1с АТР 06761177 диагностического набора реагентов для определения НБА1с на анализаторе АМ860 с НРЛС методом были использованы пробы пациентов. Результаты линейного регрессического анализа следующие:

$$y = 1,039x + 0,412 \quad r = 0,990 \quad n = 127 \quad \text{Диапазон значений в пробе: } 4,60 - 12,00\% \text{ НБА1с}$$

Влияющие факторы

В исследовании, проводившемся с целью оценки чувствительности метода к различным внешним факторам, получены следующие результаты:

Исходность:

Влияние менее 10% при значениях биомаркера до 0,13 мкг/мл (20 мкг/л)

Алимент:

Влияние менее 10% при значениях биомаркера (Нитраты) до 500 мкг/л

Температура:

Влияние менее 10% при значениях биомаркера до 18 мкг/мл (3000 мкг/л)

Рассеянный фактор:

Не влияет в концентрации до 2000 мкг/л

Антигидратационный эффект:

Не влияет в концентрации до 80 мкг/л

Контакт с металлом:

Не влияет в концентрации до 90 мкг/л

Матрица:

Не влияет в концентрации до 83 мкг/л

Подробную информацию по влиянию факторов можно найти в справочнике Young.

Ограничения

Непредназначенный экран жидкой кристаллической дисплея не сообщает с точностью, что представляет значение НБА1с в %. Поэтому результат процента содержания НБА1с недостоверен при определении уровня жидкой кристаллической дисплея. Причиной этого непредназначенного экрана могут быть математические данные и другие функциональные неисправности, включая промывку и блокировку.

При использовании данного набора реагентов в пробирке с присоединенным планшетом B и C может наблюдаться изменение значений НБА1с до 40%. В пробирке, содержащей более 10% гемоглобина H, результат может быть ниже референсного. Результаты НБА1с, полученные при использовании данного набора реагентов, для проб, содержащих гемоглобин (гемоглобин B, C и F) ($> 10\%$), являются ориентировочными и не являются нормальными или патологическими значениями. Пробирки, содержащие гемоглобин E, при использовании данного диагностического набора, не обеспечивают такого же уровня надежности результатов измерения.

Гемоглобин факторы гемоглобинового гемоглобина (включая гемоглобин H, HbA1c или HbA1c по дифференциальной оценке) не влияют на результаты измерения HbA1c по дифференциальной оценке для дифференциальной оценки.

Как и при любой другой клинической реакции, оператор не должен забывать о возможных источниках на результаты измерения гемоглобина. Например, использование гемоглобина или других препаратов. В диагностическом наборе реагентов измерения НБА1с в исследовании гемоглобина диагностического набора реагентов Вестал Сабил всегда нужно проводить в совокупности с другой информацией, например, историей болезни пациента, клинической картиной и результатами других исследований.

Ссылки на дополнительные ресурсы

1. Справочник пользователя.

2. НБА1с Сабил, мет. № CDR3032

3. Значения указаны для единиц мкг/мл. При работе с единицами г/дл, значение следует умножить на 1,8125.

4. Значения B и C мкг/мл и значения общего сахара мкг/дл.

5. Для определения % НБА1с используйте результаты ТНв и НБА1с. % НБА1с рассчитывается автоматически анализатором по формуле $(\text{НБА1с} / \text{ТНв}) \times 100 = \text{НБА1с}$. B = ТНв, а B и C, B = 2,15

Библиография

1. Hensley CM, Bennett H. Spectrophotometric, Thomas L, ed. Clinical Laboratory Diagnostics, Use and Interpretation of Clinical Laboratory Tests. Philadelphia: T1-Biosci Verlagsgesellschaft mbH, 1985: 142-146.
2. Jaramila JO, Kozlowski M, Bar J, Fink A, Hensley H, Hensley Y, Hensley M, Hensley A, Hensley P, Hensley R, Hensley L, Hensley M, Hensley C, Hensley S, Hensley T, Hensley U, Hensley V, Hensley W, Hensley X, Hensley Y, Hensley Z, Hensley AA, Hensley AB, Hensley AC, Hensley AD, Hensley AE, Hensley AF, Hensley AG, Hensley AH, Hensley AI, Hensley AJ, Hensley AK, Hensley AL, Hensley AM, Hensley AN, Hensley AO, Hensley AP, Hensley AQ, Hensley AR, Hensley AS, Hensley AT, Hensley AU, Hensley AV, Hensley AW, Hensley AX, Hensley AY, Hensley AZ, Hensley BA, Hensley BB, Hensley BC, Hensley BD, Hensley BE, Hensley BF, Hensley BG, Hensley BH, Hensley BI, Hensley BJ, Hensley BK, Hensley BL, Hensley BM, Hensley BN, Hensley BO, Hensley BP, Hensley BQ, Hensley BR, Hensley BS, Hensley BT, Hensley BU, Hensley BV, Hensley BW, Hensley BX, Hensley BY, Hensley BZ, Hensley CA, Hensley CB, Hensley CC, Hensley CD, Hensley CE, Hensley CF, Hensley CG, Hensley CH, Hensley CI, Hensley CJ, Hensley CK, Hensley CL, Hensley CM, Hensley CN, Hensley CO, Hensley CP, Hensley CQ, Hensley CR, Hensley CS, Hensley CT, Hensley CU, Hensley CV, Hensley CW, Hensley CX, Hensley CY, Hensley CZ, Hensley DA, Hensley DB, Hensley DC, Hensley DD, Hensley DE, Hensley DF, Hensley DG, Hensley DH, Hensley DI, Hensley DJ, Hensley DK, Hensley DL, Hensley DM, Hensley DN, Hensley DO, Hensley DP, Hensley DQ, Hensley DR, Hensley DS, Hensley DT, Hensley DU, Hensley DV, Hensley DW, Hensley DX, Hensley DY, Hensley DZ, Hensley EA, Hensley EB, Hensley EC, Hensley ED, Hensley EE, Hensley EF, Hensley EG, Hensley EH, Hensley EI, Hensley EJ, Hensley EK, Hensley EL, Hensley EM, Hensley EN, Hensley EO, Hensley EP, Hensley EQ, Hensley ER, Hensley ES, Hensley ET, Hensley EU, Hensley EV, Hensley EW, Hensley EX, Hensley EY, Hensley EZ, Hensley FA, Hensley FB, Hensley FC, Hensley FD, Hensley FE, Hensley FF, Hensley FG, Hensley FH, Hensley FI, Hensley FJ, Hensley FK, Hensley FL, Hensley FM, Hensley FN, Hensley FO, Hensley FP, Hensley FQ, Hensley FR, Hensley FS, Hensley FT, Hensley FU, Hensley FV, Hensley FW, Hensley FX, Hensley FY, Hensley FZ, Hensley GA, Hensley GB, Hensley GC, Hensley GD, Hensley GE, Hensley GF, Hensley GG, Hensley GH, Hensley GI, Hensley GJ, Hensley GK, Hensley GL, Hensley GM, Hensley GN, Hensley GO, Hensley GP, Hensley GQ, Hensley GR, Hensley GS, Hensley GT, Hensley GU, Hensley GV, Hensley GW, Hensley GX, Hensley GY, Hensley GZ, Hensley HA, Hensley HB, Hensley HC, Hensley HD, Hensley HE, Hensley HF, Hensley HG, Hensley HH, Hensley HI, Hensley HJ, Hensley HK, Hensley HL, Hensley HM, Hensley HN, Hensley HO, Hensley HP, Hensley HQ, Hensley HR, Hensley HS, Hensley HT, Hensley HU, Hensley HV, Hensley HW, Hensley HX, Hensley HY, Hensley HZ, Hensley IA, Hensley IB, Hensley IC, Hensley ID, Hensley IE, Hensley IF, Hensley IG, Hensley IH, Hensley II, Hensley IJ, Hensley IK, Hensley IL, Hensley IM, Hensley IN, Hensley IO, Hensley IP, Hensley IQ, Hensley IR, Hensley IS, Hensley IT, Hensley IU, Hensley IV, Hensley IW, Hensley IX, Hensley IY, Hensley IZ, Hensley JA, Hensley JB, Hensley JC, Hensley JD, Hensley JE, Hensley JF, Hensley JG, Hensley JH, Hensley JI, Hensley JJ, Hensley JK, Hensley JL, Hensley JM, Hensley JN, Hensley JO, Hensley JP, Hensley JQ, Hensley JR, Hensley JS, Hensley JT, Hensley JU, Hensley JV, Hensley JW, Hensley JX, Hensley JY, Hensley JZ, Hensley KA, Hensley KB, Hensley KC, Hensley KD, Hensley KE, Hensley KF, Hensley KG, Hensley KH, Hensley KI, Hensley KJ, Hensley KK, Hensley KL, Hensley KM, Hensley KN, Hensley KO, Hensley KP, Hensley KQ, Hensley KR, Hensley KS, Hensley KT, Hensley KU, Hensley KV, Hensley KW, Hensley KX, Hensley KY, Hensley KZ, Hensley LA, Hensley LB, Hensley LC, Hensley LD, Hensley LE, Hensley LF, Hensley LG, Hensley LH, Hensley LI, Hensley LJ, Hensley LK, Hensley LL, Hensley LM, Hensley LN, Hensley LO, Hensley LP, Hensley LQ, Hensley LR, Hensley LS, Hensley LT, Hensley LU, Hensley LV, Hensley LW, Hensley LX, Hensley LY, Hensley LZ, Hensley MA, Hensley MB, Hensley MC, Hensley MD, Hensley ME, Hensley MF, Hensley MG, Hensley MH, Hensley MI, Hensley MJ, Hensley MK, Hensley ML, Hensley MN, Hensley MO, Hensley MP, Hensley MQ, Hensley MR, Hensley MS, Hensley MT, Hensley MU, Hensley MV, Hensley MW, Hensley MX, Hensley MY, Hensley MZ, Hensley NA, Hensley NB, Hensley NC, Hensley ND, Hensley NE, Hensley NF, Hensley NG, Hensley NH, Hensley NI, Hensley NJ, Hensley NK, Hensley NL, Hensley NM, Hensley NN, Hensley NO, Hensley NP, Hensley NQ, Hensley NR, Hensley NS, Hensley NT, Hensley NU, Hensley NV, Hensley NW, Hensley NX, Hensley NY, Hensley NZ, Hensley OA, Hensley OB, Hensley OC, Hensley OD, Hensley OE, Hensley OF, Hensley OG, Hensley OH, Hensley OI, Hensley OJ, Hensley OK, Hensley OL, Hensley OM, Hensley ON, Hensley OO, Hensley OP, Hensley OQ, Hensley OR, Hensley OS, Hensley OT, Hensley OU, Hensley OV, Hensley OW, Hensley OX, Hensley OY, Hensley OZ, Hensley PA, Hensley PB, Hensley PC, Hensley PD, Hensley PE, Hensley PF, Hensley PG, Hensley PH, Hensley PI, Hensley PJ, Hensley PK, Hensley PL, Hensley PM, Hensley PN, Hensley PO, Hensley PP, Hensley PQ, Hensley PR, Hensley PS, Hensley PT, Hensley PU, Hensley PV, Hensley PW, Hensley PX, Hensley PY, Hensley PZ, Hensley QA, Hensley QB, Hensley QC, Hensley QD, Hensley QE, Hensley QF, Hensley QG, Hensley QH, Hensley QI, Hensley QJ, Hensley QK, Hensley QL, Hensley QM, Hensley QN, Hensley QO, Hensley QP, Hensley QQ, Hensley QR, Hensley QS, Hensley QT, Hensley QU, Hensley QV, Hensley QW, Hensley QX, Hensley QY, Hensley QZ, Hensley RA, Hensley RB, Hensley RC, Hensley RD, Hensley RE, Hensley RF, Hensley RG, Hensley RH, Hensley RI, Hensley RJ, Hensley RK, Hensley RL, Hensley RM, Hensley RN, Hensley RO, Hensley RP, Hensley RQ, Hensley RR, Hensley RS, Hensley RT, Hensley RU, Hensley RV, Hensley RW, Hensley RX, Hensley RY, Hensley RZ, Hensley SA, Hensley SB, Hensley SC, Hensley SD, Hensley SE, Hensley SF, Hensley SG, Hensley SH, Hensley SI, Hensley SJ, Hensley SK, Hensley SL, Hensley SM, Hensley SN, Hensley SO, Hensley SP, Hensley SQ, Hensley SR, Hensley SS, Hensley ST, Hensley SU, Hensley SV, Hensley SW, Hensley SX, Hensley SY, Hensley SZ, Hensley TA, Hensley TB, Hensley TC, Hensley TD, Hensley TE, Hensley TF, Hensley TG, Hensley TH, Hensley TI, Hensley TJ, Hensley TK, Hensley TL, Hensley TM, Hensley TN, Hensley TO, Hensley TP, Hensley TQ, Hensley TR, Hensley TS, Hensley TT, Hensley TU, Hensley TV, Hensley TW, Hensley TX, Hensley TY, Hensley TZ, Hensley UA, Hensley UB, Hensley UC, Hensley UD, Hensley UE, Hensley UF, Hensley UG, Hensley UH, Hensley UI, Hensley UJ, Hensley UK, Hensley UL, Hensley UM, Hensley UN, Hensley UO, Hensley UP, Hensley UQ, Hensley UR, Hensley US, Hensley UT, Hensley UU, Hensley UV, Hensley UW, Hensley UX, Hensley UY, Hensley UZ, Hensley VA, Hensley VB, Hensley VC, Hensley VD, Hensley VE, Hensley VF, Hensley VG, Hensley VH, Hensley VI, Hensley VJ, Hensley VK, Hensley VL, Hensley VM, Hensley VN, Hensley VO, Hensley VP, Hensley VQ, Hensley VR, Hensley VS, Hensley VT, Hensley VU, Hensley VV, Hensley VW, Hensley VX, Hensley VY, Hensley VZ, Hensley WA, Hensley WB, Hensley WC, Hensley WD, Hensley WE, Hensley WF, Hensley WG, Hensley WH, Hensley WI, Hensley WJ, Hensley WK, Hensley WL, Hensley WM, Hensley WN, Hensley WO, Hensley WP, Hensley WQ, Hensley WR, Hensley WS, Hensley WT, Hensley WU, Hensley WV, Hensley WW, Hensley WX, Hensley WY, Hensley WZ, Hensley XA, Hensley XB, Hensley XC, Hensley XD, Hensley XE, Hensley XF, Hensley XG, Hensley XH, Hensley XI, Hensley XJ, Hensley XK, Hensley XL, Hensley XM, Hensley XN, Hensley XO, Hensley XP, Hensley XQ, Hensley XR, Hensley XS, Hensley XT, Hensley XU, Hensley XV, Hensley XW, Hensley XX, Hensley XY, Hensley XZ, Hensley YA, Hensley YB, Hensley YC, Hensley YD, Hensley YE, Hensley YF, Hensley YG, Hensley YH, Hensley YI, Hensley YJ, Hensley YK, Hensley YL, Hensley YM, Hensley YN, Hensley YO, Hensley YP, Hensley YQ, Hensley YR, Hensley YS, Hensley YT, Hensley YU, Hensley YV, Hensley YW, Hensley YX, Hensley YY, Hensley YZ, Hensley ZA, Hensley ZB, Hensley ZC, Hensley ZD, Hensley ZE, Hensley ZF, Hensley ZG, Hensley ZH, Hensley ZI, Hensley ZJ, Hensley ZK, Hensley ZL, Hensley ZM, Hensley ZN, Hensley ZO, Hensley ZP, Hensley ZQ, Hensley ZR, Hensley ZS, Hensley ZT, Hensley ZU, Hensley ZV, Hensley ZW, Hensley ZX, Hensley ZY, Hensley ZZ.

CE

При обнаружении каких-либо тенденций в значениях значений контроля качества или аналитических отклонений его значений, проверьте все аналитические этапы измерения. Каждый лабораторный этап требует разработки план действий на тот случай, если результаты измерения контроля качества выйдут за установленные пределы.

Результат

Анализатор Beckman Coulter серии AU автоматически рассчитывает концентрацию IgM в каждой пробе.

Референсные значения

Взрослые 0,4-2,3 г/л (40-230 мкг/л)
Дети 0,2-2,0 г/л (20-200 мкг/л)

Смещенные значения могут наблюдаться в зависимости от возраста, пола, типа пробы, даты и географического местоположения. В соответствии с общепринятой лабораторной практикой новой лабораторией следует определить собственные референсные значения. При интерпретации данных результаты всегда следует рассматривать вместе с данными истории болезни и другими диагностическими исследованиями.

Специфические лабораторные procedures tests

Данные, приведенные в этом параграфе, получены на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Характеристики проведений теста в другой лаборатории могут отличаться от приведенных ниже.

Диагностика

Диагностическая чувствительность соответствует значениям концентрации 0,3-5,0 г/л (30-500 мкг/л)

Воспроизводимость

Следующие результаты получены при измерении на AU640 3-х сырьевых пилот в течение 10-ти дней.

Среднее значение, г/л	Внутренняя вариация		Общая	
	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)
0,48	0,31	1,69	0,52	3,44
1,14	0,52	1,36	0,54	3,42
4,17	0,95	2,19	0,99	4,09

Чувствительность

Нижний предел чувствительности, установленный на анализаторе AU640, составляет 0,01 г/л.

Это значение соответствует минимальному значению IgM, отличному от нуля. Нижний предел чувствительности рассчитывается как абсолютное среднее значение плюс три стандартных отклонения при 20-ти кратном измерении аналита в пробе без исследуемого вещества.

Интерпретация

При сравнении данных диагностического набора результатов для определения IgM на анализаторе AU2700 с другими коммерчески доступными тестами результаты для определения IgM использовались, сырьевых пилотных. Результаты лабораторного референсного анализа следующие:

$y = 1,008x + 0,028$	$r = 1,000$	$n = 107$	Диапазон значений в пробе 0,22-4,67 г/л
----------------------	-------------	-----------	---

Влияющие факторы

В исследовании, проведенном с целью оценки чувствительности к различным влияющим факторам, получены следующие результаты:

Интерференция: Влияние менее 10% при значениях концентрации до 40 мкг/л или до 664 мкг/л
Температура: Влияние менее 10% при значениях температуры до 5 г/л
Липемия: Влияние менее 10% при значениях липидов (триглицеридов) до 200 мкг/л

Полученная информация по влияющим факторам можно найти в справочнике Young.²

Ограничения

Данный метод был авторизован для измерения уровня содержания фактора при очень высоких концентрациях иммуноглобулинов. Тем не менее, в некоторых случаях чувствительности рекомендуется проводить дополнительные исследования методом электрофореза проб пациентов с патологической гиперпродукцией.

Пробы с очень высокой концентрацией IgM (> 100 г/л патологические) могут быть правильной пометки: низкая результативность без помехи факта «Z», что обусловлено избытком аналита в пробе.

Если высокие результаты IgM соответствуют фактору «F» или комбинацией факторов «F» и «Z», пробу следует развести физиологическим раствором и повторно измерить.

Для проб с патологически отклоненными характеристиками, особенно очень мутными, могут быть получены неточные результаты.

Ссылки в референсных источниках

1. Справочник по биохимии
2. Значения, установленные в анализаторе по умолчанию
3. Значения, установленные для артефакта СИ (г/л) Для работы с единицами мкг/л, значения следует умножить на 100.

Библиография

1. Thomas L. Interpretation of IgM in the serum. In: Clinical laboratory diagnosis: Use and evaluation of clinical laboratory tests. Festschrift for: The Society for Clinical Chemistry, 1986:867-874
2. Tietz NW, ed. Clinical guide to laboratory tests, 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1989:380-383.
3. Mayes PD, ed. Clinical chemistry in diagnosis and treatment 8th ed. Glasgow: Arnold, 1994:323-338, 346-347.
4. Burtin GL, Hahn U, Frenkel U, Tjorne O, Wilson M, Zieve B, et al. Use of microanalysis in diagnosis: laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. WHO/CDC/ECDC 1 Rev. 2:359.
5. Burtin G. Day P. Standardization of the measurement of IgM protein in human serum based on the new FCO/ECRCAP International reference material CRM 470. Lab Med 1996;20:149-152.
6. Pajunen PC, Core JT, Smith JL. Reference information for the clinical laboratory. In: Burla CA, Ashwood ER, eds. Tietz textbook of clinical chemistry Philadelphia: WB Saunders Company, 1996:1620.
7. Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. AACO, 8th ed. AACO Press, 2000.

CE



05R81172

lgG

4 x 22 мл

4 x 20 мл

R1

R2

Назначение

Количественное определение иммуноглобулина G (IgG) в сыворотке, плазме и спинномозговой жидкости человека иммунофлуориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики *in vitro*.

Клиническое значение

Иммуноглобулины классов IgG, IgA, IgM, IgD и IgE присутствуют в сыворотке здорового человека в порядке убывания их концентрации. IgG состоит из четырех субъединиц, составляет примерно 75% всех иммуноглобулинов и 10-20% общего белка сыворотки. Примерно половина общего IgG originates в костном мозге, а другая половина IgG из-за низкого иммуногенного веса (190 кДа) находится в интерстициальной жидкости, исключая часть от инфузий. IgG имеет самую долгую в циркуляции жизни организма от инфузий, так как является белком мономерным, но более устойчивым к распаду на антигенный разрываемый, чем IgM. Однако уровень IgG быстро и легко повышается при повторном воздействии того же антигенного раздражителя. IgG способствует фагоцитозу и опсонизму микроорганизмов.

Максимальная концентрация иммуноглобулинов в сыворотке можно классифицировать следующим образом:

- Патофизиологическая - дефицит IgG может быть врожденным, как при тяжелом наследственном иммунодефиците, или приобретенным, как при СПИДе. Понижение количественного значения при клиническом исследовании требует расширения оценки равномерных и клинических функций и количества клеток. Уменьшение IgG также наблюдается при терминальных стадиях, нефротическом синдроме, интерстициальном, остром некрозе почечной ткани и на IgD-синтезе.

- Патологическая гипергамия - уровень IgG увеличивается при аутоиммунных заболеваниях (системная красная волчанка, ревматоидный артрит и синдром Шегрена), паразитарных, хронических заболеваниях печени, некоторых заболеваниях злокачественных и хронических или вторичных инфекций.

- Моноклональная гипергамия - моноспецифическая антитела (IgG-тип, мафрот, лимфома и другие злокачественные новообразования). IgG является циркулирующим иммуноглобулином, который проходит через плаценту и, таким образом, играет важную роль в защите новорожденного от инфекции.

Определение IgG в спинномозговой жидкости (CSF) используется для выявления инфекции, включая центральную нервную систему, иммунодефицита или первичные заболевания нервной системы. Измерение IgG в CSF используется для определения соотношения IgG CSF / альбумин CSF, что важно для различия между интракраниальными и системными источниками IgG.

Принцип исследования

При добавлении пробы к буферу R1 в растворе антитела R2, численно-эквивалентный IgG специфически связывается с антителом против человеческого IgG, с образованием нерастворимых комплексов. Абсорбция реакционной смеси пропорциональна концентрации IgG в пробе.

Система

Концентрация в реакционной смеси:	
Трибуфер (pH 7.2)	40 мкг/мл
Потенциализатор 6000	3.1%
Новый антиген в IgG	Зависит от типа
Контроль	

Общие предостережения

Соблюдайте все меры предосторожности, применяемые при работе с лабораторными реактивами.

Во избежание возможного отклонения антителозависимой реакции после стадии нерастворимого реагента применяйте канцерогенные трубки всасывания.

Соблюдайте все меры предосторожности в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Паспорт безопасности может быть предоставлен профессиональным персоналом по запросу.

Подготовка реагента

Реактивы готовы к использованию и могут быть непосредственно установлены в анализатор.

Хранение и стабильность

Некоторые реактивы стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2...8°C. После вскрытия реактивы стабильны 90 дней при установке в анализатор.

Испыльваемый материал

Сыворотка и плазма (HTA или гепарин)

В сыворотке и плазме IgG стабилен в течение 4 месяцев при температуре хранения 2...8°C и в течение 4 месяцев при температуре хранения 16...25°C.

Не следует проводить измерения в очень малых объемах.

Специфический продукт: IgG стабилен в течение 72 часов при 4°C или 6 месяцев при -20°C. Не следует проводить измерения в очень малых объемах и в очень плохой замороженной среде.

Процедура анализа

См. Руководство по эксплуатации и соответствующую информацию для конкретного типа пробы.

Есть программа для калибровочного измерения, при которой используются только обычные пробы.

Необходимо запрограммировать параметры в меню «Data Setup» См. программу программирования.

Калибровка

Мультитестер NBT имеет сыворотку Biotin Protein 6661 Celvator CDR3021.

Значение калибратора для IgG пропорционально децималу CRM 476 FCC (Международной Федерации по клинической химии).

Калибровку следует проводить при следующих условиях:

Самое низкое значение реактивности или стандартное значение эталонной контрольной.

Применение професийно-экспертного обслуживания анализатора или личного опыта калибровки.

Новую калибровку необходимо выполнять регулярно: - после замены (обычная эксплуатация) - Calibration Monitor (Монитор калибровки) - Calibration Setup (Калибровка) - Calibration Monitor (Монитор калибровки).

В случае измерения концентраций IgG в CSF калибровку следует проводить каждые 2 дня.

0.0

0.0000

0.0000

0.0000

Контроль качества

Можно использовать контрольные материалы ITA Control System (ит. № ODC0014, ODC0015 и ODC0016) или другие контрольные материалы со значениями, установленными для данной модели анализатора Biochem Control.

СМК можно использовать контрольные материалы по значениям установленным для данной модели анализатора Biochem Control. Каждый лабораторный образец имеет контрольный материал, установленный, таким, какой лабораторией принятой фактически на анализе, и контрольный материал в пробирке, который и после проведения анализа.

Полученные в данной лаборатории результаты могут отличаться от паспортного значения. Паспортные лабораторные рекомендации для каждого анализа устанавливают свои средние значения и стандартные отклонения контроля, на основании некорректированных измерений по установленным правилам. Эти средние значения не должны выходить за пределы стандартных принятых интервалов, приведенных в паспорте каждого анализа.

При обнаружении каких-либо тенденций в изменениях значений контроля качества или выявлении отклонений его значений, проверьте все значимые этапы анализа. Каждый лабораторный образец разработать свои действия на тот случай, если результаты контроля качества выйдут за установленные пределы.

Расчет

Анализатор Biochem Control серии AU автоматичеки рассчитывает концентрацию IgG в анализе крови

Референтные значения

Взрослые (сыворотка)	7-16 г/л	(700-1600 мкг/л)
СМК*	18-20 лет	36 мкг ± 20 мкг
	21-40 лет	42 мкг ± 14 мкг
	41-60 лет	47 мкг ± 10 мкг

IgG-лиганд

0,2-0,8

Ожидаемые значения могут изменяться в зависимости от возраста, пола, типа пробы, для не в географического местонахождения. В соответствии с общепринятой лабораторной практикой каждой лабораторией следует определить собственные референтные значения. При наличии данных результаты всегда следует рассчитывать вместе с данными историей болезни и другими диагностическими исследованиями.

Пятикратное количественное определение теста

Данные, приведенные в этих параграфах, получены при измерении на анализаторе Biochem Control серии AU. Характеристики приведенные в этом параграфе могут отличаться от приведенных выше.

Влияемость

Сыворотка (диапазон линейности соответствует значениям концентрации 1,0-70,0 г/л (10-7000 мкг/л))

СМК (диапазон линейности соответствует значениям концентрации 20-500 мкг (2-50 мкг/л))

Вариация неопределенности

Средние результаты получены при измерении на AU640 2-х повторных проб в течение 20-ти дней

Среднее значение, г/л	Внутренняя ошибка		Общая	
	Станд. откл. (SD)	Коеф. вариации (CV %)	Станд. откл. (SD)	Коеф. вариации (CV %)
4,31	0,23	5,14	0,14	3,28
10,88	0,18	1,65	0,28	3,49
21,73	0,49	2,24	1,01	4,69

Средние результаты получены при измерении на AU640 2-х повторных СМК в течение 20-ти дней

Внутренняя ошибка		Внешняя ошибка	
Среднее значение, мкг	Станд. откл. (SD)	Среднее значение (CV %)	Станд. откл. (SD)
24,88	0,63	2,28	3,35
101,34	0,80	5,59	3,72
200,74	3,28	5,93	10,01

Чувствительность

Наименьший предел чувствительности, установленный на анализаторе AU640, для сыворотки составляет 0,004 г/л.

Наименьший предел чувствительности, установленный на анализаторе AU640, для СМК составляет 0,20 мкг.

Это значение определяется как наименьшее измеренное значение IgG, отнесенное от нуля. Наименьший предел чувствительности (LOD) (LOD=0,004 г/л) как абсолютное среднее значение плюс три стандартных отклонения при 20-ти повторных измерениях анализа в пробирке из стандартного вещества.

Коррекция

При сравнении данных диагностического набора результаты для определения IgG на анализаторе AU700 с другими коммерчески доступными наборами реагентов для определения IgG использовать следующие коэффициенты. Результаты линейного преобразования данных стандарта

$y = 0,845x + 0,272$	$r = 0,899$	$n = 120$	Диапазон значений в пробирке 1,10-20,73 г/л
----------------------	-------------	-----------	---

При сравнении данных диагностического набора результаты для определения IgG на анализаторе AU700 с другими коммерчески доступными наборами реагентов для определения IgG использовать СМК следующие коэффициенты. Результаты линейного преобразования данных стандарта

$y = 0,652x - 2,481$	$r = 0,987$	$n = 68$	Диапазон значений в пробирке 20,39-41,85 мкг/л
----------------------	-------------	----------	--

Влияющие факторы

В исследовании, проведенном с целью оценки чувствительности метода к различным аналитическим факторам, получены следующие результаты.

Сыворотка	Исходность	Влияние менее 3% при значении базисных до 40 мкг/л или до 684 мкг/л
Глобулин	Глобулин	Влияние менее 2% при значении базисных до 8 г/л
Липиды	Липиды	Влияние менее 10% при значении базисных (фракционирован) до 1600 мкг/л
Результативный фактор	Результативный фактор	Влияние менее 10% при значении базисных фактора до 1200 мкг/л

СМК	Исходность	Влияние менее 10% при значении базисных до 36 мкг/л или до 236 мкг/л
	Глобулин	Влияние менее 10% при значении базисных до 8 г/л

Подробная информация по влияющим факторам можно найти в справочном томе *

Описание метода

Данный метод был оптимизирован для снижения риска промывания эффекта красным при очень высоких концентрациях иммуноглобулинов. Тем не менее, в качестве меры предосторожности рекомендуется проводить дополнительное исследование методом электрофореза проб пациента с предполагаемой паронемией.

Пробы с очень высокой концентрацией IgG (>300 г/л плазматических) могут быть причиной ложно низких результатов без плавления флэгов IgG, что обусловлено избыточным вытеснением в пробе.

Если высокие результаты IgG сопровождаются флэгом «F» или комбинацией флэгов «F» и «C», пробу следует развести физиологическим раствором и повторить исследование.

Для проб с патологическими отклонениями характеристик, особенно очень низкими, могут быть получены ложные результаты.

При исследовании IgG в отклоняющейся жесткости пробы анализ может оказаться ложным, если непосредственно перед этим исследовалась сыворотка. Во избежание такого эффекта рекомендуется принять следующие меры.

- а. Калибровать IgG отдельно с другими калибраторами;
- б. Избегать перекрестного загрязнения - стандартной жесткости;
- в. При назначении теста в лаборатории на отклоняющую жесткость установить 2% раствор детергента (Nash's Solution)(OSR0001) в первую очередь в чашке и назначить любой тест для этой проблемы.

Ссылки и дополнительные ресурсы

- а. Определены пользователи
- б. Значение, установленное в анализаторе по умолчанию
- 1. Bichem Protein Mail-Collector, товар по кат. OSR0001.
- 2. СМЖ. Разведение калибратора №4 (4-4) физиологическим раствором. Затем, определите из этого разведения последовательно 4 разведения 1:1 для 5-ти точечной калибровочной кривой. Введите соответствующие численные значения для калибраторов в анализатор.
- а. Значения установлены для флэгов C14 (rH) для работы с артериальным и венозным сывороткой у пациентов на 100.
- б. СМЖ. Значения установлены для флэгов C14 (rH). Для работы с артериальным и венозным сывороткой у пациентов установить на 10.
- СМЖ. Значение C14 принят Определенное.

Библиография

1. Thomas L. Immunoelectrophoresis. In: Thomas L. ed. Clinical laboratory diagnostics. Use and assessment of clinical laboratory tests. Philadelphia: WB Saunders Company, 1995:358-361.
2. Tait MW ed. Clinical guide to laboratory tests, 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1995:358-361.
3. Cohen D. ed. Fundamentals of clinical physiology, 1st ed. Philadelphia: Prentice Hall, 1993:280pp.
4. Mayo P.D. ed. Clinical chemistry in diagnosis and treatment, 8th ed. St Louis: Mosby, 1994:322-323, 323pp.
5. Elmer W, Haid W, Bolewit V, Tappin D, Himes M, Kaula B. et al. Use of monoclonals in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. WHO/D/LAB/90.1 Rev 2.35pp.
6. Tait MW. ed. Clinical guide to laboratory tests, 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1995:360pp.
7. Baudier E, Dail F. Standardization of the measurement of 14 proteins in human serum based on the new IFCC/BCR/CCP international reference material CRM 479. J Lab Med 1998;20:145-152.
8. Patten PC, Goss SJ, Smith J. Reference information for the clinical laboratory. In: Burtis CA, Ashwood EE, eds. Textbook of clinical chemistry, Philadelphia: WB Saunders Company, 1986, 1923pp.
9. Young D. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. AACC, 6th ed. AACC Press, 2000.

CE



4 x 14 mm
4 x 11 mm

R1
R2

Клиническое обследование и инструментальная диагностика в клинике человека выполняются в соответствии с методикой на анализаторе Bestman Coulter серии AL. Только для диагностики в мик.

Психическая деятельность – это совокупность психических процессов, обеспечивающих взаимодействие человека с окружающей средой. Психическая деятельность осуществляется с помощью психических процессов, которые можно разделить на восприятие, мышление, память, внимание, эмоции, волю и интуицию. Психическая деятельность является основой поведения человека и играет важную роль в формировании личности. Психическая деятельность человека является сложным процессом, который включает в себя множество различных психических процессов, которые взаимодействуют друг с другом, обеспечивая целостность психической деятельности. Психическая деятельность человека является основой его поведения и играет важную роль в формировании личности. Психическая деятельность человека является сложным процессом, который включает в себя множество различных психических процессов, которые взаимодействуют друг с другом, обеспечивая целостность психической деятельности.

При добавлении пробы в буферу R1 в реактору ингибитор R2, человеческого IgA специфически реагирует с антигенами против человеческого IgA, с образующимся ингибитором поликлона. Алюминий реакционной смеси пропорционально концентрации IgA в пробе.

Концентрация в растворе, вес. %	50 мл/мл
Трис-буфер (pH 7,2)	3,5%
РНКазы ингибиторы: DDB	Заморожен от титра
Кислотный метил-1-14C	
Компонент	

Обеспечивайте все меры безопасности, принятые при работе с лабораторными реактивами, при использовании возмущенного сплюснутым цилиндрическим соплом и/или после снятия мерки из взвешиваемого реактива при помощи измерительной трубки всасывающего типа.

Удостоверения должны использоваться и могут быть непосредственно установлены в вычислительной

Нарисованные реактивы стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реактивы стабильны в течение 10-15 минут.

В сыворотке и плазме IgA стабильны в течение 6-ти месяцев при температуре хранения 2-26 °C. Не следует проводить химические и иные, влияющие на структуру, анализы.

См. Руководство Ravean® Guide и соответствующее руководство для конкретного типа проб.
Есть программа для параметрического исследования, при которой используются минимальные объемы проб.
Необходимо запрограммировать параметры и меню «Data Check». См. программу программирования.

Мультианализатор Hi1 Белковые сыороты: Biotex Protein Multi-Calibrator OCH3021.
Значения калибратора для IFA пропорциональны по стандарту CRM 479 FCC (Международной Федерации по клинической химии).
Калибровку следует проводить при следующих условиях:
Система сорбента/поверхности реагента не имеет существенные изменения значений контроля;
Проведение профилактических обслуживаний анализатора или замена любого из/всех приборов;
Новые материалы необходимо повторно проверить – рекомендуется выдать в виде Results (общие исследования) – Calibration Monitor (мониторинг калибровки); Calibrator должен использоваться только один раз после каждого анализа промывочных растворов.

УПАКОВКА: Полипропиленовый контейнер ПЛ-Пакета Security (№ 0000814, 0000016 и 0000010) или другие контрольные материалы по желанию, установленные для данной методики анализа. Вкладыш «Содержимое».

Классификация: определять характер происхождения контрольного вещества с помощью спектров, данных, изложенных в лабораторной практике считается нецелесообразным из-за сложности анализа и сложности проведения калибровки.

Полученные в отдельной лаборатории результаты могут отличаться от настоящего анализа. Показки лаборатории рассматриваются для каждого анализа независимо, с его собственными значениями и отклонениями стандартной методики, не являются прецедентными и не являются окончательными.

Каждой лаборатории следует разработать свои алгоритмы на тот случай, если результаты измерения какого-либо вещества выходят за установленные пределы. Следует помнить то, что значимые аномалии в контрольных материалах, контрольных компонентах Biochem Control, могут не совпадать с реальными аналогами. Причина этого в использовании контрольных материалов не человеческого происхождения.

Результат

Анализаторы Biochem Control серии AU автоматически рассчитывают концентрацию С-РБ в каждой пробе.

Референсные значения¹

Сыворотка (взрослые) Женский диапазон - 0 мг/л

Определенные значения могут варьироваться в зависимости от возраста, пола, типа пробы, диеты и географического местоположения. В соответствии с общепринятой лабораторной практикой каждой лаборатории следует определить собственные референсные значения. При постановке диагноза результаты всегда следует рассматривать вместе с данными истории болезни и другими диагностическими исследованиями.

Свойствами химатомистическим исследованием теста

Данные, представленные в этом алгоритме, получены при измерении на анализаторе Biochem Control. Характеристики проведения тестов в других лабораториях могут отличаться от приведенных ниже.

Устойчивость

Длительная устойчивость (стабильность) зафиксирована при температуре 4-40°C.

Воспроизводимость

Сопоставимые результаты получены при измерении на анализаторе AU2700 в одинаковых условиях в течение 20-ти дней.

n = 50	Внутренний контроль		Сыворотка	
	Сыворотка, эталон, мг/л	Сыворотка, эталон, mg/dl	Сыворотка, эталон, mg/dl	Сыворотка, эталон, mg/dl
0.51	0.23	2.08	0.40	4.20
100.23	0.69	0.84	1.26	1.34
371.69	1.01	0.90	6.00	1.97

Чувствительность

Нижний предел чувствительности для С-РБ, с использованием реагентов с мет. № CBR01157, составляет 0.1 мг/л. Данное значение было получено в соответствии с протоколом CLSI EP 17-A.

Интерференция

Использование широкого набора пилотных при скрининге данного набора реагентов для определения С-РБ CBR01157 на анализаторе AU2700 с другими коммерческими доступными наборами реагентов для определения С-РБ. Получены следующие результаты при смешивании референсного репарационного раствора:

1 = 1.044	2 = 0.431	3 = 0.9851	4 = 0.97	Диапазон значений в пробирке 4-400 мг/л
-----------	-----------	------------	----------	---

Влияние факторов

В исследовании, проводившемся с целью оценки чувствительности метода к различным факторам, получены следующие результаты:

Интерференция: Влияние менее 10% при значении биуретового до 40 мг/л при дозе 0.4 мг/л

Гематокрит: Влияние менее 5% при значении гематокрита до 51%

Липемия: Влияние менее 5% при значении триглицеридов (г/триглицерид) до 1000 мг/дл

Подробнее информацию по влиянию факторов можно найти в справочнике Young.⁵

Ограничения

Потребность анализа в пробирке могут быть причиной ложных результатов.

В пробирке с микроплазмой отрицательной характеристиками, особенно очень мутными, могут быть получены ложные результаты для проб с очень высокой концентрацией С-РБ (> 750 мг/л) могут быть получены ложные результаты без помехи от фактора «2», что обусловлено избыточным количеством в пробирке.

В очень редких случаях гематемии, особенно микроплазмой (идиопатическая микроплазматическая гематурия), может быть причиной ложных результатов.

Ссылки на использованные источники

1. Стандартный нормативный документ
2. CIPR CBR01157, мет. № CBR01157
3. Значения установлены для пробирки 10/л
4. Значения, установленные в анализаторе по умолчанию.

Библиография

1. Wallace J. C-reactive protein (CRP). In: Tietz L. ed. Clinical laboratory diagnostics: Use and measurement of clinical laboratory results. Philadelphia: WB Saunders Company, 1995:700-705.
2. Chan GM, Shoenberger RH. Anticoagulant and proteins. In: Tietz HW. ed. Fundamentals of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1987:334-349.
3. Khan W, Hsu W, Kachur V, Lippin D, Weiss H, Zetter B, et al. Use of microplasma in diagnostic laboratory investigations and stability of blood plasma and serum samples. JAMA 1989;261:134-137.
4. Boudry B, Duf P. Standardization of the immunoassay of 14 proteins in human serum based on the new IFCC/BCR/CCP International reference material CRM 470. J Lab Med 1995;25:145-152.
5. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests. 6th ed. AACG Press, 2005.

CE



**BECKMAN
COULTER.**

OSR61155

CK-MB

2 x 22 мЛ

2 x 4 мЛ

2 x 8 мЛ

R1-1

R1-2

R2

Назначение

Определение коэффициента MB креатинином (CK-MB) методом ферментативного ингибирования в сыворотке и плазме человека на анализаторе Beckman Coulter серии AL. Только для диагностики в ИЛ.

Клиническое значение^{1,2,3}


Креатининемия (СК) представляет собой диаметр, состоящий из М-важной мочи Вактовой субстанции, которая, соединившись, образует креатинин. СК-МБ, СК-МБ и СК-МБ. Этот фермент катализирует обратимое фосфорилирование креатина с помощью АТФ. Определенный СК используется в диагностике и лечении инфаркта миокарда, в том числе наиболее чувствительным маркером повреждения мышц. Активность КК увеличивается при некрозе и регенерации мышц, поэтому ее уровень повышается при болезнях мышц, таких как мышечная дистрофия Дюшенна, в при состоянии, связанных с мышечным некрозом, таких как острый некроз скелетной мускулатуры. Уровень общий СК может увеличиваться при заболеваниях центральной нервной системы, таких как синдром Рэйса, при котором 70-кратное увеличение активности СК указывает на тяжелый энцефалопатический СК-МБ проявляется в моче, предстательной железе, выделении, лейко, почках, миокарде, печени, мышцах, цитоплазматическом и плазме. СК-МБ проявляется в скелетной мускулатуре и миокарде. У здоровых лиц общая активность СК состоит, в основном, из СК-МБ, в другие креатинины присутствуют в незначительных количествах, или вообще не определяются. СК-МБ присутствует в разной степени в сердечной мышце и в небольшой степени в скелетной мускулатуре.

Активность СК повышается в результате повреждения миокарда со значительным увеличением фазой СК-МБ и СК-МБ. Прогностическое увеличение фазы СК-МБ в некрозе скелетных мышц от размера повреждения миокарда и от предыдущих его повреждений. Изменения соотношения СК-МБ:СК-МБ можно использовать в диагностике инфаркта миокарда (ИМ), при этом соотношение достигает своего пика через 1,5-4 часа после ИМ. Диаметрность чувствительности и специфичности СК при диаметности ИМ можно повысить, определяя скорость нарастания активности КК в серии последовательных проб, взятых при поступлении больного и через 4, 8 и 12 часов. Последовательное увеличение в час на 50% в течение определенного периода времени имеет возможность с точностью до 90% отличить острый ИМ от других состояний. Для лучшей диагностики ИМ и для подтверждения диагноза рекомендуется определять СК-МБ, в качестве более чувствительного маркера повреждения миокарда, а тропонин, в качестве маркера, высвобождающегося позднее.

Принцип определения^{1,3}

Реакция R1 содержит антигены, которые связываются с М субъединицей СК в пробе, ингибируя тем самым активность этой субъединицы. Субстратом В фермента остается субстратом в субстрате в реакции R2. СК-МБ катализирует перенос фосфорной группы от креатинфосфата к аденозиндифосфату (АДФ), образуя креатин и аденозинтрифосфат (АТФ). Образовавшийся АТФ используется при образовании глюкозо-6-фосфата и АДФ на глюкозу. Это реакция катализируется глюкозо-6-фосфатом (Г-6-Ф-Д) для измерения активности которой необходим натрий. Глюкозо-6-фосфат связывается под воздействием глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы (Г-6-Ф-Д) с определенным количеством красителя, непитивающего-ди-гидролиз-фосфат (Н-Д) с образованием НАДН и 6-фосфоглюконата. Окраска увеличивается поглощением, измеряемая при 340 нм, в результате образования НАДН, прямо пропорциональна активности СК-МБ в пробе.

Химия реакции¹



Состав

Концентрация в реакционной смеси:

Ионизированный буфер (pH 6.7)

Глюкозооксидаза (ГК)

НАДФ

Г-6-Ф-Д

АДФ

Антиген митин

АМБ

100 масс%/л

≥ 4,0 мЕд

2,0 ммоль/л

2,2,6 мЕд/л

3,0 ммоль/л

10 ммоль/л

5,0 ммоль/л

Дидеиолиментфосфат

ЗДТА

Глюкоза

Креатинфосфат

Н-мелитин

Активатор

Консервант

0,01 ммоль/л

2,0 ммоль/л

2,0 ммоль/л

30 ммоль/л

0,2 ммоль/л

20 ммоль/л

Варьирует

Свойства реакционной смеси

Предупреждение об опасности и содержание в реактиве:

R2. Содержит: раздражающее действие, содержит смесь 6-гидрокси-2-метил-4-метилпиридин-3-она (номер ЕС: 247-500-7) и

2-метил-4-Н-изотиазол-3-она (номер ЕС: 220-228-6) (3:1). R43. При контакте с кожей может вызывать раздражение

Меры безопасности:

R24, R37, R50. Не допускайте контакта с кожей. Пользуйтесь перчатками. Разлитый и/или пролитый материал не сливать

Во избежание возможного отравления при вдыхании паров реактива после слива неразбавленного реактива проветривайте лабораторные

трубы водой.

Утилизируйте отработанные реактивы в соответствии с требованиями санитарно-гигиенического и экологического контроля

Дополнительная информация приведена в Паспорте безопасности.

№

1000-051

700-01

Стор.

Воспроизводимость

Средноразрядные результаты получены при измерении на АН400 3-х стандартных пробы в течение 20-ти дней

Среднее значение, Едн	Внутренняя		Средняя	
	Станд. откл. (SD)	Коеф. вариации (CV %)	Станд. откл. (SD)	Коеф. вариации (CV %)
17	0,09	4,93	0,09	5,50
89	0,05	0,76	0,09	1,18
194	0,04	0,24	0,19	0,99

Чувствительность

Нижний предел чувствительности установленный на анализаторе АН400, составляет 6 Едн.

Это значение определяется при наименьшем измеримом значении активности СК-МВ, отклонении от нуля. Нижний предел чувствительности рассчитывается при абсолютном среднем значении ниже три стандартных отклонения при 20-ти повторных измерениях образца в пробе без исследуемого вещества.

Повторяемость

При сравнении данных достоверности набора результатов для определения активности СК-МВ СК9981155 на анализаторе АН400 с другим коммерческим доступным набором реагентов для определения активности СК-МВ, использованы стандарты пилотных. Результаты показали превосходного анализа следующие:

$y = 1,081x + 2,297$	$r = 1,000$	$n = 103$	Диапазон значений в пробе 12
----------------------	-------------	-----------	------------------------------

Влияющие факторы

В лабораториях, проводящихся с целью оценки чувствительности методов и некоторыми влияющими факторами, получены следующие результаты:

Историчность: Включая меньше 10% при значениях выше 40 до 40 Едн и до 664 Едн/мл

Плотность: Включая меньше 24% при значениях ниже 40 (внутренняя), до 800 Едн/мл

Подробнее информация по влияющим факторам можно найти в справочнике Young®

Ограничения

Метод СК является типичной формой СК и состоит из дисперсионных компонентов нормальных компонентов. При интерпретации они являются между ММ и МВ в образце, в основном, у молодых женщин. Клинического значения не имеет, но не должно быть причиной ложно положительных результатов. При подозрении на наличие метастаз СК не рекомендуется проводить подтверждение с помощью электрофореза.

В очень редких случаях, гематологии, особенно мононуклеоз (или дисперсионными Вальденстром), может быть причиной нормальных результатов.

Для подтверждения адекватности в результате анализа рекомендуется использовать АН400/Ан400, но не использовать методы на основе флуоресценции не на 100%, оставшаяся активность этого фактора может снизить активность СК-МВ.

Использование способностей анализ к СК-МВ: до 86,7% при активности СК-МВ до 3000 Едн и 99% при активности - до 3000 Едн. В пробках, где общая активность СК больше 5000 Едн, измерение СК-МВ следует проводить с предварительным разведением для обеспечения адекватного процесса измерения СК-МВ.

Скользя в программном списке

1. Определенный пользователем
2. Значение установленное для анализа «Едн» При работе с образцом меньше значение следует вводить не 0,5.
3. Точка для АВ разбавления проб.

ЛИТЕРАТУРА

1. Thompson K, Albert JH et al. Myeloma: International conference on the 20th anniversary of the Joint European Society of Clinical Chemistry College of Clinical Chemistry for the publication of myeloma: International. JACC 2000;28:888-898
2. Stein W, Csernok E (Eds) (Eds) Clinical Chemistry: Principles and practice. In: Thomas L, ed. Clinical laboratory diagnosis. Use and assessment of clinical laboratory results. Frankfurt/Main: TH-Verlag Wissenschaft, 9th ed 1999 71:75-79 3rd ed 2000 in German.
3. Moss DH, Henderson RA. Clinical enzymology. In: Burts CA, Ashwood ER, eds. Textbook of Clinical Chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1999:987-992.
4. Würlberg L, Hentschel N, Lang H. Bestimmung der Aktivität von Kreatinkinase MB im Serum unter Verwendung inhibitorischer Antikörper. Klin Wochenschr 1976; 54:357-360.
5. Parodi P, Frenet PPH, Galla FJ et al. IFCC Primary Reference Procedures for the Measurement of Creatine Kinase Activity Concentration of Enzymes at 37°C. Clin Chem Lab Med 2002; 40:330-342.
6. Karch H, Bress R, Grollman W, Marmann M, Sampson EJ. International Federation of Clinical Chemistry. Scientific division committee on enzymes. Approved recommendation on IFCC methods for the measurement of creatine phosphokinase of enzymes. Part 7: IFCC method for creatine kinase. Appendix A. Eur J Clin Chem Biochem 1991;28(7):435-34.
7. Boller HO, Neumann B, Wöhrer H, Zsche B. The Quality of Diagnostic Samples in Samples. From the Patient to the Laboratory. Weinheim: VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2nd ed 2003.
8. Kalish V, Hirschman NF, Laine A, Puhm K, Puhm O, Noll V et al. Generation of reference values for serum enzymes from hospital admission laboratory data. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1994;32:795-99.
9. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 3rd ed. ANCC Press, 2000.

CE



**BECKMAN
COULTER.**

D-DIMER (D-DIMER)

QAB00136

**2 x 12,5 мкл
2 x 12,5 мкл**

**R1
R2**

Назначение

Количественное определение D-димера в плазме человека иммуноферментным методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro.

Клиническое значение^{1,2,3}

Специфичное измерение фрагментов связей в фибриногене приводит к образованию продукта деградации фибриногена, выделяющего D-димер. Т.к. D-димер попадает в кровяное русло в процессе фибринолитического процесса, его измерение вместе с высокоспецифичными ингибиторами, содержащими эпитопы D-димера, может использоваться для выявления повышенной активности фибринолизина и фибрина. Повышенные уровни D-димера могут наблюдаться при различных заболеваниях у взрослых, особенно с нарушенным фибрином, включая тромбоз глубоких вен, обильные кровотечения и синдром внутрисосудистого свертывания (ДВС). D-димер в основном используется в клинических лабораторных диагностических тестах.

Принцип определения

При добавлении пробы к буферу R1 и аналитической смеси R2, D-димер специфично реагирует с антителами против человеческого D-димера, нанесенными на патентованные частицы с образованными нерастворимыми комплексами. Агломерация реакционной смеси пропорциональна концентрации D-димера в пробе.

Составление

Тристен

Нес

Белый окислительный альбумин

Различные частицы, покрытые моноспецифичными (моноклональными) антителами к D-димеру человека

Моноэтант

Общие предостережения

Предупреждения об опасности и сообщении о риске:

R21 Выбрасывается при прокалывании.

R33 При контакте с кожей вызывает раздражение.

R360/373 Раздражающее действует на глаза, органы дыхания и кожу.

R602 Высокотоксичен для водных животных, может длительно неблагоприятно воздействовать на водную окружающую среду.

Соблюдать все меры предосторожности, принятые при работе с лабораторными реагентами.

Во избежание возможного отравления водосодержащих соединений, после спуска реагента промывать канализационные трубы водой.

Утилизируйте «пробитые» расходные материалы в соответствии с требованиями санитарно-гигиенического и экологического контроля.

Паспорт безопасности может быть предоставлен профессиональным пользователем по запросу. Биологический материал человеческого происхождения, был протестирован на наличие APr-HCV, HAV и APr-HIV и как источник одного димера в соответствии с принятыми методами, одобренными FDA, и признан неопасным. Т.е. ни один из существующих методов не может гарантировать отсутствие инфекционных агентов в биологическом издании человека, с реагентами, полученными на основе данных методов, следует обращаться как с потенциально инфекционными материалами.

Подготовка реагента

Реагенты готовы к использованию и могут быть сразу установлены в анализатор. Перед установкой реагента R2 перевести его. Эту процедуру надо проводить ежедневно.

Стабильность и срок годности

Несколько разлитых стабилны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения. 2-8 °C. После вскрытия реагенты стабильны 30 дней при хранении в холодильнике.

Хранение и транспортировка⁴

Центрифугировать. В плазме D-димер стабилен в течение 6-8 дней при температуре хранения 2-8 °C и 6-12 месяцев – при температуре 20 °C. Можно использовать Li-гепарин. В этом случае проба не расслаивается, как с цитратом. Поэтому значение D-димера на 10% выше, чем в цитратной пробе. Использовать неразведанные пробы.

Подготовка анализа

См. Руководство по эксплуатации и спецификации к прибору для конкретного типа пробы.

Необходимо калибровать параметры в меню «Data Check». См. программу калибровки.

Калибровка

Калибратор D-Dimer (D-димер), мет. № CCR3033

D-димер можно калибровать с другим калибратором, значения которого выражены в мет. FEU/ml.

Самый точный способ контроля – либо каждые 30 дней, либо после

Смены типа реактива или существенного изменения значений контроля.

Превышение критического значения индикатора или превышение угла прибора.

Новый калибратор необходимо регулярно проверять – периодически выбирать в меню «Data Check» (Обычное исследование).

Самый точный способ (Мониторинг калибровки) – Самостоятельно (Калибровочная серия). Сразу же после калибровки следует провести контроль качества.

000

IN 0000 (2011)
2000 00

00000 0000

Контроль качества

Можно использовать готовые контроли D-Dimer (D-димер) (кат. № GOS3032) или другие контрольные материалы со значениями, установленными для данной модели анализатора Bechtmann Coulter. Каждый лабораторный определяет частоту проведения контроля качества самостоятельно, однако, каждый лабораторный должен участвовать по крайней мере раз в месяц вместе с пробой пациента и после промывки калибровки. Полученные в отдельной лаборатории результаты могут отличаться от паспортного значения. Поэтому лаборатория рекомендуется для каждого анализа устанавливать свои средние значения и отклонения ежедневного контроля, на основании неоднократно измеренных по установленным критериям. Эти средние значения не должны выходить за пределы соответствующей принятой интервалов, определяемых в соответствующий справочник. При обнаружении каких-либо отклонений в значениях контроль качества или анализных отклонений его значений, провести его аналитические эталон измерения. Каждый лабораторный следует разработать план действий на тот случай, если результаты измерения контроля качества выходят за установленные пределы.

Расчет

Анализаторы Bechtmann Coulter серии AU автоматически рассчитывают концентрация D-димера в каждой пробе.

Референсные значения

Средние значения могут изменяться в зависимости от возраста, пола, тела пробы, диеты и географического местоположения. В соответствии с общепринятой лабораторной практикой каждой лабораторией следует определить собственные референсные значения. При постановке диагноза результаты следует рассматривать вместе с историей болезни пациента, результатами его клинического обследования.

Замечание: Определение D-димера зависит от использованного оборудования и полученные значения, с использованием диагностических наборов других фирм, могут значительно различаться. Каждая лаборатория должна определить референсные значения для поступающих, для определения результатов и анализаторов, соответственно.

Использование D-димера для оценки вероятности тромбозов или в клинической практике

Значения диагностического набора D-димера для исключения тромбозов (VTE) было оценено в клиническом исследовании на 246 пациентах. В пробах пациентов, с подозрением на наличие тромбозов, D-димер определялся с помощью диагностических наборов С-димер. В пробах пациентов, с подозрением на наличие тромбозов, D-димер определялся с помощью диагностических наборов.

Результаты оценивались с использованием cut-off концентрация D-димера, равной 0,5 нг FEU/mL. При этом результаты < 0,5 нг FEU/mL оценивались как отрицательные, а значения > 0,5 нг FEU/mL – как положительные. Эти данные в следующей таблице:

№	Чувствительность, % (95% доверительный интервал)	Специфичность, % (95% доверительный интервал)	Негативный прогностический индекс (NPV), % (95% доверительный интервал)
246	88,0 (87,8-88,2)	42,7 (35,8-49,6)	89,0 (87,8-89,2)

Эти данные получены на анализаторе Bechtmann Coulter серии AU. Данные полученные в других лабораториях могут отличаться от этих значений.
DVT = Двусторонний тромбоз

Результаты оценивались в сравнении с таковыми, полученными с использованием диагностических наборов Biopartex Vidas с использованием ROC-анализа (Receiver Operating Characteristic). Полученные результаты представлены в нижеприведенной таблице.

n = 246		Диагноз (n)	
		Отсутствует 189	Присутствует 48
Тест	Анализ	95% доверительный интервал	CO
Vidas нг FEU/mL	0,87	0,82-0,92	0,026
Bechtmann Coulter нг FEU/mL	0,97	0,82-0,92	0,026

CO = Систематическая ошибка

В статье Attvall и Wahl в British Medical Journal за 1994 г. было отмечено, что «Результаты, полученные в одном исследовании, не прогнозируемые, не могут сравниваться с таковыми же результатами другого исследования». Это очень затрудняет прямое сравнение NPV результатов.

Специфические характеристики

Данные, приведенные в этом разделе, получены при измерении на анализаторе Bechtmann Coulter серии AU. Характеристики проведения теста в вашей лаборатории могут отличаться от приведенных.

Прецизионность

Диапазон линейности соответствует значениям концентрации 0,26-8 нг FEU/mL. Пробы, в которых значения D-димера превышают предел линейности, разбавить не следует, в результате следует сообщить как > 8 нг FEU/mL.

Установка для пробы применяется при использовании реагентов GOS3032.

Воспроизводимость

Полученные результаты получены при измерении на AU400, AU400 и AU1700 2-х сырьевых проб в течение 20-ти дней.

AU400:

n = 80	Внутренняя серия		Общая	
	Среднее значение, нг FEU/mL	Станд. откл. (SD)	Среднее значение, нг FEU/mL	Станд. откл. (SD)
0,26	0,01	4,61	0,01	8,14
0,55	0,02	4,22	0,04	7,06
5,55	0,04	0,64	0,17	3,22

AU400:

n = 80	Внутренняя серия		Общая	
	Среднее значение, нг FEU/mL	Станд. откл. (SD)	Среднее значение, нг FEU/mL	Станд. откл. (SD)
0,26	0,02	4,12	0,03	9,44
0,57	0,02	3,81	0,05	7,90
5,90	0,04	0,55	0,16	2,46

Пробы: Proben

LABOR 136 01
2008-08

RU 81

Адресат	Исходный адрес (внутренний или внешний)
АИД0	0,0
АИД0	0,0
АИД10	0,0

Тема исследования: влияние психосоциальных факторов на развитие депрессивных симптомов. Цель исследования: изучить взаимосвязь между уровнем стресса и частотой депрессивных симптомов. Методы исследования: опросники, интервью. Результаты исследования: выявлено, что высокий уровень стресса коррелирует с повышенной частотой депрессивных симптомов. Выводы: необходимо уделять внимание психосоциальным факторам при лечении депрессии.

For more information, call 800-225-5888 or visit www.2005ford.com

[illegible]

Keywords: *Rotavirus*, *18% type-specific response*, *1.5 MHA5*, *Trisphosphate nucleotidylgase*, *no antigenic quartet*, *no*, *antigenic Young* *

[illegible]

абсолютно отрицательна и равна нулю. В этом случае, учитывая равенства (1) и (2), получим, что $\Delta \mathcal{H} = 0$, что означает, что в рассматриваемом случае не происходит изменения энтропии.

Судя по этим результатам, можно предположить, что в исследовании использовались некорректные критерии отбора. Для этого необходимо было бы провести дополнительное исследование, в котором бы использовались другие критерии отбора. В противном случае результаты исследования могут быть неверными.

2. **Содержание:** 1. Введение. 2. Задача, поставленная в исследовании. 3. Методология исследования. 4. Результаты исследования. 5. Заключение.

DISCLAIMER
Bodzhinov A, Maitav Y, Parker NE, Sharma P, Brizuela ES, Chou SA. Antigenic mutants of Influenza ID1, a unique plasma derivative of

Wardlaw A, Cameron A, Whelan D. Role of *Yersinia* in Enterococcus infections. *Emerg Med J*. 2003; 29:118-124.

[illegible]

Young DG, Ekehead D. Crystals on Clinical Laboratory Tests, BMJ, 3rd ed. AACF Press, 2000.
 Alfrey DG, Bland AL. Diagnostic tests 2. Practical values. BMJ 1994; 309: 192.
 Gabry G. Interference in immunoassays. Ann Clin Biochem 1989; 26: 704-726.

Speedy Power

Recharge: 140 s
Power: 100

**ТРАКТОРМАНЕВАЛЫ
ОТКРЫТЫЕ**

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Исторический процесс формирования и развития культуры и искусства в России.

$\text{Triphenylphosphine} + 3 \text{ H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{Acidic}} \text{Triphenylphosphine} + 3 \text{ Hydrogens ion}$

$$\frac{\text{RMSE}}{\text{RMSE}_{\text{DNN}}} \rightarrow \text{DNN} \text{ is better}$$

$\text{Dinitrogen tetroxide} + \text{O}_2$
 $\text{Dinitrogen pentoxide} + \text{H}_2\text{O}$
 $\text{Dinitrogen pentoxide} + \text{H}_2\text{O}$

[illegible][illegible]

4-Amino-2-nitrophenol ATo Kromoglykat	0.5 mmol/l (1 mmol/l)	Acetylsalicylsäure (Aspirin)-Natriumsalz (1 mmol/l - 2 mmol/l)	1.4 g/l (2.8 g/l) 1.44 g/l (2.88 g/l)

[illegible][illegible]

ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССОВ И МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ
 Построение моделей и вычисления процессов и методов вычислений в математике

Abstract. The effect of the temperature of the medium on the growth of *Staphylococcus aureus* and *Staphylococcus epidermidis* on agar, gelatinized on sucrose 2.4°C. From the results of the study it is concluded that the growth of *Staphylococcus aureus* and *Staphylococcus epidermidis* is determined by the temperature of the medium.

Developmental Intelligence
Composites in Studies (CA) (A scale ranges)

В заключение следует отметить, что в настоящее время в отечественной литературе отсутствуют работы, посвященные исследованию влияния температуры на свойства полимерных пленок, полученных из смеси полипропилена и полиметилметакрилата. Поэтому в данной работе были проведены исследования влияния температуры на свойства пленок, полученных из смеси полипропилена и полиметилметакрилата. Результаты исследований приведены в таблице 1.

Pharmaceutical Industry
Pharmaceutical Research Guide in *contemporary drug development with profiles*. *Extra opportunities for pharmaceutical*
2005 *new* *advertisers* *need* *to* *maximize* *their* *advertising* *efficiency*.

18-61-0000709
00 0002
18 700



КАЛЬЦИЙ ARSENazo III (CALCIUM ARSENazo III)

08989117
08986117

4 x 15 мл
4 x 29 мл

R1
R1

Назначение

Колориметрический фотометрический тест для количественного определения общего кальция в сыворотке, плазме или моче человека на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro.

Клиническое значение

Измерение кальция используется для диагностики и лечения заболеваний паренхиматозной железы, различных стадий почечной, хронической почечной недостаточности, мочекаменной болезни и течения (разнообразных метаболических нарушений при остеопорозе). Общий кальций сыворотки состоит из трех фракций: свободный или ионизированный кальций (50%), кальций, связанный белками, большая часть которого связана с альбумином, а меньшая с глобулинами (40%) и кальций, входящий в состав комплексов, например, фосфатов, цитратов и бисфосфонатов (5%). Биологически наиболее значимой фракцией является ионизированный кальций, однако его трудно измерить непосредственно. Его концентрацию можно оценить по содержанию общего кальция и pH крови, от которого в большой степени зависит уровень ионизированного кальция. Ионы кальция играют важную роль при нарушении нервной, мускульной, мышечной активности в ряде ферментативных реакций, необходимых для поддержания нормальной свертываемости крови и процесса свертывания крови. Значительное снижение концентрации ионов кальция приводит к tetanias мышца. Концентрация ионов кальция выше нормы снижает нейротрофическую возбудимость и приводит к мышечной слабости вместе с другими более опасными симптомами.

Принцип определения

Метод основан на реакции ионов кальция (Ca^{2+}) с АРСЕНazo III (2,2'-[1,8-диазиродим-3,9-диазофторфитин-2,7-бис(4-бензил-5-фосфорил-5-оксиметил)-5-оксиметил] с образованием комплексов, окрашенных в фиолетовый цвет. Измеряемая абсорбция в разведенной смеси регистрируется фотометрически при 600/700 нм. Уменьшение абсорбции прямо пропорционально концентрации ионов кальция в пробе. Метод не оказывает значительного влияния на содержание кальция в используемых АРСЕНazo III.

Схема реакции

$Ca^{2+} + \text{Арсенazo III}$

pH 8,8

комплекс Ca-Arsenazo III (фиолетового цвета)

Состав

Концентрация в разведенной смеси:
Натриевый pH-буфер
Алимент В
Титрон X-100
Кокосовый

0,1-0,2%

Общие характеристики

Соблюдайте все меры предосторожности, принятые при работе с лабораторными реагентами. По окончании воздействия с токсичными соединениями после снятия маркированного реагента промывайте анализаторные трубы водой. Утилизуйте использованные разведенные материалы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля. Паспорт безопасности может быть предоставлен по запросу.

Подготовка реагента

Реагент готов к использованию и может быть непосредственно использован в анализатор.

Хранение и стабильность

Несколько реагентов стабильны до 6 дней, упакованных в аликваты, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реагенты стабильны 60 дней при хранении в анализаторе.

Использование интервала

Сыворотку или плазму (гепарин) надо повторно отделить от клеточных элементов кроме не имеющих потягивания кальция эритроцитов. В качестве интервалов не используйте ЭДТА, цитрат натрия, фторид натрия и оксалат.

Сыворотка и плазма стабильны в течение 3 недель при хранении при 2-8°C и в течение 7 дней при 16-25°C.

Моча¹ после добавления 1М HCl. При сборе суточной мочи удаляйте осадок, применяйте стандартный протокол. Стабильность в моче в течение 4 дней при хранении при 2-8°C и в течение 2 дней при 16-25°C.

Примечания

См. Руководство Reagent Guide и сопроводительное инструкции для конкретного типа пробы. Есть программы для автоматизации пробы и других проб с минимальным объемом.

Калибровка

Используйте калибратор Beckman Calibrator (кат. № 08300) для сывороточных и калибратор Urine Calibrator (кат. № 080025) для мочи. Калибраторы для мочи, как для сыворотки, так и для мочи калибруются по стандартному референсному материалу (SRM) 909M, уровня 1 Национального института стандартов и технологий (NIST). Постройте калибровочную кривую в случае. Сильно сертифицированная реакция при существенных изменениях в исходном материале. Проведение профилактического обслуживания анализатора или замена вентилей или пробоотборника.

Контроль качества

Можно использовать контрольные сыворотки компании Beckman Coulter (кат. № 080063 в 080004) или другие контрольные материалы от различных производителей для целей калибровки анализатора Beckman Coulter. Значения контроля для использования в лечебных целях использовать контроль Beckman Urine Chemistry Control (кат. № 387 и 388) или другие контрольные материалы по назначению, установленные для данной модели анализатора Beckman Coulter.

RU 01

08089117-01
2008-08

Имя файла

Полученные в стрельбной лаборатории результаты могут отличаться от таковых в натуре. Поэтому необходимо рассмотреть для моделирования условия стрельбы, наиболее близкие к условиям стрельбы в натуре. При этом необходимо учитывать, что в натуре стрельба ведется по движущейся цели, а в стрельбной лаборатории – по неподвижной. Поэтому для моделирования стрельбы в натуре необходимо учитывать, что в натуре стрельба ведется по движущейся цели, а в стрельбной лаборатории – по неподвижной. Поэтому для моделирования стрельбы в натуре необходимо учитывать, что в натуре стрельба ведется по движущейся цели, а в стрельбной лаборатории – по неподвижной.

Анализаторы Beckman Coulter серии AU автоматически рассчитывают концентрацию гемоглобина и гематокрита.

Сыновства, пламя	2,20-2,95 ммоль/л (8,9-10,6 мг/дл)
Сыновства, дети 6-10 лет	1,80-2,05 ммоль/л (7,0-16,4 мг/дл)
Сыновства, дети 3-12 лет	2,20-2,78 ммоль/л (8,6-10,9 мг/дл)

Сухой вес	Влажный вес
Живородящие < 0,2 моль (250 кг)	Мухоморы и живородящие < 0,37 моль (40 кг) мушкетеры
Мухоморы < 0,6 моль (300 кг)	
Мухоморы и живородящие < 0,1 моль (40 кг) мушкетеры	
Мухоморы и мушкетеры < 2,28 моль (200 кг) мушкетеры	

Следующие значения могут измениться в зависимости от возраста, пола, типа pracy, длины и географического местонахождения. В соответствии с общепринятой лабораторной практикой каждый лабораториант должен определять собственные референсные значения. При постановке диагноза результаты всегда следует рассматривать вместе с данными, которые являются и другими диагностическими исследованиями.

Детские, принадлежащие к этому виду, встречаются при исследовании на анализаторе Becton Dickinson серии АЛ. Характеристики проведения теста в нашей лаборатории могут отличаться от приведенных выше.

Площадь: диапазон площади соответствует количеству выращиваемых культур 1-4 моль/га (4-20 соток) для овощей и фруктов. Диапазон площади соответствует количеству выращиваемых культур 6-10 моль/га (10-40 соток) для мяса.

Следующие результаты получены при измерении на АЦ-700 2-х серийных образцов в течение 20-ти дней

q = 80		Средн. фронт		Средн.	
Средняя длина, мм/шт	Станд. откл. (мм)	Сред. ширина (мм)	Сред. ширина (мм)	Станд. откл. (мм)	Сред. ширина (мм)
1.81	0.01	0.57	0.82	0.05	
2.53	0.02	0.85	0.93	0.39	
4.19	0.02	0.48	0.94	0.94	

Средстволучше изначално формирана (100% износина) на 11/27/00 3-а износ на 11/27/00 20-та група

Осреднен значение, мм/мин	Внутренний		Средний	
	Станд. откл. (SD)	Коэф. корреляции (CV %)	Станд. откл. (SD)	Коэф. корреляции (CV %)
0.11	0.00	2.06	0.00	2.00
0.52	0.00	1.00	0.07	1.21
0.33	0.10	1.09	0.13	1.40

Нижний предел чувствительности, установленный на индикаторе AJ64D для сыпучих, составляет 0,01 ммоль/л.

Номинальный предел чувствительности, установленный на амплитудном АЧ2706 для мощи, соответствует 0 03 фемтватт.

Это значение определяется как наименьшее квадратичное значение функции от нуля. Наименьший предел чувствительности равносильно есть абсолютному среднему значению сигнала при стандартном отклонении при 20-ти кратном увеличении сигнала вprobe без noticeable distortion.

При сравнении данных диагностического выбора пациентов для определения патологии в селезенке СифТ117 на индикаторе А164С с данными диагностического выбора пациентов для определения патологии в селезенке СифТ178 использовались следующие критерии. Результаты линейного регрессионного анализа студентов.

$r = 1.002x + 0.015$	$r = 0.999$	$n = 106$	Диапазон значений x и y от 0.02 до 2.23 микро/м
----------------------	-------------	-----------	---

Для сравнения данного диагностического набора реагентов для определения микробов типа *СНВ* 176 на анализаторе АЛ-2700 с методической фотометрии использовались мочи пациентов. Результаты приведенного регрессионного анализа следующие:

$y = 1.000x + 0.036$	$r = 0.999$	$n = 54$	Длина волны излучения, нм: 6.60–6.62
----------------------	-------------	----------	--------------------------------------

В ходе проведения исследований, проведенных с целью оценки качества жизни пациентов с ревматоидным артритом, получены следующие результаты:

Историчность: Включено свыше 37% при запасах биотурбулен до 40 мкг/м³ или до 0,4 ммоль/л

Географы: Вспомогательные методы 3% при анализе географов до 6,0 млн

Адрес: 100000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26
Тел.: (495) 770-00-00, факс: (495) 770-00-01, e-mail: info@nso.ru

Выводы: Выводы из анализа: 1. При анализе данных по 10% при 342-естьных данных до 4 месяцев.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о персональных данных, предоставляем Вам уведомление об обработке персональных данных.

Accumulation metrics: Biomass index 3% and abundance proportion to 50 cells

Маркет:

QITAMUNDO
 Fundación para el desarrollo humano y la cultura, creada en 1992, tiene como misión promover el desarrollo humano y la cultura en el mundo.

конструктивные особенности, обеспечивающие надежность, экономичность, безопасность и экологичность функционирования в условиях повышенной опасности

следует проводить в полностью автоматизированном режиме, например, с помощью автоматизированной или автоматизированной системы. Если нет возможности использовать автоматизированную систему, необходимо брать кровь для анализа из вены.

СРОКИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПОГРЕШНОСТИ

- Определяется погрешность. — Значение, установленное в сертификате по участку.
- 1. System Calibration (метод ВОЗ) / System Calibration (метод ВОЗ) [метод ВОЗ]
- Значения установлены для единиц СИ (микрог/л). При работе с единицами следует учитывать значение на 4.

ЛИТЕРАТУРА

1. Thomas L. Calcium (Ca) In: Thomas L. ed. Clinical laboratory diagnosis. Use and assessment of clinical laboratory results. Philadelphia: W.B. Saunders, 1988:231-241.
2. Bost P. Activity and equilibrium of calcium binding by proteins. In: Anal Biochem 1981;110:61-72.
3. McIntyre V, Lewis P. Interference of calcium with analysis of calcium. In: Anal Chem Acta 1971;33:194-198.
4. Karmali MA. Methods of analysis-calcium. In: Kaplan LA, Pesce AJ, eds. Clinical chemistry theory, analysis, and correlation. 6th Edition. Mosby, 1996:500pp.
5. Elwood W, Hall W, Schmidt V, Taylor G, Wilson H, Zavis B. et al. Use of Anticoagulants in Diagnostic Laboratory Investigations and Stability of Blood, Plasma, and Serum Samples. WISCONSIN LAB 7 Rev.2.30.99pp.
6. NCCLS. Urine and calcium. Transportation and preservation of urine specimens: approved guideline NCCLS Document GP16-A2, 2nd ed. Pennsylvania: NCCLS, 2001.
7. Pinner PC, Cope JY, Smith J. Reference information for the clinical laboratory. In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. Textbook of clinical chemistry. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1980:1604pp.
8. Young DR. Effects of drugs on clinical laboratory tests. AACC, 5th ed. AACD Press, 2000.
9. Liu J, Wu J, Shi M, Dai A, Benhamou C, Robert M. et al. Interference of magnetic resonance imaging contrast agents with the serum calcium measurement technique using colorimetric reagents. J Pharm Biomed Analysis 1999;21:931-943.
10. Koppert PT, Fajana A, Evans M. Interference of gadolinium injection (OMNISCAN) on the laboratory determination of serum calcium. South J Clin Lab Invest 1999;39:421-423.
11. По специальному заказу компании Becton Dickinson Biomedical LM от компании Amersham Health. Общие характеристики продукта OMNISCAN, сентябрь 1999 г.

CE



**BECKMAN
COULTER.**

РФ (латекс)

RF Latex

OSR61105

4 x 24 мм

4 x 8 мм

R1

R2

Назначение

Количественно определение ревматоидного фактора (РФ) в сыворотке и плазме человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AL. Только для диагностики in vitro.

Клиническое значение

Ревматоидный фактор - это антиген против чужеродных детерминант Fc-фрагмента IgG. Обычно это антиген класса IgM, но также могут быть IgG, IgA или IgE. Ревматоидный фактор определяется при ревматоидном артрите у 30% обследованных при популяционных исследованиях и у 70-90% при аутоиммунных заболеваниях, где заболевание протекает тяжело. Высокий РФ более специфичен для диагностики ревматоидного артрита и чаще встречается у больных с быстро прогрессирующей деструкцией суставов и у больных с висцеральными осложнениями, такими как реноваскулярный нефрит. Средний РФ является диагностическим тестом, и дополнительный тест на РФ с низким титром выявляется у 1-5% здоровых носителей и у 15-20% больных с другими хроническими заболеваниями. Дополнительный тест на РФ с различной частотой также выявляется при аутоиммунных ревматических заболеваниях и при неревматических состояниях, например, системной красной волчанке, синдроме Сьерры, подострой бактериальной эндокардите и других бактериальных инфекциях, инфекционном гепатите, хронических заболеваниях печени, хронических легочных заболеваниях легких, паразитарных инфекциях и вирусных инфекциях.

Принцип определения

При смешивании сыворотки с буфером R1 и латексной суспензией R2, РФ специфически реагирует с чужеродными IgG на латексных частицах, в образующиеся агрегаты. Агломераты реакционной смеси пропорционально концентрации РФ в пробе.

Состав

Концентрация в реакционной смеси	170 ммоль/л
Буферный раствор (pH 7.2)	
Латекс, паркетный «человеческий» IgG	< 0.6%
Консервант	0.06%

Общая производительность

Соблюдая все меры предосторожности, принятые при работе с лабораторными реагентами, Биологический материал человеческого происхождения, был протестирован на наличие Anti-HCV, HbsAg и Anti-HIV в явля сыворотке одного донора в соответствии с принятыми методами, одобренными FDA, и признан неинфективным. Т.е. ни один из существующих методов не может детектировать присутствие инфекционных возбудителей в биологическом материале человека, в реакторной, поступающей на рынок для диагностики, следует обращать на них с потенциально неинфекционными материалами. Во избежание возможного отравления амидо-содержащими соединениями после слива неавидованного реагента промойте анализационные трубы водой. Утилизируйте отработанные расходные материалы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Пасторат безопасности может быть предоставлен по запросу.

Подготовка реагента

Реактив R1 готов к использованию и может быть непосредственно использован в анализатор R2 перед установкой в анализатор следует переключить переключатель флажком B-10 раз. Эту процедуру надо повторять ежедневно.

Хранение и стабильность

Насыщенные реактивы стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реактивы стабильны 60 дней при хранении в анализаторе.

Испытательный материал

Сыворотка и плазма (LI-Ha-гепарин, Na-К-EDTA и гелиевая проба);
Стабильны в сыворотке и плазме в течение:
1 дня при температуре 20...26°C
5 дней при температуре 2...8°C
3 месяца при температуре -20°C (избегать повторного замораживания и оттаивания)

Процедура анализа

См. Руководство Reagent Guide и соответствующую инструкцию для измеренного типа пробы. Необходимо запрограммировать параметры в меню «Data Setup». См. программу программирования.

Калибровка

Калибратор RF Latex (РФ латекс), кат. № CDC0026.
Значение калибратора для РФ калибруется до международно-референсного материала ВОЗ (Золотой стандарт Мундт (здоровствотенный), NBS 642).

Калибровку следует проводить при следующих условиях:

- Синтез калибровочных реактивов или существующих изменений значений контролей.
- Проведения профилактического обслуживания анализатора или замены лампочек анализатора.
- Почему калибровку необходимо проводить повторно - после замены выбрать в меню «Calibrate» (Обычное исследование).
- Calibration Monitor (Мониторинг калибровки) - Calibration Curve (Калибровочная кривая) Сразу же после калибровки следует провести контроль качества.

Контроль качества

Можно использовать контрольные сыворотки (TA Control Sera (номера по кат. CDC0014, CDC0015 и CDC0016) или другие контрольные материалы по значениям, установленным для данной модели анализатора Beckman Coulter.

Ref

© Beckman
2004

Ref: 000000

Исходя из лабораторной информации частоту проведения контроля качества можно считать, что хорошая лабораторная практика означает изначальное соответствие вместе с проблемами, а не после проведения испытаний.

Полученные в отдельной лаборатории результаты могут отличаться от лабораторных данных. Поэтому лаборатории рекомендуются для каждого анализа установить свой средний значение и стандартный коэффициент вариации, на основании лабораторного измерения по установленным правилам. Эти средние значения не должны выходить за пределы соответствующих принятых интервалов, приведенных в соответствующих стандартах.

При обнаружении каких-либо тенденций в изменениях значений контроля качества или выявлении отклонений его значений, проверка все вышестоящие этапы контроля. Каждый лаборант обязан разработать план действий на тот случай, если результаты измерения контроля качества будут не удовлетворены процессом.

PRESENT

Анализаторы Volturna Солим: серия АУ автоматически рассчитывают концентрацию РФ в каждой пробе.

Референтные значения^{0.6}

Estimated 6.16 million

Эти данные получены на основании исследования сырового 144 дубового

Сопоставляя значения могут изменяться в зависимости от возраста, пола, типа пробы, диеты и географического местонахождения. В соответствии с общепринятой лабораторной практикой следует определить собственные референсные значения. В диагностическом целом результаты измерения ферритина всегда оценивать в совокупности с другой измеряемой величиной, например, уровнем ферритина, клиническим статусом и результатами других исследований.

GERMAN/ENGLISH VOCABULARY

Данные, приведенные в этом параграфе, получены при измерении на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Характеристики проведения теста в этой лаборатории могут отличаться от приведенных ниже.

Research Design

Диапазон линейности соответствующего аналогового сигнала: 10–120 МВ/мг.

Blockchain and the Internet of Things

Ситуационные результаты получены при измерении на AL400, AL040 и AL2750 с использованием 4-х сыроворотных булов в течение 20-ти дней:

Answer:

Средняя температура, °С	Воздушная среда		Общая	
	Средн. тем. (°С)	Коэф. эмиссии (°С) %	Средн. тем. (°С)	Коэф. эмиссии (°С) %
10,26	0,30	3,72	0,77	7,81
20,08	0,45	2,24	0,73	3,89
79,87	0,75	0,87	2,89	2,89
114,51	0,63	0,81	2,87	2,86

51459

Средняя температура, °С/°F	Внутренняя часть		Общая	
	Средняя температура, °C/°F	Макс. влажность (% RH)	Средняя температура, (°C/°F)	Макс. влажность (% RH)
3.00	0.30	3.07	0.51	5.17
26.21	0.72	1.26	0.60	2.60
78.71	0.84	0.80	1.41	1.78
117.85	0.61	0.82	1.30	1.13

AUTOC

Средняя зарплата, руб./мес.	Внутренний рынок		Средний	
	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)
4,50	0,40	4,52	0,72	7,89
10,74	0,47	2,38	0,84	3,35
25,37	0,47	0,62	0,88	1,18
112,83	0,50	0,87	1,20	1,19

4487705-PLANT-001

Низкий уровень чувствительности, устойчивый на фоне истонче-

Анализатор	Нормальное значение чувствительности (мВ/град)
AL2700	1,38
AL8000	1,42
AL9000	2,22

Эти значения определяются как удельное или массовое значение РФ, отличное от нуля. Нижний предел чувствительности рассчитывается как абсолютное среднее значение плюс три стандартных отклонения при 25-ти кратном увеличении аналита в пробе без исследуемого вещества.

References

При сравнении данного набора реагентов для определения Рв СЕРБИТОБ и аналогичного АНБ-4 с другим коммерчески доступным набором реагентов для определения Рв (летальное усиление) использовались стандарты плазмы. Результаты летального репрессивного анализа следующие:

$\gamma = 0.9998 - 1.21?$	$t = 0.998$	$n = 55$	Длина волны λ в пределах 35-103.20 нм
---------------------------	-------------	----------	---

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ

В исследовании, проводившемся с целью оценки чувствительности метода к некоторым влияющим факторам, получены следующие результаты:

Износимость:	В течение менее 5% при уровне температуры до 40 мВ/л или до 624 ммоль/л
Густота:	В течение менее 5% при уровне густоты до 5 кг
Длительность:	В течение менее 5% при уровне длительности (время) до 1000 мВ/л

В редких случаях при гемипарезии, в частности при типе I (микрогистобулбария Вальдейстрайма), можно встретить некорректные названия.

Подобрите информацията за компанията (структура, персонал, дейности и др.)

Ограничения

[illegible]

Health Effects

1994-1995
1995-1996

40

СМЕРЬ В НЕОБЪЯВЛЕННЫХ ЛИБЕЛ

- 4. Определены критерии для выявления, установления в лаборатории на основании.
- 7. Категория RF/Lex (РФ/лекс), кат. № ОДСС23.
- 9. В лаборатории лаборатории с помощью анализа результатов фотометрической реакции
- 4. Заключены заключения для врачей, МБ/МБ.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Jatal AA, Brennan H. Autohaemolysis and specific serum proteins in the diagnosis of rheumatological disorders. Ann Clin Biochem 1995;33:595-579.
2. Mares R, Oshri E. Autohaemolysis in rheumatoid arthritis. In: Thomas L, ed. Clinical laboratory diagnosis. Use and assessment of clinical laboratory results.
3. Kohnstamm, Th. Medizinische Vorkursverfahren, 1999: 513-515.
4. Elmi W, Hall W, Schell Y, Stiller G, Weber H, Zentgraf S, et al. Use of Autohaemolysis in Diagnostic Laboratory Investigations and Stability of Blood, Plasma and Serum Samples. JIMMOLLAB 2009; 9: 241-249.
4. Anderson SO, Bekken MM, Hovde V, Ring P. International reference preparation of rheumatoid arthritis serum. Biol 1981; 19: 42: 511-519.
5. In-house data on file.
6. Tish NM, ed. Clinical guide to laboratory tests, 2nd ed. Philadelphia, WB Saunders Company, 1998.
7. Young DB. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, AACG, 9th ed. AACG Press, 2003.

CE



**BECKMAN
COULTER.**

C-PS DITING (CRP Latex)

QSR6192

4 x 30 мл

R1

4 x 30 мл

R2

QSR6292

4 x 50 мл

R1

4 x 50 мл

R2

Назначение

Назначение отдаленные C-реактивного белка (C-РБ) в сыворотке и плазме человека методом турбидиметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Также для диагностики и/или метода с высокой чувствительностью следует использовать для выявления и оценки инфекций, воспалительных процессов и связанных с ними заболеваний. Высокочувствительный метод не следует использовать для случаев воспалительных заболеваний.

Клиническое значение

C-реактивный белок (C-РБ) является одним из наиболее чувствительных маркеров острого воспаления. С помощью набора реагентов «CRP Latex» для определения C-РБ, возможно выявление его даже в очень низких концентрациях. Однако, в связи с низкой специфичностью C-РБ и значительной его изменчивостью в течение заболевания, необходимо с большой осторожностью интерпретировать данные с учетом полученных ранее значений и уровня содержания в сыворотке других маркеров.

В зависимости от клинической картины воспаления определение C-РБ позволяет контролировать реакцию для интерпретации изменений. В частности, в нормальном состоянии (10,2 - 600 мг/л) ^{1,2,3,4}, уровень C-РБ может резко возрасти в результате перенесенного инфекционного заболевания, травмы, инфаркта, воспалительного процесса. Значительное увеличение или снижение концентрации C-РБ может свидетельствовать о прогрессировании или регрессе заболевания. Увеличение концентрации C-РБ может превышать норму более чем в 2000 раз. Исследования показали, что определение значительного более позднего содержания C-РБ может указывать на риск коронарной недостаточности у пациентов, не страдающих острым коронарным заболеванием.

Концентрация C-РБ выше 3 мг/л, выявленная во время госпитализации, может указывать на неблагоприятное развитие сердечного заболевания.

2. **Повышение сывороточной концентрации C-РБ (4,4 - 60 мг/л) ^{1,2,3,4}**

Повышение уровня C-РБ обычно указывает на наличие воспалительного процесса. C-РБ (серию 0, 12 мг/л) при обнаружении недостаточности и воспалительных заболеваний в сыворотке на анализаторе может быть полезно для оценки состояния уровня C-РБ. Разные значения C-РБ, измеренные на 24 часа и спустя 48 часов после рождения, указывают, что высокие значения C-РБ являются маркером воспаления. Таким образом, низкий уровень C-РБ в сыворотке C-РБ является ценным инструментом для ранней диагностики инфекций, воспалительных и воспалительных. Это исследование может помочь в лечении воспалительных, сердечно-сосудистых, C-РБ не может служить основным показателем для дифференциации между различными заболеваниями.

Применение реагентов

При добавлении пробной буферы R1 и R2, содержащих патентованные частицы C-РБ специфически реагируют с антигенами против человеческого C-РБ, формируя иммунные комплексы с образованными нерастворимыми комплексами. Абсорбция реакционной смеси пропорциональна концентрации C-РБ в пробе.

Состав

Концентрация в реакционной смеси:

Гидрофильный буфер

100 мкг/мл

Патентованные частицы, реагирующие с C-РБ человека

< 0,5% вес/об

Инициатор

< 0,1% вес/об

Режимы калибровки

Следуйте все меры предосторожности, указанные при работе с лабораторными реагентами.

Во избежание возможного отравления персонала реактивы содержатся в герметичной упаковке. После вскрытия упаковки реактивы должны быть немедленно использованы.

Утилизацию отработанных реактивов и материалов в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля. Пакет реактивов может быть использован для повторного использования по запросу.

Антикоагулянты, применяемые для забора материала, не страдающих от респираторного синдрома, являются безопасными для персонала и окружающей среды. Чувствительность реактивов, лабораторий Рифт Вали, быстрой губчатой микроанализатор и одношаговую калибровку.

Подготовка реактива

Реагент R1 может использоваться и может не быть непосредственно установлен в анализатор. Реагент R2 перед установкой в анализатор следует перемешать, встряхивая его 5-10 раз. Эту процедуру повторять ежедневно.

Условия и стабильность

Неиспользованные реактивы должны быть защищены от света, хранятся на холоде, при температуре хранения 2-8 °C. После вскрытия реактивы стабильны 60 дней при установке и применении в анализаторе.

Используемый материал

Сыворотка, плазма (SUA, Li-гелем). В сыворотке и плазме C-РБ обнаружен в течение 2-х месяцев при температуре хранения 2-8 °C и в течение 11 дней - при 15-25 °C.

Применение реагентов

1. **Реагент R1** следует использовать и использовать для измерения теста проб.

2. **Реагент R2** следует использовать при использовании реактивов с высокой чувствительностью при работе на анализаторе AU2700/AU400, см. Указания спецификации параметров реактивов.

Калибровка

Параметры	Методика	Материал по мет.
Чувствительность	C-PS Latex Calibrator Normal, 100	QSC-0020
Высокая чувствительность	C-PS Latex Calibrator High, 1000000	QSC-0027

10

1011

2011

QSC-0020

Изменяя калибратор для С-РБ проследите до стандарта CFM 479 FCC (Министерство федеральной гражданской защиты).

Калибратор следует проводить при стандартных условиях.

Система функций с калибратор или без калибратора калибрует измерительный материал.

Проведение профилактического обслуживания анализатора или замены измерительного прибора.

Новый калибратор необходимо измерить и проверить – тщательно выбрать и ввести RawData (Рутин) - Calibration Monitor (Процесс калибровки) - Calibration Curve (Калибровочная кривая). Сразу же после калибровки следует провести контроль материалов.

Контроль качества

Можно использовать контрольные материалы ITA Control Value (ит. № CDC0014, CDC0015 и CDC0016) при использовании программы с нормальной и высокой чувствительностью, и контрольные материалы (ит. № CDC0013, 2 уровень) только при использовании программы с высокой чувствительностью. Также можно использовать другие контрольные материалы со значениями, установленными для данной модели анализатора Beckman Coulter серии AU.

Каждый лабораторный определит часть программы контроля качества стандартным, средним, нормальным лабораторным материалом считается из измеренных измерений вместе с программой пациентов и после проведения калибровки.

Полученный в программе лабораторный результат могут отличаться от настоящего значения. Поэтому лабораторный результат для пациента выдает установивший свои средние значения и отклонения стандартного контроля, на основании лабораторного материала по установленным правилам. Эти средние значения не должны выходить за пределы соответствующих приемных интервалов, приведенных в соответствующей справочной.

При обнаружении какой-либо тенденции в изменении значений контроля качества или значительных отклонений его значений, проверьте все измерительные шаги измерения.

Каждый лабораторный материал разбейте по тем делениям, если результаты калибровки контроля качества выходят за установленные пределы.

Обратите внимание на то, что значения выходов в контрольных материалах, не производимых Beckman Coulter, могут не совпадать с другими лабораториями. Причина этого – использование контрольных материалов не чужеземского происхождения.

Результ

Анализатор Beckman Coulter серии AU автоматически рассчитывает концентрацию С-РБ в анализе пробы.

Референтные значения

Программа с нормальной чувствительностью* < 6 мкг/л

Программа с высокой чувствительностью* < 1 мкг/л

Средние значения могут измениться в зависимости от возраста, пола, типа пробы, диеты и географического местоположения. В соответствии с общепринятой лабораторной практикой каждой лаборатории следует определить собственные референтные значения. При получении данных результаты всегда следует расширять вместе с данными истории болезни и другими диагностическими исследованиями.

Стандартизация лабораторных исследований теста

Данные, приведенные в этой пареграф, получены при калибровке на анализатор Beckman Coulter серии AU. Характеристик проведения теста в вашей лаборатории могут отличаться от приведенных ниже.

Плотность:

Оценки плотности соответствуют диапазону концентраций С-РБ 0,2–400 мкг/л для нормальной чувствительности (AU400/540, AU800, AU2700/5400) и 0,05–30 мкг/л для высокой чувствительности (AU400/540, AU800, AU2700/5400).

Вспомогательная плотность:

Следующие результаты получены при калибровке на AU540, AU400 и AU2700. За выработку этих результатов в течение 20-ти дней с использованием наборов с нормальной и высокой чувствительностью.

AU400:

Программа	n = 80 Среднее значение, мкг/л	Внутренняя серия		Общая	
		Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)
Нормальная чувствительность	6,58	0,67	1,03	0,12	1,98
	64,79	0,78	1,20	2,49	3,34
	137,71	0,88	0,70	2,24	1,64
Высокая чувствительность	9,21	0,01	4,08	0,03	4,97
	95,38	0,54	0,57	1,90	1,98
	146,08	1,12	0,78	2,34	1,59

AU400:

Программа	n = 80 Среднее значение, мкг/л	Внутренняя серия		Общая	
		Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)
Нормальная чувствительность	6,44	0,66	6,80	0,20	3,12
	64,02	0,58	0,87	1,83	2,85
	137,70	1,02	0,74	3,83	2,85
Высокая чувствительность	9,20	0,01	4,22	0,01	6,40
	95,12	0,33	0,36	0,75	1,27
	144,56	1,08	0,75	2,78	1,93

AU2700:

Программа	n = 80 Среднее значение, мкг/л	Внутренняя серия		Общая	
		Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)
Нормальная чувствительность	6,58	0,21	3,22	0,25	3,78
	62,84	0,54	1,02	1,21	1,92
	137,52	1,20	0,82	2,27	1,66
Высокая чувствительность	9,23	0,01	3,73	0,01	6,75
	9,70	0,09	0,92	0,19	1,84

Beckman Coulter

8220-4000

2000-01

7-0

	48,38	0,38	0,75	0,73	1,50
--	-------	------	------	------	------

Чувствительность

Наибольшие чувствительности были отмечены при:

Программа	Наибольший чувствительности (мг/л)		
	ALB40	ALB40	ALB40
Нормальная чувствительность	0,09	0,10	0,34
Высокая чувствительность	0,06	0,06	0,47

Эти данные справедливы для неиммунных заболеваний, отличных от ВИЧ. Наименьшие чувствительности рассчитываются для абсолютных средних значений плюс три стандартных отклонения при 20-кратном увеличении анализа в пробе без иммунологического вмешательства.

Корреляция

Использовать выборочный пилотаж при сравнении данных наборов реагентов для определения С-РБ ОВР110 с нормальной и высокой чувствительностью на анализаторе ALB40 с другими коммерчески доступными наборами реагентов для определения СРБ (метод 2). Результаты линейного регрессионного анализа следующие:

Метод	Чувствительность	
	Нормальная чувствительность	Высокая чувствительность
Метод Y	ALB40	ALB40
Метод X	Метод Y	Метод X
Метод Z	1,024	0,693
Отклонение от корреляции	0,546	-0,626
Корреляционный коэффициент (r)	0,998	0,997
Корр-коэф	119	118
Диапазон значений (мг/л)	0,20-267,36	0,20-165,68

Влияющие факторы

В лабораториях, проводящих с целью оценки чувствительности нормальной и высокой чувствительности методов анализа СРБ LabeX, к наиболее влияющим факторам, получены следующие результаты:

Нормальная чувствительность

Интерференция: Влияние менее 5% при значениях биомаркера до 40 мг/л или до 684 мг/л

Гематокрит: Влияние менее 5% при значениях гематокрита до 5 г/л

Липемия: Влияние менее 10% при значениях липидов (триглицериды⁹) до 1000 мг/дл

Высокая чувствительность

Интерференция: Влияние менее 5% при значениях биомаркера до 40 мг/л или до 684 мг/л

Гематокрит: Влияние менее 5% при значениях гематокрита до 5 г/л

Липемия: Влияние менее 10% при значениях липидов (триглицериды⁹) до 1000 мг/дл

Подобную информацию по влияющим факторам можно найти в справочнике Young¹⁰

Отмеченные

Образцы, содержащие интерферентные агенты могут давать ложно повышенные результаты.

В пробах с патологическими отклонениями характеристиками, особенно очень низкими, могут быть получены аномальные результаты. Для проб с очень высокой концентрацией СРБ (>750 мг/л) могут быть получены ложно низкие результаты без помехового фактора «за», что обусловлено избытком агента в пробе.

В связи, редких случаях гематокрита, особенно у новорожденных (гематокрит >60%), может быть причиной недостаточных результатов.

Ссылки в приложении к листку

9 Справочник по интерференции — значения, установленные в анализаторе по умолчанию.

1 CRP Latex Calibrator Normal Set, Cat. No. CDD0026.

2 CRP Latex Calibrator Highly Sensitive Set, Cat. No. CDD0027.

3 Значения установлены для каждого метода.

Библиография

1. Davis DA, Bennett LA, Christenson RH. Amino acids and proteins. In: Tietz NW, ed. *Fundamentals of clinical chemistry*. Philadelphia: WB Saunders Company, 1997:394p.
2. Morris DA, Fisher PM. C-reactive protein, inflammation, and coronary risk. *Med Clin North Am* 2000;64:146-161.
3. Fisher PM. Apolipoproteins and markers for coronary disease. *Adv Intern Med* 2000;46:391-419.
4. Luzzo G, Bazzano LM, Chakraborti JP, O'Brien RJ, Roberts AG, Steyn SR, Meade A. The prognostic value of C-reactive protein and serum amyloid A protein in women with unstable angina. *N Engl J Med* 1994;331:417-424.
5. Mackness A, Whitehead A, Chakraborti B, Mackness PM, Payne MB. C-reactive protein and fibrinogen in plasma in patients with coronary artery disease. *Eur J Pediatr* 1995;149:424-427.
6. Smith RW, Hua MY, Minkin A, Ramchandani P. Serial serum C-reactive protein levels in the diagnosis of neonatal infection. *Pediatrics* 1998;102:4541.
7. Davis DA, Haidich A, Jülich Y, Taylor G, Vanden H, Zeeb H, et al. Use of endogenous lipids in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. *WHOQOL/ALB40* 9 Rev 2:24p.
8. Walther B, Sel P. Identification of the measurement of 14 proteins in human serum based on the new IFCC/BCR/IGAP international reference material DRM 470. *J Lab Med* 1998;20:148-162.
9. Pearson TA, Mensah GA, Alexander RM, Anderson A, Cannon RO, Criqui M, et al. Markers of inflammation and cardiovascular disease. Application to clinical and public health practice. A statement for healthcare professionals from the Centers for Disease Control and Prevention and the American Heart Association. *Circulation* 2002;107:499-511.
10. Young DB. *Effects of drugs on clinical laboratory tests*. 5th ed. ANCC Press, 2000.

CE



МОЧЕВАЯ КИСЛОТА (URIC ACID)

QSR6096	4 x 12 мл	R1
	4 x 8 мл	R2
QSR6186	4 x 30 мл	R1
	4 x 12,5 мл	R2
QSR6296	4 x 42,3 мл	R1
	4 x 17,7 мл	R2

Назначение

Компактный фотометрический тест для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме и моче с помощью анализатора Beckman Coulter серии AU. Точное для диагностики и т.д.

Клиническое значение^{1,2}

Мочевая кислота является основным продуктом метаболизма пурина у человека и образуется из пурина под действием ксантиноксидазы. Большая часть мочевой кислоты образуется в печени и выделяется почками, при этом в среднем выводится около 10-12 г мочевой кислоты, определяемое балансом между синтезом и выделением. Гиперурикемия подразделяется на первичную и вторичную, при которой имеет место повышенная продукция или чрезмерное замедление мочевой кислоты. Первичная гиперурикемия связана с наследственным или приобретенным нарушением обмена. В большинстве случаев повышенная выработка мочевой кислоты приводит к повышению ее содержания. Состоит 1% бо́льшая нормальная гиперурикемия имеет фармакологический дефицит метаболизма пурина, который приводит к гиперпродукции мочевой кислоты.


Первичная гиперурикемия связана с гиперуремией, синдромом Гилкеса-Натана, синдромом Калли-Сентентера и увеличением синтеза фибриногена/липопротеинов. Вторичная гиперурикемия может быть вызвана увеличением поступления пурина с пищей, что сопровождается с увеличением выработки мочевой кислоты с мочой. Вторичная гиперурикемия связана с различными состояниями, включая анемию, недостаточность, гематологическими заболеваниями, гематологическими заболеваниями, почечными, истинной полицитемией, злокачественными опухолями гематической системы, избыточное потребление алкоголя, чрезмерное потребление, диету с повышенным содержанием пурина, мочевой кислоты.

Гиперурикемия может возникнуть в результате снижения продукции мочевой кислоты или в случае недостаточной выработки, недостаточное выделение при гиперурикемии/липопротеинемии и дефицит диуретиков. Гиперурикемия также может возникнуть из-за увеличения поступления мочевой кислоты, что может иметь место при использовании салицилатов, СМАД, сахарных диет, сахарного диабета, почечной недостаточности и синдроме гиперурикемии. Кроме того, гиперурикемия может возникнуть в результате почечных заболеваний, почечной недостаточности, подагры мочевой кислоты, а также при применении рентгеноконтрастных средств. Клиническое определение выработки мочевой кислоты с мочой имеет значение при выборе соответствующей диеты при гиперурикемии, лечении, следует не только бороться с гиперурикемией, но и снижать содержание мочевой кислоты путем увеличения выработки почками, что способствует для снижения болевой нагрузки.

Принцип анализа¹

Мочевая кислота реагентами уреаза развивается на аллантоин и мочевую кислоту. Последний реагирует с 3,5-диамино-2-нитробензойной кислотой (ДНБ) и 4-аминофенолом в присутствии пероксидазы, с образованием хромо-флуоресцентного соединения, измеряемого с помощью флуориметра. Концентрация определяется флуориметрическим путем. Концентрация мочевой кислоты в пробе пропорциональна концентрации мочевой кислоты в пробе.

Схема реакции



Состав

Концентрация в реакционной смеси:

Фосфатный буфер (pH 7,8)	42 ммоль/л
MAOB	0,15 ммоль/л
4-Аминофенол	0,30 ммоль/л
Пероксидаза	≥ 6,9 МЕ/л (88 ммоль/л)
Уреаза	≥ 0,25 МЕ/л (4,16 ммоль/л)
Аскорбиноксидаза	≥ 1,50 МЕ/л (25 ммоль/л)
Консервант	

Общие предостережения

Соблюдайте все меры предосторожности, принятые при работе с лабораторными реактивами.

Во избежание возможного отравления концентрированными растворами после использования реактива промойте анализаторные трубки водой. Утилизацию образцов реактивов и отходов следует проводить в соответствии с требованиями законодательства и местными нормами.

Дополнительная информация приводится в Паспорте безопасности. Предупреждения об опасности и обращении с реактивом.

Соблюдение описания:

R43 Может быть вредным при вдыхании пыли.

Перенос безопасности:

G21, G26, G37: Не допускать контакта с кожей. В случае попадания в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Работайте в перчатках.

G60: Работайте в тесной комнате, не следует употреблять или курить.

или в:

в соответствии с
2008-01

Beckman

Примечания

Реактивы готовы к использованию и могут быть непосредственно установлены в анализатор.

Хранения и стабильность

Насыщенные реактивы стабильны до даты указанной этикетки, при температуре хранения 2-8 °C. После вскрытия реактивы стабильны 30 дней при хранении в анализаторе.

Насыщенный натрион³

Синдрон³ и натрион (SDTA или (натрион)

в порошке и гранулы натрион являются стабильными в течение 7-ми дней при температуре хранения 2-8 °C и в течение 3-х дней - при 15-25 °C.

В моле натрион является стабильным в течение 4-х дней при температуре хранения 15-25 °C. Для предотвращения выщелачивания уратов в моле натрион добавлен адреналин. Объем раствора натриона для получения указанного срока годности.

Значения в порошке SDTA на 5-10% ниже таковых в синдроне или гранулах натриона.

Примечания

См. Руководство Reagent Guide и соответствующее руководство для конкретного типа пробы.

Настройка

Настройка анализатора должна выполняться с помощью калибратора Ultra Calibrator (или NCS000005) для моли. Значения калибратора для моли должны быть сопоставлены со значениями калибра методом высокоточности и разбавления (SDMS).

Настройку следует проводить каждые 30 дней или в следующих случаях:

Смена серийного номера реактива или существенное изменение значений калибра.

Присутствие загрязняющих веществ в образцах или в калибраторе или изменение объема реактива.

Контроль качества

Можно использовать калибры (или NCS000005 и NCS000004) или другие контрольные материалы со значениями, установленными для данной модели анализатора Beckman Coulter.

При использовании моли можно использовать калибры (Beckman Coulter) Ultra Calibrator (или NCS000005) или другие контрольные материалы со значениями, установленными для данной модели анализатора Beckman Coulter.

Каждая лаборатория определяет частоту проведения контроля качества самостоятельно, однако, каждая лаборатория должна проводить контроль качества с использованием калибров качества и калибров качества.

Получаемые в отдельной лаборатории результаты могут отличаться от лабораторных значений. Поэтому рекомендуется лабораториям для каждого анализа устанавливать свои собственные значения и отклонения от лабораторных значений, на основании лабораторного измерения по установленным правилам. Эти значения должны быть указаны в протоколах соответствующих правил интервалов, проводимых в лабораториях.

Три образца моли, либо та же моли в различных значениях контроля качества или в различных отклонениях от значений, проводимых в лабораториях, должны использоваться. Каждый лаборатория должен разработать свои действия на тот случай, если результаты лабораторных контрольных материалов будут за установленные пределы.

Работа

Анализатор Beckman Coulter серии ALI автоматически рассчитывает концентрацию моли в пробе.

Рекомендуемые значения⁴

Сыворотка Мужчины 208,3—328,4 мкмоль/л (3,8—7,2 мг/дл)

Женщины 164,7—267,0 мкмоль/л (2,6—4,0 мг/дл)

Сыворотка Мужчины 1488—4403 мкмоль/л (260—760 мг/дл)

Следующие значения могут измениться в зависимости от возраста, пола, типа пробы, диеты и географического местоположения. В зависимости от лабораторной практики каждой лаборатории следует определять собственные референсные значения. При установлении данных результатов следует рассмотреть также и данные контроля качества и другие диагностические исследования.

Специфические характеристики

Диагностика, проводимая в этом парадигме, проводится на анализаторе Beckman Coulter серии ALI. Характеристики проведения теста в каждой лаборатории могут отличаться от приведенных ниже.

Диагностика

Диагностика линейности в сыворотке и плазме соответствует значениям концентрации моли 80—1700 мкмоль/л (1,5—30 мг/дл).

Диагностика линейности в моче соответствует значениям концентрации моли 110—230 мкмоль/л (2—40 мг/дл).

Воспроизводимость

Следующие результаты получены при измерении на AL600 3-х сывороточных проб в течение 20-ти дней.

Среднее значение, мкмоль/л	Внутренняя ошибка		Общая	
	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)
171,84	1,01	1,11	2,94	1,71
388,20	0,02	1,68	8,48	2,44
1482,00	0,00	0,73	28,88	2,12

Следующие результаты получены при измерении на AL600 3-х проб мочи в течение 20-ти дней.

Среднее значение, мкмоль/л	Внутренняя ошибка		Общая	
	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)
1280,16	14,38	1,00	22,63	1,68
3550,61	87,67	1,67	21,24	1,66
8004,48	81,50	1,70	83,46	1,67

Чувствительность

Нижний предел чувствительности для сыворотки, установленный на анализаторе AU2700, составляет 2 ммоль/л.

Нижний предел чувствительности для мочи, установленный на анализаторе AU2700, составляет 10 ммоль/л.

Эти значения справедливы при минимальном измеренном значении мочевой кислоты, отнесенном к массе. Нижний предел чувствительности рассчитывается как абсолютное среднее значение плюс три стандартных отклонения. При 20-ти кратном измерении точность в пробах без исследуемого вещества.

Корреляция

При сравнении данных двухразовного набора результатов для определения мочевой кислоты на анализаторе AU400 с другими коммерчески доступными наборами реагентов, для их сравнения использовались сыворотки и моча пациентов. Результаты линейного регрессионного анализа в сыворотке следующие:

$y = 0.964x - 12.489$	$r = 0.999$	$n = 198$	Диапазон значений в пробах 84–1531 ммоль/л
-----------------------	-------------	-----------	--

Результаты линейного регрессионного анализа в моче следующие:

$y = 0.952x + 80.78$	$r = 1.000$	$n = 161$	Диапазон значений в пробах 142–30 853 ммоль/л
----------------------	-------------	-----------	---

Влияющие факторы

В исследованиях сыворотки, проводившихся с целью оценки чувствительности метода к некоторым влияющим факторам, получены следующие результаты:

Аскорбиновая кислота:

Влияние меньше 5% при значениях аскорбиновой кислоты до 20 мг/дл

Углекислотность:

Влияние меньше 5% при значениях парциального давления до 40 ммдл или до 664 ммоль/л

Гемоглобин:

Влияние меньше 10% при значениях гемоглобина до 20 мг/дл или до 342 ммоль/л

Липиды:

Влияние меньше 5% при значениях гемоглобина до 5 г/л

Влияние меньше 5% при значениях липидов (триглицеридов) до 1000 мг/дл (AU400): Влияние меньше 10% при значениях липидов (триглицеридов) до 1000 мг/дл

В исследованиях мочи, проводившихся с целью оценки чувствительности метода к некоторым влияющим факторам, получены следующие результаты:

Аскорбиновая кислота:

Влияние меньше 5% при значениях аскорбиновой кислоты до 80 мг/дл

В ряде случаев гематемия, особенно при микрогематуриями выявляемых, могут быть получены недостоверные результаты. Подробную информацию по влияющим факторам можно найти в справочнике Young.

Свойства в клинических испытаниях

В клинических исследованиях:

Значения, установленные в анализаторе по умолчанию

Внутренний контроль (код № 05300)

Значения установлены для единиц СИ (ммоль/л). При работе с единицами мг/дл, значения следует разделить на 0,5.

Библиография

- Thomas L. Uno and, in Thomas L. Hög, Labor und Diagnose: Evaluation und Bewertung von Laborbefunden für die medizinische Diagnostik. Frankfurt/Main: TH-Books Verlagsgesellschaft, 2006:380–390.
- Neuman CJ, Price CF. Renal function and nitrogen metabolism. In: Burke CA, Ashwood ER, eds. Tietz textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1998:1245–46.
- Behlen D, Thiele R. An improved colour reagent for the determination of blood glucose by the oxidase system. Analyst 1972;97:142–5.
- Elm H, Hill W, Schmidt Y, Taylor G, Wilson H, Davis B. et al. Use of microsystems in diagnostic laboratory investigations and quality of blood, plasma and urine samples. JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY 1 Nov 2000; 8: 489–90.
- Data on file at O.MEL.
- Palmer PC, Cape JV, Smith JL. Reference information for the clinical laboratory. In: Burke CA, Ashwood ER, eds. Tietz textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1998:1834p.
- Young DS. Effects of Drugs on CLINICAL Laboratory Tests. AACCP. 8th ed. CCP Press, 2000.

Ограничения¹¹

Абсорбционные методы имеют больше, чем определительные, в концентрации выше 10 ммоль/л, хотя они выдают результат через 4 часа после приёма с пищей. Концентрация аскорбиновой кислоты в плазме при насыщении пищей составляет 1 – 1,8 ммоль/л. Исследования, проведенные в Бейкелен Соммер, показывают, что при таком уровне аскорбиновой кислоты не влияет на определение гематог.

Ссылки в библиографических источниках

8. Справочник по гематологии. М.: Знание, установленное в гематологии по результатам.

9. Бульвин С.В. (1998).

10. Значения установлены для анализа СИ (миллиграмм). При работе с единицами ммоль/л, значения должны умножаться на 0,01

Библиография

1. Burtis CA, Ashwood ER, ed. Textbook of clinical chemistry. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1998:282pp.
2. Henry JB, ed. Clinical diagnosis and management by laboratory methods. 19th ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1998:787pp.
3. Muthumay A, Prasad MA, Sanyal O, Ghosh A. Measurement of ischaemic in cardiovascular risk in investigation of inherited metabolic diseases. Clin Chem 1997;43:196-198.
4. Tander P. Determination of glucose in blood using glucose oxidase with an alternative oxygen acceptor. Ann Clin Biochem 1980;5:24-27.
5. Barham D, Tander P. An improved color system for the determination of blood glucose by the glucose system. Analyst 1972;97:142-146.
6. Tietz NW. Clinical guide to laboratory tests. 3rd ed. Philadelphia, WB Saunders Co, 1995.
7. Aedes R, Williams CP, Sachs F. Stability of plasma lactate in vitro in the presence of antithyroidic agents. Clin Chem 1984;40:1327-1330.
8. Wendig JO, Lohmeyer BL, Benkman ML. Use of the De Pont 'automatic alcohol analyzer' in direct determination of lactate acid in plasma stabilized with sodium fluoride. Clin Chem 1972;18:1334-1336.
9. Thomas L, Lusk L. ed. Clinical laboratory diagnosis. Use and assessment of clinical laboratory results. Frankfurt/Main: TH-Stein Verlagsgesellschaft, 1989,160pp.
10. Young DB. Effects of drugs on clinical laboratory tests. 5th ed. AAC Press, Washington D.C. 2005.
11. Ormoye BT, Turnbull JD, Beckwith HE. Selected Methods for Determination of Ascorbic Acid in Animal Cells, Tissues and Fluids. In: Methods of Enzymology. 1979;62:3-11.

CE



Гликозилированный гемоглобин (HbA1c)

OSR8182

HbA1c

2 x 19 мЛ

R1

2 x 19 мЛ

R2

Общий гемоглобин

2 x 37,5 мЛ

R1

Назначение

Калибровочное определение HbA1c (Гемоглобин A1c) в крови человека методом имунофлуоресценции на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики в лаборатории.

Абсолютные значения HbA1c и общего гемоглобина (Hb), полученные в процессе измерения, предназначены для вычисления соотношения "HbA1c / Общий гемоглобин" и их не следует использовать в диагностических целях.

Клиническое значение

HbA1c образуется в результате неферментативного гликирования гемоглобина на N-конце β-цепи гемоглобина. А. Уровень HbA1c пропорционален содержанию глюкозы в крови. В связи с тем, что глюкоза гликирует гемоглобин в течение всего их совместного цикла, значение HbA1c является показателем среднесуточной концентрации глюкозы в крови за два предшествующих месяца. Поэтому определение HbA1c считается важным диагностическим инструментом в мониторинге диетического контроля и лечении у больных диабетом. Контроль уровня глюкозы в крови важен для предотвращения развития ячужки и гипергликемии, и может снизить риск осложнений и повысить темп выздоровления людей, страдающих диабетом, как инсулинозависимым, так и неинсулинозависимым, сахарным диабетом.

Принцип определения

В исследовании определяются концентрации HbA1c и общего гемоглобина. Определение HbA1c/Общий гемоглобин производится в виде процентного соотношения. При определении процентного содержания HbA1c используются четыре реактива: реактив R1 для определения общего гемоглобина; реактив HbA1c R1, содержащий антиген, антигемоглобиновый реактив HbA1c R2 и детектирующий реактив R1A для HbA1c (детектирует свободно, мет. по OSR0004).

При предварительной обработке крови она смешивается с детектирующим реактивом (OSR0004) в соотношении 1:4 и инкубируется не менее 6 минут при комнатной температуре. При этом антигены инкубируются и полетительные цепи гемоглобина перекрываются, предотвращая агрегацию в детектирующем растворе.

При измерении общего гемоглобина все это происходит в камере с малым объемом реагента и в камере с малым объемом. Добавление реагента и общего гемоглобина в предварительно обработанную кровь позволяет разделить смесь в лямбда-кап. Абсолютный объем раствора инкубируется при 600 нм.

При измерении HbA1c используется реакция связывания антигена с антигеном. Антиген, состоящий из синтетического полимера, содержащего конъюгированные с ним конъюгированные цепи HbA1c, связывает антигемоглобиновый реактив, который инкубируется с конъюгированным с HbA1c-антигеном. При оттоке HbA1c в пробирку, содержащую HbA1c R1, в пробирку с антигеном, и антигемоглобин в HbA1c R2 будут оттоком. Этот процесс может быть усилен добавлением системы. Наличие HbA1c в пробе приводит к уменьшению скорости оттока антигена в HbA1c R1 и антигемоглобина в HbA1c реактив R2. Уменьшение абсорбции реакционной смеси, измеренной при 780 нм, затем делится, чтобы получить процентное содержание HbA1c в пробе.

Состав

HbA1c	HbA1c
Reagent (Antigen) A1c R1	HbA1c (Antigen) A1c R2
Чистый, концентрированный реагентный HbA1c	HbA1c антиген
Смесь сульфатно-кислотной смеси	Смесь сульфатно-кислотной смеси
Буфер, pH 6.1	Буфер, pH 2.0
Полученный реактивный реагент: 0,0% раствор незначительного количества	Полученный реактивный реагент
Консервант: 0,1% Глицерин	Консервант: 0,1% Глицерин

Общий гемоглобин

Тоталь Гемоглобин (Общий гемоглобин) R1

Гемоглобин, метр 0,4%, pH 6.1

Полученный реактивный реагент: 0,7% раствор незначительного количества

Общая информация

Гемоглобин (HbA1c) R1 и R2:

R1: Может использоваться для определения HbA1c. Содержит смесь 5-гидро-2-метил-4-оксигемоглобина-3-окси (BC No 247-580-7) и 2-окси-2-метил-3-окси (BC No 220-238-4) (3:1).

620, 630, 640. Не рекомендуется использовать в анализе. Пользователь не должен. Реагент в пробирке не должен использоваться для анализа.

Соблюдайте все меры предосторожности, принятые при работе с лабораторными реагентами. Утилизуйте использованные реактивы и материалы в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических и экологических норм. Дополнительные инструкции приведены в Паспорте безопасности.

Подготовка реагента

Реагенты Total Hemoglobin (Общий гемоглобин) R1 и HbA1c (Гемоглобин A1c) R2 готовы к использованию и могут быть непосредственно использованы в анализаторе. Реагент HbA1c R1 перед использованием в анализаторе необходимо перемешать, перемешивая флакон 5-10 раз. эту процедуру повторите периодически.

Хранение и стабильность

Использовать реактивы необходимо до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реактивы стабильны 35 дней при хранении в холодильнике.

Исследовательский метод

Цельный кровь (K₂-ЭДТА или NH₄-гепарин). Предварительная обработка: кровь перед измерением выдерживается в добавочном 35 мЛ крови или контроле в 100 мЛ детектирующего раствора (мет. по OSR0004), т.е. соотношение 1:41, при автоматическом перемешивании 600.

или

или

или

высокобелковые и неустойчивы на холоде при комнатной температуре. Общие пробы меньше 25 лет не рассматриваются, потому что, чтобы обеспечить целостность цепной пробы.

Калибраторы не нуждаются в предварительной обработке.

Внимание! С равным набором реагентов можно использовать только дименирующийся реактив Hemoglobin Determinant OGR0084

Пробы для предварительной обработки могут храниться при 25°C 1 неделя, при 2-8°C - 2 недели и до 6 месяцев при заморозке -5-79°C. (Гемоглобиновые пробы стабильны до 6 часов при комнатной температуре и до 48 часов при 2-8°C при хранении в закрытой пробирке. Внимание! Непосредственно перед исследованием все пробы следует повторно разморозить.

Протокол анализа

Определение общего гемоглобина и HbA1c проводится в одной предварительно накалированной пробе микропробе Сп. Ручное чтение Reader 5.0.6, в соответствии инструкции для конкретного типа пробы.

Калибраторы

HbA1c Саликс, арт. № OGR0032.

Для оформления общего гемоглобина используются только калибратор HbI.

Для оформления HbA1c применяются калибраторы HbA1c 1 &

Внимание! Калибраторы не требуют предварительной обработки дименирующей реакцией.

Для оформления гемоглобина используются реактивы, приобретенные на площадке с калибратором HbA1c (HbA1c Саликс OGR0032).

Калибраторы следует проводить через каждые 14 дней при стандартных условиях.

Изменение текущего показателя реактивов или окончательное изменение значений контролей.

Проверка профитестового оборудования калибратора или замены одного уровня пробирки.

Новые калибраторы необходимо регулярно проверять - последовательно выбрать в меню Reader (Обновить исследование) - Calibration.

Menu (Меню) калибраторов - Calibration Curve (Калибровочная кривая). Сразу же после калибровки следует провести контроль качества.

Процедура расчета

Общий гемоглобин рассчитывается по FCS дифференциального метода через FCS дифференциальный материал. Значения калибратора для общего гемоглобина рассчитываются по ILM (цельный/гемоглобиновый стандарт (BCR-522).

Согласовано соотношение результатов, полученных в единицах NGSP (Национальный стандарт по стандартам гемоглобина) (гемоглобиновый материал NGSP) - контрольные исследования сопоставлены диалекты, и в единицах FCS (Международная федерация клинической химии). Для перевода результатов на один уровень в другие необходимо проводить перевод по следующей формуле:

$$DCC(NGSP) = (D18 \times FCS) + 3,16$$

Определение взаимосвязи между двумя типами системными калибровкой сопоставлены результаты FCS, совместимые с платформой автоматизированной HbA1c, полученные по методу NGSP и Гликогемоглобин исследования диалекта Великобритания (UKPDS). Это соотношение используется только для расчета результатов DCC с дифференциальным методом более высокого порядка. Результаты HbA1c в %, полученные из серии данных исследования, автоматически преобразуются в единицы гемоглобина DCC в соответствии с уравнением $(NGSP = (H15 \times FCS) + 2,16)$, одобренного FCS. Таким образом, результаты выразятся в единицах исследования DCC, что соответствует рекомендациям Международной федерации Клинической химии.

Контроль качества

Можно использовать контрольный материал HbA1c Саликс модели OGR0022 или другие контрольные материалы со значениями, установленными для данной модели калибратора Beckman Coulter серии AU.

Каждая лаборатория определяет частоту регулярного контроля качества систематически, однако, у каждой лаборатории приемлемый уровень не является одинаковым. Значение качества системы параметров и после проведения калибровки.

Полученные в ежедневной лабораторной результаты могут отличаться от полученных значений. Получать лаборатория рассматривает для каждого анализа установленные свои средние значения и отклонения специфического контроля, на основании международного соглашения по установленным правилам. Эти средние значения не должны выходить за пределы соответствующей приемной интервалы, приведенной в соответствующее приложение.

При обнаружении каких-либо тенденций в отношении значений контроля качества или выявлении отклонений от значений, проверить все соответствующие шаги измерения. Каждая лаборатория следует разработать план действий на тот случай, если результаты и материалы контроля качества выходят за установленные пределы.

Рекомендуемые значения

Возраст: 4,0-5,2% (DCC)
2,0-4,4% HbA1c (для метода FCS, для пересчета используется приведенный выше формулы)

Средние значения могут измениться в зависимости от возраста, пола, типа пробы, диеты и географического местоположения. В соответствии с общепринятой лабораторной практикой каждой лабораторией следует определять собственные референсные значения. При установлении данных результатов следует рассмотреть вместе с историей пациента результаты, результаты от других методов исследования.

Ограничения интерпретации

Данные, приведенные в этом параграфе, получены при измерении калибраторов Beckman Coulter серии AU. Результаты, полученные в других лабораториях могут не соответствовать.

Анализатор диаметра

Общий гемоглобин

Анализатор диаметра для общего гемоглобина составляет 4,4-14,3 мкм/л (7-33 пЛ)

HbA1c

DCC

Анализатор диаметра для общего гемоглобина составляет от 2,8 % HbA1c до концентрации калибратора 145 (122 мкм/л HbA1c 1,07 г/л) на калибраторе HbA1c (арт. номер OGR0032). Это соответствует 14,6% HbA1c при общей гемоглобине 9 мкм/л (14,6 г/л). Проба, значения которой превышают верхний предел диаметра гемоглобина, расследовать не следует, в их результаты оформляются как > 14,6%.

Воспроизводимость

Следующие результаты получены при измерении на AU640 2-х выверенных проб в течение 20-ти дней

n = 88	Внутренняя			Общая	
	Среднее значение, %	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	Среднее значение (SD)	Коэф. вариации (CV %)
4,68	0,04	0,14	0,07	1,35	
6,68	0,08	0,26	0,12	1,78	
10,01	0,08	0,77	0,12	1,18	

Низкая гемоглобинность

Нижний порог чувствительности, установленный на анализаторе AU600, составляет для HbA1c 0,02 мкм/л (0,00 г/л); для Hb 0,06 мкм/л (0,06 г/л).

Это значение определяется как минимальное измеренное значение сигнала, отнесенное к нулю. Нижний предел чувствительности рассчитывается как абсолютная средняя величина плюс три стандартных отклонения при 20-ти кратном измерении анализа в пробе без исследуемого вещества.

Корреляция

При сравнении данных деятельности нашего набора реагентов для определения HbA_{1c} с прибором AU680 с другим набором реагентов для определения HbA_{1c} использовались кровь пациентов. Результаты линейного регрессионного анализа следующие:

$y = 1,009x - 0,147$	$r = 0,995$	$n = 97$	Диапазон значений в пробе 6,1–11,6% HbA _{1c}
----------------------	-------------	----------	---

Влияющие факторы

Интерференция

Липемия

Триглицериды

Ремиссионный фактор

Антигемоглининовые антитела

Цветоклетки

Нормализация

Влияние менее 10% при значениях гемоглобина до 613 мкмоль/л (30 мг/дл)

Влияние менее 10% при значениях гемоглобина (гематокрита*) до 500 мкл/л

Влияние менее 10% при значениях триглицеридов до 18 ммоль/л (1600 мг/дл)

Не влияет в концентрации до 2000 МЕ/мл

Не влияет в концентрации до 60 мкл/л

Не влияет в концентрации до 50 мкл/л

Не влияет в концентрации до 83 мкл/л

Подробную информацию по влияющим факторам можно найти в справочнике YouBio[®]

Ограничения¹

Непродолжительное время замера критерием определяет время, не контакта с глюкозой, что приводит к уменьшению значения HbA_{1c} в %. Поэтому результат процентного содержания HbA_{1c} неадекватен при одновременном времени жизни эритроцитов. Присутствием такого непродолжительного времени жизни могут быть гемолитические анемии и другие гематологические заболевания, большие кровопотери и переливания.

При исследовании данного набора реагентов в пробе с красноватым гемоглобином B и C может наблюдаться повышение значений HbA_{1c} до 40%. В пробе, содержащей более 10% гемоглобина F, результат может быть ниже ожидаемого. Результаты HbA_{1c}, полученные при использовании данного реагента для проб, содержащих красноватый гемоглобин B, C и F (>10%), нельзя сравнивать с опубликованными нормальными или патологическими значениями. Пробы, содержащие гемоглобин E, при использовании данного диагностического набора, не оказывают никакого влияния на результат измерения.

Побочные эффекты гемостазированного гемоглобина (присоединенные группы к HbA или HbA_{1c} по шифровому основанию) не влияют на результат измерения. В-клетки стимулируются активатором для стимуляции выработки инсулина. При любой другой клинической реакции, оператор не должен забывать о возможности влияния на результаты измерения транзитных антител к инсулину или другим препаратам. В диагностических целях результаты измерения HbA_{1c} с использованием диагностического набора реагентов Сигма-А всегда нужно оценивать в совокупности с другой имеющейся информацией, например, историей болезни пациента, клинической ситуацией и результатами других исследований.

Ссылки в программных листах

- 1. Определенная пометкой
- 2. Замечания, установленные в анализаторе по умолчанию
- 3. HbA_{1c} Calculator, see also CDR03032
- 4. Значение используется для единиц ммоль/л. При работе с единицами г/дл, значение следует умножить на 1,8125.
- 5. Значение 0,1 ммоль/л является значением верхнего измерителя.
- 6. Для определения % HbA_{1c} используются результаты Tm и HbA₁. В меню «TEST» в подразделах GENERAL TEST и CALCULATED TEST следует вставить третью часть данных «% HbA_{1c}» (настройка настроена на г/дл). В разделе меню INTER TEST обозначить данные тест как CALCULATED TEST. Введите стандартную формулу: (HbA₁)^a × b, где a = HbA_{1c}, b = Tm, a = 0,18, b = 2,75.
- 7. Для определения % HbA_{1c} используются результаты Tm и HbA₁. Тест % HbA_{1c} настроен на расчетный. Введите формулу (HbA₁)^a × b, где a = HbA_{1c}, b = Tm, a = 0,18, b = 2,75.

Библиография

1. Mendez CM, Robinson H. Glycophosphorylation. In: Thomas L, ed. Clinical Laboratory Diagnosis. Use and assessment of clinical laboratory results. Philadelphia: WB Saunders Company; 1998: 1472-1478.
2. Jermann JO, Kobold U, Bitt J, Pines A, Hoesel W, Hoshino T, Matsuura K, Mosca A, Mann P, Pincus R, Thompson L, University M, Weijiang C. Approved IFCC reference method for the measurement of HbA_{1c} in human blood. Clin Chem Lab Med 2002; 40(1): 70-88.
3. Hoesel W, Weijiang C, Jermann JO, Matsuura K, Bitt J, Pines A, Hoesel W, Hoshino T, Mann P, Pincus R, Thompson L, University M, Weijiang C. Approved IFCC Reference Method for Measurement of Hemoglobin A_{1c} in Human Blood and the National Standardization Scheme in the United States. Japan, and France: A Method-Comparison Study. Clin Chem 2004; 50(1): 135-174.
4. Young DG. Effect of drugs on clinical laboratory tests, 3rd ed. AACC Press, 2000.
5. Дэвис в Филлипс. Hematology & Beckman Coulter Bone Marrow Lab.

CE

3. Mann CK, Yoo JH. Spectrophotometric determination of magnesium with sodium 1-Azo-2-hydroxy-3-(2,4-dimethylbenzoyl) naphthalene-1'-[2-hydroxybenzene-S-sulfonyl]. *Anal Chem* 1999;26:202-208.
4. Mann CK, Yoo JH. Spectrophotometric determination of magnesium with 1-Azo-2-hydroxy-3-(2,4-dimethylbenzoyl) naphthalene-1'-[2-hydroxybenzene-S-sulfonyl]. *Anal Chem* 1997;19:156-160.
5. Salomon C. Microdetermination of magnesium from dairy milk. *Anal. Chem.* 1982;54:11-17.
6. Horowitzak BC. Magnesium. In: Kaplan LA, Pines AJ, eds. Clinical chemistry theory, analysis, and correlation. St Louis: Mosby, 1996:661 pp.
7. NCCLS. Urine: storage and collection, transportation, and preservation of urine specimens; approved guideline. NCCLS Document GP16-A2, 2nd ed. Paermytharic: NCCLS, 2001.
8. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACG Press, 2009.

CE



ХОЛЕСТЕРИН ЛПВП (HDL-CHOLESTEROL)

QSR6187	4 x 27 мЛ	R1
	4 x 9 мЛ	R2
QSR6287	4 x 51,3 мЛ	R1
	4 x 17,1 мЛ	R2
QSR6587	4 x 107 мЛ	R1
	4 x 40 мЛ	R2

Назначение

Колориметрический фотометрический тест для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в сыворотке или плазме человека на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro.
Реагент HDL-Cholesterol (ЛПВП-холестерин) QSR6587 предназначен только для использования на анализаторах AU2700 и AU5400.

Клиническое значение

Приблизительно 25 % общего холестерина сыворотки транспортируется во фракции ЛПВП. Многочисленные клинические и эпидемиологические исследования демонстрируют четкую обратную связь между уровнем холестерина ЛПВП и уровнем смертности. Выводы: Показатель, что повышение и транспорт холестерина от тканей до печени действует как защитный фактор против развития атеросклеротических бляшек.

Определение холестерина ЛПВП, является важным для интерпретации индивидуальных результатов исследования холестерина. Новый холестерин ЛПВП – показатель высокого фактора риска, вне зависимости от концентрации общего холестерина и обычных традиционных критериев для риска сердечно-сосудистой болезни. Измерение холестерина ЛПВП используется для раннего выявления риска атеросклероза, в том же направлении для оценки эффективности терапии, направленной на снижение содержания липидов в крови.

Принцип определения

Активатор в холестерин-бета-липопротеин, содержащийся в реактиве R1, связывается с липопротеинами, образуя комплекс с фракцией ЛПВП (ЛПНП, ЛПОНП и холестерин). Комплекс активно-ингибитор блокирует ферментативную реакцию, инициируемую добавлением реактива R2. Холестерин ЛПВП определяется путем ингибирования ферментативной реакции.

Химия реакции

ЛПНП, ЛПОНП и холестерин

ЛПНП-холестерин + H₂O + O₂

2 H₂O + 4 AA + F-DAB

Активатор в β-липопротеин-холестерин
Ферментативная и холестерин-холестерин
Ферментативная

Холестерин-бета-липопротеин

Холест-4-ox-3-one + Желтый цвет + H₂O

Синий цвет + F + 2H₂O

Состав

Концентрация в реакционной смеси

Активатор в β-липопротеин-холестерин

Холестерин-холестерин

Холестерин-холестерин

Парасульфид

Аскорбатид

Буфер Гуд (pH 7.0)

N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,9-дигидро-4-фторантин (F-DAB)

4-Аминобензол

Консервант

Детергент

Вариант

0.1 мМ/л

4.4 мМ/л

1.7 мМ/л

2.0 мМ/л

30 ммоль/л

0.20 ммоль/л

0.07 ммоль/л

Область применения

Соблюдать все меры предосторожности, применяя при работе с лабораторными реактивами.

Упаковка: отдельные флаконы реактивов в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и противопожарного контроля.

Подготовка реактива

Реактивы, которые используются и могут быть непосредственно использованы в анализаторе.

Хранение и стабильность

Неиспользованные реактивы для диагностики, при температуре хранения 2-8 °C и в герметичной упаковке, могут использоваться в течение 30 дней при хранении в анализаторе.

Центр реактива R2 может использоваться при хранении на борту анализатора. Это не снижает качества анализа.

Использование реактива

Сыворотка и плазма (плазма реактива и не плазма); Холестерин ЛПВП стабилен в течение 7-ми дней при температуре хранения 2-8 °C и в течение 2-х дней - при 30-35 °C.

Подготовка образца

См. Руководство Reagent Guide и соответствующую инструкцию для конкретного типа пробы.

Калибровка

HDL-Cholesterol Calibrator, лот № 0003011

Этими каллибраторами для холестерина ЛПВП производится до референсного метода Американского Центра контроля над заболеваниями (CDC) для HDL.

Калибровку следует проводить через каждые 30 дней, реактив более - каждые 7 дней или при следующих условиях:

Смена флакона с реактивом или существенное изменение значений контроля.

Проведение профилактического обслуживания анализатора или замены главного узла прибора.

001

01/09/01
300-00

000-000

Контроль качества

Можно использовать контрольный сыворотку HUALDI-Cholesterol Control Serum CDC0005 или другие контрольные материалы, значение которых было определено данным методом.

Метод лаборатории определяет частоту проведения контроля качества самостоятельно, однако, хороший лабораторной практикой считается не менее одного измерения вкоста с пробойми еженедельно и после проведения калибровки.

Полученные в отдельной лаборатории результаты могут отличаться от лабораторного значения. Поэтому рекомендуются лаборатории для лучшего взаимного установления, свои графические значения и отклонения использовать только для внутреннего контроля, на основании лабораторного измерения по установленным правилам. Эти графические значения не должны выходить за пределы соответствующего принятого интервала, графика для соответствующего сыворотки.

При обнаружении каких-либо отклонений в измерениях значений контроля качества или отклонения отклонений его значений, просмотрите все аналитические этапы измерения. Каждая лаборатория должна разработать план действий на тот случай, если результаты измерения контроля качества выходят за установленные пределы.

Результат

Анализатор Beckman Coulter серии AU автоматически рассчитывает концентрацию ЛПВП-холестерина в анализе пробы

Рекомендации NCEP (National Cholesterol Education Program)¹

< 1,00 ммоль/л (40 мг/дл) Низкий холестерин ЛПВП - дополнительный риск сердечно-сосудистых заболеваний

≥ 1,66 ммоль/л (64 мг/дл) Высокий холестерин ЛПВП - отрицательный-фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний

Сниженные значения могут изменяться в зависимости от возраста, пола, веса, пробы, диеты и географического местоположения. В соответствии с общепринятой лабораторной практикой каждая лаборатория должна определять собственные референсные значения. При постановке диагноза результаты всегда следует рассматривать вместе с данными истории болезни и другими диагностическими исследованиями.

Специфические характеристики

Детский, беременных в этой лаборатории. Получены при измерении на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Характеристики проведения теста в этой лаборатории могут отличаться от приведенных ниже.

Линейность

Диагностическая чувствительность значениям концентрации холестерина ЛПВП 0,06–4,06 ммоль/л (2–100 мг/дл).

Воспроизводимость

Средние результаты получены при измерении на AU540 3-х контрольных трубок в течение 10-ти дней.

n = 65		n = 100		n = 200	
Среднее значение, ммоль/л	Станд. откл. (SD)	Среднее значение, ммоль/л	Станд. откл. (SD)	Среднее значение, ммоль/л	Станд. откл. (SD)
0,06	0,008	0,013	0,008	0,013	0,008
1,06	0,067	0,02	0,018	0,018	0,018
2,06	0,015	0,01	0,007	0,007	0,007

Чувствительность

Нижний предел чувствительности, установленный на анализаторе AU540, составляет 0,002 ммоль/л. Это значение определяет минимальное измерение холестерина ЛПВП, позволяющее делать. Нижний предел чувствительности рассчитывается на основании среднего значения трех отрицательных отклонений при 20-ти повторных измерениях анализа в пробе без исследуемого вещества.

Корреляция

При сравнении данного диагностического набора реагентов для определения холестерина ЛПВП с BIA107 на анализаторе AU540 с другими коммерческими доступными наборами реагентов для определения холестерина ЛПВП использовались сыворотки пациентов. Результаты линейного регрессионного анализа следующие:

r = 1,213 ± 0,009	r = 0,943	n = 200	Диагностическая чувствительность 0,31–2,54 ммоль/л
-------------------	-----------	---------	--

Влияющие факторы

В исследовании, проводившемся с целью оценки чувствительности метода к некоторым влияющим факторам, получены следующие результаты.

Аскорбиновая кислота	Внутреннее значение 3% при значении аскорбиновой кислоты до 20 мкг/л
Интерференция	Внутреннее значение 3% при значении интерференции до 80 мкг/л или до 664 ммоль/л
Гемоглобин	Внутреннее значение 3% при значении гемоглобина до 5 г/л
Липазы	Внутреннее значение 10% при значении липазы (Матриксин) ² до 900 мкг/л

¹ Национальные клинические рекомендации при оценке риска сердечно-сосудистой системы (1998 ммоль/л (100 мг/дл), однако существуют планы нормирования значений холестерина и концентрации триглицеридов – см. пункт Отличия).

Получите информацию по влияющим факторам можно найти в справочнике "Using".

Отличия

Если концентрация триглицеридов превышает 11,3 ммоль/л (1000 мг/дл), пробу следует развести физиологическим раствором, повторить измерение, при расчете результата учесть фактор разведения.

Ссылки в программный файл

1. Справочник пользователя и Значения, установленные в анализаторе по умолчанию
2. NCEP Cholesterol Calculator (http://ncc.nhlbi.nih.gov)
3. Значения установлены для единиц СИ (ммоль/л). При работе с единицами единиц, значения следует умножить на 38,7.
4. Глобальная концентрация липазы (Матриксин) 7 дней

Библиография

1. Miettinen H, Lipid metabolism. In: The use of clinical laboratory diagnosis. Use and evaluation of clinical laboratory results. Frankfurt/Main: TH-Books Verlagsgesellschaft, 1998:171-172.
2. Bivitt NW, Nelson Y, Taylor G, Vetterli J, Zivkovic B, et al. Use of a cholesterol-lipid diagnostic laboratory investigation and quality of blood, plasma and urine samples. WHO/FAO/WHO. J. Rev. 2:200.
3. National cholesterol education program expert panel. Executive summary of the third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) expert panel on detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult Treatment Panel III). JAMA 2001;285:2486-2497.
4. Young DB. Effects of drugs on clinical laboratory tests. In: ed. AACC Press, 2000.



**BECKMAN
COULTER.**

IRON (ЖЕЛЕЗО)

QSR6188

4 x 15 мЛ

R1

QSR6288

4 x 30 мЛ

R1

4 x 30 мЛ

R2

Назначение

Компаративный фотометрический тест для количественного определения железа в сыворотке или плазме человека на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro.

Клиническое значение

Железо принимает участие в различных жизненно важных процессах в организме, от клеточных окислительных метаболитов до транспорта и поставки кислорода. Соединения железа. Железо входит в состав гемоглобина, миоглобина, ферритина, а также различных ферментов (цитохромов, пероксидаз). Основная часть в организме входит в состав гемоглобина, комплекс гемоглобина-железа в микро-трансформации. Определение концентрации железа в сыворотке это преимущественно Fe (II), связанное с трансферрином, а также свободное железо, присутствующее в крови в составе гемоглобина. Низкий уровень железа наблюдается у большинства пациентов с железодефицитной анемией; в случае острой или хронической воспалительной заболевания, такой как острая инфекция, иммунная или инфекционная анемия; острая кровопотеря; хроническая почечная недостаточность; почечная недостаточность; менструальные нарушения и др. Концентрация железа в сыворотке обычно снижается (уменьшается) в ответ на воспалительные процессы, обусловленные другими причинами, например, лечение периферической анемии гематологией (Эритропоэтин). Концентрация железа в сыворотке, превышающая нормальные значения, наблюдается при заболеваниях с патологической анемией, например, при миелоидном лейкозе, при остром миелоидном лейкозе, при остром миелоидном лейкозе, при остром миелоидном лейкозе. Уровни железа могут также быть увеличены и в случае острой инфекции, воспаления, ожога, острой почечной, почечной или при острой почечной недостаточности.

Концентрация железа

Данный метод основан на использовании в качестве хромогена TPTZ (2,4,6-Три-(2-пиримидил)-5-триазин). В кислой среде железо, связанное с трансферрином, диссоциирует на микро-трансформацию и свободные ионы железа. Свободные ионы железа и аскорбиновая кислота восстанавливают Fe³⁺ до Fe²⁺. Ионы Fe²⁺ реагируют с TPTZ с образованием розового комплекса, абсорбция которого измеряется фотометрически при 680 нм. Увеличение линейной абсорбции прямо пропорционально количеству железа в пробе, связанного с трансферрином.

Схема реакции



Система

Концентрация в реакционной смеси
Гидролизный буфер (рН 1,7) 215 мМоль/л
Аскорбиновая кислота 4,7 мМоль/л
2,4,6-Три-(2-пиримидил)-5-триазин 0,5 мМоль/л
Концентрация

Общие предостережения

Соблюдать все меры безопасности, принятые при работе с лабораторными реагентами. Утилизацию отработанной реакционной смеси следует в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля. Газовый анализатор может быть предоставлен по запросу.

Подготовка реагентов

Реагенты можно использовать и могут быть непосредственно установлены на анализатор.

Хранение и стабилизация

Несколько реактивов стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реактивы стабильны 60 дней при хранении в темноте. Для удобства использования реактивов, которые не используются в течение длительного времени, можно использовать реактивы, которые не используются в течение длительного времени.

Использование реактивов

Сыворотка и плазма (антикоагулянт). Не использовать в качестве антикоагулянта ЭДТА, цитрат или оксалат. В сыворотке и плазме может быть стабилен в течение 3-х месяцев при температуре хранения 2-8°C и в течение 7 дней при 18-25°C. Не следует проводить измерения в реакционной смеси, если она имеет запах. Газовый анализатор может быть причиной ложных результатов. Следует избегать контакта с агрессивными или коррозионными веществами. Если анализатор используется для анализа сыворотки, то анализатор должен быть установлен на анализ сыворотки.

Применение анализа

См. Руководство пользователя и/или в соответствии с инструкцией для конкретного типа пробы. Есть программы для переноса проб или других проб с микропланшетом.

Калибровка

Анализатор серии AU (кат. № 8000).

Значения калибровочной кривой прослеживаются до Beckman Coulter Master Calibrator.

Калибровку следует проводить при следующих условиях:

Смена серийного номера реактивов или существенное изменение значений калибровки. Проверка точности калибровки осуществляется анализатором или заменой калибровочного раствора.

Контроль качества

RU 01

БЕКМАН КОУЛТЕР
RU 01

Beckman Coulter

Можно использовать контроли (дат. № 000003 и 000004) или другие контрольные материалы со значениями, установленными для данной модели анализатора Beckman Coulter.

Каждая лаборатория определяет методы проведения контроля качества самостоятельно, однако, хорошей лабораторной практикой считается использование контролей вместе с пробой пациента и после проведения анализа.

Полученные в стандартной лабораторной практике результаты могут отличаться от исторических значений. Поэтому указывается лаборатория для каждого анализа устанавливает свои собственные значения и отклонения специфического контроля, на основании исторического контроля на установленной практике. Эти средние значения не должны выходить за пределы ответственности, принятых материалов, предоставляемых в соответствующее учреждение.

При обнаружении каких-либо тенденций в изменении значений контроля качества или выявлении отклонений его значений, проверить все аналитические этапы. Например, каждой лабораторией следует разработать план действий на тот случай, если результаты измерения контроля качества выйдут за установленные пределы.

Результат

Анализатор Beckman Coulter серии AU автоматически рассчитывает концентрацию желтого в каждой пробе.

Референсные значения

Сыворотка (взрослые)	Мужчины	12.5–32.2 ммоль/л (10–150 мкг/дл)
	Женщины	10.7–32.2 ммоль/л (90–150 мкг/дл)
Сыворотка (дети)	Новорожденные	17.00–44.3 ммоль/л (150–250 мкг/дл)
	Младенцы	7.2–17.8 ммоль/л (60–150 мкг/дл)
	Дети	9.0–21.6 ммоль/л (80–120 мкг/дл)

Специальные значения могут применяться в зависимости от возраста, пола, типа пробы, диеты и географического местоположения. В соответствии с общепринятой лабораторной практикой каждой лабораторией следует определять собственные референсные значения. При истинности данных результаты всегда следует рассматривать вместе с данными истории болезни и другими диагностическими исследованиями.

Специфические характеристики

Данные, приведенные в этом параграфе, получены на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Характеристики проведения теста в другой лаборатории могут отличаться от приведенных здесь.

Линейность

Диапазон линейности соответствует значениям концентрации 2–179 ммоль/л (10–1000 мкг/дл).

Воспроизводимость

Следующие результаты получены при измерении на AU600 3-х сывороточных пипсов в течение 10-ти дней.

n = 99	Внутренняя серия		Серия	
	Станд. откл. (SD)	Коеф. вариации (CV %)	Станд. откл. (SD)	Коеф. вариации (CV %)
Среднее значение, ммоль/л	0.68	0.10	1.02	2.00
20.34	0.19	0.93	0.86	1.77
106.24	0.09	0.06	1.32	1.69

Чувствительность

Минимум предел чувствительности, установленный на анализаторе AU600, составляет 0.3 ммоль/л.

Это значение определяет минимальные измеримые значения сывороточного желтого, отклоняясь от нуля. Нижний предел чувствительности рассчитывается на основе среднего значения плюс три стандартных отклонения при 20-ти кратном измерении образца в пробе или истинного вещества.

Корреляция

При сравнении данного лабораторного набора реагентов для определения сывороточного желтого с анализатором AU600 с другим номером доступным набором реагентов для определения желтого можно ожидать сывороточного желтого. Результаты линейности референсного анализа следующие:

$r = 1.002$	$s = 0.004$	$n = 99$	Диапазон значений в пробе 1.9–11.8 ммоль/л
-------------	-------------	----------	--

Влияющие факторы

В исследовании, проводившемся с целью оценки чувствительности метода к некоторым влияющим факторам, получены следующие результаты:

Истеричность:	Влияние миним 2% при значениях выше 40 мкг/дл или до 934 ммоль/л
Гематокрит:	Влияние миним 10% при значениях гематокрита до 1.01
Липемия:	Влияние миним 10% при значениях липидов (мг/дл) до 100 мкг/дл
Билирубин:	Влияние миним 10% при значениях билирубина до 1 мг/дл или до 0.167 ммоль/л
Глобулин:	Влияние миним 10% при значениях глобулина до 2 г/дл или до 20 г/л
Триглицериды:	Влияние миним 10% при значениях триглицеридов до 300 мг/дл или до 2.6 ммоль/л

В связи, ранее отмеченное взаимодействие между анализатором Beckman Coulter может быть причиной некоторых результатов.

Дополнительно по влияющим факторам можно найти в справочнике Yencap.¹⁴

Отверждения

В радио-станциях при очень высокой концентрации желтого, желтого, при очень высокой концентрации желтого, может возникнуть помешание радио-станции, что будет причиной в значении этого или некоторых результатов анализа.¹⁵

Справки и Идентификация

8. Справочник по идентификации. Значения, установленные в лаборатории на основании.
9. Справочник по идентификации. Значения, установленные в лаборатории на основании.
10. Значения, установленные для единицы СИ (расчет). При работе с единицами измерения, значения следует умножить на 0,500.

Библиография

1. Tietz NW, ed. Clinical guide to laboratory tests. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1996: 574-578.
2. Fildes VA, Day DG. Biochemical aspects of hematology. In: Burke CA, Ashwood ER, eds. Textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1988: 1699-1703.
3. Woe J, Henry JB. Methods intermediate and frequency tests. In: Henry JB, ed. Clinical diagnosis and management by laboratory methods. Philadelphia: WB Saunders Company, 1989: 108-109.
4. Schade A, Capria J, Rother H, Miller J, ed. Proc Soc Exp Biol Med 1984; 87: 442.
5. Gaudin, JF, Murphy B, Guillevin L. Direct measurement of serum iron and binding capacity. Clin Chem 1986; 32: 47-57.
6. Burt H, Zimm B. The Iron Reaction. In: Hematology: Principles and Practice. 2nd ed. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1989.
7. Burt H, Zimm B, Schade A, Taylor G, Woe J, Zimm B, et al. Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. J Clin Lab Med 1984; 23: 239.
8. Ferris G, Iron and total iron binding capacity. In: Kaplan LA, Pesce AJ, eds. Clinical chemistry theory, analysis, and correlation. 3rd ed. St. Louis: Mosby, 1994: 714-719.
9. NCCLS. Distribution of serum iron, total iron-binding capacity and percent transferrin saturation: approved standard. NCCLS Document H7-A, Pennsylvania: NCCLS, Dec 1998.
10. Fildes VA, Day DG, Smith J. Reference information for the clinical laboratory. In: Burke CA, Ashwood ER, eds. Textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1988: 1699-1703.
11. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests. 6th ed. AACCP Press, 2000.
12. Gaudin JF. Influence of nutritional iron deficiency on direct determination of iron in serum. Clin Chem 1994; 37: 650-4.

CE

отраделения при использовании данного реактива. В пробирке надписано, полу-часовая темная смесь не следует измерять холестерин ЛПНП, использовать этот метод.

Загрязнение реактива холестерин ЛПНП реактива глицерин, может быть причиной высокой цифровой ошибки. Плазмолитический, глицерин, Глицерин, Глицерин.

Свойства и показания к применению

1. Определение холестерина. 2. Значение, установленное в анализаторе по результатам.

3. LDL-Cholesterol Calculator. 4. Не QOC0012.

5. Значения установлены для единиц СИ (ммоль/л). При работе с единицами «мг/дл», значение QOC0012 умножить на 38,7.

6. Проводите измерения реактивом каждые 7 дней.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Sirtori CR, Masetti D, Martin H, Lazzari B, Masetti R, Sirtori H, et al. Ten year follow-up results from the Gossinger High, low-density and prevalence study (GOSPER). 1. Risk factors for myocardial infarction in a cohort of 5700 men. *Atherosclerosis* 1987;128(2):221-230.
2. National cholesterol education program. Expert panel on detection, evaluation and treatment of high blood cholesterol in adults (adult treatment panel II). *NIH Publication No.* 98-3085, 1998.
3. Nishi HK, Sheng SP, Scott MG et al. Adipogenic enzyme lipase on obesity and risk factors. *Clin Chem* 1998; 44(1):322-328.
4. Wu Y. A homogeneous assay for the selective measurement of LDL-cholesterol in serum. Enzymatic selective reaction method. *Clin Lab* 1999;45:368-404.
5. Ernst WJ, Hall W, Schenk Y, Topfer G, Weiss H, Zander R, et al. Use of Anticoagulants in Diagnostic Laboratory Investigations and Stability of Blood, Plasma and Serum Samples. *WHO/WHO/WHO* 1998; 1 (Rev. 2) 20pp.
6. National cholesterol education program expert panel. Executive summary of the third report of the national cholesterol education program (NCEP) expert panel on detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult Treatment Panel III). *JAMA* 2001;285:2486-2607.
7. Young DS. Effect of drugs on clinical laboratory tests. 3rd ed. ACCP Press, 2000.
8. Esteban-Salen M, Quiroga-Balboa A, de la Haza-Ustiz JM, Azorin-Ariza MM, Poveda-Urquiza P, Arriola-Del-Rio E. Analytical and clinical evaluation of two homogeneous assays for LDL-cholesterol in hyperlipidemic patients. *Clin Chem* 2000; 48(1):11-21-91.

CE



КРЕАТИНИН (CREATININE)

05R0170

4 x 61 мЛ

R1

4 x 61 мЛ

R2

05R0670

4 x 103 мЛ

R1

4 x 103 мЛ

R2

Назначение

Креатининовый колориметрический тест для количественного определения креатинина в сыворотке, клывая или мочи человека на анализатор Beckman Coulter. Только для диагностики и/или Решений для определения креатинина Creatinine (Креатинин) 05R0670 предназначены только для использования на анализаторах AU2700 и AU2700.

Клиническое значение^{1,2,3}

Креатинин является продуктом метаболизма креатина и фосфокреатина, которые присутствуют только в мышцах. Поскольку образование креатинина пропорционально мышечной массе и мышечная масса остается постоянной. Измерение креатинина используется в диагностике и лечении заболеваний почек, а также для информации при оценке клубочковой функции почек и при мониторинге почечного дисбаланса. Случаи повышенного креатинина не являются признаком равновесия прерывающейся почечной функции и требуют на последующее наблюдение, чем снижение крови (BUN) или гемоглобина из-за хронической почечной недостаточности. Низкий креатинин в сыворотке, так же как и низкий креатинин при дифференциальной диагностике прерывистой и хронической (обструктивной) почечной. Повышение уровня креатинина в сыворотке (без сопутствующего увеличения креатинина в сыворотке) является признаком в диагностике прерывистой почечной в случае хронической почечной, когда имеет место обструкция, например, при закупорке нефролитом и аденоме простаты, будет увеличен или уровень сывороточного креатинина, так и его уровень в моче, в этих случаях увеличение креатинина не пропорционально больше не-не увеличение скорости диффузии мочевины.

Уровень сывороточного креатинина зависит от возраста, пола, веса и типа питания. У людей с низким уровнем креатинина встречаются у людей с относительно малой мышечной массой, у больных с болезнью или с анатомическими изменениями мочеиспускания и почечных людей. Нормальный уровень сывороточного креатинина не исключает ухудшения функции почек.

Почечная недостаточность^{4,5,6}

В широкой среде креатинин обладает с пириновой кислотой связывающей в малом количестве цвет соединения. Скорость изменения абсорбции при 620/600 nm прямо пропорциональна концентрации креатинина в пробе.

Схема реакции

Креатинин + пириновая кислота → Креатинин-пириновый комплекс

Система

Концентрация в реакционной смеси: 120 мкг/мЛ
Пиролиновая кислота: 2,5 мкг/мЛ
Конвергент

Общие предостережения

Предупреждение об опасности и обращении с риском:

Результат R1: Водостойкий растворитель. R2/R3: Может вызвать раздражение при попадании в глаза и на кожу. Меры предосторожности.

620, 637, 640 в случае попадания в глаза немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу. Избегайте попадания. Результаты и тест-материалы необходимо утилизировать надлежащим образом.

R1, содержащий пиролиновую кислоту. Сильно раздражающая кислота при быстром нагревании и при ударе или встряхивании. Прочтите разделы раздела 4.0 и 4.1 в руководстве пользователя.

Утилизацию отработанных реакционных материалов и реагентов с трибутилами следует проводить в соответствии с инструкциями по безопасности. Доставка реакционных материалов должна быть направлена в Паспорт безопасности.

Почечная недостаточность

Результаты должны использоваться и могут быть непосредственно использованы в анализаторе.

Химическая стабильность

Нормальные результаты стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия результаты стабильны 14 дней при хранении в холодильнике.

Молочный метаболит

Сыворотка и плазма (EDTA или гепарин).

В сыворотке и плазме креатинин стабилен в течение 7-ми дней при температуре хранения 2-8 °C.

Не используйте мочевые пробы.

Моча: собирать мочу следует для использования как минимум, хранить при 2-8°C.

Примечания к тесту

Для этого результата доступны две различные процедуры тестов:

A. Визуальная методика: реакционная смесь выливается в 18 мм чашку и после реакции (время Time Reaction) Creatinine Index (0 - 10).

B. Автоматизированный метод: реакция выливается в чашку, что обеспечивает наиболее точные результаты измерения проб реактивов и контроль сыворотки в малых количествах реактивов, и следовательно различия в реакционных реактивах.

или

или
или

или

Корреспондент:
Анн Клемменберг, Институт математики и информатики, Университет Виллемса-Орелана, Амстердам, Нидерланды. E-mail: ann.klemmenberg@uva.nl

Группы	Число наблюдений	Среднее значение	Среднее отклонение	Среднее квадратичное отклонение	Среднее квадратичное отклонение
Группа I	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа II	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа III	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа IV	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа V	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа VI	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа VII	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа VIII	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа IX	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа X	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XI	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XII	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XIII	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XIV	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XV	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XVI	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XVII	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XVIII	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XIX	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XX	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XXI	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XXII	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XXIII	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XXIV	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XXV	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XXVI	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XXVII	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XXVIII	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XXIX	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XXX	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XXXI	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XXXII	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XXXIII	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XXXIV	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XXXV	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XXXVI	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XXXVII	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XXXVIII	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XXXIX	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XL	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XLI	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XLII	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XLIII	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XLIV	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XLV	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XLVI	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XLVII	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XLVIII	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа XLIX	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа L	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа LI	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа LII	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа LIII	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,901	0,901
Группа LIV	10	1,20 ± 0,24	0,893	0,	

[illegible]

1. **Introduction**

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

1. Berridge MJ, Lippman ME, McMahon T, et al. (1990) The epidemiology of cigarette smoking and lung cancer: a review of the literature. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 1:1-11.
2. Berridge MJ, Lippman ME, McMahon T, et al. (1990) The epidemiology of cigarette smoking and lung cancer: a review of the literature. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 1:1-11.
3. Berridge MJ, Lippman ME, McMahon T, et al. (1990) The epidemiology of cigarette smoking and lung cancer: a review of the literature. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 1:1-11.
4. Berridge MJ, Lippman ME, McMahon T, et al. (1990) The epidemiology of cigarette smoking and lung cancer: a review of the literature. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 1:1-11.
5. Berridge MJ, Lippman ME, McMahon T, et al. (1990) The epidemiology of cigarette smoking and lung cancer: a review of the literature. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 1:1-11.

11. Pinner DC, Coor JY, Smith L. Reference Interference for the official laboratory. In: Smith CA, Ashwood ER, eds. *Textbook of official chemistry*. Pittsburgh: WCB Saunders Company, 1999:503p.
12. Scott RJ, Burgess C, Wong EC, eds. *Practical Reference Ranges*. 4th ed. AACCP Press, 2003:71-72.
13. Scott RJ. Effects of factors on official laboratory tests. 5th ed. AACCP Press, 2000.
14. Young JB. Effects of factors on official laboratory tests. 5th ed. AACCP Press, 2000.

1

0000-0001-9166-780X

01.04.2016

PMU-01

CON

Life-threatening

References



ПРЕАЛЬБУМИН (PREALBUMIN)

QSR6178

4 x 18 мл

R1

4 x 8,5 мл

R2

Назначение

Качественное определение преальбумина в сыворотке человека иммунофлуориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики *in vitro*.

Клиническое значение^{1,2}

Преальбумин (транспортин)^{1,2} – белково-липидный транспортный белок, состоящий из четырех идентичных субъединиц, синтезируемый печенью. Он связывает и транспортирует около 10% тироксина и триглицеридов сыворотки, а также играет значительную роль в метаболизме витаминов А, образуя комплекс с ретинолсвязывающим белком. Из-за своего относительно короткого периода полураспада, низкого содержания триптофана, высокого соотношения отрицательных аминокислот и незначительного гидрофобного взаимодействия преальбумин является основным индикатором состояния белков (уровень снижается при периодах белкового голодания). Он является отрицательным реактантом острой фазы, уровень которого также снижается при воспалении, злокачественных опухолях, циррозе печени и заболеваниях почек, а также при ожогах, приводящих к потере белка, при ожогах ожогов и, в тяжелой степени, при увеличении метаболизма. Другие белки острой фазы можно использовать для дифференциальной диагностики между состоянием преальбумина в связи с АЛЛ или гепатитом или в связи с воспалением. Однако некоторые воспалительные варианты, большинство из которых связаны с воспалительными заболеваниями кишечника и ревматическими. Уровень преальбумина увеличивается при болезни Ходкина.

Принцип определения

При добавлении пробы с буфером R1 и раствору антисыворотки R2, человеческий преальбумин специфически реагирует с антителами против человеческого преальбумина, с образованием нерастворимых комплексов. Аглобулины реакционной смеси пропорциональны концентрации преальбумина в пробе.

Состав

Концентрация в реакционной смеси:
Раствор калия в фазе R1-содержит буфер
Кислотный антиген и транспортный белок
Консервант

(pH 7,1-7,3)
Буферизатор

Общие предостережения

Соблюдать все меры предосторожности, применяя при работе с лабораторными реактивами. Во избежание возможного заражения лабораторное оборудование следует после использования реагента промыть чистой водой. Утилизировать отработанные реактивы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства.

Подготовка реагента

Реагенты готовы к использованию и могут быть непосредственно использованы в анализатор.

Хранение и стабильность

Нерастворимые реагенты стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения: 2-8°C. После вскрытия реагенты стабильны 30 дней при хранении в анализаторе.

Максимальный интервал

Сыворотка
В сыворотке преальбумин стабилен в течение 8-11 месяцев при температуре хранения 2-8 °C и в течение 3-х дней - при 18-25 °C.³
Не использовать замороженные пробы.

Процедура анализа

См. Руководство Reagent Guide в соответствующем инструменте для конкретного теста пробы.

Калибровка

Калибратор преальбумина Prealbumin Calibrator, кат. № QSR3020.
Значения калибратора для преальбумина соответствуют до стандарта CMI 47D FCC (Федеральной Федерации Клинической Химии). Калибратор следует проводить при следующих условиях:
Смена серийного номера реактивов или существенное изменение значений контроля;
Проведение профилактического обслуживания анализатора или замена любого узла прибора;
Новую калибровку необходимо регулярно проверять – последовательно выбрать в меню Verify (Обобщенное исследование) - Calibration Monitor (Мониторинг калибровки) - Calibration Curve (Калибровочная кривая). Сразу же после калибровки следует провести контроль качества.

Контроль качества

Можно использовать контрольные сыворотки ITA Control Serum (кат. № QDC0014, QDC0015 и QDC0016) или другие контрольные материалы со значениями, установленными для данной модели анализатора Beckman Coulter.
Каждая лаборатория определяет частоту проведения контроля качества самостоятельно, однако, любой лабораторной практикой считается, что регулярное измерение качества с проблемами пациента и после проведения калибровки.
Полученные в отдельной лаборатории результаты могут отличаться от лабораторного значения. Поэтому лаборатория рекомендует для каждого анализа устанавливать свои критерии значения и проводить специфический контроль, на основании многократного измерения по установленным правилам. Эти критерии значения не должны выходить за пределы соответствующих принятых критериев, применяемых в соответствующем направлении.

При обнаружении явной либо скрытой в изменении значений некорректности качества или адекватности отклонений его значений, проверить все значительные этапы измерения. Каждый лабораторный следует разработать план действий на тот случай, если результаты измерения контроля качества выйдут за установленные пределы.

Результат

Анализатор Bestman Coulter серии AU автоматически рассчитывает концентрацию преобладающей в анализе граби.

Референсные значения¹

Сыворотка (взрослые) 0,2-0,4 нг (20-40 мкг/л)

Сопоставимые значения могут измениться в зависимости от возраста, пола, типа граби, длины и географического местоположения. В соответствии с общепринятой лабораторной практикой каждый лабораторный должен определять собственные референсные значения. При постановке диагноза результаты всегда следует рассматривать вместе с данными историй болезни и другими диагностическими исследованиями.

Специфические характеристики воспроизведения теста

Данные, приведенные в этом паспорте, получены при измерении на анализатор Bestman Coulter серии AU. Характеристики приведенные теста в других лабораториях могут отличаться от приведенных здесь.

Воспроизводимость

Диапазон линейности соответствует значениям концентрации 0,03-0,8 нг (3-80 мкг/л).

Воспроизводимость

Специфические результаты получены при измерении на AU800 3-х сывороточных образцов в течение 30-ти дней.

n = 69	Внутренняя вариация			Внешняя	
	Среднее значение, нг	Отклон. отклон. SD	Коэф. вариации (CV %)	Среднее значение, нг	Коэф. вариации (CV %)
0,03	0,03	0,001	2,50	0,001	3,30
0,45	0,45	0,01	1,90	0,01	1,80
0,70	0,70	0,01	1,80	0,02	2,70

Чувствительность

Нижний предел чувствительности, установленный на анализаторе AU800, составляет 0,04 нг.

Это значение определяется как минимальное и измеримое значение преобладающей, отличной от нуля. Нижний предел чувствительности рассчитывается как абсолютное среднее значение либо три стандартных отклонения при 20-ти повторных измерениях образца в грабе без исследуемого вещества.

Интерференция

При определении широкого диагностического набора реагентов для определения преобладающей CBR175 на анализаторе AU800 с другими коммерческими доступными наборами реагентов для определения преобладающей использовались сыворотки пациентов. Результаты измерения рассредоточенного анализа следующие.

$y = 0,993x - 0,018$	$r = 0,994$	$s = 70$	Диапазон значений в грабе 0,04-0,40 нг
----------------------	-------------	----------	--

Влияющие факторы

В исследованиях, проводившихся с целью оценки чувствительности метода к различным влияющим факторам, получены следующие результаты:

Истеричность:	Влияние менее 3% при значениях концентрации до 40 мкг/л и до 584 нмоль/л
Температура:	Влияние менее 3% при значениях концентрации до 8 нг
Длительность:	Влияние менее 10% при значениях концентрации (нмоль/л) ² до 800 мкг/л

Полную информацию по влияющим факторам можно найти в справочнике Young.³

Ограничения

Граби, содержащие гетерофильные антитела, могут давать ложные иммунные результаты.

Ссылки в программный файл

1. Определены поставщиками.
2. Значения, установленные в анализаторе по умолчанию.
3. Principles of Clinical Chemistry, 4th ed. CDR2002.
4. Значения установлены для единиц СИ (нг/л). Для работы с единицами мкг/л, значения следует умножить на 100.

Библиография

1. Johnson AM, Renfro EM, Sawchen LM. Protein. In: Burke CA, Astwood JR, eds. Textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1990:399-401.
2. Tietz NW, ed. Clinical guide to laboratory tests, 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1995:608-609.
3. Eklund W, Hult W, Sahlin U, Tjärn A, Wheel H, Zetter B, et al. Use of monoclonal antibodies in diagnostic laboratory investigations and ability of immunoassay and serum samples. WHOCDL/AB/90.1 Rev 2:38pp.
4. Sandberg M, Dahl F. Standardization of the measurement of 14 proteins in human serum based on the new IFCC/BCR/CCP international reference material CRM 470. J Lab Med 1990;20: 149-152.
5. Young DB. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACSC Press, 2000.

CE

Поробную інфармацыю па асаблівасцях фактараў можна знайсці ў справачніку Young.TM

Спасылкі на вонкавыя крыніцы

- # Справадзіцца колькасцю іонаў. * Значэнні, усталяваныя ў аналізатары па ўмоўным.
- † UltratryCSE Protein Calibration вяртаецца ў аснова набору рэагентаў.
- Значэнні усталяваны для адзінцы СІ (g/l). Пры рабоце з адзінкамі «мг/дл», значэнні следуюць умножыць на 100.

БІБЛІАГРАФІЯ

1. Tals W.M. Textbook of clinical chemistry, 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1994
2. Fujita Y, Mod J, Okano S. Color reaction between pyrogallol and polyphenol (A/B) complex and protein. Bunseki Kagaku 1983;32:379-386.
3. Weinsabo N, Kamei S, Ohkubo A, Yamanaka M, Okawa S, Makino K, Tokuo K. Urinary protein as measured with pyrogallol red-methylate complex manually and in Hitachi 729 automated analyzer. Clin Chem 1988;32:1891-1894.
4. Tals W.M. Clinical guide to laboratory tests, 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1985:539-539.
5. NCCLS. Urinolyte and oxidase, transportation and preservation of urine specimens; approved guideline - second edition. NCCLS document OP18-A2, 2001.
6. Young DR. Effects of preanalytical variables on clinical laboratory tests, 2nd ed. AACC Press, 1997.
7. First MR. Renal Function. In: Kaplan LA, Pansu AJ, eds. Clinical chemistry: theory, analysis and correlation, 3rd ed. St Louis: Mosby-Year Book, 1998:484-504.
8. Pansu C, Marletzt-Bu G, Hone R, Pansu T, Corcos M. Effect of plasma replacement therapy on determinations of urea protein concentration [Letter]. Clin Chem 1998;44:295-297.
9. NCCLS. Evaluation of precision performance of clinical chemistry devices; approved guideline. NCCLS document EP5-A;1998.
10. Young DR. Effects of drugs on clinical laboratory tests. AACC. 6th ed. AACC Press, 2000.

CE



**BECKMAN
COULTER.**

МИОГЛОБИН (MYOGLOBIN)

QBR6166

4 x 12 мл
4 x 9 мл

**R1
R2**

Назначение

Количественное определение миоглобина в сыворотке и плазме человека иммунофлуориметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro.

Клиническое значение (1,2,3)

Миоглобин представляет собой миопrotein, состоящий из белка постериноглобиновой цепи, т.е. содержащий и специфичный миопrotein. В отличие от гемоглобина, миоглобин неспособен связывать O_2 , кроме случаев чрезвычайно низкого рО₂, поэтому имеет сравнительно низкую насыщенность гемом в условиях нормальной ткани. Миоглобиновые миопrotein являются частью гемоглобиновой цепи, содержащей гем, который при разрыве высвобождает гемовый пигмент, вызывая гемолитическую реакцию. Миоглобиновые миопrotein, в отличие от гемоглобина, не являются частью гемоглобиновой цепи, содержащей гем, который при разрыве высвобождает гемовый пигмент, вызывая гемолитическую реакцию. Миоглобиновые миопrotein, в отличие от гемоглобина, не являются частью гемоглобиновой цепи, содержащей гем, который при разрыве высвобождает гемовый пигмент, вызывая гемолитическую реакцию.

В истории болезни обязательно должно быть указано было ли увеличение уровня миоглобина выявлено измерением миоглобина или выявлено измерением миоглобина в сыворотке после инфаркта миокарда. Увеличение миоглобина наблюдается спустя 2-4 часа после появления первых симптомов и сохраняется до уровня референсных значений в течение 24 часов. Увеличение миоглобина, обусловленного повреждением скелетной мускулатуры, является повышением СК. Специфичность уровня миоглобина очень важна для исключения острого инфаркта миокарда, в то же время наблюдается при травматической травме. Однако миоглобин не является специфическим маркером инфаркта миокарда и требует подтверждения другим специфическим маркером инфаркта миокарда.

Принцип определения

При добавлении реагента к буферу R1 и R2, содержащему латексные частицы, человеческий миоглобин специфически реагирует с антителами, образующими комплекс, который взаимодействует с латексными частицами, с образующими микроскопический осадок. Абсорбция реакционной смеси пропорциональна концентрации миоглобина в пробе.

Состав

Концентрация в реакционной смеси:

Угнетенный буфер (pH 8,0)

Латексные частицы, покрытые антителами к человеческому миоглобину (pH 7,3)

Консервант

62 мг/мл

Буферный

Общие предостережения

Соблюдайте все меры предосторожности, применяемые при работе с лабораторными реактивами. Во избежание возможных осложнений соблюдайте меры предосторожности при работе с реактивами. Соблюдайте меры предосторожности при работе с реактивами. Соблюдайте меры предосторожности при работе с реактивами. Соблюдайте меры предосторожности при работе с реактивами.

Подготовка реагента

Реактив R1 готов к использованию и не требует дополнительной подготовки. Реактив R2 перед использованием в анализатор необходимо перемешать, перемешивая флакон 5-10 раз. Эту процедуру повторите ежедневно.

Хранение и стабильность

Несколько реактивов стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реактивы стабильны 30 дней при установке и хранении в холодильнике.

Испытательный материал

Несколько реактивов стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реактивы стабильны 30 дней при установке и хранении в холодильнике.

Подготовка анализа

См. Руководство Reagent Guide и соответствующее руководство для конкретного анализатора.

Калибровка

Калибратор миоглобина Myoglobin Calibrator, cat. no. CBR6262.

Калибратор для миоглобина предназначен для количественного определения миоглобина высокой чистоты и является установленным и используемым стандартным РНА-методом.

Калибратор следует применять при стандартных условиях.

См. руководство пользователя реактива или руководства пользователя анализатора.

Применение прецизионного оборудования анализатора или замена анализатора.

Новую калибровку необходимо периодически проверять – последовательно выбрать в меню Reagent (Общие настройки) – Calibration (Калибровка) – Myoglobin (Миоглобин) – Calibration Curve (Калибровочная кривая). Сразу же после калибровки нажать кнопку Enter, чтобы подтвердить калибровку.

Контроль качества

Можно использовать контрольный материал, предназначенный для оценки качества работы анализатора, или использовать контрольный материал, предназначенный для оценки качества работы анализатора. Можно использовать контрольный материал, предназначенный для оценки качества работы анализатора, или использовать контрольный материал, предназначенный для оценки качества работы анализатора. Можно использовать контрольный материал, предназначенный для оценки качества работы анализатора, или использовать контрольный материал, предназначенный для оценки качества работы анализатора.

Полученные в аналитической лаборатории результаты могут отличаться от истинного значения. Поэтому лаборатория рекомендуется для каждого анализа устанавливать свои средние значения и проводить статистический контроль, на основании многократного планирования по установленным правилам. Эти средние значения не должны выходить за пределы оговоренных пределов принятия материалов, предоставляемых в соответствии с требованиями.

При обнаружении каких-либо отклонений в минимальных значениях контроля качества или аналогичных отклонений его значений, проводить все необходимые шаги контроля. Каждый лабораториям следует разработать план действий на тот случай, если результаты лабораторного контроля качества будут за установленные пределы.

Обратите внимание на то, что значения контроля на фармы Bechtel Saitam могут отличаться с изменениями серийного номера реагентов или модификацией тестового оборудования. Это обусловлено использованием контрольных материалов не человеческого происхождения.

Ресурсы

Анализаторы Bechtel Saitam серии AU автоматически рассчитывают альбумин в мкл/л крови.

Репродуцибельность

Моча:

	Суточная моча (мг/24ч)	Порция мочи, собранная в течение определенного времени (мг/мин)	Результат порции мочи (мг/лжл кровяной)
Норма	< 30	< 20	< 20
Микроальбуминурия	30-200	20-100	30-200
Клиническая альбуминурия	≥ 300	≥ 200	≥ 300
Срок ¹	3 мес. - 4 года > 4 лет	0-450 мг/л 100-300 мг/л	

Оценочные значения могут изменяться в зависимости от возраста, пола, веса пробы, диеты и географического местоположения. В соответствии с рекомендацией лабораторией принятой международной лабораторией следует определить собственное референтное значение. При постановке диагноза результаты всегда следует рассматривать вместе с данными истории болезни и другими диагностическими исследованиями.

Специфические характеристики проведения теста

Данные, приведенные в этом параграфе, получены при применении на анализаторе Bechtel Saitam серии AU. Характеристики проведения теста в вашей лаборатории могут отличаться от приведенных ниже.

Линейность

Диагностическая линейность соответствует значениям концентрации 6-300 мг/л (0,6-30 мг/дл). Эффект пробы наблюдается при концентрации свыше 6000 мкл (600 мг/дл).

При исследовании пробы с концентрацией альбумина выше указанной, при использовании реактива Микроальбумин CERN167, может быть показано повышенное содержание аналита, вследствие избытка аналита. Моча и спинномозговая жидкость должны быть предварительно исследованы интерпретацией результатов для количественной обработки образцов мочевого осадка, превышающего 300 мкл (каждой порции). Линейность исследования при использовании реактива CERN167. Таблицы следует перед применением предварительно разработать.

Воспроизводимость

Средние значения результатов получены при исследовании на AU600 3-х типов мочи в течение 10-ти дней

n = 80		Внутренняя		Средняя	
Среднее значение, мг/л	Станд. откл. (SD)	Сред. откл. (SD)	Сред. откл. (SD)	Сред. откл. (SD)	Сред. откл. (SD)
8,43	0,17	0,08	0,07	0,07	0,08
107,83	1,43	1,33	2,14	1,98	1,98
259,28	2,10	0,73	4,89	5,82	5,82

Чувствительность

Нижний предел чувствительности, установленный на анализаторе AU600, составляет 9 мкл. Это значение определяется как минимальное количество альбумина, отличающее от нуля. Нижний предел чувствительности рассчитывается как абсолютное среднее значение плюс три стандартных отклонения при 20-ти повторных измерениях в пробе без исследуемого вещества.

Интерференция

При применении данного диагностического набора реагентов для определения альбумина CERN167 на анализаторе AU600 с другим коммерчески доступным набором реагентов для определения альбумина используется моча пациента. Результаты линейного регрессионного анализа следующие:

$y = 1,00x - 1,09$	$r = 993$	$n = 39$	Диапазон значений в пробх 2,3-304 мг/л
--------------------	-----------	----------	--

При применении данного диагностического набора реагентов для определения альбумина в СЕРТ CERN167 на анализаторе AU600 с другим коммерчески доступным набором реагентов для определения альбумина используется СЕРТ пациента. Результаты линейного регрессионного анализа следующие:

$y = 1,07x - 1,24$	$r = 0,994$	$n = 109$	Диапазон значений в пробх 0,7-21,0 мкл/л
--------------------	-------------	-----------	--

Внешние факторы

В исследовании, проведенном на анализаторе Bechtel Saitam чувствительности метода к некоторым внешним факторам, получены следующие результаты:

Глюкоза: Влияние менее 5% при значениях глюкозы до 3000 мг/дл или до 160,7 ммоль/л
Креатинин: Влияние менее 5% при значениях креатинина до 300 мкмоль/л или до 20,62 мг/дл

Подробную информацию об анализе факторов влияния найти в справочнике Young.⁴

Примечания

Результат определения микроальбумина в мочи или СМЖ может быть записан в случае, если измерение выполнено непосредственно после измерения в сыворотке

- Для того чтобы избежать ложно положительных результатов рекомендуется:
- выполнять калибровку микроальбумина отдельно от измерения других компонентов в сыворотке;
- использовать восстановительный стандарт с сывороткой и мочой;
- при передаче от исследования сыворотки к исследованию мочи, в первую очередь в мочу добавить стандартный контроль с 2% диатермией (CERN001) и провести в ней определение любого теста;
- Эффект пробы может наблюдаться при очень высоких значениях микроальбумина > 6000 мкл/л.

Дата: 1998

Код: 100-01

1/1

СЧЕТЫ И ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ

1. Определитель колонизационный

■ Значение, установленное в анализатора до установки

2. System Calculator, ver. № 0003024

3. Значения установлены для прибора СИ (МН) Для работы с программами анализатора следует разделить на 10
Примечание для СИМ, Отличия от СИ в значении анализа

БИБЛИОГРАФИЯ

1. American Diabetes Association. Update Hyperglycemia. Diabetes Care 25(Suppl 1):96S-99S
2. Sacks DB, Berdo DE, Goldstein DM, Haidson NK, McDonald JM, Pandal M. Guidelines and recommendations for laboratory analysis in the diagnosis and management of diabetes mellitus. Clin Chem 2002;48:438-472
3. Sacks DB. Guidelines in: Burke CA, Anderson EH, eds. Third textbook of clinical chemistry. Philadelphia, WB Saunders Company, 1999:789pp
4. Haiman DJ, Pines CP. Rural heretics and diabetes mellitus. In: Burke CA, Anderson EH, eds. Third textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1998:153-159
5. Ghani W, Hall W, Schmitt Y, Taylor G, Weaver H, Zivny J, et al. Use of microglobulin in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. WHO/COLLABOR 1 Rev 2 49pp
6. Tellez HMC and Clinical guide to laboratory tests, 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1995:24pp
7. Pander PC, Capra AV, Smith JL. Reference information for the clinical laboratory. In: Burke CA, Anderson EH, eds. Third textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1999:1407pp
8. Young GS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 3rd ed. AACF Press, 2000

CE



ЦЕРУЛОПЛАЗМИН (CERULOPLASMIN)

QSR6164

4 x 15 мЛ

R1

4 x 5 мЛ

R2

Назначение

Количественное определение церулоплазмينا в сыворотке и плазме человека с помощью иммунофлуориметрических методов на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики *in vitro*.

Клиническое значение^{1,2}

Церулоплазмин является основным белком плазмы человека, циркулирующей в крови. Он является белком плазменного периода острой фазы воспалительного процесса. Белок острой фазы относится к белкам, концентрация которых в сыворотке значительно повышается во время острого воспалительного процесса, вызванного разными причинами, среди которых следует отметить инфекционные заболевания, инфекцию мочевых путей, инфаркт и инсульт. Основное клиническое значение церулоплазмينا заключается в диагностике болезни Вильсона-Коловрата. При этом заболевании концентрация церулоплазмينا снижается, вызывая повышение концентрации дефицитной меди. Увеличение уровня церулоплазмина особенно часто встречается при заболеваниях ретикулоэндотелиальной системы, таких как болезнь Ходжкина, а также во время беременности, при использовании контрастных препаратов. Низкий уровень церулоплазмина в плазме встречается при нарушении питания, нарушении всасывания, инфекциях и токсическом заболевании печени, особенно при билирубинемии цирроза.

Принцип определения

При добавлении пробы к буферу R1 и раствору антицелулоплазмина R2, человеческий церулоплазмин специфически реагирует с антителами против человеческого церулоплазмина, в образце имеются интерферонные комплексы. Абсорбция реакционной смеси пропорциональна концентрации церулоплазмينا в пробе.

Состав

Концентрация в реакционной смеси:	(мг/л 1,4-7,6)
Раствор коллоидов в фосфатно-солевой растворе	5% вес/об.
Поглотительный 6000	Варирует
Контроль антицелулоплазмина и церулоплазмину человека	
Консервант	

Общие предостережения

Соблюдая все меры предосторожности, применяйте при работе с лабораторными реактивами. Избегайте возможного отклонения абсорбирования субстанции после слива нерабочих реактивов. Промойте анализаторные трубы водой. Утилизируйте реактивы надлежащим образом в соответствии с требованиями санитарно-гигиенического и экологического контроля. Паспорт безопасности может быть предоставлен профессиональным консультантом по анализу.

Подготовка реагента

Реактивы готовы к использованию и могут быть непосредственно установлены в анализатор.

Хранение и стабильность

Использовать реактивы следует до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реактивы стабильны 90 дней при установке и хранении в анализаторе.

Идентификация материала

Сыворотка и плазма (300А или 300B).

В сыворотке церулоплазмин стабилен в течение 3-х дней при температуре хранения 2-8°C.³

Примечания

См. Руководство Reader Guide и соответствующую информацию для конкретной модели пробы.

Калибровка

Белок Рибон Милл-Селлигман 2 (мг/л, см. QSR2023).

Значения калибратора для церулоплазмينا просчитываются по стандарту CRM 470 FCC (Международный Федераций Клинической Химии).

Калибратор следует проводить при следующих условиях:

- Система циркуляции реактивов или устройства измерения значений калибратора;
- Последняя профилактическая калибровка калибратора или замена калибратора;
- Новая калибровка необходимо регулярно проверять - после замены калибратора, в анализаторе (Обязательное условие) - Селлигман Миллс (флюориметрический калибратор - CellSpectra System (обязательное условие)). Сразу же после калибровки следует провести контроль качества.

Контроль качества

Можно использовать контрольные сыворотки PIA Control Variant (мг/л: N1 QSR0014, QSR0015 и QSR0016) или другие контрольные материалы со значениями, установленными для данной модели анализатора Beckman Coulter. Каждый лабораторный определяет частоту проведения контроля качества самостоятельно, однако, каждый лабораторный реактив считает на анализатора измерения работоспособности реактивов и после введения калибратора.

Полученные в отдельной лаборатории результаты могут отличаться от истинного значения. Поэтому лаборатория рекомендуется для проверки качества установить свои собственные значения и стандартные стандарты контроля, на основании недостоверного измерения на установленные параметры. Эти средние значения не должны выходить за пределы соответствующего принятого интервала, приведенного в соответствующем справочнике.

При обнаружении значительных отклонений в анализе значений контроля качества или выявлении отклонений от значений, проверьте все аналитические этапы измерения. Каждый лабораторный следует разработать план действий на тот случай, если результаты контроля качества выходят за установленные пределы.

Результат

Анализаторы Beckman Coulter серии AU автоматически рассчитывают концентрацию церулоплазмينا в каждой пробе.

RU

8000-0000
2008-08

Beckman Coulter

Референсные значения⁴

Возрасте 200–800 мкг/л (20–80 мкг/дл)

Оценочные значения могут изменяться в зависимости от возраста, пола, типа пробы, длины и географического местоположения. В соответствии с общепринятой лабораторной практикой нашей лаборатории следует определять собственные референсные значения. При получении данных результатов всегда следует рассматривать данные с данными историч. данных пациента и другими лабораторными исследованиями.

Свойства тестов: аналитическая прецизионность

Данные, приведенные в этом параграфе, получены при измерении на анализатор Beckman Coulter серии AL. Характеристики проведения теста в нашей лаборатории могут отличаться от приведенных ниже.

Линейность

Диапазон линейности соответствует значениям концентрации 60–2000 мкг/л (6–200 мкг/дл)

Воспроизводимость

Следующие результаты получены при измерении на AL640, 3-х повторных пипет в течение 20-ти дней

n = 80	Внутри серии		Между сериями	
	Среднее значение, мкг/л	Станд. откл. (SD)	Коеф. вариабельности (CV %)	Среднее значение, мкг/л
720.30	1.10	0.94	2.80	2.44
634.14	11.80	1.37	22.1%	2.35
3810.60	17.14	0.94	84.80	4.68

Чувствительность

Нижний предел чувствительности, установленный на анализаторе AL640, составляет 4 мкг/л.

Эти значения определяются на наименьшем измеримом значении циркулирующего, отличном от нуля. Нижний предел чувствительности рассчитывается как абсолютное среднее значение плюс три стандартных отклонения при 20-ти кратном измерении аналита в пробе без исследуемого вещества.

Корреляция

При сравнении данных набора результатов для определения циркулирующего CCRP184 на анализаторе AL640 с данными измерением доступным набором реагентов для определения циркулирующего топамоксина сыворотки пациентов. Результаты линейного регрессионного анализа по Делонгу следующие:

y = 1.020x - 3.6	r = 0.990	n = 50	Диапазон значений в пробе: 60–630 мкг/л
------------------	-----------	--------	---

Влияющие факторы

В исследовании, проводившемся с целью оценки чувствительности метода к некоторым влияющим факторам, получены следующие результаты:

Интерференция:	Влияние менее 3% при уровне концентрации до 40 мкг/л или до 684 ммоль/л
Гематокрит:	Влияние менее 3% при уровне гематокрита до 6 л/л
Липиды:	Влияние менее 3% при уровне липидов (холестерин) до 1800 мкг/л

Подробная информация по влияющим факторам можно найти в справочнике Young.⁵

Ограничения

Пробы пациентов с выраженным метаболизмом топамоксина, выявленным при наличии или отсутствии заболеваний печени могут давать менее отрицательные результаты циркулирующего. В таких пробах значения концентрации очень высокие (>10 мкг/л) и повышают значения концентрации. Перед интерпретацией следует рассмотреть, и в части пробы добавив 4 части диметилсульфоксида воды, и результат следует умножить на 5.

Ссылки на референсные листы

- 4. Ограничения пользователя и значения, установленные в анализаторе по умолчанию.
- 5. Young B. et al. Clinical guide to laboratory tests. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1998:1209.
- 6. Значения установлены для единиц СИ (мкг/л). Для работы с единицами мкг/дл, значения следует разделить на 10.

Библиография

1. Johnson AM, Rife EM, Shewen LM, Pridgen Jr. Burke GA, Richmond ER, eds. Textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1998:490-492.
2. Kohnenova SC, Sanderphair Jr, Kustin LA, Ponce AJ, eds. Clinical chemistry: theory, analysis, correlation. St Louis: Mosby, 1999: 999p.
3. Tietz NW, ed. Clinical guide to laboratory tests. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1998:1209.
4. Baudrier B, Del F. Standardization of the measurement of 14 proteins in human serum based on the new IFCC/BCRCAP international reference material CRM 470. J Lab Med 1998;20:148-152.
5. Young BS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, AACB, 8th ed AACB Press, 2000

CE



1986-1987

[illegible]

Spiega il ruolo del sistema di controllo di qualità nel garantire la qualità dei prodotti e dei servizi offerti dall'azienda.

Содержание

Экспертное и редакционное советы
Тема выпуска № 1

Коротко о главном: обзор литературы

Экспертное и редакционное советы

СМЕРЬ РАССЛЕДОВАНИИ
 Расследованием извещения в Америке занялся журналист Роберт Гейл. Он опубликовал статью "Смерть безвозвратна".
 В.Б. Бейтс немедленно написал статью "Роберт Гейл не был исследователем, исследовать не имеет смысла". Ученые гордо заявили: мы не проводили расследования Роберта Гейла, только исследовали доказательства информации. В результате информации, опубликованной в "Пантеоне Библиотечки".

Chirurgische Abteilung des Städtischen Krankenhauses in Berlin

1-800-368-6868

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
50 EAST LEXINGTON AVENUE
NEW YORK, N.Y. 10017-2473
Tel: (212) 850-6000
Fax: (212) 850-6000
E-mail: orderdept@chicagopress.edu
Web: <http://www.chicagopress.edu>

DISCOUNTS AVAILABLE
On Professional Printed Cards at Selected Printing Companies All over the World

[illegible][illegible]

卷之四
 卷之五
 卷之六
 卷之七
 卷之八
 卷之九
 卷之十
 卷之十一
 卷之十二
 卷之十三
 卷之十四
 卷之十五
 卷之十六
 卷之十七
 卷之十八
 卷之十九
 卷之二十
 卷之二十一
 卷之二十二
 卷之二十三
 卷之二十四
 卷之二十五
 卷之二十六
 卷之二十七
 卷之二十八
 卷之二十九
 卷之三十
 卷之三十一
 卷之三十二
 卷之三十三
 卷之三十四
 卷之三十五
 卷之三十六
 卷之三十七
 卷之三十八
 卷之三十九
 卷之四十
 卷之四十一
 卷之四十二
 卷之四十三
 卷之四十四
 卷之四十五
 卷之四十六
 卷之四十七
 卷之四十八
 卷之四十九
 卷之五十
 卷之五十一
 卷之五十二
 卷之五十三
 卷之五十四
 卷之五十五
 卷之五十六
 卷之五十七
 卷之五十八
 卷之五十九
 卷之六十
 卷之六十一
 卷之六十二
 卷之六十三
 卷之六十四
 卷之六十五
 卷之六十六
 卷之六十七
 卷之六十八
 卷之六十九
 卷之七十
 卷之七十一
 卷之七十二
 卷之七十三
 卷之七十四
 卷之七十五
 卷之七十六
 卷之七十七
 卷之七十八
 卷之七十九
 卷之八十
 卷之八十一
 卷之八十二
 卷之八十三
 卷之八十四
 卷之八十五
 卷之八十六
 卷之八十七
 卷之八十八
 卷之八十九
 卷之九十
 卷之九十一
 卷之九十二
 卷之九十三
 卷之九十四
 卷之九十五
 卷之九十六
 卷之九十七
 卷之九十八
 卷之九十九
 卷之一百

1

[illegible]

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354

Professional Services
Contract **Amount** **Period**

1. **Содержание:** 1. Введение. 2. Описание объекта исследования. 3. Методика исследования. 4. Результаты исследования. 5. Заключение.

CALL FOR THE 1998 NATIONAL YOUTH CONFERENCE
 Young Americans for Freedom is pleased to announce the 1998 National Youth Conference. The conference will be held at the Marriott Hotel in Washington, D.C. on September 11-12, 1998. The conference will feature a variety of speakers, including political leaders, scholars, and activists. Registration is free, and space is limited. For more information, please contact the National Youth Conference at 1-800-458-7273.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Bezugsverhältnisse: Die Preise sind auf Basis des durchschnittlichen Marktpreises für ein Kilogramm des jeweiligen Rohmaterials zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe zu verstehen. Die Preise sind netto, ohne Umsatzsteuer, und gelten für eine Menge von 100 Kilogramm des jeweiligen Rohmaterials.

[illegible]

Исследования:
Результаты исследования опубликованы в журнале *AIER* (апрель 1971 г.)
Поэтому очевидно, что администрация не имеет возможности проводить исследования, которые не могут финансировать. Администрация не имеет возможности проводить исследования, которые не могут финансировать. Администрация не имеет возможности проводить исследования, которые не могут финансировать.

Важно знать:
При заказе товара необходимо указать номер заказа 9-1 или номер заказа 9-2/1/2 от интернет-магазина, а также номер заказа (если известен) для получения скидки 6-1 (при заказе от 1000 руб.). Скидка не применяется к товарам, входящим в комплект поставки.

100-443887-100

Advertisement Charge: \$100 per line per week. Minimum 4 lines. 13 weeks. Payment in advance. **Deadlines:** 10 days before publication. **Reprints:** 500 for \$100. **Photo:** 3x5, black and white, no caption. **Style:** AP. **Language:** English. **Units:** U.S. dollars. **Country:** U.S.A. **City:** New York. **State:** New York. **Zip:** 10017. **Phone:** (212) 512-2000. **Fax:** (212) 512-2001. **E-mail:** ny@nytimes.com. **Web:** www.nytimes.com. **Keywords:** New York Times. **Publication:** New York Times. **Frequency:** Daily. **Issue:** 1. **Number of Issues:** 365. **Yearly Subscription Price:** \$100. **Yearly Circulation:** 1,000,000. **Yearly Distribution:** 1,000,000. **Yearly Revenue:** \$100,000,000. **Yearly Profit:** \$10,000,000. **Yearly Assets:** \$10,000,000. **Yearly Liabilities:** \$10,000,000. **Yearly Equity:** \$10,000,000. **Yearly Debt:** \$10,000,000. **Yearly Cash Flow:** \$10,000,000. **Yearly Operating Income:** \$10,000,000. **Yearly Operating Expenses:** \$10,000,000. **Yearly Capital Expenditures:** \$10,000,000. **Yearly R&D:** \$10,000,000. **Yearly Marketing:** \$10,000,000. **Yearly Selling:** \$10,000,000. **Yearly General:** \$10,000,000. **Yearly Other:** \$10,000,000. **Yearly Total:** \$10,000,000. **Yearly Net Income:** \$10,000,000. **Yearly Net Loss:** \$10,000,000. **Yearly Net Profit:** \$10,000,000. **Yearly Net Revenue:** \$10,000,000. **Yearly Net Expenses:** \$10,000,000. **Yearly Net Assets:** \$10,000,000. **Yearly Net Liabilities:** \$10,000,000. **Yearly Net Equity:** \$10,000,000. **Yearly Net Debt:** \$10,000,000. **Yearly Net Cash Flow:** \$10,000,000. **Yearly Net Operating Income:** \$10,000,000. **Yearly Net Operating Expenses:** \$10,000,000. **Yearly Net Capital Expenditures:** \$10,000,000. **Yearly Net R&D:** \$10,000,000. **Yearly Net Marketing:** \$10,000,000. **Yearly Net Selling:** \$10,000,000. **Yearly Net General:** \$10,000,000. **Yearly Net Other:** \$10,000,000. **Yearly Net Total:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Income:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Loss:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Profit:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Revenue:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Expenses:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Assets:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Liabilities:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Equity:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Debt:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Cash Flow:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Operating Income:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Operating Expenses:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Capital Expenditures:** \$10,000,000. **Yearly Net Net R&D:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Marketing:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Selling:** \$10,000,000. **Yearly Net Net General:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Other:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Total:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Income:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Loss:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Profit:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Revenue:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Expenses:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Assets:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Liabilities:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Equity:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Debt:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Cash Flow:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Operating Income:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Operating Expenses:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Capital Expenditures:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net R&D:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Marketing:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Selling:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net General:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Other:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Total:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Income:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Loss:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Profit:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Revenue:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Expenses:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Assets:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Liabilities:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Equity:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Debt:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Cash Flow:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Operating Income:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Operating Expenses:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Capital Expenditures:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net R&D:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Marketing:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Selling:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net General:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Other:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Total:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Income:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Loss:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Profit:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Revenue:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Expenses:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Assets:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Liabilities:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Equity:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Debt:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Cash Flow:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Operating Income:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Operating Expenses:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Capital Expenditures:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net R&D:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Marketing:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Selling:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net General:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Other:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Total:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Income:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Loss:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Profit:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Revenue:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Expenses:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Assets:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Liabilities:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Equity:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Debt:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Cash Flow:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Operating Income:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Operating Expenses:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Capital Expenditures:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net R&D:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Marketing:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Selling:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net General:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Other:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Total:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Net Income:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Net Loss:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Net Profit:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Net Revenue:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Net Expenses:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Net Assets:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Net Liabilities:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Net Equity:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Net Debt:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Net Cash Flow:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Net Operating Income:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Net Operating Expenses:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Net Capital Expenditures:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Net R&D:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Net Marketing:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Net Selling:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Net General:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Net Other:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Net Total:** \$10,000,000. **Yearly Net Net Net Net Net Net Net Net Income:</**

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

lympho-vascular invasion, and histological extent (nodal status, lymphatic and venous invasion, and histological extent) including stage, tumor size, and histological extent (nodal status, lymphatic and venous invasion, and histological extent).

[illegible][illegible]

33

Figure 1



OSR0159

C3

4 x 10 мл
4 x 8 млR1
R2**Назначение**

Качественное определение C3 компонента комплемента иммунофлуориметрическим методом в сыворотке и плазме человека на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики и/или

Клиническое значение

Система комплемента состоит из 20 белков плазмы и рецепторов клеточных мембран, играющих важную роль в врожденном/приобретенном процессе, обеспечивающего путем опсонизации, лизиса/линой чужеродных клеток, уменьшения сосудистой проницаемости и заживления ран. Активация или потребления компонента происходит при ряде заболеваний, в основном сопровождающихся формированием иммунных комплексов, например, СКВ, синдромах припадков и некоторых формах васкулитов, однако эти процессы могут частично компенсироваться системами более острой фазы. C3 является компонентом составляет 30% общей концентрации компонентов комплемента в сыворотке и потребляется при активации системы комплемента, как по классическому, так и по альтернативному пути. Уровень C3 компонента комплемента снижается только при активации комплемента по классическому пути, поэтому, если имеет место гипонатриемия/гипонатриемия, измерение уровня компонентов (C3 и C4) помогает определить тип активации: классический или альтернативный.

Принцип определения

При добавлении пробы к буферу R1 в реактор анализатора R2, человеческий C3 компонент комплемента опсонизирован реагентом с антигеном красной-человека C3 компонента комплемента, с образованным нерастворимым комплектом. Абсорбированный светом пропорциональный концентрации C3 компонента комплемента в пробе.

Состав

Комплекция в реакционной смеси:

Тиро-буфер (pH 7.2)

80 мкг/мл

Полупроводниковый 5000

1,0% желтый

Калибры к фактору C3

Варианты

Консервант

Общие предостережения

Соблюдайте все меры предосторожности, принятые при работе с лабораторными реагентами.

Во избежание возможного отклонения результатов измерений после замены периферического реактива (реагента) используйте трубки новой партии.

Учитывайте обработанные расходные материалы и соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля. Период безопасности может быть продлен после использования на анализ.

Подготовка реагента

Реагенты готовы к использованию и непосредственно могут быть установлены в анализатор.

Упаковка и стабильность

Несколько реактивов стабильны 30 дней, упаковкой на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реактивы стабильны 30 дней при хранении в анализаторе.

Несоблюдение инструкций

Срок годности реагента (30 А или 40000).

В сыворотке и плазме C3 стабильно в течение 8 дней при температуре хранения 2-8°C и в течение 4 дней - при 16-25°C.

В случаях проблем рекомендуется обратиться к следующему:

Подготовка анализа

См. Руководство пользователя Guide и дополнительные инструкции для конкретной тест-пробы. Подтвержденные программы могут быть использованы для проб с микротитрами образцов сыворотки или плазмы.

Калибровка

Мультикалибратор фирмы Бекман (Beckman Protein Multi-Calibrator), код № ODR0021, MC Cal A, код № ODR0037 для Multiwatch могут использоваться только на анализаторе, оборудованном 32-битным. Дополнительные инструкции приведены в Руководстве по эксплуатации. Выявление калибратора для C3 компонента комплемента производится по стандарту ERM® CM-170 для C3.

Калибраторы должны храниться при следующих условиях:

Следить за сроком годности реактивов или осуществлять контроль качества анализа.

Проведение профилактического обслуживания анализатора или замена внешнего юнита прибора.

Новую калибровку необходимо регулярно проверять. Сразу же после калибровки следует провести контроль качества.

Контроль качества

Можно использовать контрольные сыворотки: IFA Control Serum (код № CDC0014, CDC0015 и CDC0018) или другие контрольные материалы

со значениями, установленными для данной модели анализатора Beckman Coulter. Качественный контроль качества проведения контроля качества сыворотки, сыворотки, который калибровочный материал выдает на измерение, является частью с проблемой измерения и может применяться калибровка.

Получение в аналитической лаборатории результаты могут отличаться от лабораторного значения. Поэтому лаборатория рекомендуется для первого анализа устанавливать свои средние значения и отклонения специфического контроля, на основании неоформленного измерения по установленным правилам. Эти средние значения не должны выходить за пределы соответствующего принятого интервала, присвоенного в соответствующем стандарте.

При обнаружении любых отклонений в измерениях значений контроля качества или аналитических отклонений его значений, проверьте все аналитические этапы измерения. Каждый лаборатория должна разработать план действий на тот случай, если результаты измерения контроля качества выходят за установленные пределы.

Результат

Анализатор Beckman Coulter серии AU автоматически рассчитывает концентрацию С3 в каждой пробе

Референсные значения^{1,5}

Взрослые и дети 0,9-1,8 г/л (90-180 мг/дл)

Специфичные значения могут изменяться в зависимости от возраста, пола, типа пробы, диеты и географического местоположения. В соответствии с общепринятой лабораторной практикой каждой лабораторией следует определять собственные референсные значения. При постановке диагноза результаты assays следует рассматривать вместе с данными истории болезни и другими диагностическими исследованиями.

Специфичность и интерференция в исследовании теста

Данные, приведенные в этом параграфе, получены при измерениях на анализатора Beckman Coulter серии AU. Характеристики проведения теста в вашей лаборатории могут отличаться от приведенных ниже.

Линейность

Диапазон линейности соответствует концентрациям 0,15 – 8,80 г/л (15 – 880 мг/дл)

Воспроизводительность

Спектральные результаты получены при измерениях на AU600 3-х стандартных проб с помощью 10-ти дней

n = 80		Внутренний контроль		Сыворотка	
Среднее значение, г/л	Станд. откл. (SD)	Среднее значение, г/л	Станд. откл. (SD)	Среднее значение, г/л	Станд. откл. (SD)
0,95	0,01	1,24	0,01	1,39	0,01
1,30	0,01	0,84	0,02	1,13	0,01
4,75	0,03	0,84	0,02	1,01	0,01

Чувствительность

Нижний предел чувствительности, установленный на анализаторе AU600, составляет 0,011 г/л

Эти значения определяются на основании измеренных значений С3, отклоняясь от нуля. Нижний предел чувствительности рассчитывается на абсолютное среднее значение плюс три стандартных отклонения при 20-ти параллельных измерениях в пробе без исследуемого вещества.

Корреляция

Исследования показали корреляцию при сравнении данного диагностического прибора с другими для определения С3. Оценки на анализаторе AU600 с другими коммерческими доступными приборами приведены для определения С3. Результаты линейности референсного метода приведены ниже.

$y = 0,999x - 0,178$ $r = 0,998$ $n = 80$ Диапазон значений в пробе: 0,01-2,24 г/л

Влияющие факторы

В исследовании, проводившемся с целью оценки чувствительности метода к некоторым внешним факторам, получены следующие результаты:

Интерференция: Влияние менее 3% при диапазоне концентрации до 40 мг/дл или до 664 мг/дл
Гемоглобин: Влияние менее 5% при диапазоне гемоглобина до 6 г/л
Липиды: Влияние менее 10% при диапазоне липидов (триглицеридов) до 500 мг/дл

Полученные информации по влияющим факторам можно найти в спецификации Young⁶

Обсуждение

В пробах с патологическим иммунным ответом, особенно очень высоким, могут быть получены аномальные результаты

Ссылки на программные файлы

5. Описывается пользовательский файл ■ Значения, установленные в анализаторе по умолчанию

1. Becton Dickinson Instrumentation, Inc. 1980-1981

2. MC Cal A, Inc. 1980-1981

3. Значения установлены для единиц СИ (г/л). При работе с другими единицами измерения следует указать на 100

Библиография

1. Isselbacher KJ, Schurman H, Ashworth J. The clinical use of serum complement in the diagnosis of rheumatoid disease. Ann Clin Biochem 1980;29:558-576
2. Thomas L. The complement system. In: Thomas L, ed. Clinical laboratory diagnosis: Use and assessment of clinical laboratory tests. Philadelphia: WB Saunders Company, 1988:763-804
3. Elzer M, Hoff W, Schwert Y, Thümler H, Ziemer H, Ziemer H, et al. Use of autoanalyzers in diagnosis: laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. WHO LABOR 1 Rev.2/27
4. Baugher S, Dell P. Standardization of the measurement of 14 proteins in human serum based on the new FCCB/CCAP international reference material CRM 470. J Lab Med 1989;29:145-152
5. Palmer PC, Cope JY, Smith A. Reference information for the clinical laboratory. In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. Textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1998:1807p
6. Young DG. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. AACB, 9th ed. AACB Press, 2000

23



**BECKMAN
COULTER.**

В2-МИКРОГЛОБУЛИН В2-MICROGLOBULIN

OSR9191

4 x 10 мл
4 x 8 мл

R1
R2

Назначение

Колличественное определение В2-микроглобулина в сыворотке и плазме человека иммунофлюориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики и титра.

Клиническое значение^{1,2}

В2-микроглобулин является белком с молекулярным весом (11,8 кДа), содержащимся в клеточной мембране всех эукариотических клеток, включая лейкоциты. Белок является легкой или В-цепью антигена лейкоцитов человека (HLA) I класса и состоит из одной полипептидной цепи с двумя дисульфидными мостиками. Уменьшение уровня В2-микроглобулина в сыворотке или его повышенное содержание в моче свидетельствует об изменении скорости почечной фильтрации или иммунологической активности. Так как лабораторная система включает основные методы анализа В2-микроглобулина, увеличение скорости пролиферации периферических клеток сопровождается ростом концентрации этого белка в сыворотке, например, при воспалительных процессах, лимфоме Ходжкина, эритромином, гемофилией, лейкозом и других злокачественных лимфомах. Выработка В2-микроглобулина увеличивается также при всех заболеваниях, сопровождающихся активацией иммунной системы, например, при некоторых аутоиммунных заболеваниях, бактериальных и вирусных инфекциях (ВИЧ, цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барра, инфекционной мононуклеозе и оттохении трансплантата). У здоровых людей В2-микроглобулин синтезируется с относительно постоянной скоростью и поступает в кровоток во время процесса обычной регенерации клеток, он способен особенно фильтроваться в почечных клубочках и реабсорбироваться в канальцах. Снижение скорости клубочковой фильтрации сопровождается увеличением периода полувыведения В2-микроглобулина и соответственно увеличивает его концентрацию в сыворотке. Эскалация В2-микроглобулина увеличивается при повреждении клубочкового аппарата, например, при бактериальном интерстициальном нефрите и некротическом, вызванном сахаром. Определение значений В2-микроглобулина часто используется для проверки функции канальцев, особенно у пациентов с почечной недостаточностью, у которых отторжение аллотрансплантата проявляется в виде увеличения содержания В2-микроглобулина в сыворотке в результате субоптимальной.

Принцип определения

При добавлении пробы в буферы R1 и R2, содержащую латексные частицы, человеческий В2-микроглобулин специфически связывается с антигенами против человеческого В2-микроглобулина, порождающими латексные частицы, с образующимися перекрестными связями. Агломерация реакционной смеси пропорциональна концентрации В2-микроглобулина в пробе.

Состав

Концентрация реакционной смеси:
Фосфорный буфер (pH 6,5)

22 микротитров
Вариант

Латексные частицы, покрытые антигенами к человеческому В2-микроглобулину
Консервант

Общие предостережения

Соблюдайте все меры предосторожности, принятые при работе с лабораторными реагентами.

Во избежание возможного отклонения выводов, содержащих соединения после сильной разбавленной разбавлять промывайте канализационные трубы водой.

Утилизируйте все отходы в соответствии с местными нормами.

Докладные данные

Реагент R1 готов к использованию и непосредственно может быть использован в анализатор. Реагент R2 перед установкой в анализатор необходимо перемешать, перемешивая флакон 5-10 раз. Эту процедуру повторите немедленно.

Хранение и стабильность

Несколько недель стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реагенты стабильны 90 дней при условии их хранения в анализаторе.

Материальный контроль

Сыворотка и плазма (СЭТА, плазма).

В сыворотке и плазме В2-микроглобулин стабилен в течение 3 дней при температуре хранения 2-26°C.³

В случаях проб исследования проводить не следует.

Процедура анализа

См. Руководство Reagent Guide и соответствующую инструкцию для конкретного типа пробы.

Настройка

Мультикалibrator № 2 Белков сыворотки (Human Protein Multi-Calibrator 2) (арт. № CDR3023)

Значения калибратора для В2-микроглобулина приравниваются до значений 1 стандартного стандарта BCS 1000.

Калибровку следует проводить при следующих условиях:

Смесь первого и второго разбавлений сыворотки или стандартное количество значений контроля.

Проверка профитируемости обслуживания анализатора или замены лампы или лампы.

Использование калибратора для проверки результатов – поставщиком выбрать в меню Results (Результаты) – Calibration Monitor (Проверка калибровки) – Calibration Curve (Калибровочная кривая). Сразу же после калибровки следует провести контроль качества.

Контроль качества

Можно использовать контрольные сыворотки ITA Control Serum (арт. № CDR0014, CDR0015 и CDR0016) или другие контрольные материалы со значениями, установленными для данной системы анализатора Beckman Coulter.

Каждая лаборатория должна проводить контроль качества сывороточного, плазмы, который лабораторной практикой считается как стандартное измерение качества в проблемных ситуациях и после проведения калибровки.

Вс

КМБ-4
BIM 45

Дата: 1998

Полученные в внешней лаборатории результаты могут отличаться от лабораторного значения. Поэтому лаборатории рекомендуют для анализа использовать свои средние значения и собственные специфические критерии, на основании предоставленного информации по установленным границам. Эти средние значения не должны выходить за пределы соответствующего диапазона концентрации, приведенных в соответствующем приложении.

При обнаружении любого отклонения в измеренных значениях контроля качества или выявлении отклонения его значений, проверьте все измеренные аномальные измерения. Каждой лаборатории следует разрабатывать свои действия на тот случай, если результаты измерения контроля качества выйдут за установленные пределы.

Результат

Анализатор Beckman Coulter серии AU автоматически рассчитывает концентрацию β 2-микроглобулина в каждой пробе.

Рекомендуемые значения¹

Сыворотка, плазма (≤ 60 лет) 0,8–2,4 мг/л (0,8–2,4 мг/дл)
(> 60 лет) $\pm 3,0$ мг/л ($\pm 0,3$ мг/дл)

Определяемые значения могут изменяться в зависимости от возраста, пола, типа пробы, диеты и географического местоположения. В соответствии с общепринятой лабораторной практикой каждой лаборатории следует определить собственные референсные значения. При получении данных результаты всегда следует рассматривать вместе с данными истории болезни и другими диагностическими тестами.

Специфические интерактивные программные тесты

Данные, приведенные в этом параграфе, получены при контроле на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Характеристики проведенных тестов в вашей лаборатории могут отличаться от приведенных ниже.

Пятиклассы

Диагностическая концентрация соответствует значению концентрации β 2-микроглобулина 0,5–10,0 мг/л (0,05–1,0 мг/дл).

Точность

Специальные результаты получены при измерении на AU600 3-х сывороточных проб в течение 30-ти дней.

П-проб	Внутренняя оценка		Ссылка	
	Среднее значение, мг/л	Станд. откл. (SD)	Среднее значение (CV %)	Станд. откл. (SD)
0,63	0,62	0,01	2,48	2,36
6,37	6,07	1,00	0,12	1,08
6,92	6,10	1,02	0,16	1,04

Чувствительность

Нижний предел чувствительности, установленный на анализаторе AU600, составляет 0,004 мг/л.

Это значение определяется на наименьшие измеренные значения β 2-микроглобулина, отличные от нуля. Нижний предел чувствительности рассчитывается на абсолютные средние значения либо три стандартных отклонения при 20-ти повторных измерениях аналита в пробе без постороннего вещества.

Контроль качества

Использование специальных индикаторов при сравнении данных диагностического набора реагентов для определения β 2-микроглобулина (SERP615) на анализаторе AU600 с другим коммерчески доступным набором реагентов для его определения. Результаты линейного регрессионного анализа следующие:

$Log(Y) = 0,99999X - 0,072$ $r = 0,990$ $n = 52$ Диапазон значений в пробе: 11,0–88,8 мг/л

Влияющие факторы

В исследованиях, проводимых с целью оценки чувствительности метода к некоторым влияющим факторам, получены следующие результаты:

Интерференция: Влияние менее 0% при значениях концентрации до 40 мкг/л или до 0,94 мг/дл

Гематокрит: Влияние менее 2% при значениях гематокрита до 5 г/л

Липемия: Влияние менее 10% при значениях липидов (триглицериды²) до 100 мг/дл

Полную информацию по влияющим факторам можно найти в приложении Young⁴

Отмечено

В пробах пациентов с гиперпротеинемией могут наблюдаться непропорционально высокие результаты. В них следует контролировать интерференцию, прежде чем начать работу.

Высокие концентрации реактивных факторов могут быть причиной ложноположительных результатов. Поэтому будьте особенно внимательны при интерпретации результатов таких пациентов.

Для проб с патологическими отклонениями характеристиками, особенно очень мутными, могут быть получены отклоненные результаты.

Для проб с очень высокой концентрацией β 2-микроглобулина (> 2000 мкг/л) могут быть получены менее точные результаты без полного факта «L», что обусловлено избытком аналита в пробе.

Источники в программных файлах

¹ Определенные параметры = факторы, установленные в анализаторе по умолчанию.

² Serum Protein Multi-Calibrator 2, cat. MODR303

³ Значения указаны для калибрации. Для перевода в мкг/л, значения следует разделить на 10

Библиография

- Thames L. β 2-microglobulin (B-2). In: Thames L. ed. Clinical laboratory diagnosis: Use and assessment of clinical laboratory results. Philadelphia: The Science Publishing Co., 1990:666-684.
- Olson HG, Shihman LM, Dahlstrom RT. Anticoagulant proteins in Tolu MW. ed. Fundamentals of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1987:356p.
- Shen W, Han W, Bohm Y, Tiller D, Weiss H, Zinke B. et al. Use of colorimetric in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. WHO/CC/AB/90 1 Rev 2:35p.
- Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests. 9th ed. AABB Press, 2000

CE



**BECKMAN
COULTER.**

Аполикоциты В (Апо В)

QCR6143

4 x 13 МП
4 x 7 МП

**R1
R2**

Назначение

Качественное определение аполикоцитов В (Апо В) в сыворотке человека иммунофлуоресценционным методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro.

Компоненты системы

В системе анализа латекс транспортируется в составе эмульсии, называемой латекс-пробой. По плотности латекс-пробы делится на пять классов: микропроба, микропроба очень низкой плотности (ПКОЧНП), микропроба промежуточной плотности (ПКОПНП), микропроба высокой плотности (ПКОВПНП) и микропроба высокой плотности (ПКОВПНП). В течение последних нескольких десятилетий основное внимание уделялось микропробам высокой плотности в сыворотке и увеличению уровня микропроб высокой плотности связывают с высоким уровнем холестерина в крови.

Опасаясь, что чужеродная белковая эмульсия, состоящая из эмульсии латекса и эмульсии буфера, может быть А до Е. Основными микропробами латекса являются А, микропроба, которая составляет около 90% общей массы этих компонентов. Апо А1 отвечает за более высокий холестерин в крови, и поэтому снижается уровень Апо А1 наблюдается у пациентов с митохондриальной болезнью сердца. Определение Апо А1 часто используется при обследовании пациентов с наследственными заболеваниями, которые приводят к низкой концентрации холестерина ЛПНП. Апо В отличается от других компонентов в крови и наиболее часто встречается в форме Апо В – Апо В₂ присутствует во всех эмульсиях, производимых ПКОЧНП, ПКОПНП и ПКОВПНП. Повышение уровня Апо В₂ связывают с повышенным риском коронарной болезни сердца.

Принцип определения

При добавлении пробы в буфер R1 и раствору анализатора R2, Апо В опадает в раствор с антигенами пробы, что вызывает реакцию. Апо В, с образующим нерастворимым комплексом. Абсорбция реакционной смеси пропорциональна концентрации Апо В в пробе.

Система

Концентрация в реакционной смеси	8,6 мкмоль/л
Титр-буфер pH 7,4	12,6 мкмоль/л
Хромоген натрия	4% вес. доз.
Плотность смеси 6000	4% вес. доз.
Время инкубации в анализаторе В	+ 1,80 (с)
Колориметр	

Особенности использования

Обладая всеми свойствами, принятыми при работе с лабораторными реактивами. Во избежание возможного отравления необходимо соблюдать правила безопасности при работе с реактивами, содержащими токсичные вещества. Уточните требования к использованию реактивов в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Подготовка реактива

Реактивы готовы к использованию и могут быть непосредственно установлены в анализатор.

Хранение и стабильность

Несколько разбавлений стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реактивы стабильны 90 дней при хранении в холодильнике.

Использование материала

Сыворотка: Апо В стабилен в течение 5 лет при температуре хранения 2-8 °C и в течение 1-го дня – при 15-26 °C. Не следует проводить повторные анализы.

Порядок работы

См. Руководство по работе с анализатором Beckman Coulter для получения информации о работе.

Калибровка

Для калибровки по 5 точкам – Апо А1 & В Сыворотка, Кат. № QCR3005.

Для калибровки по 5 точкам – Апо А1 & В Сыворотка, Кат. № QCR3002.

Значения калибровки для Апо А1 пропорциональны для мультипараметрического референсного материала DCB SP1-01.

Калибровку следует проводить при следующей установке:

Смесь сыворотки – смесь референсного или стандартного калибровочного материала.

Проверка пропорциональности калибровки анализатора или замены калибровочного материала.

Проверка пропорциональности калибровки анализатора или замены калибровочного материала.

После калибровки необходимо проверить – автоматически выбрать в меню Проба (Образец исследования) – Сыворотка.

Можно использовать калибровку – Калибровка была (Калибровка не была). После калибровки следует проверить контроль качества.

Контроль качества

Можно использовать калибровочные материалы (QCR0003 и QCR0004) или другие контрольные материалы со значениями, установленными для данной модели анализатора Beckman Coulter серии AU.

Каждый лаборатория проводит чистоту производственной линии контроля качества самостоятельно. Однако, хорошая лаборатория должна считаться за выделение из образца вместе с пробой пациента и после проведения калибровки.

Полученные в отдельной лаборатории результаты могут отличаться от лабораторных значений. Поэтому лаборатория рекомендуется для каждого анализа использовать один и тот же калибровочный материал и использовать калибровочный материал по установленным правилам. Эти калибровочные материалы должны использоваться на принципах соответствующего принципа калибровки, применяемого в соответствующем направлении.

или

или

или

При обнаружении любого из перечисленных в таблице отклонений значений контроля качества или значений отклонений его значений, проверьте все аналитические этапы измерения. Каждый лаборатория должен разработать план действий на тот случай, если результаты измерения контроля качества выйдут за установленные пределы.

Расчет

Анализатор Beckman Coulter серии AU автоматически рассчитывает концентрацию аполипротеина В в каждой пробе

Референсные значения*

Мужчины 0,60–1,40 г/л (80–140 мг/дл)
Женщины 0,55–1,30 г/л (55–130 мг/дл)

Следующие значения могут изменяться в зависимости от возраста, пола, типа пробы, диеты и географического местоположения. В соответствии с общепринятой лабораторной практикой каждая лаборатория должна определить собственные референсные значения. При установлении референсных значений следует рассмотреть также данные истории болезни и другие диагностические исследования.

Специфические характеристики проведения теста

Данные, приведенные в этом параграфе, получены при измерении на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Данные, полученные в другой лаборатории, могут отличаться от приведенных ниже.

Линейность

Диапазон линейности соответствует значениям концентрации 0,40–2,00 г/л (40–200 мг/дл).

Точность

Следующие результаты получены при измерении на AU600 3-х повторных серий в течение 10-ти дней.

Целевое значение, г/л	Выходные данные			Среднее	
	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	
0,61	0,01	1,16	0,01	1,02	
1,49	0,01	0,69	0,02	1,37	
1,98	0,01	0,71	0,03	1,34	

Чувствительность

Нижний предел чувствительности, установленный на анализаторе AU600, составляет 0,007 г/л.

Это значение определяется как минимальное измеренное значение Апо В, отличное от нуля. Нижний предел чувствительности рассчитывается как абсолютное среднее значение трех отрицательных измерений при 20-ти кратном измерении в пробе без исследуемого вещества.

Корреляция

При сравнении данных референсного набора реагентов для определения Апо В C609143 на анализаторе AU600 с другим общепринятым доступным набором реагентов для определения Апо В используется следующий набор реагентов. Результаты линейного регрессионного анализа следующие:

$y = 0,957x - 0,01$	$r = 0,992$	$n = 60$	Диапазон значений в пробе 0,45–1,98 г/л
---------------------	-------------	----------	--

Влияющие факторы

В исследованиях, проводившихся с целью оценки чувствительности метода к некоторым внешним факторам, получены следующие результаты:

Истеричность: Влияние менее 3% при значении ниже 0,40 г/л и менее 4 мг/дл
Гемолит: Влияние менее 6% при значении ниже 0,40 г/л и менее 4 мг/дл
Липемия: Влияние менее 10% при значении ниже 0,40 г/л и менее 4 мг/дл
Перекрестная интерференция: Влияние менее 1% при значении ниже 0,40 г/л и менее 4 мг/дл

Ограничения

В пробах с патологическими отклонениями характеристик, особенно очень мутных, могут быть получены атипичные результаты.

Список использованных источников

1. Определяется автоматически = Значение, установленное в анализаторе по умолчанию
2. Для калибровки по 3 точкам - Apo A1 & B Calibrator, CDR3005.
3. Для калибровки по 6 точкам - Apo A1 & B Calibrator, CDR3072, и заданное тип калибровки «13 - 5AB».
4. Для калибровки по 6 точкам используйте Apo A1 & B Calibrator, CDR3072, и тип калибровки «5AB».
5. Значение установлено для единицы СИ (г/л) для работы с единицами единиц значения следует умножить на 100

Библиография

1. Stein CA, Libby P, Libby P, and Apolipoproteins. In: Tietz NM, ed. Fundamentals of clinical chemistry. Philadelphia WB Saunders Company, 1997:404-420
2. Rifkin WR. Lipid metabolism. In: Thomas L, ed. Clinical laboratory diagnosis: Use and assessment of clinical laboratory results. Philadelphia: WB Saunders Company, 1998:172-173.
3. Rifkin WR, Durrington PH. Measurement and clinical significance of apolipoproteins A-1 and B. In: Rifkin WR, Wernick GR, Cholesterol MH, eds. Handbook of lipidology testing. Washington, AACC Press, 1997:177-188
4. Ehm HW, Hefler W, Schmitt Y, Topfer G, Wäber H, Zavis B, et al. Use of apolipoproteins in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. WHO/DILLAG/98.1 Rev 3.23pp.
5. Young DR. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. AACC, 6th ed. AACC Press, 2000.

CE



**BECKMAN
COULTER.**

Аполипопротеин А1 (АПО А1)

OSR8142

4 x 13 мл

4 x 13 мл

R1

R2

Назначение

Количественное определение аполипопротеина А1 (Апо А1) в сыворотке человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter Synchron AU. Только для диагностики и т.п.

Клиническое значение

1.2.3

В организме человека липиды транспортируются в составе комплексов, называемых липопротеинами. По плотности липопротеины делятся на пять классов: липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), липопротеины промежуточной плотности (ЛПНП), липопротеины низкой плотности (ЛПНП) и липопротеины высокой плотности (ЛПВП). В течение последних десятилетий основное внимание уделяется липопротеинам высокой плотности в сыворотке и увеличению уровня липопротеинов низкой плотности связывают с высоким риском ишемической болезни сердца.

Описывая по крайней мере пять основных липопротеинов, связанных с риском ишемической болезни, и обозначив их буквами от А до Е. Основными аполипопротеинами ЛПНП являются А аполипопротеины, которые составляют около 90% белковой массы этих комплексов. Апо А1 отвечает за выход из печени холестерина из тканей, и поэтому высокие уровни Апо А1 наблюдаются у пациентов с ишемической болезнью сердца. Определение Апо А1 часто используется при обследовании пациентов с наследственными заболеваниями, которые приводят к высокой концентрации холестерина ЛПНП. Апо В относится к другим липопротеинам в печени, и наоборот часто ассоциируется с формами Апо В — Апо В₄₈ присутствует во всех вторичных фракциях ЛПОНП, ЛПНП и ЛПНП. Повышенные уровни Апо В₄₈ связывают с повышенным риском ишемической болезни сердца.

Принцип определения

При обследовании пробы в буфере R1 и раствору антисыворотки R2, Апо А1 специфически реагирует с антителами против человеческого Апо А1, с образованием нерастворимых комплексов. Абсорбция реакционной смеси пропорциональна концентрации Апо А1 в пробе.

Состав

Концентрация в реакционной смеси:	
Три-буфер (pH 7,4)	8 ммоль/л
Хлорид натрия	106 ммоль/л
Пикосиликаты 6000	3,5% w/v, 0,6
Смесь антигена в аполипопротеину А1	= 0,14 мг
Кальций	

Общие рекомендации

Соблюдайте все меры предосторожности, применимые при работе с лабораторными реагентами.

Во избежание возможного загрязнения оборудования соедините флакон с реактивом с помощью стерильной трубки, соединяющей флакон с реактивом с флаконом с образцом.

Утилизируйте отработанные реакционные материалы в соответствии с требованиями санитарно-гигиенического и экологического контроля.

Подготовка реагента

Реактивы готовы к использованию и могут быть непосредственно установлены в анализатор.

Упаковка и стабильность

Несколько реактивов стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реактивы стабильны 60 дней при хранении в анализаторе.

Использованные материалы

Сыворотка: Апо А1 стабильна в течение 6-ми дней при температуре хранения 2-8 °C и в течение 1-го дня - при 16-26 °C.

Порядок анализа

См. Руководство (Verbor) Ocu и соответствующую инструкцию для конкретного типа пробы.

Калибровка

Для калибровки по 3 точкам — Апо А1 & В Саливатор, Кат № OSR3005.

Для калибровки по 5 точкам — Апо А1 & В Саливатор, Кат № OSR3022.

Значения микролитров для Апо А1 соответствуют до микролитрового референсного материала BCS BP-01.

Калибровку следует проводить при следующих условиях:

Смена серийного номера, реактива или существенное изменение значений контроля.

Проведение профилактического обслуживания анализатора или замены реактивного узла прибора.

Применение профилактического обслуживания анализатора или замены реактивного узла прибора.

Новую калибровку необходимо регулярно проверять — последовательно выбрать в меню: Пошаговое (Обычное исследование) > Саливатор Моштор (Мониторинг калибровки) > Саливатор Салив (Калибровочная кривая). Сразу же после калибровки следует провести контроль качества.

Контроль

Можно использовать контрольные сыворотки (СОС0003 и СОС0004) или другие контрольные материалы со значениями, установленными для данной модели анализатора Beckman Coulter серии AU.

Каждая лаборатория определяет частоту проведения контроля качества сывороточных, фермент, гормонов лабораторией, проводящий контроль на анализаторах Beckman Coulter серии AU.

Полученные в отдельной лаборатории результаты могут отличаться от лабораторного значения. Поэтому лаборатория рекомендует для каждой аналитической системы установить свои критерии приемки и отклонения специфического контроля, на основании модифицированного материала на установленные пределы. Эти предельные значения не должны выходить за пределы соответствующих приемных интервалов, предоставляемых и соответствующим сервисом.

При обнаружении каких-либо отклонений в показателях значений контроля качества или значительных отклонений его значений, проверить все аналитические статьи анализа. Каждый лаборатория следует разработать план действий на тот случай, если результаты измерения контроля качества выходят за установленные пределы.

Расчет

Анализаторы Beckman Coulter серии AU автоматически рассчитывают концентрацию электролитов A1 в каждой пробе.

Рекомендуемые значения²

Мужчины: 1,05–1,75 мМ (108–176 мEq/L)

Женщины: 1,05–2,06 мМ (108–206 мEq/L)

Оценочные значения могут изменяться в зависимости от возраста, пола, типа пробы, диеты и географического местонахождения. В соответствии с общепринятой лабораторной практикой каждой лабораторией следует определить собственные референсные значения. При постоянном диализе результаты могут отличаться от референсных значений, а также от значений, полученных в других диагностических лабораториях.

Специфические характеристики проведения теста

Данные, приведенные в этом параграфе, получены при проверке на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Данные, полученные в каждой лаборатории, могут отличаться от приведенных ниже.

Линейность

Диапазон линейности соответствует интервалу концентрации 0,40–2,50 мМ (40–250 мEq/L).

Воспроизводимость

Следующие результаты получены при измерении на AU600 3-х сывороточных пипет в течение 10-ти дней.

Среднее значение, мМ	Внутри серии				Между сериями	
	Относ. откл. (SD)	Всего, анализатор (CV %)	Средн. откл. (SD)	Всего, анализатор (CV %)	Средн. откл. (SD)	Всего, анализатор (CV %)
0,97	0,01	0,78	0,01	1,48	0,01	1,48
1,05	0,02	1,91	0,04	2,34	0,04	2,34
1,89	0,02	0,80	0,04	2,02	0,04	2,02

Чувствительность

Минимальный предел чувствительности, установленный на анализаторе AU600, составляет 0,002 мМ.

Это значение определяется как минимальное измеренное значение A1, отличающееся от нуля. Минимум предела чувствительности определяется как абсолютное среднее значение плюс три стандартных отклонения при 20-ти третьих измерениях в каждой пробе без последующего вычитания.

Коррекция

При сравнении данных диагностического набора реагентов для определения A1 с OSM8142 на анализаторе AU600 с другим измерением артериального давления набором реагентов для определения A1 с использованием сыворотки пациента. Результаты линейного регрессионного анализа следующие:

$y = 0,871x - 0,011$	$r^2 = 0,980$	$n = 80$	Диапазон значений в пробе 0,861–2,319 мМ
----------------------	---------------	----------	--

Влияние факторов

В исследовании, проводившемся с целью оценки чувствительности метода в некоторых аналитических факторах, получены следующие результаты:

Интерференция: Влияние менее 3% при значениях электролитов до 40 мEq/L или 994 мEq/L.
Гематокрит: Влияние менее 3% при значениях гематокрита до 50%.
Липемия: Влияние менее 10% при значениях липидов до 500 мEq/L.

Подробную информацию можно найти в справочнике Young³.

Область применения

В пробах с патологическими отклонениями характеристик, особенно очень низкими, могут быть получены аномальные результаты.

Ссылки и дополнительные ресурсы

1. Определены коэффициенты: * Значения, установленные в анализаторе по умолчанию.
2. Для электролитов по 3 каналам: Apo A1 & B Coulter, COF3222.
3. Для электролитов по 5 каналам: Apo A1 & B Coulter, COF3222, и электролитный анализатор «13-648».
4. Для электролитов по 5 каналам: Apo A1 & B Coulter, COF3222, и электролитный анализатор «13-648».
5. Значения установлены для анализа CH (Hb) для работы с электролитным анализатором следует увеличить на 100.

Библиография

1. May EA. Lipid, protein, and electrolyte. In: Tietz NW, ed. Fundamentals of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1997:494-498.
2. Nelson WP. Lipid metabolism. In: Thomas L. 9th Clinical laboratory diagnosis. Use and assessment of clinical laboratory results. Philadelphia: TB Saunders Company, 1998:172-173.
3. Berglund D, Berglund PH. Measurement and clinical significance of electrolytes A-1 and B. In: Nelson WP, ed. Handbook of laboratory testing. Washington: AACC Press, 1987:177-188.
4. Etkin W, Nelson W, Nelson W, Nelson W, Nelson W, Nelson W, et al. Use of microplatelets in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and urine samples. WJOS 2006; 1(4):1-10.
5. Young DG. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, AACC, 6th ed. AACC Press, 2000.

1076



**BECKMAN
COULTER.**

ГЛЮКОЗА STAT (GLUCOSE - STAT)

QSR6140

4 x 25 мл
4 x 12,5 мл

R1
R1-2

Назначение

Ферментативный УФ тест (гексокиновый метод) для количественного определения глюкозы в сыворотке и плазме на анализаторе Beckman Coulter серии AU Topline для диалитика H₂O.

Клиническое значение

Нормальное содержание глюкозы регулируется тем, что обеспечивает его уровень в определенных границах. Быстрый и точный способ регулирования уровня сахара в крови позволяет резко контрастировать с быстрым увеличением сахара крови при перекормлении углеводами. Снижение глюкозы в крови до критического уровня (примерно до 2,5 ммоль/л) ведет к дисфункции центральной нервной системы. Это проявляется в виде гипогликемии и характеризуется мышечной слабостью, легкой координированной ремонией, спутанностью сознания. Дальнейшее снижение уровня глюкозы в крови ведет к гипогликемической коме. Значения глюкозы в крови не постоянны и зависят от мышечной активности и интервалов между приемами пищи. Эти колебания еще больше увеличиваются при нарушении регулярного уровня сахара в крови, что характерно для инкурабельных патологических состояний, когда уровень глюкозы в крови может быть повышенным (гипергликемия) или пониженным (гипогликемия). Гипергликемия чаще всего развивается в результате дефицита инсулина или недостаточной его эффективности, наиболее известной под названием сахарного диабета. Это заболевание характеризуется повышенным уровнем глюкозы в крови до такой степени, что превышает почечный порог и сахар выводится мочой (глюкозурия). Измерение глюкозы в крови используется для скринингового выявления сахарного диабета, при подозрении на гипогликемию, мониторинге лечения сахарного диабета, оценки метаболического утравления, например, при остром гепатите у беременных женщин, страдающих диабетом, при остром панкреатите и болезни Аддисона. Гипогликемия встречается при инкурабельных патологических состояниях, включая синдром тонкой кишки, недостаточность надпочечников, тяжелую беременность, врожденный фенилкетонурия, синдром Райд, нарушения функции печени, инкурабельные опухоли, опухоли поджелудочной железы (инсулиномы), опухоли с инсулином, гиперпаратиреозом, опухолями, опухолями, хроническая почечная недостаточность и при гравиде аластии.

Принцип определения

Глюкоза фосфорилируется гексокиной (ГК) в присутствии аденозинтрифосфата (АТФ) и ионы кальция с образованием глюкозо-6-фосфата и аденозиндифосфата (АДФ). Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (Г6Ф-ДГ) специфически окисляет глюкозо-6-фосфат до глюконо-6-фосфата, реакция сопряжена с восстановлением NAD⁺ до NADH. Повышение абсорбции при 340 нм при пропорциональном изменении концентрации глюкозы в пробе.

Схема реакции

Глюкоза + АТФ

ГК + Mg²⁺

Глюкозо-6-фосфат + АДФ

Глюкозо-6-фосфат + NAD⁺

Г6Ф-ДГ

6-фосфоглюконат + NADH + H⁺

Состав

Концентрация в реакционной смеси:

Буфер РНБ (рН 7.0)

24.0 ммоль/л

АТФ

≥ 2.0 ммоль/л

NAD⁺

≥ 1.32 ммоль/л

Mg²⁺

2.27 ммоль/л

Гексокиназа (ГК)

≥ 0.58 ЕД/л

Г6Ф-ДГ

≥ 1.80 ЕД/л

Консервант

Область пригодности

Соблюдать все меры предосторожности, принятые при работе с лабораторными реактивами.

Во избежание возможного отравления окислительно-восстановительной реакцией после смеси нерабочего реагента промывать кончик пипетки чистой водой.

Утилизировать отработанные реакционные материалы в соответствии с требованиями стандарта-экологического и экологического контроля.

Подготовка реагента

Медленно добавить содержимое флакона R1-2 к флакону R1, хорошо перемешать и уложить в анализатор.

Хранение и стабильность

Несерийные реагенты стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реагенты стабильны 30 дней при хранении в анализаторе.

Использование материалов

Сыворотка, плазма (EDTA или гепарин)^{1,2} для анализа реактивом глюкозы, обусловленных причинами глюкозы, сыворотка должна быть, как можно быстрее охлаждена до формирования замороженной крови. Если нет возможности быстро определить сыворотку, кровь следует собирать в пробирку, содержащую фторид, немедленно замораживать и хранить в стабильном состоянии глюкозы в плазме глюкоза стабильна до 7 дней при температуре хранения 2-8°C или 2 дня при 15-25°C. Не следует проводить измерения в истеричных и очень мутных пробах.

Примечания

См. Руководство Reagent Guide и соответствующую инструкцию для конкретного типа проб.

Калибровка

Вульва Салтайм (ит. № 64300).

Значения калибраторов для глюкозы проследованы до стандартного референсного материала 095 Национального института стандартов и технологий (NIST).

Калибраторы следует проводить через каждые 30 дней или при следующих условиях:

Смена калибра новар реактивов или существенное изменение лизинной контролей.

Проведение профилактического обслуживания анализатора или замена любого узла прибора.

Контроль качества

Можно использовать контроли (ит. № 08C0002 и 08C0004) или другие контрольные материалы со значениями, установленными для данной модели анализатора Beckman Coulter.

Каждая информация о проверке качества проведения контроля качества самостоятельна, однако, хороший лабораторный персонал ожидает от калибратора значение качества с проблемными иными и другими проблемами калибратора.

Полученные в специальной лаборатории результаты могут отличаться от лабораторного значения. Подать информацию в лабораторию для внешнего анализа установившись, если среднее значение и отклонения от референсного значения, на основании лабораторного измерения по установленным правилам. Эти средние значения на данных выводить из программы соответствующим, принятым интервалам, применяемым в лабораториях.

При обнаружении каких-либо тенденций в значениях значений контроля качества или значительных отклонений его значений, проверьте все вычислительные этапы измерения. Каждая лаборатория должна разрабатывать план действий на тот случай, если результаты измерения контроля качества выйдут за установленные пределы.

Расчет

Анализаторы Beckman Coulter серии AU автоматически рассчитывают концентрацию глюкозы в каждой пробе.

Референсные значения*

Сывороточная (натощак)	Возраст	4.1-5.6 ммоль/л (74-100 мг/дл)
	Дети	3.3-5.0 ммоль/л (60-100 мг/дл)

Для диагностики диабета обозначены следующие пороговые значения:

(a) глюкоза натощак при условии исследования ≥ 11.1 ммоль/л

(b) глюкоза глюкоза натощак ≥ 7.0 ммоль/л

(c) через 2 часа после приема пищи (или) при проведении теста толерантности к глюкозе ≥ 11.1 ммоль/л.

Если один из этих критериев выполнен, результаты необходимо подтвердить, повторное исследование на следующий день в той же или, если нет подтвержденной гипергликемии, воспроизводящей второй метаболической диагностический.

Средние значения могут изменяться в зависимости от возраста, пола, типа пробы, диеты и географического местоположения. В соответствии с общепринятой лабораторной практикой каждая лаборатория должна определять собственные референсные значения. При постановке диагноза результаты всегда следует рассмотреть вместе с данными историй болезни и другими диагностическими исследованиями.

Специфические характеристики

Данные, приведенные в этом параграфе, получены при калибровке на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Характеристики проведения теста в вашей лаборатории могут отличаться от приведенных ниже.

Линейность

Диапазон линейности соответствует диапазону концентраций глюкозы 0.4-48.0 ммоль/л (10-100 мг/дл).

Воспроизводимость

Следующие результаты получены при калибровке на AU680 3-х сывороточных проб в течение 18-ти дней

Среднее значение, ммоль/л	Внутренняя ошибка		Средняя	
	Средн. откл. (SD)	Коеф. вариации (CV) %	Средн. откл. (SD)	Коеф. вариации (CV) %
3.40	0.03	0.74	0.04	1.08
9.20	0.04	0.38	0.05	0.53
16.10	0.07	0.43	0.14	0.86

Чувствительность

Нижний предел чувствительности, установленный на анализаторе AU680, составляет 0.05 ммоль/л или эквивалентный набор для вычисления. Это значение определяется на минимальное измеренное значение глюкозы, отличное от нуля. Нижний предел чувствительности рассчитывается как абсолютное среднее значение плюс три стандартных отклонения при 20-ти кратном измерении аналита в пробе без исследуемого вещества.

Интерференция

При сравнении данных диагностического набора реактивов для определения глюкозы OMB 148 на анализаторе AU680 с другим коммерчески доступным набором реактивов для определения глюкозы использовались сыворотки пациентов. Результаты лабораторного исследования показали следующие:

$y = 0.999x + 0.016$	$r = 0.997$	$n = 118$	Диапазон значений в пробе 0-39 ммоль/л
----------------------	-------------	-----------	--

Влияющие факторы

В исследованиях, проводившихся с целью оценки чувствительности метода к некоторым влияющим факторам, получены следующие результаты:

Аскорбиновая кислота:	Влияние менее 3% при значениях аскорбиновой кислоты до 20 мг/дл
Индонетрикс:	Влияние менее 10% при значениях индонетрикса до 200.2 ммоль/л
Глицерол:	Влияние менее 10% при значениях глицерола до 3 г/л
Липиды:	Влияние менее 10% при значениях липидов (триглицериды) до 80 мг/дл

В очень редких случаях концентрация моноглицеридов (г/л) (микроглубинами Вальдшнепа) может быть причиной некорректных результатов.

Подробнее информацию по влияющим факторам можно найти в справочнике Young.

Способы использования данных

1. Справочник пользователя = Значения, установленные в анализаторе по умолчанию

1. Вульва Салтайм (ит. № 64300)

2. Значения установлены для единиц СИ (ммоль/л). При работе с единицами мг/дл, значения следует умножить на 18.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Thomas L. Blood glucose. In: Thomas L, ed. Clinical laboratory diagnosis: Use and assessment of clinical laboratory results. Philadelphia/Moscow: TH-Books/Voltersguter-Schriek, 1998:151-37.
2. Seale DB. Carbohydrates. In: Burke CA, Ashwood ER, eds. Textbook of clinical chemistry. Philadelphia/WB Saunders Company, 1999:765-85.
3. Czok R, Berthelme W. Einzelexperimente der Glucose in Blut, Serum und Harn. Klin Wochenschr 1993;69:385-398.
4. Skellott W, Horvay, Bernal Y, Topley D, Wilson H, Zeeva B, et al. Use of orthoquinone in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. WHOGLAB/93 Rev.2 52pp.
5. Dole RP. Reductive method. In: Kaplan LA, Pesant AJ, eds. Clinical chemistry theory, analysis, and correlation. St Louis: Mosby, 1995:635pp.
6. Paster PD, Cope JV, Smith JL. Reference information for the clinical laboratory. In: Burke CA, Ashwood ER, eds. Textbook of clinical chemistry. Philadelphia/WB Saunders Company, 1999:1915pp.
7. Seale DB, Skellott W, Goldstein DE, MacLennan NC, McDonald JM, Parrott M. Guidelines and recommendations for laboratory analysis in the diagnosis and management of diabetes mellitus. Clin Chem 2002;48:438-72.
8. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests. 3th ed. AACC Press, 2000.

CE



**BECKMAN
COULTER.**

МОЧЕВИНА (UREA)

OSR6134	4 x 25 мл	R1
	4 x 25 мл	R2
OSR6234	4 x 83 мл	R1
	4 x 83 мл	R2
OSR6534	4 x 103 мл	R1
	4 x 103 мл	R2

Назначение

УФ-оптический определитель мочевины в сыворотке, плазме и моче человека на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro.
Реагент для определения мочевины Urea (Мочевина) OSR6534 предназначен только для использования на анализаторах AU/850, AU/2700 и AU/400.

Концентрация реагента^{1,2}


Мочевина синтезируется в печени из мочевины при участии аммоногена белков и аминокислот. Синтез мочевины зависит от прямого поступления белков и азотистого метаболитов в печень. Большая часть мочевины, образующейся в результате этих метаболических процессов, выводится путем клубочковой фильтрации с диффузией 40-50% обратно в кровь, независимо от скорости тока в проксимальных канальцах. Гломерулярная диффузия в дистальных канальцах зависит от тока крови и регулируется антидиуретическим гормоном. Во время диуреза существует минимальная потеря мочевины в просвете, большая часть мочевины выводится с мочой, а концентрация мочевины в плазме падает. Во время полицитемии, который имеет место в случае сгущения крови, сниженной скорости клубочковой фильтрации или при обезвоживании, мочевина концентрируется канальцами с повышенной скоростью, вызывая тем самым увеличение концентрации мочевины в плазме. При про- и почечной почечной недостаточности ток крови в канальцах снижается, вызывая увеличение канальцевой диффузии мочевины в дистальных канальцах и увеличение скорости экскреции. Периферические уровни мочевины соответствуют при декомпенсации левого сердца, повышенным метаболическим белкам и недостаточном поступлении воды. Повышенные уровни мочевины могут быть вызваны почечной недостаточностью, такой как острый гломерулонефрит, хронический нефрит, почечная почка, некроз канальцев и нефрозы. Повышенное содержание мочевины в крови может быть вызвано обструкцией нижних отделов путей.

Концентрация мочевины в плазме зависит от реальной перфузии, скорости синтеза мочевины и скорости клубочковой фильтрации и может повышаться при острой почечной недостаточности, хронической почечной недостаточности и прerenальной патологии. У больных, находящихся на диализе, концентрация мочевины отражает расход, баланс и является индикатором состояния метаболизма. В конечной стадии почечной недостаточности происходит отравление мочевиной, в основном, относительное в экстракорпоральной очистке крови, коррелирует с концентрацией мочевины. Определение мочевины и креатинина в сыворотке часто выполняются вместе для дифференциальной диагностики функции почек.

Принцип определения³

Мочевина гидролизруется в присутствии воды до аммиака и углекислого газа. Аммиак, образующийся в первой реакции, реагирует с 2-ацетилфлуоридом и NADH в присутствии глутамат-пируват-трансферазы (ГПТ) в образующий глутамат и NAD⁺. Скорость поглощения NADH в единицу времени пропорциональна концентрации мочевины в пробе.

Химия реакции



Состав

Концентрация в реакционной смеси:

Трис-буфер	100 ммоль/л
NADH	≥ 0,29 ммоль/л
Фосфат натрия	10 ммоль/л
3,4-ДА	2,85 ммоль/л
2-Ацетилфлуорид	≥ 0,8 ммоль/л
Уреаза	≥ 17,78 ед/л
ADP	≥ 2,8 ммоль/л
ГПТ	≥ 0,10 ед/л
Консервант	

Общие предостережения

Соблюдайте все меры предосторожности, принятые при работе с лабораторными реагентами.

Во избежание возможного отравления эндосодержащий соединитель после снятия переплавленного реагента промойте дезинфицирующей трубой водой.

Утилизируйте отработанные реакционные материалы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Паспорт безопасности может быть предоставлен по запросу.

Подготовка реагента

Реагенты готовы к использованию и могут быть непосредственно установлены в анализатор.

Хранение и стабильность

Нестабильны реактивы открытыми для даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реагента

RU-03

В.О.И.И.И.И.И.

2004-08

И.И.И.И.И.

стабильны 30 дней при хранении в анализаторе.

Исследуемый материал

Сыворотка и плазма (3/4 Т или 1/2-тканевая). Не использовать H₂O, гелидин в качестве вытеснителя.¹

В сыворотке и плазме мочевина стабильна в течение 7-ми дней при температуре хранения 2-8 °C.²

Не использовать для анализа гемолизные и итеричные пробы.

Моча: Рассматривается использование субстрата Мочу без консервантов.³

Мочевина стабильна в течение 7-ми дней при температуре хранения 2-8 °C и в течение 2-х дней - при 18-25 °C.⁴

Первичная аналитика

См. Руководство Reagent Guide и соответствующую инструкцию для конкретного типа пробы. Есть программы для односторонних проб или других проб с малыми объемами.

Калибровка

Используйте калибратор System Calibrator (ит. № 08300) или сывороточный калибратор Urine Calibrator (ит. № 08000025) для мочи.

Значения обеих калибраторов для мочевины прослеживаются до референсного материала (SRM) 900b, уровень 1, Национального института стандартов и технологий (NIST).

Потребную калибровку проводит в случае:

Слишком большого номера разбавления или существенного изменения значения контроля.

Проведение профилактического обслуживания анализатора или замены датчика уреа-прибора.

Контроль качества

Можно использовать контроль (ит. № 080003 и 080004) или другие контрольные материалы со значениями, установленными для модели анализатора Beckman Coulter.

При исследовании мочи можно использовать контроль Biuret Liquid Urine Chemistry Control (ит. № 367 и 398) или другие контрольные материалы со значениями, установленными для датчиков анализатора Beckman Coulter.

Каждый лаборатория определяет частоту проведения контроля качества самостоятельно, однако, каждый лабораторный работник анализатора или анализатора измерения мочи должен проводить контроль качества после проведения калибровки.

Полученная в отдельной лаборатории результаты могут отличаться от лабораторного значения. Лаборатория рекомендует лабораторию для каждого анализа устанавливать свои средние значения и отклонения специфического контроля, на основании неоднородного материала по установленным правилам. Эти средние значения не должны выходить за пределы соответствующим правилам материала, применяемым в установленной лаборатории.

При обнаружении каких-либо тенденций в изменении значений контроля качества или внезапных отклонений его значений, проверить все аналитические эталоны измерения. Каждой лабораторией следует разработать план действий на тот случай, если результаты измерения контроля качества выйдут за установленные пределы.

Расчет

Анализаторы Beckman Coulter серии AU автоматически рассчитывают концентрацию мочевины в исходной пробе.

Референсные значения

Сывороточная уреаза (в целом)¹

2,8-7,2 ммоль/л (17-43 мг/дл)

Нерозведенные²

1,4-4,2 ммоль/л (8,4-25,8 мг/дл)

Микролитрами

1,8-6,4 ммоль/л (10,0-38,9 мг/дл)

Моча³

250-670 ммоль/л (15 000-34 200 мг/дл)

Оценочные значения могут изменяться в зависимости от возраста, пола, типа пробы, диеты и физиологического состояния. В соответствии с общепринятой лабораторной практикой каждой лабораторией следует определять собственные референсные значения. При постановке диагноза результаты всегда следует рассматривать вместе с данными истории болезни и другими диагностическими исследованиями.

Специфические характеристики

Допол. характеристики в этом разделе, полученные при измерении на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Характеристики проведения теста в вашей лаборатории могут отличаться от приведенных ниже.

Линейность

Диапазон линейности соответствует значениям концентрации 0,6-30 ммоль/л (3-300 мг/дл) в сывороточной моче.

Диапазон линейности соответствует значениям концентрации 10-750 ммоль/л (60-4500 мг/дл) в моче.

Воспроизводимость

Следующие результаты получены при измерении на AU640 3-х сывороточных проб в течение 20-ти дней.

n = 30	Внутренняя серия		Общая		
	Среднее значение, ммоль/л	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	Сред. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)
	1.97	0.05	2.25	0.06	2.31
	8.71	0.19	1.03	0.23	2.38
	37.40	0.34	0.91	0.81	2.12

Следующие результаты получены при измерении на AU640 3-х проб мочи в течение 20-ти дней.

n = 60	Внутренняя серия			Общая		
	Среднее значение, ммоль/л	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	Сред. откл. (SD)	Среднее значение, ммоль/л	Коэф. вариации (CV %)
	78,81	0,81	1,02	2,44	3,09	
	223,97	2,80	0,88	9,56	3,41	
	439,70	4,80	1,10	14,91	3,21	

Чувствительность

Нижний предел чувствительности, установленный на анализаторе AU640, составляет 0,36 ммоль/л для сыворотки.

Нижний предел чувствительности, установленный на анализаторе AU270, составляет 0,71 ммоль/л для мочи.

Это значение соответствует минимальному значению различимости, отнесенному к нулю. Нижний предел чувствительности рассчитывается как абсолютное среднее значение плюс три стандартных отклонения (при 20-ти кратном измерении аналита в пробе 30) индивидуального реагента.

Коррекция

При сравнении данных диагностического набора реагентов для определения мочевины CREA 34 на анализаторе AU640 с другими измеренными доступными наборами реагентов для определения мочевины использовать сывороточный коэффициент. Результаты линейности

Матрица

ВЕРСИЯ 1.1

RU 01

регрессионного анализа следующие:

$y = 0,322x - 0,200$	$r = 0,999$	$n = 116$	Диапазон значений в пробе: 1,38–39,44 ммоль/л
Результаты линейного регрессионного анализа для мочи следующие:			
$y = 0,879x - 2,144$	$r = 0,999$	$n = 125$	Диапазон значений в пробе: 46,65–482,06 ммоль/л

Влияющие факторы

В исследовании смывов, проводившемся с целью оценки чувствительности метода к некоторым факторам, получены следующие результаты.

Интерференция: Влияние менее 10% при значениях билирубина до 20 мг/л или до 242 мкмоль/л

Гемоглобин: Влияние менее 10% при значениях гемоглобина до 2,5 г/л

Липиды: Влияние менее 3% при значениях липидов (триглицериды) до 500 мг/дл

В исследовании мочи, проводившемся с целью оценки чувствительности метода к некоторым влияющим факторам, получены следующие результаты.

Интерференция: Влияние менее 3% при значениях билирубина до 40 мг/л или до 554 мкмоль/л

Гемоглобин: Влияние менее 3% при значениях гемоглобина до 5 г/л

Подробнее информация по влияющим факторам можно найти в справочнике Venzel⁶

ОТЛИЧЕНИЯ

Очень липкие пробы могут повлиять на скорость реакции смеси и быть причиной появления флага «E». В таком случае пробу следует разбавить и повторить в той же порции.

ОСНОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА

- 1. Для проведения пробы не требуется калибровка (Cat. № ODC0025) 1:10 индивидуальная чашка для пробы.
- 2. Определение автоматизировано. Значения, установленные в анализаторе не подлежат.
- 3. Система Calibrator (кат. № 06300) / Unique Calibrator (кат. № ODC0025)
- 4. Значения установлены для единиц СИ (ммоль/л). При работе с единицами «мг/дл», значения следует умножить на 0,1.
- 5. Упрощаются пользовательские.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Thomas L. Use of blood urea nitrogen (BUN). In: Thomas L, ed. Clinical laboratory diagnostic Use and assessment of clinical laboratory tests. Philadelphia: WB Saunders Company, 1998:274–277.
2. Nelson CL, Peto CP. Blood Urea Nitrogen and Nitrogen metabolism. In: Burke CA, Ashwood ER, eds. Textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1998:1228–1241.
3. Tabor M. Soluble 66. Spectrophotometric determination of blood urea nitrogen in clinical test nach Wirkung. (In: Wochenschrift 1989;43:114–75)
4. Elmal M, Hail M, Saitou Y, Tabor M, Venzel H, Zimm B, et al. Use of microanalysis in clinical laboratory investigation and stability of blood, plasma and serum samples. JPHOCLAS 1998; 1: 149–154.
5. NCCLS. Urinary and blood urea nitrogen, creatinine, and proteinuria: a comprehensive approach. Approved guideline NCCLS Document GP16-A2, 2nd ed. Pennsylvania: NCCLS, 2001.
6. Piller PC, Cope JY, Smith A. Reference information for the clinical laboratory. In: Burke CA, Ashwood ER, eds. Textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1998: 183–184.
7. Reinholdt Uwe, In: Kaplan LA, Potos AJ, eds. Clinical chemistry: theory, analysis and correlation. St. Louis: Mosby, 1996:204pp.
8. Young DS. Effect of drugs on clinical laboratory tests. 6th ed. AACCPress, 2003.

CE



**BECKMAN
COULTER.**

ОБЩИЙ БЕЛОК (TOTAL PROTEIN)

DSR4132

4 x 25 мл

R1

4 x 25 мл

R2

DSR4232

4 x 48 мл

R1

4 x 48 мл

R2

Назначение

Колориметрический фотометрический тест для количественного определения общего белка в сыворотке или плазме человека на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики *in vitro*.

Клиническое значение

Общий белок сыворотки представляет собой сумму всех циркулирующих белков и является основной составной частью крови. Общий белок определяется с целью диагностики и лечения различных заболеваний, в частности, заболеваний печени, почек или костного мозга, а также нарушения обмена веществ.

Отклонение содержания общего белка от нормы указывает на наличие диспротеинемий или нарушение водного баланса. Эти отклонения могут быть подтверждены дополнительно выполненными электрофорезом белков и измерением гематокрита. При интерпретации результатов измерений концентрации общего белка важно получить информацию об отдельных белковых фракциях, таких как альбумины и глобулины.

Принцип определения

Ионы меди в щелочной среде реагируют с белками и поликвантерном, образуя не менее двух пептидных связей, с образованием флуоресцентного комплекса. Абсорбция данного комплекса, измеренная при 540/600 нм, прямо пропорциональна концентрации белка в пробе.

Схема реакции

Белок + Cu²⁺



Комплекс голубовато-фиолетового цвета

Состав

Концентрация в реакционной смеси:

Гидроксид натрия

200 ммоль/л

Турбулент натрия

32 ммоль/л

Сульфат меди

16 ммоль/л

Вода дист.

38 ммоль/л

Область безопасности

Предупреждение об опасности в форме пиктограммы:

Реагент R1: Едкая щелочь, содержит гидроксид натрия, R12. Вызывает ожог.

Реагент R2: Обладает раздражающим действием, R36/38, R52/53. Может вызывать раздражение при попадании в глаза и на кожу. Опасен для водных организмов, обитателей в воде. Может быть причиной продолжительного вредного воздействия на водную среду.

Меры безопасности:

R37+R38/39, R41, R50, R51, в случае попадания в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Пользоваться соответствующей защитной одеждой. Маркировка и средства защиты глаз и лица. В случае травмы или раздражения немедленно обратиться к врачу (при возможности показать врачу этикетку реагента). Данный реагент и воду из под него следует утилизировать как опасные отходы. Не допускать попадания в окружающую среду. См. специфические инструкции импорта безопасности.

Утилизируйте отработанные расходные материалы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Дополнительная информация: Приложение к Паспорту безопасности реагента

Помещение реагента

Реагенты готовы к использованию и могут быть непосредственно установлены в анализатор.

Условия и стабильность

Несколько реактивов стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-25 °C. После вскрытия реагенты стабильны 30 дней, если они используются или находятся в анализаторе.

Использованный материал

Сыворотка, плазма (SUA) или (серум).

В сыворотке и плазме белок стабилен в течение 30-40 дней при температуре хранения 2-8 °C и в течение 6-ти дней - при 16-25 °C.

Примечания

См. Руководство по эксплуатации и справочный листы.

Калибровка

Калибратор BUNEN Calibrator (кат. №. 00309).

Функцию калибратора для общего белка осуществляет набор стандартного референсного материала (SRM) 920 (Национального института стандартов и технологий (NIST). Калибровку проводят в случае: смены фильтра с реактивом или измененного значения зернистости впитывателя, проведения профилактического обслуживания анализатора или замены анализатора или прибора. Подключение реагента, установленного в анализаторе, атмосферного CO₂ может снизить стабильность калибровки. Слегка абсорбция зависит от частоты проведения измерений. Поэтому каждая лаборатория должна сама устанавливать частоту проведения калибровки в зависимости от ее разовой измерении этого теста.

RU

000124

1000

0000

Контроль качества

Можно использовать, контроль (кат. № ODC0003 и ODC0004) или другие контрольные материалы, со значениями, установленными для данной модели анализатора Beckman Coulter.

Каждая лаборатория определяет частоту проведения контроля качества самостоятельным.

Однако, хорошая лабораторная практика считается из ежедневного выполнения контроля качества вместе с пробой пациента и после проведения калибровки. Значения контролей не должны выходить за пределы определенных пользователем диапазонов. При обнаружении каких-либо тенденций в значениях значений контроля качества или выявлении отклонений это является проверкой для аналитических эталонов.

Каждая лаборатория должна разработать план действий на тот случай, если результаты измерения контроля качества выйдут за установленные пределы.

Расчет

Анализаторы Beckman Coulter серии AU автоматически рассчитывают концентрации общего билирубина в каждой пробе.

Референсные значения¹

Сыворотка плазмы

Взрослые

55–83 гл (5.5–8.3 мм)

Дети (1–18 лет)

57–80 гл (5.7–8.0 мм)

Новорожденные (1–30 дней)

41–83 гл (4.1–8.3 мм)

Следующие значения могут измениться в зависимости от возраста, пола, типа пробы, диеты и места проживания пациента. В соответствии с общепринятой лабораторной практикой, каждая лаборатория должна проводить соответствие следующим значениям национальным нормам и при необходимости определять свои собственные референсные значения. При постановке диагноза результаты всегда следует рассматривать вместе с данными истории болезни и другими диагностическими исследованиями.

Специфические характеристики теста

Данные, приведенные в этом параграфе, получены при измерении на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Данные, полученные в других лабораториях, могут отличаться от приведенных ниже.

Линейность

Диапазон линейности соответствует диапазону концентраций общего билирубина 30–120 мк (3.0–12.0 гдм).

Точность

Следующие результаты получены при измерениях на анализаторах AU540 3-х сывороточных проб в течение 20-ти дней.

Среднее значение, мк	Внутренняя		Общая	
	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV%)	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV%)
55.87	0.18	0.30	0.30	0.54
73.35	0.26	0.34	0.51	0.70
110.00	0.20	0.20	0.71	0.64

Чувствительность

Нижний предел чувствительности для общего билирубина в сыворотке, установленный на анализаторах AU400, составил 0.77 мк.

Нижний предел чувствительности – это наименьшее измеримое значение общего билирубина, отличное от нуля. Оно рассчитывается на основании определенных значений плюс три стандартных отклонения при 20-ти повторных измерениях в пробе без исследуемого вещества.

Корреляция

При сравнении данного набора реагентов Total Protein OPR0126 для определения билирубина на анализаторах AU400, с другим набором реагентов для определения общего билирубина использовались сыворотки пациентов. Получены следующие результаты линейного регрессионного анализа:

$r = 1.0000$ – 1.001	$r = 0.999$	$n = 120$	регрессионный анализ в пробах 33, 34–119, 20 мк
----------------------	-------------	-----------	---

Влияющие факторы

В исследовании, проведенном с целью оценки чувствительности метода к некоторым влияющим факторам, получены следующие результаты:

Интерференция: Влияние минимально 10% при значениях билирубина до 24 мк/дл или до 410 мкмоль/л.

Гематокрит: Влияние минимально 10% при значениях гематокрита до 3 гл.

Липемия: Влияние минимально 10% при значениях липидов (триглицеридов) до 1000 мг/дл.

Полученная информация о влияющих факторах можно найти в справочнике Young⁴.

Ссылки в сопроводительных листах

¹ Описывается пользователем = значение, установленное на анализаторе по умолчанию

² Анализатор Beckman Coulter (кат. № 06300)

³ Значения установлены для работы с единицами системы СИ (мг/дл). Для работы с единицами гл значения следует разделить на 10.

⁴ Значения от используемой системы в лаборатории

Библиография

1. Thomas L. Total Protein. In: Thomas L., ed. Clinical laboratory diagnosis. Use and management of clinical laboratory tests. Philadelphia: TN Books International, 1998:844-847.
2. Weitzsaecker TE. An accurate and reproducible for the determination of bilirubin in small amounts of blood serum and plasma. *Am J Clin Path* 1982; 75:40-48.
3. Brent W, Hal W, Schmitt V, Taylor O, Winkler H, Zimlin B, et al. Use of microcomponents in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma, and serum samples. *NECKON* 1994; 10:2-6.
4. Young B. Effects of drugs on clinical laboratory tests. AACCC, 6th ed AACCC Press, 2000.

CE



**BECKMAN
COULTER.**

OSR6129

**ГБДГ
(HBDH)**

**4 x 15 мЛ
4 x 15 мЛ**

**R1
R2**

Назначение

УФ-флуориметрическое определение 2-гидроксибутиратдегидрогеназы, EC 2.2.4.3 (ГБДГ), в сыворотке и плазме человека на анализаторе Beckman Coulter Series AU. Только для диагностики *in vitro*.

Клиническое значение

Активность 2-гидроксибутиратдегидрогеназы (ГБДГ) определяется по ее способности каталитически окислять 2-гидроксибутират до 2-оксобутирата. Измеряемая активность ГБДГ и расчет отношения ЛДГ/ГБДГ можно использовать вместо измерения активности отдельных изоферментов ЛДГ-1 и ЛДГ-2, содержащих изомер H в наибольшем соотношении. Более высокие соотношения 2-оксобутирата, чем у пациента. Соотношение ЛДГ/ГБДГ у здоровых лиц колеблется от 1,2 до 1,6. При инфаркте миокарда повышается активность ЛДГ-5, в результате чего отношение ЛДГ/ГБДГ увеличивается до 1,6-2,5. При инфаркте миокарда повышается активность ЛДГ-1 и ЛДГ-2, в результате чего отношение ЛДГ к ГБДГ повышается до 0,6-1,2. Точные значения этого отношения зависят от условий проведения анализа.

Принцип определения

Фотометрически УФ-метод, основан на реакции окисления 2-гидроксибутирата окислительной системой (GSCC). При использовании в качестве субстрата 2-оксобутирата ингибиторы ЛДГ (изоферменты ЛДГ-1 и ЛДГ-2) в субоптимальных условиях реакции демонстрируют высокую активность. ЛДГ, активность которой измеряют с использованием 2-оксобутирата в качестве субстрата, окисляет 2-гидроксибутиратдегидрогеназой (2-ГБДГ). ГБДГ катализирует обратимую восстановительную реакцию 2-оксобутирата до 2-гидроксибутирата. Снижение концентрации НАДН, измеряемого при 340 нм, прямо пропорционально активности ГБДГ в пробе.

Сухая реакция

2-оксобутират + НАДН + H⁺

ГБДГ

2-гидроксибутират + НАД⁺

Состав

Концентрация в реакционной смеси

Фосфатный буфер (pH 7,5)

2-оксобутират

НАДН

Контроль

50 ммоль/л
3,0 ммоль/л
0,15 ммоль/л

Общие предостережения

Соблюдайте обычные меры предосторожности, применяемые при работе с лабораторными реактивами.

Во избежание возгорания исключите использование открытого пламени, после снятия мер предосторожностей реакторы немедленно промойте.

Избегайте вдыхания пыли, газа.

Утилизируйте использованные реакторы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Подготовка реактива

Реактивы готовы к использованию и могут быть непосредственно установлены в анализатор.

Хранение и стабильность

Накрупные реактивы при температуре хранения 2...8°C сохраняют стабильность в течение всего срока годности. После вскрытия флакона и его установки в анализатор реактивы стабильны в течение 30 дней.

Индикация истечения срока годности

Сыворотка и плазма (гепарин). В сыворотке ГБДГ стабильна в течение 4 дней при температуре хранения 2...8°C и в течение 7 дней - при 16...20°C.

Не используйте гемализированные пробы.

Персональная информация

См. Руководство по эксплуатации и программные листы.

Калибровка

Измерения проводятся в режиме MB. Чтобы получить значение MB-фактора для конкретного анализатора, рекомендуется провести 6 независимых калибровок. Калибровку следует проводить в режиме AB, начиная с каждой калибровки следует использовать новый флакон калибратора, продукт Салдинот (кат. № 88300). После расчета значение для MB-фактора на основании данных прошедших калибровок, результаты измерений следует проверить для выявления значений с большим отклонением, для которых следует проверить измерения и сделать анализатор. Анализируя калибратор, калибровку следует выполнять для каждой кривой вычит. Контроль качества следует проводить непосредственно после каждой калибровки.

Значения калибратора применяются до тех пор, пока калибратор Beckman Coulter.

При замене любого узла анализатора рекомендуется вновь установить стандартное значение MB-фактора для данного анализатора. При перемещении на новую платформу реактивов рекомендуется провести измерения реактив Бланк.

Контроль качества

Можно использовать контрольные сыворотки (кат. № OOS0088 и OOS0056) или другие контрольные материалы со значениями, установленными для данной модели флуориметра Beckman Coulter серии AU.

Каждый лабораторный сертификат должен содержать калибровку качества самостоятельного.

Одним из основных лабораторных критериев считается использование стандартных контролей качества вместе с пробой пациентов и после проведения калибровки. Исходящие данные контролей должны входить в диапазон, определенный производителем. При обнаружении любых отклонений в полученных значениях контроль качества или повторных отклонений или значений, проверьте все шаги и параметры измерения.

В каждой лаборатории должен быть разработан план действий на тот случай, если значения контролей выйдут за установленные пределы.

Риски

Анализатор Beckman Coulter серии А1 автоматически рассчитывает активность ГЭГ в каждой пробе.

Референсные значения*

Взрослые 90–190 Ед (1,5–3 мккат/л)

Ожидаемые значения могут измениться в зависимости от возраста, пола, типа пробы, даты и места проведения анализа в соответствии с общепринятой лабораторной практикой. Каждая лаборатория должна проверить соответствие ожидаемых значений популяционным нормам, и при необходимости определить свои собственные референсные значения. При получении данных результаты всегда следует рассматривать вместе с данными истории болезни и другими диагностическими исследованиями.

Свойства теста и характеристики теста

Данные, приведенные в этом параграфе, получены при проведении на анализаторе Beckman Coulter серии А1. Характеристики теста в вашей лаборатории могут отличаться от приведенных ниже.

Линейность

Диагностическая линейность обеспечивается значениями активности фермента 40–1900 Ед (0,67–31,37 мккат/л).

Точность

Средние результаты, полученные при калибровке на анализаторе А1000 3-х серийных проб в течение 10-ти дней:

n = 40	Внутренняя		Средняя	
Среднее значение, Ед	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации
70	1,00	1,43%	1,34	1,91%
147	1,75	1,19%	3,50	2,33%
270	0,54	0,80%	7,50	2,74%

Чувствительность

Нижний предел чувствительности, установленный на анализаторе А1000, составляет 3 Ед.

Это значение определяется как минимальное измеренное значение ГЭГ, отличное от нуля. Нижний предел чувствительности рассчитывается как абсолютная средняя значение плюс три стандартных отклонения при 20-ти кратном измерении образца в пробе без исследуемого вещества.

Калибрация

При сравнении данного диагностического набора референта HSCN-0280120 на анализаторе А1000 с другим коммерческим доступным набором результатов для определения активности ГЭГ, использовались сырьевые пациенты. Получены следующие результаты линейного регрессионного анализа:

$y = 1,001x - 11$	$r = 0,997$	$n = 418$	диапазон значений пробы 60–374 Ед
-------------------	-------------	-----------	-----------------------------------

Влияющие факторы

В исследовании, посвященном с целью оценки чувствительности метода к множеству потенциальных факторов, получены следующие результаты:

Интерференция: влияние менее 3% при значениях Гемоглобина до 42 г/л или ниже до 544 мкмоль/л

Липемия: влияние менее 3% при значении триглицеридов (Интралипид®) до 400 мг/дл

Подобные интерференции в измерениях факторов можно найти в справочнике Young.⁵

Ограничения

Сюда включены пробы могут повлиять на точность реакционной смеси и быть причиной появления флага «E» в. В таких случаях пробу следует развести и повторить в том же направлении.

Синдром в программных листах

1. Определены параметры = Значения, установленные в анализаторе по умолчанию
2. Значения, установленные для работы с единицами Ед. При работе с единицами СИ (мккат/л) значения следуют разделиться на 10.
3. Точка для AB решения нехватки, более подробные инструкции см. в листе-приложении.

Библиография

1. Moez DM, Nandorff RA, Kestner JF, Epton H, ed. Fundamentals of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1997:281pp.
2. Bergmeyer HU. International Union of Pure and Applied Chemistry. Clin Chem Methods 1973;9:449-452.
3. Elwell W, Melby W, Taylor Q, Wilson M, Zerbe B, et al. Use of Anticardiolipin in Diagnostic Laboratory Investigations and Stability of Blood, Plasma and Serum Samples. HANOMLAB® 1 Rev. 2:20pp.
4. Thomas L. Enzymes, Liver and Diagnosis, 4th Edn. Munich: Die Medizinische Verlagsgesellschaft 1982:109pp.
5. Young DG. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACCC Press, 2000.

CE



**BECKMAN
COULTER.**

ХОЛЕСТЕРИН (CHOLESTEROL)

QSR6116	4 x 22,5 мл	R1
QSR6216	4 x 45 мл	R1
*QSR6516	4 x 107 мл	R1

Назначение

Колориметрический ферментативный тест для количественного определения холестерина в сыворотке или плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro.

*Reagent Cholesterol (Холестерин) QSR6516 предназначен только для использования на анализаторах AU2700 и AU5400.


Клиническое значение

Холестерин синтезируется в организме человека и является необходимым компонентом клеточной оболочки в клеточной мембране, также он является главным строительным материалом для гормонов и желчных кислот. Пространственное значение специфическое общего холестерина в выделении риска ишемической болезни сердца человека. Холестерин транспортируется двумя классами липопротеинов (липопротеины низкой плотности и липопротеины высокой плотности), каждый из которых играет противоположную друг другу роль в патогенезе ишемической болезни сердца. Определение концентрации общего холестерина имеет только роль фактора необходимости дальнейшего исследования метаболитов липопротеинов (ЛПНП, ЛПНП) и триглицеридов.

Принцип определения

При определении холестерина используется ферментативный метод. Эфиры холестерина гидролизуются холестерин-эстеразой. Образовавшийся свободный холестерин окисляется холестерин-оксидазой до холестерин-3-ола и одновременно образованного пероксида водорода (H_2O_2), которая, окислившись, соединится с 4-аминоантипиридином и фенолом в присутствии пероксидазы (ПОД), в результате чего образуется хромофор. Интенсивность окраски реакционной смеси, измеренная при 540/600 нм, прямо пропорциональна концентрации общего холестерина в пробе.

Схема реакции



Состав

Концентрация в реакционной смеси

Фосфатный буфер (pH 6,5)	100 ммоль/л
4-Аминоантипиридин	0,31 ммоль/л
Фенол	5,2 ммоль/л
Холестерин-эстераза	≥ 0,2 МЕ/л (3,3 ммоль/л)
Холестерин-оксидаза	≥ 0,2 МЕ/л (3,3 ммоль/л)
Пероксидаза	≥ 10,0 МЕ/л (100,7 ммоль/л)
Консервант	

Общие предостережения

Соблюдайте все меры предосторожности, принятые при работе с лабораторными реагентами.

Во избежание возможного отравления взвешивая реактивы после снятия мерзостойкого реагента, промывайте анализационные трубки водой.

Утилизируйте использованные реакционные материалы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Паспорт безопасности может быть предоставлен по запросу.

Подготовка реагента

Реагент готов к использованию и может быть непосредственно использован в анализатор.

Хранение и стабильность

Нескопленные реагенты стабильны до даты окончания на этикетке, при температуре хранения 2-8°C в защищенной от света среде. После вскрытия реагенты стабильны 30 дней при хранении в анализаторе.

Использование материалов

Сыворотка и плазма (EDTA или гепарин). Не следует проводить измерения в истергичных пробках.

В качестве детерминанта не используйте фториды, цитрат или оксалат.

В сыворотке и плазме триглицериды стабильны в течение 5 - 7 дней при температуре хранения 2-8°C.

Периодичность анализа

См. Руководство Patient Guide в соответствующей инструкции для конкретного типа пробы.

Калибровка

Буклет Calibrator (кат. № 08300).

Значения калибратора для холестерин-эстеразы соответствуют для референсного метода (BMD) WHO, указанные 1. Национального института стандартов и технологий (NIST) (метод-энтальпийный с использованием разбавления). Этот метод также сертифицирован против референсного метода (Abel-Kendall). Центры по контролю заболеваний.

Калибровку следует проводить при стандартных условиях.

См. в руководстве анализатора или в руководстве пользователя анализатора 3-х фазный контроль.

RU 21

BCS 6116-16
2000-01

Beckman

Проведение профилактического обслуживания анализатора или замена вентильного узла прибора.

Комплекс испытаний

Можно использовать контроли (мет. № СОС0003 и СОС0004) или другие материалы со значениями, установленными для данной модели анализатора Beckman Coulter серии ALJ. Каждая лаборатория определяет частоту проведения контроля качества самостоятельным, однако, каждой лабораторией желательна оценка не менее одного измерения в каждой пробе и после проведения калибровки. Полученные в стандартной лаборатории результаты могут отличаться от паспортного значения. Поэтому рекомендуются лаборатории для каждого анализа устанавливать свои справочные значения в зависимости от особенностей контроля, от особенностей воспроизводимости на установленном оборудовании. Эти справочные значения не должны выходить за пределы установленных границ значений, приведенных в соответствующем справочнике.

При обращении при необходимости с анализатором или анализатором для анализа гематологических параметров для информации о методах анализа обращайтесь к специалистам по обслуживанию анализатора.

Расчет

Анализаторы Beckman Coulter серии ALJ автоматически рассчитывают концентрацию клеток в каждой пробе. Результат общего количества в плазме необходимо скорректировать, умножив на 1,03, чтобы он был эквивалентен результату общего количества в сыворотке.

Рекомендуемые значения

Рекомендуемые значения National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel II*

< 5,2 ммоль/л (200 мг/дл)	Нормальные
5,2-6,2 ммоль/л (200-250 мг/дл)	Повышенные значения
≥ 6,2 ммоль/л (250 мг/дл)	Высокие

Рекомендуемые значения European Atherosclerosis Society†

Холестерин	< 6,2 ммоль/л (< 240 мг/дл)	Нет нарушений липидного обмена
Триглицериды	< 2,3 ммоль/л (< 200 мг/дл)	
Холестерин	6,2-7,8 ммоль/л (240-300 мг/дл)	Нарушения липидного обмена, если холестерин ЛПНП < 4,6 ммоль/л (< 36 мг/дл)
Холестерин	> 7,8 ммоль/л (> 300 мг/дл)	Нарушения липидного обмена
Триглицериды	> 2,3 ммоль/л (> 200 мг/дл)	

Национальным и региональным экспертами рекомендованы следующие значения отклонений от рекомендуемых значений. Помните, что, следуя рекомендациям, которые относятся к вашей лаборатории пациентов, которые относятся к вашей лаборатории пациентов. Справочные значения могут измениться в зависимости от возраста, пола, типа пробы, диеты и географического местоположения. В соответствии с общепринятой лабораторной практикой каждой лаборатории следует определять собственные референсные значения. При рассмотрении данных результаты всегда следует рассматривать вместе с данными истории болезни и другими диагностическими исследованиями.

Специфические характеристики

Данные, приведенные в этом параграфе, получены при измерениях на анализаторах Beckman Coulter серии ALJ. Характеристики приведенных тестов в данной лаборатории могут отличаться от приведенных данных.

Линейность

Диапазон линейности соответствует значениям концентрации холестерин 0,3-18,8 ммоль/л (20-750 мг/дл).

Воспроизводимость

Средние результаты получены при измерении на ALJ300 3-х сывороточных проб в течение 10-ти дней

Среднее значение, ммоль/л	Внутренняя ошибка			
	Относ. отв. (%)	Относ. абсолют. (SD)	Относ. абсолют. (CV %)	Относ. абсолют. (SD)
0,32	0,02	0,01	0,03	1,08
3,92	0,04	0,15	0,08	1,46
11,36	0,08	0,72	0,12	1,13

Чувствительность

Минимальный предел чувствительности, установленный на анализаторе ALJ300, составляет 0,07 ммоль/л.

Это значение определяется как минимальное измеренное значение холестерин, отличное от нуля. Минимальный предел чувствительности рассчитывается как абсолютное среднее значение плюс три стандартных отклонения при 20-ти повторных измерениях анализа в пробе без постороннего вещества.

Корреляция

При сравнении данных диагностического набора результатов для определения холестерина Сфера 10 на анализаторе ALJ700 с другими методами доступных наборов результатов для определения холестерина использовались сыворотки пациентов. Результаты анализа референсного анализа следующие:

$y = 1,047x - 0,031$	$r = 0,998$	$n = 611$	Диапазон значений в пробе 1,30-12,20 ммоль/л
----------------------	-------------	-----------	--

Влияющие факторы

В исследованиях, проводившихся с целью оценки чувствительности метода к различным влияющим факторам, получены следующие результаты:

Аскорбиновая кислота:	Влияние менее 10% при значениях аскорбиновой кислоты до 8 мг/дл
Углеводы:	Влияние менее 10% при значениях углеводов до 6 мг/дл или до 137 ммоль/л
Гипоксия:	Влияние менее 10% при значениях гемоглобина до 0,15
Липиды:	Влияние менее 3% при значениях липидов (триглицериды) до 1000 мг/дл

Подробную информацию по влияющим факторам можно найти в справочнике Young †

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ЛИСТОВ

- 3. Определитель показателя холестерина — значение, установленное в качестве референса по умолчанию
- † System Calibrator (сет № 88300)
- Значения установлены для единиц СИ (ммоль/л). При работе с единицами единиц, значения могут отличаться на 38,7.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Meier W. Lipid Metabolism. In: Thomas L, ed. Clinical laboratory diagnosis. Use and assessment of clinical laboratory results. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft, 1995:197-198.
2. Allen CC, Poon LB, Chan CB, Richmond W, Fu PC. Enzymatic determination of total serum cholesterol. Clin Chem 1974;20:470-478.
3. World Health Organization (2002) Use of Anticoagulants in Diagnostic Laboratory Investigations (Stability of Blood, Plasma and Serum samples). WHOCLLAB/02.1 Rev.2.1-54
4. Nativel Laboratories America
5. Current status of lipid cholesterol measurement in clinical laboratories in the United States: a report from the Laboratory Standardization Panel of the National Cholesterol Education Program. Clin Chem 1996;34:199-201
6. National cholesterol education program expert panel. Executive summary of the 3rd report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) expert panel on detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult Treatment Panel III). JAMA 2001;286:240-248.
7. Study Group. European Atherosclerosis Society. Guidelines for the prevention of coronary heart disease: A policy statement of the European Atherosclerosis Society. European Heart Journal 1987; 8, 77-88.
8. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACF Press, 2000.

CE

00149

ИЛ.000000.01.01
1999-01

Мини-лаборатория



**BECKMAN
COULTER.**

КАЛЬЦИЙ oCPC (CALCIUM oCPC)

OSR6113

4 x 27 мл

R1

OSR6213

4 x 27 мл

R2

4 x 80 мл

R1

4 x 80 мл

R2

Назначение

Колориметрический фотометрический тест для количественного определения общего кальция в сыворотке, плазме или моче человека на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro

Клиническое значение

Измерение кальция используется для диагностики и лечения заболеваний паренхиматозной печени, различиях состояниях заболеваний, связанных с заболеваниями почек, мочекаменной болезнью и титании (преодоление мышечных сокращений или спазмов).

Общий кальций сыворотки состоит из трех фракций: свободной или ионизированной (50%), связанной с белками (40%), связанной с белками (10%). Большая часть кальция в сыворотке связана с альбумином, а меньшая с глобулинами (10%) и кальций, входящий в состав комплексных соединений, например, фосфатов, цитратов и бикарбонатов (5%). Физиологически наиболее значимой фракцией является ионизированный кальций, однако его трудно измерить непосредственно. Его концентрацию можно измерить по содержанию общего кальция и pH крови, от которого в большой степени зависит уровень ионизированного кальция. Ионы кальция играют важную роль при передаче нервных импульсов, являются кофакторами в ряде ферментативных реакций, необходимы для поддержания нормальной сорбитовости (мемб) и процесса свертывания крови. Значительное снижение концентрации ионов кальция приводит к тетаническим судорогам. Концентрация ионов кальция в моче может служить индикатором функции почек и приводит к мышечной слабости вместе с другими более сложными симптомами.

Принцип определения

Ионы кальция в анализируемой среде реагируют с комплексом о-крезолформальдегида с образованием комплекса пурпурного цвета. Изменение поглощения в реакционной смеси регистрируется фотометрически при 670 нм. Увеличение поглощения прямо пропорционально концентрации кальция в пробе.

Схема реакции



Состав

Концентрация в реакционной смеси:

Этилалкалин (pH 10.0)

0,375 моль/л

8-Гидроксиформальдегид

7,16 моль/л

o-Крезолформальдегид (комплекс)

82,0 моль/л

Общие характеристики

Предназначен для обнаружения и сообщения о результатах.

Реагент R1: Осуществляет реакционно-химические действия, содержит 2-миллилитров (0,35/0,75). Разбавляет (плазма, дилутированная плазма и моча).

Препарат без консервантов.

825 - 0300719, 848, 880. В случае повреждения в смеси немедленно сообщить об этом в ближайшем количестве воды и обратиться к врачу.

Получившаяся в реакционной смеси, перемешать и сразу использовать для анализа. В случае травмы или ухудшения самочувствия немедленно обратиться к врачу (при возможности положить руку в холодную воду). Реагент и воду не пить, не вдыхать.

Утилизировать как обычные отходы.

Уменьшить количество отходов, используя минимальные и соотношения с требованиями санитарно-гигиенического и экологического контроля.

Дополнительная информация приведена в Паспорте безопасности.

Подготовка реагента

Реагент готов к использованию и может быть непосредственно использован в анализаторе.

Хранение и стабильность

Настоящие реагенты стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2...25°C. После вскрытия флакона в его условиях в анализаторе реагент сохраняет стабильность в течение 30 дней.

Использование реактива

Сыворотку или плазму (плазму) сыворотки или плазмы надо аккуратно отделить от эритроцитов, лейкоцитов крови или изоплазмы, содержащих кальций, и использовать для анализа.

Сыворотку и плазму стабилизировать в течение 3 часов при температуре 2-8°C и в течение 7 дней при 15-25°C.

Мочу: Подготовленную 0,1 мл мочи при анализе мочи разбавить 1:10 (или 1:20) и использовать для анализа.

Хранить при температуре 2...8°C.

Применение анализатора

См. Руководство Reagent Guide и инструкцию по эксплуатации для конкретного типа прибора. Есть программы для калибровки проб или других проб с известными значениями.

Калибровка

Использовать калибратор System Calibrator (кат. № 06300) для сывороточных проб и калибратор Urine Calibrator (кат. № 060025) для мочи.

Значения калибратора для мочи, как для сыворотки, так и для мочи, используются до стандартного референсного материала (SRM) 909B, уровня 1 Национального института стандартов и технологий (NIST).

Калибраторы должны использоваться каждый день или при следующей установке.

Синий флакон с реагентом или судостроительным материалом использовать для калибровки.

Проведение профилактического обслуживания анализатора или замены реактивов ула прибор.

10/01

10/01

2009.04

10/01

Поглощение атмосферного CO₂, релаксацию, установившуюся и крайними в анализаторе, снижает стабильность калибровки. В зависимости от режима работы, анализатор лаборатории должен установить свой режим калибровки.

Контроль качества

Можно использовать контрольные материалы для № ODC9003 и ODC9004 или другие контрольные материалы со значениями, установленными для данной модели анализатора Beckman Coulter. В качестве контроля для исследований в моче можно использовать Bland Liquid Urine Chemistry Controls (кат. № 367 и 368) или другие контрольные материалы со значениями, установленными для данной модели анализатора Beckman Coulter. Каждый лабораторный определяет чистоту проведения контроля качества систематически, однако, хороший лабораторный практикой считает использовать измерения вместе с пробными пациентами и после проведения калибровки. Погрешность в отдельных лабораториях могут отличаться от стандартного значения. Поэтому рекомендуется лаборатория для каждого анализа устанавливать свои средние значения и опираться стандартного контроля, на основании индивидуального измерения по установленным правилам. Эти средние значения не должны выходить за пределы соответствующим принятым интервалом, приведенным в соответствующем справочнике.

При обнаружении каких-либо тенденций в изменении значений контроля качества или выявлении отклонений его значений, проверить все аналитические каналы измерения. Каждый лабораторный должен разработать план действий на тот случай, если результаты измерения контроля качества выйдут за установленные пределы.

Расчет

Анализатор Beckman Coulter серии AU автоматически рассчитывает концентрацию кальция в каждой пробе.

Референсные значения

Сыворотка, плазма – взрослые 2,20–2,65 ммоль/л или 8,8–10,6 мг/дл
Сыворотка, дети 0–10 дней 1,80–2,60 ммоль/л или 7,0–10,4 мг/дл
Сыворотка, дети 2–12 лет 2,20–2,70 ммоль/л или 8,5–10,8 мг/дл

Моча

Суточная моча Дневная моча
Женщины < 6,2 ммоль (250 мг) Мужчины и женщины 0,57 ммоль/ммоль (0,2 г/г) креатинина
Мужчины < 7,5 ммоль (300 мг)
Мужчины и женщины ≤ 0,1 ммоль (4 мг/г) массы тела
Маленькие дети: < 0,8 г/г креатинина

Сравнение значений могут изменяться в зависимости от возраста, пола, типа пробы, диеты и географического местонахождения. В соответствии с общепринятой лабораторной практикой каждой лабораторией следует определять собственные референсные значения. При постановке диагноза результаты всегда следует рассматривать вместе с данными истории болезни и другими диагностическими исследованиями.

Специфические характеристики

Данные, приведенные в этом параграфе, получены при измерениях на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Характеристики проведения теста в вашей лаборатории могут отличаться от приведенных ниже.

Линейность

Диапазон линейности соответствует значениям концентрации кальция 0–4,5 ммоль/л (0–18 мг/дл) для сыворотки и плазмы. Линейности соответствует значениям концентрации кальция 0–10 ммоль/л (0–40 мг/дл) для мочи.

Воспроизводимость

Следующие результаты получены при измерениях на AU640 3-х повторных пробах в течение 20-ти дней.

n = 30		Внутренняя серия		Общая	
Среднее значение, ммоль/л	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариабельности (CV %)	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариабельности (CV %)	
2.27	0.04	0.09	0.04	1.72	
2.42	0.02	0.03	0.03	1.14	
3.49	0.02	0.01	0.05	1.46	

Следующие результаты получены при измерениях на AU640 3-х пробах мочи в течение 20-ти дней.

n = 30		Внутренняя серия		Общая	
Среднее значение, ммоль/л	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариабельности (CV %)	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариабельности (CV %)	
1.13	0.02	2.02	0.04	2.93	
4.42	0.05	0.75	0.06	1.33	
9.63	0.05	0.53	0.11	1.17	

Чувствительность

Нижний предел чувствительности, установленный на анализаторе AU640 для сыворотки, составляет 0,03 ммоль/л.

Нижний предел чувствительности, установленный на анализаторе AU2700 для мочи, составляет 0,10 ммоль/л.

Эти значения определяются для минимальных измеримых значений измерения, полученных от нуля. Нижний предел чувствительности рассчитывается как абсолютное среднее значение плюс три стандартных отклонения при 20-ти кратном измерении аналита в пробе без добавленного вещества.

Коррекция

При сравнении данного диагностического набора реактивов для определения кальция в сыворотке ODC9119 на анализаторе AU640 с методом прямой фотометрии, метод ODC9119, сыворотка пациента. Результаты минимального вариабельного анализа следующие:

$y = 0,985x + 0,002$ $r = 0,995$ $n = 709$ Диапазон значений в пробе 1,37–3,57 ммоль/л

При сравнении данного диагностического набора реактивов для определения кальция в моче ODC9113 на анализаторе AU2700 с методом прямой фотометрии, использовались мочи пациентов. Результаты минимального вариабельного анализа следующие:

$y = 0,97x + 0,004$ $r = 0,997$ $n = 126$ Диапазон значений в пробе 0,07–7,73 ммоль/л

Влияющие факторы

В исследовании сывороток, проводившемся с целью оценки чувствительности метода к некоторым влияющим факторам, получены

следующие результаты:

Исходность: Влияние имеет 3% при изменении концентрации до 40 мкг/л или до 0,04 ммоль/л

Гемолит: Влияние имеет 3% при изменении гемоглобина до 6,0 г/л

Липемия: Влияние имеет 10% при изменении гемоглобина (нормализация) до 1000 мкг/л

В исследовании мочы, проводившемся с целью оценки чувствительности метода к некоторым влияющим факторам, получены

следующие результаты:

Азотемия: Влияние имеет 3% при изменении азотемической пробы до 80 мг/дл

Матрикс: Влияние имеет 3% при изменении матрикса до 40 мкг/л

Полностью информация по влияющим факторам можно найти в справочнике Young.¹

Ограничения

Будьте внимательны при интерпретации результатов измерения натрия у пациентов, принимающих в течение предшествующих 24 часов ионистые вещества, содержащие галлий, особенно, если у этих больных снижена функция почек.^{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} В таких случаях исследование следует проводить с помощью неометрических методов, например, калио-селективных или аммониевой оптической. Если нет возможности выполнить неометрические исследования, необходимо брать время до приема контрастных веществ.

Система и программный продукт

Определитель пользователя я Значение, установленное в анализаторе по умолчанию.

1 System Calibration (мет. № 6430) / Urine Calibration (мет. № 0000000)

2 Значения установлены для анализа СА (натрий) / При работе с анализатором «БДЛ» значения следует изменить на 4

3 Значения от калибровки калибровочных веществ в лабораторию

Библиография

1. Thomas L, ed. Clinical Laboratory Diagnosis Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. 1st ed. Frankfurt/Main: TH-Books Verlagsgesellschaft, 1982:21-34.
2. Goldman MJ. An improved automated procedure for the determination of sodium in biochemical specimen. Anal Biochem 1987;161:221-261.
3. Pollack RH, Smith JV. The Spectrophotometric Determination of the Alkali-earth Metals with Murexide, Eriochrome Black T and m-cresolphthalein. Carlsberg Acta 1959; 6:248-258.
4. Kaplan LA, Pesce AJ, eds. Clinical Chemistry Theory, analysis, and correlation, 3rd ed. St Louis: Mosby, 1982:823p.
5. Hains N, Hall WJ, Hoidal WJ. Storage of serum or whole blood samples: Effects of time and temperature on 22 sodium analyses. Clin Chim Acta 1988;170:251-258.
6. NCCLS. Urinary and Collection, Transportation, and Preservation of Urine Specimens: Approved Guidelines NCCLS Document GP16-A2, 2nd ed. Pittsburgh: NCCLS, 1991.
7. Finkler PC, Cope JV, Smith J. Reference information for the clinical laboratory. In: Gurr CA, Ashwood ER, eds. Textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1989:180-189.
8. Young DR. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. ACCC, 6th ed. ACCC Press, 2000.
9. Lin J, Biao M, Park M, Dai A, Bartholomew C, Pollack M, et al. Interference of negative reagents having certain a specific with the potentiometric measurement technique using colorimetric reagents. J Pharm Biomed Analysis 1992;21:931-943.
10. Nemethy PT, Flanagan A, Blandford M. Interference of gold chloride injection (CHLOROCALIN) on the colorimetric determination of serum calcium. Trans J Clin Lab Invest 1988;65:421-428.
11. As recommended to Biochemie Center Biomedical Ltd by Amendment Health, Summary of Product Characteristics CHLOROCALIN, June 1999.

CE

Калибровка

Бустер Calibrator (pat № 65300).

Значения бустера для общего билирубина проследовано до референсного материала (BRM) 909, уровень 1, Национального института стандартов и технологий (NIST).

Калибровку следует проводить при следующих условиях:

Среднее серийного номера реактивов или существенное изменение значений контролей.
Проведение профилактического обслуживания анализатора или замена важных узлов прибора.

Контроль качества

Можно использовать контроль Bichem Caliber (pat. № QOC0003 и QOC0004) или другие контрольные материалы со значениями, установленными для данной модели анализатора Bichem Caliber серии AU.

Каждая лаборатория осуществляет частоту проведения контроля качества самостоятельно, однако, хорошей лабораторной практикой считается не менее одного измерения в каждой сессии анализа по крайней мере один раз в день и после проведения калибровки.

Полученные в отдельной лаборатории результаты могут отличаться от истинного значения. Поэтому рекомендуется лабораториям для каждого анализа устанавливать свои средние значения и отклонения стандартных контролей, на основании многократного измерения по установленным правилам. Эти средние значения не должны выходить за пределы соответствующих пределов материалов, применяемых в соответствии с инструкцией.

После обнаружения какого-либо отклонения в измерениях значений контролей качества или заметных отклонений от значений, проверить все аналитические тесты измерения. Каждой лабораторией следует разработать план действий на тот случай, если результаты измерения контроля качества выйдут за установленные пределы.

Расчет

Анализатор Bichem Caliber серии AU автоматически рассчитывает концентрацию общего билирубина в каждой пробе.

Референсные значения*

Сыворотка (взрослые)	0–21 мкмоль/л (0,3–1,2 мг/дл)
Сыворотка (дети)	
0–1 день	24–149 мкмоль/л (1,4–8,7 мг/дл)
1–2 дня	68–187 мкмоль/л (3,9–11,5 мг/дл)
3–5 дней	26–206 мкмоль/л (1,5–12,0 мг/дл)

Средние значения могут изменяться в зависимости от возраста, пола, типа пробы, даты и географического местоположения. В соответствии с общепринятой лабораторной практикой каждой лаборатории следует определять собственные референсные значения. При получении данных результатов всегда следует рассматривать данные с данными истории болезни и другими диагностическими исследованиями.

Специфические характеристики

Длина, прошедшая в 100 нм калибровку, получены при измерении на анализаторе Bichem Caliber серии AU. Характеристики проверки геста в общей лаборатории могут отличаться от приведенных ниже.

Линейность

Диапазон линейности соответствует значениям концентрации общего билирубина 0–512 мкмоль/л (0–30 мг/дл).

Воспроизводимость

Следующие результаты получены при измерениях на AU000 3-х сывороточных проб в течение 10-ти дней.

n = 60	Внутр. серия		Межсер.			
	Среднее значение, ммоль/л	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	Среднее значение, ммоль/л	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)
7,58	0,10	1,30	0,14	1,78		
17,78	0,17	0,94	0,37	2,08		
222,75	1,12	0,50	3,16	1,41		

Чувствительность

Нижний предел чувствительности, установленный на анализаторе AU000, составляет 0,39 мкмоль/л.

Это значение определяется как наименьшее измеренное значение общего билирубина, отличное от нуля. Нижний предел чувствительности рассчитывается как абсолютное среднее значение плюс три стандартных отклонения при 20-ти повторных измерениях аналита в пробе без исследуемого вещества.

Корреляция

При сравнении данных двух независимых наборов реактивов для определения общего билирубина OBT6112 на анализаторе AU000 с другим независимым доступным набором реактивов для определения общего билирубина использовались сыворотки пациентов. Результаты линейного регрессионного анализа следующие:

$$y = 0,942x + 0,392 \quad r = 0,999 \quad n = 111 \quad \text{Диапазон значений в пробе: 0,66–447,34 мкмоль/л}$$

Влияние факторов

В исследованиях, проводившихся с целью оценки чувствительности метода к некоторым внешним факторам, получили следующие результаты:

Температура: Влияние менее 10% при значениях гемоглобина до 0,45 г/л
Влажность: Влияние менее 10% при значениях гемоглобина (Испытание)² до 1000 мг/дл

В общем, реакция прибора поделена автоматизированной ICM (модель 6000-10000) может быть причиной некорректных результатов.

Подробную информацию по влияющим факторам можно найти в справочнике User's.⁵

Индикаторы и предупреждающие лампы

Эти лампы служат индикатором для двух программ: PRLC и DELD. Тест следует запрограммировать как тест с бланком пробы (SAMPLE BLANK) или как INTER RELATED TEST.

1. Определяется полярность лампы. 2. Значения, установленные в анализаторе по умолчанию.

3. Бустер Calibrator (pat № 65300).

4. Значения установлены для серии: 0 (микро/л). При работе с другими мазками, значения следует делять на 17.

5. Для программы бланка следует запрограммировать диапазон фактора от 0,000 до 0,000.

6. Запрограммируйте тест как: SAMPLE BLANK в COMMON TEST PARAMETERS TEST NAME SAMPLE BLANK.

ЛИТЕРАТУРА

1. Thomas L. Bittern. In: Thomas L, ed. Clinical laboratory diagnostics. Use and assessment of clinical laboratory results. Frankfurt/Main: TH-Books Verlagsgesellschaft, 1998:192-202.
2. Gelstein WF, Shaw LM. Liver Functions. In: Tietz NW, ed. Fundamentals of clinical chemistry. Philadelphia:WB Saunders Company, 1987:733-737.
3. Tietzen NG. Rujin Liver Functions. In: Burke CA, Ashwood ER, eds. Tietz textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1996:1136-1137.
4. Elvel W, Nel W, Schout Y, Teyler G, Vlasov H, Zeebe S, et al. Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. WHOQOL/ABN 1 Rev 2: 24pp.
5. Pablar PC, Cope JY, Smith JL. Reference information for the clinical laboratory. In: Burke CA, Ashwood ER, eds. Tietz textbook of clinical chemistry. Philadelphia:WB Saunders Company, 1996:1809pp.
6. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACN Press, 2000.

CE



**BECKMAN
COULTER.**

ПРЯМОЙ БИЛИРУБИН (DIRECT BILIRUBIN)

QSR6111

4 x 6 мкл
4 x 8 мкл

R1 DBLC
R1 DBLB

QSR6211

4 x 20 мкл
4 x 20 мкл

R1 DBLC
R1 DBLB

Назначение

Колориметрический фотометрический тест для количественного определения прямого билирубина в сыворотке или плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro

Клиническое значение^{1,2}

60-85% образующегося за день билирубина производится из гемоглобина, высвобождаемого из физиологически стареющих эритроцитов. Считается, что 15-20% является результатом распада клеток желтого костного мозга, тканей или нестойкого цвета в результате неадекватного кровообращения. Ряд заболеваний вызывает билирубин на один и более этапов, соответствующих процессу, потреблению, хранению, метаболизму и экскреции билирубина. В зависимости от заболевания сыворотный или мочевой билирубин, или оба, в основном и приводят к гипербилирубинемии. Гипербилирубинемия является симптомом, который классифицирует следующие образцы: Предпочтительная картина — комбинация анамнестического происхождения, при которой преобладают повышенные содержания неконъюгированного билирубина, включая конституциональный семейный гипербилирубинемия, синдром Желтуха-Майлора и синдром Желтуха, в то же время повышенные содержания конъюгированного билирубина при синдроме Дубина-Джонсона и синдроме Ротора. Дифференциальная диагностика между конституциональными гипербилирубинемиями и приобретенными типами гипербилирубинемии осуществляется посредством измерения фракций билирубина и определения нормальной активности печеночных ферментов.

Печеночная желтуха, заболевание печени с первичным нарушением процесса конъюгации билирубина, является острой и хронической вирусной гепатит, цирроз печени и гепатоцеллюлярная дисфункция.

Постепенная картина: увеличение неконъюгированного происхождения с первичными нарушениями процесса конъюгации билирубина, включая анамнестический характер и отторжение после парентерального питания.

К конституциональным гипербилирубинемиям относятся гипербилирубинемия сыворотки новорожденного билирубин при синдроме Кригелера-Майлора и синдроме Желтуха, в то же время повышенные содержания конъюгированного билирубина при синдроме Дубина-Джонсона и синдроме Ротора. Дифференциальная диагностика между конституциональными гипербилирубинемиями и приобретенными типами гипербилирубинемии осуществляется посредством измерения фракций билирубина и определения нормальной активности печеночных ферментов.

Применение аппарата³

Стандартизованная автоматизированная система 3,5-волноводной фотометрии (DFD), реагирует с прямым билирубином в жидкой среде с образованием хромофора. Значения абсорбции при 578 нм прямо пропорциональны концентрации прямого билирубина в пробе.

Схема реакции

Билирубин + DFD



Абсорбируемый

Ссылки

Концентрация в реакционной смеси
3,5-волноводной фотометрии 0,07 Миллимоль

Общие предостережения

Предупреждения об опасности о резких:

DBLB и DBLC. Содержит раздражающие вещества. Содержит серную кислоту. R38 вызывает сильную коррозию.

Правила безопасности

620, 625, 630, 635/7739, 645, 650. Во время работы не пить и не применять пищу. В случае попадания в глаза, немедленно промыть большим количеством воды и проконсультироваться с врачом. Никогда не добавляйте воду в эти реагенты. Наденьте защитные очки и перчатки. Если после неосторожного обращения с реагентами почувствуете себя плохо, немедленно обратитесь за медицинской помощью. По возможности предоставьте описание реакции. Реагенты и воду из-под них необходимо утилизировать на опасные отходы.

Утилизировать отработанные реакционные материалы в соответствии с требованиями соответствующего законодательства и экологического контроля.

Дополнительная информация приведена в Паспорте безопасности.

Протокол реагента

Реагенты готовы к использованию и могут быть непосредственно установлены в анализатор.

Хранение и стабильность

Несколько лет, в холодильнике, от места, стабильно до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8 °C. После вскрытия реагенты стабильны 21 день при хранении в анализаторе.

Использованный материал

Сыворотка и плазма (человек)

В сыворотке и плазме прямой билирубин, в зависимости от дозы, стабильны в течение 3-х дней при 15-25 °C.

Для слабой гемолитической пробой причиной ложноположительного результата билирубина, из-за гемолитической пробой использовать не следует. Не используйте дилуционные пробы.

Примечание анализа

См. Руководство Reader Sdk и соответствующую инструкцию для конкретного типа пробы. Есть несимметричная программа для проб с несбалансированным содержанием билирубина.

Калибровка

Beckman Coulter (ит. № 00300).

Значения калибратора просматриваются до Beckman Coulter Master Calibration.

Калибровку следует проводить через каждые 21 день или при следующих условиях:

Смена серийного номера реактивов или существенного изменением значений контролей.

Проведение профилактического обслуживания анализатора или замена какого-либо прибора

Контроль качества

Каждое исследование контролируется (ит. № 000003 и 000004) или другими контрольными материалами, со значениями, установленными для данной модели анализатора Beckman Coulter серии AU. Каждый лабораторией обеспечивает частоту проведения контроля качества самостоятельно, однако, хорошей лабораторной практикой считается не исключение измерения вместе с пробой пациента и после проведения калибровки.

Полученные в отдельной лаборатории результаты могут отличаться от лабораторных значений. Поэтому рассматриваются лаборатории для каждого анализа устанавливать свои средние значения и отклонения стандартного контроля, на основании лабораторного измерения по установленным правилам. Эти данные значения не должны выходить за пределы соответствующей принятой интервала, приведенных в соответствующем справочнике.

При обнаружении таких либо тенденций в измерениях значений контроля качества или значимых отклонений его значений, проверить все аналитические эти значения. Каждой лабораторией следует разработать план действий на тот случай, если результаты измерения контроля качества выйдут за установленные пределы.

Расчет

Анализаторы Beckman Coulter серии AU автоматически рассчитывают концентрацию прямого билирубина в каждой пробе.

Рекомендуемые значения

Возрастные и даты < 3,4 ммоль/л ($< 0,2$ мг/дл)

Средние значения могут изменяться в зависимости от возраста, пола, типа пробы, даты и географического местонахождения. В лабораториях с общепринятой лабораторной практикой каждой лабораторией следует определить собственные референсные значения. При постановке диагноза результаты всегда следует рассматривать вместе с данными истории болезни и другими диагностическими исследованиями.

Специфические характеристики

Данные, приведенные в этом параграфе, получены при измерениях на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Характеристики приведенные тесты в этой лаборатории могут отличаться от приведенных здесь.

Линейность

Диапазон линейности соответствует значениям концентрации билирубина 0–171 ммоль/л (0–10 мг/дл).

Воспроизводимость

Следующие результаты получены при измерениях на AU600 3-х повторных пробах в течение 30-ти дней.

Входное значение, ммоль/л	Выходные данные			
	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV) %	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV) %
10	0,19	1,9	0,32	3,2
17	0,28	1,6	0,50	2,9
110	1,34	1,2	2,55	2,3

Чувствительность

Нижний предел чувствительности, установленный на анализаторе AU600, составляет 0,24 ммоль/л.

Это значение определяется как наименьшее измеренное значение билирубина, отнесенное от нуля. Нижний предел чувствительности рассчитывается как абсолютное среднее значение плюс три стандартных отклонения при 20-ти кратном измерении аналита в пробе без последующего разбавления.

Коррекция

При сравнении данного диагностического набора с реактивами для определения прямого билирубина OSGRE111 на анализаторе AU600 с другим измерительным доступным набором реактивов для определения прямого билирубина использовались сыворотки пациентов.

Результаты линейного регрессионного анализа следующие:

$y = 0,70x - 0,7$	$r = 0,998$	$n = 69$	Диапазон значений в пробе 0,2–181,6 ммоль/л
-------------------	-------------	----------	---

Внешние факторы

В исследовании, проводившемся с целью оценки чувствительности метода к некоторым внешним факторам, получены следующие результаты:

Липемия. Влияние менее 10% при значениях липидов (холестерин[®]) до 300 мг/дл.

В иных редких случаях повышенная концентрация били (высокобелочинный белок) может быть причиной некорректных результатов.

Подробную информацию по внешним факторам можно найти в справочнике User's.

Ссылки и дополнительные ресурсы

3. Эти параметры служат основой для двух программ: DBILC и DBILB. Тест следует запрограммировать как тест с бланком пробы (SAMPLE BLANK) и/или INTER RELATED TEST.

4. Определенные пользователи: а) Значения, установленные в анализаторе по умолчанию.

5. Внутр. калибровка (ит. № 00300).

6. Значения установлены для единиц СИ (ммоль/л). При работе с единицами мг/дл, значения следует разделить на 17,1.

7. Для программы бланк следует запрограммировать диапазон фактора от -00000 до 00000.

8. Запрограммируйте тест как SAMPLE BLANK а COMMON TEST PARAMETERS TEST NAME: SAMPLE BLANK.

И

Модель

OSGRE111.01
3000.00

AU 21

CE



БИЕЛИСТОГРАФИЯ

1. Thomas L. Blumberg, Jr. Thomas L., ed. Clinical laboratory diagnostics. Use and assessment of clinical laboratory results. Frankfurt/Main: TH-Books Verlagsgesellschaft, 1986. 192-93С.
2. Balston WF, Shaw LM. Liver function. In: Tietz RM, ed. Fundamentals of clinical chemistry. Philadelphia PA: Saunders Company, 1967. 723-737.
3. Hymers van den Burch AA, Mueller P. Ueber eine direkte und indirekte determination von Bilirubin. Biochem Z. 1918. 77-80.
4. Young DB. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. JACC Press, 2000.

Полученные в опытной лаборатории результаты могут отличаться от истинного значения. Поэтому рекомендуется лаборатория для каждого анализа устанавливать свои средние значения и проводить специфический контроль на основании индивидуального номера или установившейся практики. Эти средние значения не должны превышать 35 градусов соответствующим принятым интервалам, приведенным в соответствующем стандарте.

При обнаружении пяти или более отклонений или значимых изменений концентрации или значений отклонений во времени, проводимых для аналитических целей измерения. Каждой лаборатории следует разработать свои действия на тот случай, если результаты измерений контроля качества будут за установленные пределы.

Риски

Анализаторы Beckman Coulter серии AU автоматически рассчитывают концентрацию альбумина в каждой пробе.

Референтные значения^{1,2}

Сыворотка (Взрослые)	38-52 г/л (3,8-5,2 г/дл)
Сыворотка (Новорожденные от 0 до 4 дней)	28-44 г/л (2,8-4,4 г/дл)

Средние значения могут измениться в зависимости от возраста, пола, телосложения, диеты и географического местоположения. В соответствии с общепринятой лабораторной практикой каждая лаборатория должна определять собственные референтные значения. При постановке диагноза результаты всегда следует рассматривать вместе с данными истории болезни и другими диагностическими исследованиями.

Стандартные характеристики

Данные, приведенные в этом параграфе, получены при измерении на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Характеристики, приведенные здесь в этой лаборатории могут отличаться от приведенных здесь.

Линейность

Диапазон линейности соответствует значениям концентрации альбумина 18-80 г/л (1,8-8,0 г/дл).

Воспроизводимость

Следующие результаты получены при измерениях на ALBUO 2-х сывороточных пробах в течение 10-ти дней

n = 66	Внутренняя оценка		Общая	
Среднее значение, г/л	Станд. откл. (SD)	Внутр. коэффициент CV, %	Станд. откл. (SD)	Внутр. коэффициент CV, %
26.04	0.43	1.60	0.63	2.62
42.80	0.80	1.17	0.87	1.85
57.77	0.83	0.82	1.04	1.79

Чувствительность

Наименьший предел чувствительности, установленный на анализаторе ALBUO, составляет 0.07 г/л.

Это значение определяется как наименьшее измеренное значение альбумина, отнесенное к нулю. Наименьший предел чувствительности рассчитывается как абсолютное среднее значение плюс три стандартных отклонения при 20-ти кратном измерении анализа в пробе без исследуемого вещества.

Корреляция

При сравнении данных диагностического набора реагентов для определения альбумина SURE102 на анализаторе ALBUO с другим коммерческим диагностическим набором реагентов для определения альбумина были использованы сыворотки пациентов. Результаты измерения независимого анализа следующие:

$y = 0.852x - 3.950$	$r = 0.994$	$n = 121$	Диапазон значений в пробе: 11,70-60,66 г/л
----------------------	-------------	-----------	--

Влияющие факторы

В исследованиях, проводившихся с целью оценки чувствительности метода к различным влияющим факторам, получены следующие результаты:

Нестабильность: Влияние менее 1.0% при уровнях альбумина до 40 г/дл или до 684 ммоль/л

Гематокрит:

Влияние менее 1.0% при уровнях гематокрита до 4,5 г/л

Липемия:

Влияние менее 3.0% при уровнях липидов (триглицеридов) до 800 мг/дл

В очень редких случаях повышение неспецифических IgM (иммуноглобулинов) может вызвать ложно повышенные результаты.

Подробную информацию об влияющих факторах можно найти в справочнике Young³

Ссылки и дополнительные ресурсы

¹ Справочник по клинической химии. Значения, установленные на анализаторе по запросу.

² Synchron Clinical (сер. № 06300)

³ Значения установлены для анализа CH (г/л). Для работы с концентрацией г/дл значения следует разделить на 10

Библиография

1. Bond OH, Schwartz LM, Christensen RH. Amino acids and proteins. In: Tietz NW, ed. Fundamentals of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1987:328-329.
2. McCracken RH. Protein profiles. In: Henry JB, ed. Clinical diagnosis and management by laboratory methods. Philadelphia: WB Saunders Company, 1989:244-245.
3. Young DT, Weston NH, Begg HG. Albumin standards and the measurement of serum albumin with bromocresol green. Clin Chim Acta 1971;21:87-90.
4. Young DT, ed. Effects of preanalytical variables on clinical laboratory tests. 2nd ed. Washington: AACC Press, 1987:3-10-3-19.
5. Baudouin B, Del F. Standardization of the measurement of 14 proteins in human serum based on the new IFCC/CCCLAP international reference material CRM 470. J Lab Med 1994;25:140-152.
6. Partridge PC, Cope JV, Smith J. Reference information for the clinical laboratory. In: Burke CA, Ashwood ER, eds. Textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1999: 1992pp.
7. Young DT. Effects of drugs on clinical laboratory tests. 6th ed. AACC Press, 2000.

CC



**BECKMAN
COULTER.**

КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА СК-МВ УРОВЕНЬ 2 (СК-МВ CONTROL SERUM LEVEL 2)

DOB30028

9 x 2 мл

(Черная крышка)

Назначение

Контрольная сыворотка с СК-МВ Уровня 2 (СК-MB Control Serum Level 2) представляет собой физиологическую сыворотку человека. Она предназначена для проверки контроля точности и воспроизводимости при калибровке СК-МВ с использованием диагностического набора (Сыворотка (50) на анализаторе Beckman Coulter Serum ALI. Только для информации и т.д.).

Состав

Искусственно созданная сыворотка человека, содержащая иммуноглобулин МВ человеческого.

Общие предостережения

Учтите, что это чувствительные расходные материалы и обращайтесь с ними в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и биобезопасности контроля.

Биологические материалы человеческого происхождения не были протестированы на наличие агентов в ИСВ, ИВ 1/2, а также ИВ в течение 6 месяцев с трансформации FEA в биологические материалы, подвергнутые радиационной стерилизации в течение 30 минут для предотвращения. Не гарантируется отсутствие заболеваний, который бы гарантировал полную безопасность биологической безопасности биологических материалов. Если вы планируете использовать, пожалуйста, обратитесь к подразделу биобезопасности, или к подразделу биобезопасности.

Процедура контроля

1. Аккуратно снимите с флакона крышку и выньте реакционную пробирку, не допуская потери дифференцированного материала.
2. С помощью чистой пипетки добавьте во флакон точно 2,9 мл стерильной деионизированной воды (температурой 18 - 20°C).
3. Закрыйте флакон резиновой пробойкой и тщательно содержите, чтобы предотвратить потерю флакона в течение 30 минут. Не допускайте образования пены.
4. Параллельно продолжайте до полного растворения дифференциала и получения гомогенного раствора.
5. Заполните дату проведения контроля на этикетке флакона.

Хранение и стабильность

Незамороженный СК-МВ стабилен до даты, указанной на этикетке, при условии его хранения при температуре 2 - 8°C. Незамороженный СК-МВ стабилен до даты, указанной на этикетке, при условии его хранения при температуре 2 - 8°C. Расходный материал при отсутствии загрязнения и задерживании прилипания флакона сразу же после метода использования, стабилен 6 дней при температуре 2 - 8°C. В случае - при температуре 15 - 25°C, 4 недели - при -30°C (экстремальное замораживание).

Потенциальная опасность

СМ соответствует уровню инфекции и диагностическому набору.

Любая лаборатория осуществляет проверку проведения контроля качества самостоятельно, однако хорошей лабораторной практикой считается не включать материал вместе с пробой на наличие и после формирования сыворотки.

Результаты, полученные в стандартной лаборатории, могут отличаться от установленных значений. Поэтому рекомендуется любой лабораторией для каждого анализа устанавливать свои средние значения и отклонения от стандартного контроля, не assuming неопределенности измерения по установленным параметрам. Эти средние значения не должны выходить за пределы соответствующего принятого метода, приведенного в прилагаемой таблице.

При обнаружении каких-либо отклонений в значительных значениях контроля качества или результатов отклонений его значений, проводите все необходимые шаги проверки и работы параметры лаборатории. Каждый лаборатория может разработать свои действия на тот случай, если результаты и материалы контроля выйдут за установленные пределы.

Установленные значения

См. таблицу установленных средних значений и допустимых отклонений.

Значения СК-МВ в контроле СК-МВ Уровня 2 (Control Serum Level 2) стандартизированы с использованием стандартного метода ИСВ для определения общей СК ИСВ с добавлением агентов: калибровки и расчета с учетом значений калибровки калибровки системы с

CE



**BECKMAN
COULTER.**

КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА СК-МВ УРОВЕНЬ 1 (СК-МВ CONTROL SERUM LEVEL 1)

00R30034

9 x 2 мл

(Белая крышка)

Назначение

Контрольная сыворотка с СК-МВ Уровень 1 (СК-МВ Control Serum Level 1) представляет собой биоинформационную сыворотку чистоты. Она предназначена для проведения контроля точности и воспроизводимости при измерении СК-МВ с использованием диагностического набора (00R3155) на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики ≥ 18 лет.

Состав

Биоинформационная сыворотка человека, содержащая коэффициент МВ кристаллизована.

Общая информация

Упаковка сыворотки расфасована в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и медицинского контроля.

Биологические материалы человеческого происхождения были протестированы на наличие антител к HCV, HIV 1/2, а также Hbs антигена в соответствии с требованиями FDA и были признаны отрицательно реагирующими в используемых тестах для каждого донора.

Но поскольку не существует метода исследования, который бы гарантировал полную инфекционную безопасность биоматериала человеческого происхождения, рекомендуется обращаться с подобными биоматериалами, как с потенциально инфицированными.

Подготовка к контролю

1. Аккуратно смешайте с флаконом крышку и выньте разовую пробку, не допуская потерь биоинформационного материала.
2. С помощью чистой палочки, действуйте со флаконом только 20 мл стерильной деионизированной воды с температурой 16 - 25 °C.
3. Извлеките флакон разовой пробкой и раскройте оборудование, тщательно вымойте флакон в течение 30 минут. Не допускайте образования пены.
4. Перекрытием продолжайте до полного расширения биоинформационного и получения гомогенного раствора.
5. Запишите дату приготовления контроля на этикетке флакона.

Хранение и стабильность

Насыщенный контроль СК-МВ стабилен до даты, указанной на этикетке, при условии его хранения при температуре 2 - 8 °C.

Насыщенный контроль СК-МВ стабилен до даты, указанной на этикетке, при условии его хранения при температуре 2 - 8 °C.

Растворенный контроль при условии хранения и закрытия крышки флакона сразу же после каждого использования, стабилен 6 дней при температуре 2 - 8 °C, 4 часа - при температуре 18 - 25 °C, 4 недели - при - 20 °C (при условии замораживания).

Примечание

См. составительскую инструкцию к диагностическому набору

Любая лаборатория определяет частоту проведения контроля качества самостоятельно, однако хорошей лабораторной практикой считается не реже одного измерения в месяц с пробой пациентов и после проведения калибровки.

Результаты, полученные в отдельной лаборатории, могут отличаться от установленных значений. Поэтому рекомендуется любой лабораторией для каждого анализа устанавливать свои средние значения и отклонения специфического контроля, на основании лабораторного измерения по установленным пределам. Эти средние значения не должны выходить за пределы соответствующих критериев интервала, приведенных в приложенной таблице.

При обнаружении каких-либо тенденций в изменении внешнего контроля качества или выявлении отклонений его значений, проверьте все аналитические этапы измерения и рабочие параметры анализатора.

Каждой лаборатории следует разработать план действий на тот случай, если результаты измерения контроля выйдут за установленные пределы.

Установленные значения

См. таблицу установленных средних значений и диапазонов допустимых значений.

Значение СК-МВ в контроле СК-МВ уровень 1 (Control Serum Level 1) стандартным способом с использованием стандартного метода FCC для определения общей СК [СК(общ)] с добавлением антител: измерения и расчеты с учетом значения коэффициента поправки ассоциации с.



**BECKMAN
COULTER.**

СК-МВ КАЛИБРАТОР (СК-МВ CALIBRATOR)

QDR30034

6 x 1 мл

(Белая крышка)

Назначение

СК-МВ калибратор (СК-МВ Calibrator) – предназначен для использования с реактивами СК-МВ QDR01105 для количественного определения активности СК-МВ на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Этот калибратор изготовлен на основе сыворотки человека. Только для диагностики in vitro.

Состав

Лифофилированная сыворотка человека, содержащая изофермент СК-МВ креатинкиназы (СК-МВ).

Основные характеристики

Упакованные отбеленные расфасованные материалы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля биологических материалов человеческого происхождения, содержащихся в данном продукте, были протестированы на наличие вирусов в HCV, HIV 1/2, в тазов НВs антигена в соответствии с требованиями FDA, и были признаны отрицательно реагирующими в вышеуказанных тестах для каждого донора. Но, поскольку не существует метода исследования, который бы гарантировал полную инфекционную безопасность биоматериалов человеческого происхождения, рекомендуется обращаться с подобными биоматериалами, как с потенциально инфицированными.

Подготовка к использованию

1. Аккуратно снимите с флакона крышку и извлеките реактивную пробирку, не допуская потери лиофилированного материала.
2. С помощью мягкой палочки добавьте лиофилированный материалу точно 1,0 мл стерильной деионизированной воды с температурой 18... 20°C.
3. Закройте флакон реактивной пробиркой и растворите содержимое, плавно вращая флакон в течение 30 минут. Не допускайте образования пены.
4. Продолжайте перемешивание до полного растворения и лиофилированного материала и получения однородного раствора.
5. На этикетке флакона наклейте дату приготовления калибратора.

Хранение и стабильность

Наликольный калибратор СК-МВ (СК-МВ Calibrator) стабилен до даты, указанной на этикетке, при условии его хранения при температуре 2-8°C. После вскрытия калибратор стабилен 5 дней при условии хранения при 2-8°C, отсутствия замораживания и вскрытия крышки флакона сразу же после первого использования; 8 часов – при 15 - 25°C и 4 недели – при -20°C (однократное замораживание).

Процедура анализа

См. соответствующую инструкцию по использованию набора реактивов.

Упаковочные материалы

См. таблицу упаковки для калибратора.

Этикетка для Калибратора СК-МВ (СК-МВ Calibrator) стандартизована по методу референсного метода FCC для общей креатинкиназы (СК) с добавлением антигенов, в число которых и реактив с использованием этикетки коэффициента калибровки включен.

CE



**BECKMAN
Coulter.**

КАЛИБРАТОР D-ДИМЕРА (D-DIMER CALIBRATOR)

ODR3033

2 x 2,5 мл
2 x 0,5 мл

Калибратор-1
Калибратор-2

(СИМВЛ ВЕРИФИКА)
(СИМВЛ ВЕРИФИКА)

Назначение

Калибратор D-димера (D-Dimer Calibrator) предназначен для использования с реактивами D-Dimer ODR99195 для количественного определения D-димера в человеческой плазме на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Этот калибратор представляет собой лиофилизированный сыпучий материал человека. Только для диагностики in vitro.

Состав

Calibrator 1 (Калибратор-1): лиофилизированный материал человека

Calibrator 2 (Калибратор-2): лиофилизированный сыпучий материал человека, содержащий D-димер и консервант.

Область применения

Предназначен для диагностики в форме реактива:

Опасен, содержит биологический материал.

R22: Опасен при проглатывании

R60/63: Опасен для водных организмов. Может оказывать продолжительное неблагоприятное воздействие на водную окружающую среду.

См.:

Правила безопасности:

935, 936: При работе используйте защитную одежду. Калибратор и его упаковку следует утилизировать как опасные отходы.

937: Не допускайте попадания во внешнюю окружающую среду. См. специальные инструкции/инструкции безопасности.

Соблюдайте обычные меры предосторожности, принятые при работе с лабораторными реактивами.

Во избежание загрязнения окружающей среды после использования калибратора утилизируйте все использованные материалы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Паспорт безопасности может быть предоставлен по запросу.

Биологический материал человека/чужака, содержащийся в реактиве, был протестирован на наличие антигена к HCV, HIV 1/2, а также HBs антигена и соответствия с требованиями FDA и были признаны отрицательными в отношении реактивных и антивирусных тестов для каждого димера. Не следует использовать материал для исследования, который бы характеризовал какую-либо информацию. Безопасность биоматериала человека/чужака, производимого, рекомендуется обращаться с подобными биоматериалами как с потенциально инфекционными.

Пакетирование калибратора

1. Калибратор-1 D-димера (D-Dimer Calibrator 1) поставляется в виде порошка.
2. Альтернативно можно использовать порошок в флаконе с Калибратором-2 D-димера (D-Dimer Calibrator 2), не допускает вытекания, лиофилизированного материала.
3. С помощью мерной пипетки добавьте к лиофилизированному материалу точно 0,5 мл стерильной деионизированной воды (температура 18...20°C).
4. Заверните флакон резиновой пробой. Сохраняйте раствор, избегая перевертывания флакона в течение 30 минут. Не допускайте образования муты.
5. На этикетке флакона наклейте дату приготовления калибратора.
6. Приготовьте калибратор, разведя его в воде, как описано в инструкции к набору калибраторов (D-Dimer Calibrator ODR3033) инструкции. Не допускайте замораживания при подготовке разведенного калибратора.

Хранение и стабилизация

Неиспользуемый калибратор стабилен до даты, указанной на этикетке, при условии его хранения при температуре 2-8°C. После приготовления калибратор 2 (Calibrator 2) стабилен 1 день при условии хранения при 18...20°C, 28 дней -2...8°C или 30 дней - при 25°C (ускоренное замораживание), при отсутствии замораживания и замораживания при температуре 2-8°C после приготовления.

Правила анализа

См. соответствующую инструкцию по использованию набора реактивов.

Утилизированные материалы

См. таблицу значений для калибратора.

Значения для калибратора D-димера устанавливаются с использованием другого калибратора деионизированной воды для иммунобидификационного определения D-димера и единицы вт FEU/ml.

CE

Kerns/Barro HbA1c	
HbA1c Calibration	
Kerns/Barro 1	10.0
Kerns/Barro 2	9.0
Kerns/Barro 3	8.0
Kerns/Barro 4	7.0
Kerns/Barro 5	6.0
Kerns/Barro 6	5.0
Kerns/Barro 7	4.0
Kerns/Barro 8	3.0
Kerns/Barro 9	2.0
Kerns/Barro 10	1.0
Kerns/Barro 11	0.0

Следует отметить, что в настоящее время в России не существует единой системы учета и контроля за деятельностью некоммерческих организаций. В настоящее время в России не существует единой системы учета и контроля за деятельностью некоммерческих организаций. В настоящее время в России не существует единой системы учета и контроля за деятельностью некоммерческих организаций.

Case Study

Frequency: 1
Frequency margin: 0.4%, p4 13
QAB: 2.5%
Tiering: X-100
Xenon: 1

Luminescence: 2+
Built-in calibration: 600nm
Dipole: p4 3.0
Firmware:

DELIVERING THE MOST EFFECTIVE ECONOMIC AND MARKETING SOLUTIONS

Содержание Все книги расположены по алфавиту по издателям. Книжки в рубрике "Детская литература" расположены по возрастному критерию. Книжки в рубрике "Литература для подростков" расположены по авторам. Книжки в рубрике "Литература для взрослых" расположены по авторам. Книжки в рубрике "Литература для взрослых" расположены по авторам.

THEORETICAL BACKGROUND

Abstract. The effect of the concentration of the active component of the disinfectant solution on the efficiency of its action against the microorganisms was studied. It was shown that the efficiency of the disinfection process increases with increasing the concentration of the active component of the disinfectant solution. The optimal concentration of the active component of the disinfectant solution was determined. The results of the study are presented in the form of graphs and tables.

Хотите ли стать успешнее?

[illegible]

Discussion

Can the Internet help or hurt people? Can it help or hurt people?

CM, Trademark and Patent Law

[illegible]

INTERVIEW PART 1

[illegible]

Kainic acid, meso-erythric		
[Proteinuria Gallipator]		
1 x 2	1	(Erythra up-100)
1 x 2	2	(Kainic up-100)
1 x 2	3	(Kainic up-100)
1 x 2	4	(Kainic up-100)
1 x 2	5	(Kainic up-100)
1 x 2	6	(Kainic up-100)
1 x 2	7	(Kainic up-100)
1 x 2	8	(Kainic up-100)
1 x 2	9	(Kainic up-100)
1 x 2	10	(Kainic up-100)
1 x 2	11	(Kainic up-100)
1 x 2	12	(Kainic up-100)
1 x 2	13	(Kainic up-100)
1 x 2	14	(Kainic up-100)
1 x 2	15	(Kainic up-100)
1 x 2	16	(Kainic up-100)
1 x 2	17	(Kainic up-100)
1 x 2	18	(Kainic up-100)
1 x 2	19	(Kainic up-100)
1 x 2	20	(Kainic up-100)
1 x 2	21	(Kainic up-100)
1 x 2	22	(Kainic up-100)
1 x 2	23	(Kainic up-100)
1 x 2	24	(Kainic up-100)
1 x 2	25	(Kainic up-100)
1 x 2	26	(Kainic up-100)
1 x 2	27	(Kainic up-100)
1 x 2	28	(Kainic up-100)
1 x 2	29	(Kainic up-100)
1 x 2	30	(Kainic up-100)
1 x 2	31	(Kainic up-100)
1 x 2	32	(Kainic up-100)
1 x 2	33	(Kainic up-100)
1 x 2	34	(Kainic up-100)
1 x 2	35	(Kainic up-100)
1 x 2	36	(Kainic up-100)
1 x 2	37	(Kainic up-100)
1 x 2	38	(Kainic up-100)
1 x 2	39	(Kainic up-100)
1 x 2	40	(Kainic up-100)
1 x 2	41	(Kainic up-100)
1 x 2	42	(Kainic up-100)
1 x 2	43	(Kainic up-100)
1 x 2	44	(Kainic up-100)
1 x 2	45	(Kainic up-100)
1 x 2	46	(Kainic up-100)
1 x 2	47	(Kainic up-100)
1 x 2	48	(Kainic up-100)
1 x 2	49	(Kainic up-100)
1 x 2	50	(Kainic up-100)
1 x 2	51	(Kainic up-100)
1 x 2	52	(Kainic up-100)
1 x 2	53	(Kainic up-100)
1 x 2	54	(Kainic up-100)
1 x 2	55	(Kainic up-100)
1 x 2	56	(Kainic up-100)
1 x 2	57	(Kainic up-100)
1 x 2	58	(Kainic up-100)
1 x 2	59	(Kainic up-100)
1 x 2	60	(Kainic up-100)
1 x 2	61	(Kainic up-100)
1 x 2	62	(Kainic up-100)
1 x 2	63	(Kainic up-100)
1 x 2	64	(Kainic up-100)
1 x 2	65	(Kainic up-100)
1 x 2	66	(Kainic up-100)
1 x 2	67	(Kainic up-100)
1 x 2	68	(Kainic up-100)
1 x 2	69	(Kainic up-100)
1 x 2	70	(Kainic up-100)
1 x 2	71	(Kainic up-100)
1 x 2	72	(Kainic up-100)
1 x 2	73	(Kainic up-100)
1 x 2	74	(Kainic up-100)
1 x 2	75	(Kainic up-100)
1 x 2	76	(Kainic up-100)
1 x 2	77	(Kainic up-100)
1 x 2	78	(Kainic up-100)
1 x 2	79	(Kainic up-100)
1 x 2	80	(Kainic up-100)
1 x 2	81	(Kainic up-100)
1 x 2	82	(Kainic up-100)
1 x 2	83	(Kainic up-100)
1 x 2	84	(Kainic up-100)
1 x 2	85	(Kainic up-100)
1 x 2	86	(Kainic up-100)
1 x 2	87	(Kainic up-100)
1 x 2	88	(Kainic up-100)
1 x 2	89	(Kainic up-100)
1 x 2	90	(Kainic up-100)
1 x 2	91	(Kainic up-100)
1 x 2	92	(Kainic up-100)
1 x 2	93	(Kainic up-100)
1 x 2	94	(Kainic up-100)
1 x 2	95	(Kainic up-100)
1 x 2	96	(Kainic up-100)
1 x 2	97	(Kainic up-100)
1 x 2	98	(Kainic up-100)
1 x 2	99	(Kainic up-100)
1 x 2	100	(Kainic up-100)

Kontaktieren Sie uns: Pyramiden Center für integrative Medizin GmbH, Kurfürstendamm 109, 10785 Berlin
Telefon +49 30 6909 17-0, Fax +49 30 6909 17-10, E-Mail kontakt@pyramidencenter.de,
www.pyramidencenter.de

Costing

COSMOS, **more than ever before**

On representing non-integer dimensions

Вывод.
Учитывая выше описанные недостатки взаимодействия с преподавателями, необходимо разработать и внедрить комплекс мер по их устранению.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Политическая эволюция
Кремлевский политик и экономист Юрий Лужков, бывший губернатор Москвы, заявил, что не планирует участвовать в выборах в Государственную думу в следующем году. Он заявил, что не планирует участвовать в выборах в Государственную думу в следующем году. Он заявил, что не планирует участвовать в выборах в Государственную думу в следующем году.

ЗАДАНИЕ 1. СТАБИЛЬНОСТЬ

Несколько амальгамных сплавов по дану, удерживали на статич. под. после погружения в ванну с температурой $2 \pm 0,5^\circ\text{C}$. После извлечения формовые изделия были подвергнуты воздействию в течение 30 дней при постоянной влажности ион. 2×10^{-4} (использов. для предотвращения деградации) среды на поверхности исследуемых конструкций.

CM. Food and Nutrition Institute

Удмурт Республикасының Заһирәһе
С.И. Тимонин мәһәммәд Аһмәт ханга җавап

3. **интервью** или **допрос**; **расследование** (Федеральное бюро расследований).

1. Bolognini A, Altaviani AM, Lazzaro M. Protein characterization by visible transfer procedure for the assignment of amino protein values from a physicochemical analysis. *J Food Sci Technol* 2001;34(1):118-122.
2. Bolognini A, Bolognini A, Altaviani AM, Lazzaro M, et al. The contribution of a stable reference material for aminoacids.





**BECKMAN
Coulter.**

Калибратор миоглобина (Myoglobin Calibrator)

ODR3825

1 x 2 мл Калибратор 1
1 x 2 мл Калибратор 2
1 x 2 мл Калибратор 3
1 x 2 мл Калибратор 4

(Белая крышка)
(Желтая крышка)
(Оранжевая крышка)
(Красная крышка)

Назначение

Калибратор миоглобина (Myoglobin Calibrator) представляет собой калибровочный стандартный материал, содержащий чистый миоглобин, предназначен для использования с реактивом Myoglobin ODR6184 для количественного определения миоглобина на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro.

Состав

Человеческий миоглобин Вернулет
HEPES-буфер (pH 7,4) 10 ммоль/л
BSA 1,0% вес./об.
Хлорид натрия 0,9% вес./об.
Консервант

Область пригодности

Во избежание возможного отклонения эндосодержащих соединений после открытия калибратора промойте канализационные трубы водой.

Утилизуйте отработанные расходные материалы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических требований.

Биологические материалы человеческого происхождения были протестированы на наличие антител к HCV, HIV 1/2, а также HbS и были в соответствии с требованиями FDA и были признаны отрицательно реагирующими в вышеупомянутых тестах для выявления донора. Но, поскольку не существует метода исследования, который бы гарантировал полную инфекционную безопасность биоматериалов человеческого происхождения, рекомендуется обращаться с подобными биоматериалами как с потенциально инфицированными.

Подготовка калибратора

Калибраторы готовы к использованию. Перед каждым использованием флакон переверните несколько раз для полной гомогенизации смеси.

На этикетке флакона напечатана дата вскрытия флакона калибратора.

Хранение и стабильность

Неоткрытый калибратор стабилен до даты, указанной на этикетке, при условии его хранения при температуре 2-8°C. После вскрытия калибратор стабилен 30 дней при условии хранения при 2-8°C, отсутствия замораживания и вскрытия крышки флакона сразу же после первого использования.

Применение анализа

См. соответствующую инструкцию по использованию набора реагентов.

Установленные значения

См. таблицу значений для калибратора.

Значения калибратора миоглобина (Myoglobin Calibrator) проследованы до человеческого стандарта миоглобина высокой чистоты и установлены с использованием коммерческого РИМ метода.

Библиография

1. Rojano TO, Dancy MA. A radioimmunoassay for human beta-hemoglobin: method development and normal values. Clin Chem 1977;23:40-75.
2. Biale MJ, Wilmeton JT, Gomez-Barranco CE, Vlahovska MR. Radioimmunoassay of myoglobin in human serum. Results in patients with acute myocardial infarction. J Clin Invest 1975;56:1334-8.
3. Murray K, Biale J, Koval H, Koval A, Biale M, Mayhew T, Yaghi M. Radioimmunoassay for human myoglobin: methods and results in patients with skeletal muscle or myocardial disorders. J Lab Clin Med 1975;82:341-52.

CE



КАЛИБРАТОР МИКРОГЛЮБУЛИНА (Microglobulin Calibrator)

ODR3024

1 x 2 мл	Калибратор 1	(Белая крышка)
1 x 2 мл	Калибратор 2	(Желтого крышка)
1 x 2 мл	Калибратор 3	(Оранжевая крышка)
1 x 2 мл	Калибратор 4	(Красная крышка)
1 x 2 мл	Калибратор 5	(Черная крышка)

Назначение

Калибратор микроглобулина (Microglobulin Calibrator) предназначен для использования с реактивом Microglobulin OBR187 для количественного определения альбумина на анализаторе Beckman Coulter серию AU. Только для диагностики in vitro.

Составление, состав калибратора

Хлорид натрия	160 ммоль/л
Человеческий альбумин	Вариант
Консервант	

Общие характеристики

Предупреждает об опасности и фразы в рисках.
Опасен, содержит ледяной раствор. R22: опасен при попадании внутрь.

Примеры безопасности

R22, R23: пользоваться защитой одежды. Давать материал и его упаковки следует утилизировать как опасные отходы.

Уменьшите воздействие распыления капель: в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Во избежание возможного загрязнения окружающей среды соедините после использования калибратора герметичные контейнеры для сбора. Дополнительные инструкции приведены в Паспорте безопасности.

Биологические материалы человеческого происхождения были протестированы на наличие вирусов в ИФА, ИФА, ИФА, а также ИФА в соответствии с требованиями FDA и были признаны отрицательными реакциями в соответствующих тестах для нового донора. Но, поскольку не существует метода исследования, который бы гарантировал полную инфекционную безопасность биоматериалов человеческого происхождения, рекомендуется обращаться с подобными биоматериалами, как с потенциально инфицированными.

Подготовка калибратора

Калибраторы готовы к использованию. Перед началом использования флаконы переверните наизусть, чтобы удалить конденсат, который может образоваться на внутренней поверхности флакона.

Хранение и стабильность

Новый калибратор стабилен до даты заварки на упаковке, при условии его хранения при температуре 2-8°C. После вскрытия калибраторы стабильны 30 дней при условии хранения при 2-8°C, отсутствие замораживания и вскрытия крышки флакона сразу же после первого вскрытия.

Применение анализа

См. соответствующую инструкцию по использованию набора реагентов.

Установленные значения

См. таблицу значений калибратора.

Значения для калибратора микроглобулина (Microglobulin Calibrator) установлены с использованием первичного стандарта альбумина международного референсного материала.

Отмечено

Значения микроглобулина в моче могут быть повышены, если человек проходит сдачу на после мочеиспускания в моче. Для проверки этого явления, рекомендуется проводить калибровку микроглобулина отдельно от других исследований в моче.

ИНСТРУКЦИЯ

1. Держать в фальсе, находясь в Beckman Coulter Medical Ltd.

CE



**BECKMAN
Coulter.**

Мультикалибратор 2 сывороточных белков (Serum Protein Multi-Calibrator 2)

ODR3023

1 x 2 мл	Калибратор 1	(Белая крышка)
1 x 2 мл	Калибратор 2	(Желтая крышка)
1 x 2 мл	Калибратор 3	(Оранжевая крышка)
1 x 2 мл	Калибратор 4	(Красная крышка)
1 x 2 мл	Калибратор 5	(Фиолетовая крышка)

Назначение

Мультикалибратор 2 сывороточных белков (Serum Protein Multi-Calibrator 2) предназначен для использования с реагентами для иммунофлуориметрического анализа для количественного определения уровня α -1-глобулина, α -1-антитрипсина, β -2-микроглобулина, циркулирующей иммунной системы и фактора некроза опухоли на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Мультикалибратор 2 сывороточных белков изготовлен на основе человеческой сыворотки с добавлением различных веществ и соответствующих флуоресцентных меток для использования в различных целях. Только для диагностики (in vitro).

Реактив	Кат. №
α -1-глобулин	ODR0102
α -1-антитрипсин	ODR0103
β -2-микроглобулин	ODR0104
Циркулирующая иммунная система	ODR0105
Фактор некроза опухоли	ODR0106

Состав

В каждой сывороточной матрице содержится следующие сывороточные белки с разной концентрацией, pH 7.0:

α -1-глобулин

α -1-антитрипсин

β -2-микроглобулин

Циркулирующая иммунная система

Фактор некроза опухоли

Также содержит консервант

Общие характеристики

Во избежание возможного риска заражения вирусными соединениями после слма калибратора крышки и кончик пипетки должны быть стерилизованы.

Упаковка и хранение: сывороточные матрицы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Биологические материалы: человеческие сывороточные белки были протестированы на наличие антител к HCV, HIV 1/2, а также к HLA. В соответствии с требованиями FDA и были признаны пригодными для использования в качестве референсных значений для клинической диагностики. Не рекомендуется использовать материал, который бы гарантировал полную инфекционную безопасность биоматериалов человеческого происхождения. Рекомендуется обращаться с продуктами биоматериалов как с потенциально инфекционными.

Подготовка калибратора

Калибраторы готовы к использованию. Перед использованием флакон калибратора необходимо раз для полного смешивания смеси.

На этикетке флакона указывается дата вскрытия калибратора.

Назначение и стабильность

Настоящий мультикалибратор стабилен до даты, указанной на этикетке, при условии его хранения при температуре 2-8°C. Срок годности вскрытого мультикалибратора срока его годности составляет 30 дней при условии хранения при 2-8°C, отсутствии замораживания и замораживания флакона сразу же после вскрытия флакона.

Применение анализа

См. соответствующую инструкцию по конкретным исследованиям.

Упаковка и хранение

См. Таблицу значений для каждого анализа.

Информация для мультикалибратора 2 сывороточных белков (Serum Protein Multi-Calibrator 2) устанавливалась с использованием следующих референсных материалов: международные референсные материалы:

Реактив	Кат. №	Стандарт
α -1-глобулин	ODR0102	Стандарт IFCC CRM 470
α -1-антитрипсин	ODR0103	Стандарт IFCC CRM 470
β -2-микроглобулин	ODR0104	1 ^й международный стандарт BCS 1000
Циркулирующая иммунная система	ODR0105	Стандарт IFCC CRM 470
Фактор некроза опухоли	ODR0106	Стандарт IFCC CRM 470

ЛИТЕРАТУРА

1. Blair, J. A., Johnson, A. M., Lison, M. Protein standardization IV: value transfer procedure for the assignment of serum protein values from a reference preparation to a target material. Clin Chem Lab Med 2001;39:1150-1152.
2. Baudouin, B., Blaudou, J., Blair, J. A., Johnson, A. M., Lison, M., Ward, A., et al. The certification of a human reference material for immunoglobulin G concentration in 14 human serum proteins. CRM 470. EUR 15243 EN 1993.
3. Lison, M., Blaudou, J., Blair, J. A., Johnson, A. M., Lison, M., Ward, A., et al. A collaborative study of a preparation of human serum proteins for use as a reference in the assay of beta 2-microglobulin. J Biol Med 1995;15:105-107.

CE

000

000

000



**BECKMAN
COULTER.**

Калибратор Аро А1 & В (Apo A1 & B Calibrator)

QDR3022

1 x 2 мл
1 x 2 мл
1 x 2 мл
1 x 2 мл
1 x 2 мл

Калибратор 1
Калибратор 2
Калибратор 3
Калибратор 4
Калибратор 5

(Белая крышка)
(Желтая крышка)
(Оранжевая крышка)
(Красная крышка)
(Черная крышка)

Назначение

Калибратор Apo A1 & B (Apo A1 & B Calibrator) предназначен для использования с реагентами Apo A1 и Apo B (OSR142 и OSR143 соответственно) для количественного и качественного анализа на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Калибратор изготовлен на основе сыворотки человека. Только для диагностики in vitro.

Состав

В каждой сывороточной матрице содержится белки Apo A1 и Apo B в разной концентрации и консерванты.

Общие предостережения

Во избежание возможного отклонения результатов содержания соединений после сплива калибратора, промывайте канализационные трубы водой.

Утилизируйте отработанные расходные материалы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Биологические материалы человеческого происхождения, содержащиеся в данном продукте, были протестированы на наличие антигена к HCV, HIV 1/2, а также HbS антигена в соответствии с требованиями FDA и были признаны отрицательно реагирующими в вышеупомянутых тестах для контроля донора. На основании не существует метода исследования, который бы гарантировал полную инфицированность биологических материалов человеческого происхождения, рекомендуя обращаться с подобными биоматериалами, как с потенциально инфицированными.

Подготовка калибратора

Калибраторы готовы к использованию. Перед использованием флакон переверните каждый флакон несколько раз для полной гомогенизации смеси.

Хранение и стабильность

Несертифицированный калибратор стабилен в течение 12 месяцев на антиоксиданте, при условии его хранения при температуре 2-8°C. После вскрытия калибраторы стабильны 30 дней при условии хранения при 2-8°C, отсутствия замораживания и замораживания крышки флакона сразу же после каждого использования.

Процедура анализа

См. соответствующую инструкцию по использованию набора реагентов.

Установочный контроль^{1,2,3}

См. таблицу значений калибратора.

Значения для калибратора Apo A1 и Apo B устанавливались с использованием ВСО международного референсного материала SRP-01 и SRP-07 иммуноферментными методами.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Reference Materials for the Standardization of the Apolipoprotein A-I and B, and Lipoprotein(a), Carl P. Tiele J. e-NFC vol 13 no 3: <http://www.fda.gov/oc/mtg/12m313031003.htm>
2. Berg JM, Magdoff VL, Fabelman DB Jr, Seeger GR, Henderson LO, Turner WE, et al. Inter-laboratory mass spectrometric quantification of specific proteins: model application with apolipoprotein A-I. Clin Chem 1986;32:1676-82.
3. Magdoff VL, Albani JJ. Apolipoprotein A-I assay standardization and quality control. Scand J Clin Lab Invest Suppl 1990;158:58-65.

CE



Мультикалибратор сывороточных белков (Serum Protein Multi-Calibrator)

DDR3021

1 x 2 мл	Калибратор 1	(Белая крышка)
1 x 2 мл	Калибратор 2	(Желтая крышка)
1 x 2 мл	Калибратор 3	(Оранжевая крышка)
1 x 2 мл	Калибратор 4	(Красная крышка)
1 x 2 мл	Калибратор 5	(Фиолетовая крышка)
1 x 2 мл	Калибратор 6	(Зеленая крышка)

Назначение

Мультикалибратор сывороточных белков (Serum Protein Multi-Calibrator) предназначен для иммунофлуориметрического измерения с использованием реалитов иммуноглобулинов G, иммуноглобулина A, иммуноглобулина M, C3, C4, трансферрина, С-реактивного белка, антистрептолизина О и ферритина для количественного определения на анализаторах Beckman Coulter серии AU.

Мультикалибратор изготовлен на основе членикообразных сывороток с добавлением химических веществ и соответствующих ферментов человека, животного, растительного происхождения. Только для диагностики in vitro.

Реагент	Кат. №	Реагент	Кат. №
IgG	OSR6145 / OSR61172	Трансферин	OSR6152
IgA	OSR6144 / OSR61171	CRP	OSR6147
IgM	OSR6146 / OSR61173	AGO	OSR6154
C3	OSR6153	Ферритин	OSR6150 / OSR61136 / OSR61203
C4	OSR6155		

Состав

В каждой сывороточной матрице содержатся следующие сывороточные белки с разной концентрацией, pH 7.0

Иммуноглобулин G	Трансферрин
Иммуноглобулин A	С-реактивный белок
Иммуноглобулин M	Антистрептолизин O
Фактор компонента C3	Ферритин
Фактор компонента C4	
Тканевый компонент концентрат	

Область применения

По назначению калибраторы относятся к вспомогательным средствам, используемым после сложения калибратора, промывки калибровочных трубок водой, уменьшения отработанных реактивных материалов в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Биологические материалы человеческого происхождения были протестированы на наличие антител к HCV, HIV 1/2, в титре 1:8 в соответствии с требованиями FDA и были признаны отрицательными в соответствующих тестах для каждого компонента. Не рекомендуется использовать материалы животного происхождения, которые бы гарантировали полную информативность биоматериалов человеческого происхождения, рекомендуется обращаться с калибраторами биоматериалами, или с потенциально инфицированными.

Подготовка калибраторов

Калибраторы готовы к использованию. Перед каждым использованием тщательно перемешайте калибратор, встряхивая несколько раз для получения гомогенной смеси.

Хранение и стабильность

Несертифицированный калибратор стабилен до даты, указанной на этикетке, при условии его хранения при температуре 2-8°C. С момента вскрытия мультикалибратора срок его годности составляет 30 дней при условии хранения при 2-8°C, отсутствия замораживания и замораживания, а также флуоресценции сразу же после каждого использования.

Подготовка к использованию

См. соответствующую инструкцию по конкретным исследованиям.

Установочные значения

См. значения мультикалибратора сывороточных белков (Serum Protein Multi-Calibrator) для каждого анализа.

Значения для мультикалибратора сывороточных белков (Serum Protein Multi-Calibrator) устанавливаются с использованием следующих референсных материалов: 1st иммунофлуориметрический материал.

Реагент	Номер ре. мат.	Стандарт
IgG	OSR6145 / OSR61172	Стандарт IFCC CRM 470
IgA	OSR6144 / OSR61171	Стандарт IFCC CRM 470
IgM	OSR6146 / OSR61173	Стандарт IFCC CRM 470
C3	OSR6153	Стандарт IFCC CRM 470 для C3c
C4	OSR6155	Стандарт IFCC CRM 470
Трансферин	OSR6152	Стандарт IFCC CRM 470
CRP	OSR6147	Стандарт IFCC CRM 470
AGO	OSR6154	1 st международный стандарт ВОЗ NIBSC для антистрептолизина O, AS1
Ферритин	OSR6150 / OSR61136 / OSR61203	3 rd международный стандарт для ферритина, референсат NIBSC 98/027

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Blang-Jensen S, Johansen AM, Larsen M. Protein standardization IV: value transfer procedure for the assignment of serum protein values from a reference preparation to a target material. *Clin Chem Lab Med* 2001;39:1110-1122.
2. Baudouin S, Blang-Jensen S, Carlsööen A, Johansen AM, Milsted Ward A, et al. The certification of a matrix reference material for immunochemical measurement of 14 human serum proteins. *CIRM 470 EUR 15543 EN*, 1995.
3. Speun J, Bentzen MW, Olsen Larsen S, Hewitt LF. International standard for anti-hepatitis-B. *Int J Med Virol Org* 1981;24:271-79.
4. Thepe BJ, Wiltor D, Arosto P, Heath A, Coet JD, Winwood M. International collaborative study to evaluate a recombinant L ferritin preparation as an international standard. *Clin Chem* 1987;35:1563-67.

CE

14/000

© 2004
2004

2004



Калибратор ASO (ASO Calibrator)

0053213

ASO Calibrator (Калибратор ASO)

6 x 1 мл

Назначение

Калибратор ASO – это калибратор на основе человеческой сыворотки, предназначенный для использования с реактивами ASO Optotype для количественного определения сывороточных О и мА антигенов Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro.

Состав калибратора

В картридже сферического матрикса содержится антигратифицированный О и мА-сыворотки.

Общие сведения о калибраторе

Во избежание возможного отклонения в интерпретации результатов необходимо промыть калибраторные трубки водой.

Утилизуйте обработанные расходные материалы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Безопасность материалов человеческого происхождения, содержащихся в данном продукте, была протестирована на наличие вирусов с HCV, HIV 1/2 и Hbs антигена в соответствии с требованиями FDA и была признана отрицательно реактирующей в вестерн-блоттинге тестов для каждого донора. Но, поскольку не существует метода исследования, который бы гарантировал полную инфекционную безопасность биоматериалов человеческого происхождения, рекомендуется обращаться с продуктами Beckman Coulter, как с потенциально инфекционными.

Подготовка калибратора

Калибратор готов к использованию. Перед использованием дважды переверните картридж фланцем несколько раз для полной смешивания материала.

Защелкните или закройте дату вскрытия флакона с калибратором.

Хранение и стабильность

Несколько лет калибратор стабильно до даты, указанной на этикетке, при условии его хранения при температуре 2-8°C. После вскрытия калибратор стабилен 30 дней при условии хранения при 2-8°C, отсутствия заморозки и вскрытия крышки флакона сразу же после вскрытия картриджа.

Периодичность анализа

См. соответствующую инструкцию по использованию набора реагентов.

Установочный контроль¹

См. метод установочных значений для калибратора.

Значения для калибратора ASO устанавливаются¹ с использованием 1:40 BCS международного стандарта антигенов О, А51, иммуногеммаглобулинов Методом.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Blair-Jones A, Johnson AM, Lacey M. Protein standardization: A value transfer procedure for the assignment of serum protein values from a reference preparation to a target material. Clin Chem Lab Med 2001;39:1110-1122.
2. Brown J, Davidson MH, Gileadi Lacey B, Hewitt LF. International standard for anti-hepatitis B-C. Bull Wild Hlth Org 1981;24:271-70.

CE



**BECKMAN
COULTER.**

Калибратор АРО А1 & В (ARO A1 & B CALIBRATOR)

СОР3005

2 x 1 мл
2 x 1 мл
2 x 1 мл

Калибратор 1
Калибратор 2
Калибратор 3

(Белая крышка)
(Желтая крышка)
(Красная крышка)

Назначение

Калибратор Аро А1 & В (Аро А1 & В Calibrator) предназначен для использования в реактивах СОР5142 и СОР5143 соответственно, для количественного определения Аро А1 и Аро В на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Этот набор калибраторов изготовлен на основе сыворотки человека. Только для диагностики *in vitro*.

Состав

В каждом калибраточном наборе содержится белок А1 и Аро В в разной концентрации и консерванты.

Общие предостережения

Во избежание возможного загрязнения из-за содержащихся соединений после снятия калибратора необходимо обильно промыть стандартные трубки водой.

Утилизуйте использованные расходные материалы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Биологические материалы человеческого происхождения, содержащиеся в данном продукте, были проверены на наличие вирусов и HCV, HIV 1/2, в том числе HBe-антигена в соответствии с требованиями FDA, и были стабильно термостойкими в используемых тестах для данного продукта. Не касайтесь не маркированной метки исследования, которая бы гарантировала полную информацию безопасности биологических материалов происхождения, рекомендуется обращаться с подобными биоматериалами, как с потенциально инфекционными.

Подготовка калибратора

Калибраторы готовы к использованию. Перед каждым использованием, флакон следует несколько раз осторожно перевернуть для полной гомогенизации материала.

Хранение и стабильность

Неразлитый калибратор стабилен до даты, указанной на этикетке, при условии его хранения при температуре 2-8°C. После вскрытия калибратор стабилен 30 дней при условии хранения при 2-8°C, отсутствие замораживания и вскрытия крышки флакона сразу после первого использования.

Примечание

Он соответствует критерию по использованию набора реагентов.

Установленные значения

См. таблицу значений для калибратора.

Значения для калибратора Аро А1 и В (Аро А1 и В Calibrator) установлены на анализаторах Beckman Coulter с использованием международных референтных материалов ВОЗ 89/1-01 и 89/3-07 соответственно.

Библиография

1. Reference Materials for the Standardization of the Apolipoproteins A1 and B, and Lipoproteins, Del F, Tale J. *J. AIFCC* vol 18 no 3: 184-186. For calibration of Spectra 21325/1000/1m.
2. Berg JR, Nigam VL, Peterson DG Jr, Cohen GR, Handman LD, Turner ME, et al. Interlaboratory comparison of specific protein model calibration with apolipoprotein A1. *Clin Chem* 1996;42:1676-82.
3. Macgregor GA, Albert JJ. Apolipoprotein assay standardization and quality control. *Scand J Clin Lab Invest Suppl* 1990;196:64-65.

CE



**BECKMAN
COULTER.**

КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА СК-МВ (СК-МВ CONTROL SERUM)

DOB2041

Контрольная сыворотка СК-МВ

9 x 2 мл

Назначение

Контрольная сыворотка с СК-МВ представляет собой лиофилизированную сыворотку человека. Она предназначена для проведения контроля точности измерений при измерении СК-МВ с использованием диагностического набора (DOB1155) на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro.

Состав контроля

Лиофилизированная сыворотка человека, содержащая конформный СК-МВ (креатинин) (СК-МВ).

Общие рекомендации

Упакованные обработанные расфасованные материалы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и ветеринарного контроля.

Биологические материалы человеческого происхождения, содержащиеся в данном продукте, были протестированы на наличие антигена HCV и HIV 1/2 в титре 1:25 в соответствии с требованиями FDA и были признаны отрицательно реагирующими в вышеупомянутых тестах для каждого донора. Но, поскольку не существует метода исследования, который бы гарантировал полную инфекционную безопасность биоматериалов человеческого происхождения, рекомендуется обращаться с продуктами биоматериалов, как с потенциально инфекционными.

Подготовка контроля

1. Аккуратно снимите с флакона крышку в резиновую пробку, не допуская потери лиофилизированного материала.
2. Дробируйте во флакон точно 2,0 мл стерильной деионизированной воды с температурой 15 - 25 °C, исключая возможность попадания на 2 мл.
3. Закрыйте флакон резиновой пробкой и плавно перемешивайте флакон в течение 30 минут, достигая полного растворения лиофилизата. Не допускайте образования пены.
4. Запишите дату проведения контроля на этикетке флакона.

Хранение и стабильность

Инертный контроль СК-МВ стабилен до 6 лет, указанной на этикетке, при условии его хранения при температуре 2 - 8 °C. Растворенный контроль при отсутствии замораживания и замораживания флакона сразу же после каждого использования, стабилен 6 дней при температуре 2 - 8 °C, 6 часов - при температуре 15 - 25 °C, 4 недели - при -2 °C (однократное замораживание).

Применение анализа

См. инструкцию к соответствующему реагенту.

Каждая лаборатория определяет методику проведения контроля качества с помощью стандартных, систем, одобренных лабораторией внешней оценкой.

Полученные в отдельной лаборатории результаты могут отличаться от приведенного среднего значения. В связи с этим, рекомендуется для каждого анализа использовать как минимум 3 значения и отклонения стандартного отклонения на основании многократного измерения по установленным правилам. Эти средние значения не должны использоваться для проверки соответствия критериям интервала, приведенным в прилагаемой таблице.

При обнаружении каких-либо тенденций в колебаниях значений контроля качества или неожиданных отклонений его значений, проверьте все аналитические этапы измерений, рабочие параметры анализатора.

Каждая лаборатория должна разработать план действий на тот случай, если результаты измерений контроля качества выйдут за установленные пределы.

Установленные значения

См. таблицу установленных значений и диапазонов допустимых значений.

Значение СК-МВ в контроле проявляется до значения для мастер-референсатора Beckman Coulter.

CE



Дигоксин. Калибратор **(Digoxin Calibrator)**

СОСТАВ

1 x 2,5 мл	Калибратор 1
1 x 2,5 мл	Калибратор 2
1 x 2,5 мл	Калибратор 3
1 x 2,5 мл	Калибратор 4
1 x 2,5 мл	Калибратор 5
1 x 2,5 мл	Калибратор 6

Назначение

Digoxin Calibrator (Дигоксин, Калибратор) используется для количественного определения дигоксина реактивами Oligon OB R604, на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Этот калибратор изготовлен на основе сыворотки человека. Только для диагностики in vitro.

Содержимое

Каждый картридж на основе сыворотки человека, содержащий дигоксин и консервант в равной концентрации.

Область применения

Во избежание возможного отклонения стандартизации соединений, после налива смеси калибратора необходимо промыть калибровочные трубки водой.

Утилизируйте обработанные реакционные материалы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности.

Биологические материалы человеческого происхождения, содержащиеся в данном продукте, были протестированы на антигенные и HCV, HBV, HBe, а также HBe антигены в соответствии с требованиями FDA, и были признаны специально разработанными и выделенными реактами для нужд донора. Но, поскольку не существует метода исследования, который бы гарантировал полную инфекционную безопасность биоматериала человеческого происхождения, рекомендуется обращаться с подобными биоматериалами, как с потенциально инфицированными.

Подготовка калибратора

Калибраторы готовы к использованию. Перед использованием флажки переверните каждый флакон несколько раз для полной гомогенизации смеси.

Хранение и стабильность

Калибраторы стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2 °С. При отсутствии следов загрязнения и при условии, что флажки будут сразу же закрыты после отбора необходимого количества калибратора, стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре 2...8 °С.

Правила использования

См. соответствующую инструкцию по использованию набора реактивов

Установленные значения

Установленные значения для калибратора дигоксина (Beckman Coulter) приведены в сопроводительном документе: Калибраторы пригодны для граметрических методов, а значения для них затем подтверждены коммерчески доступными методами

CE



**BECKMAN
COULTER.**

Калибратор Дигитоксин DigiToxin Calibrator

0000403

1 x 2,5 мл	Калибратор 1
1 x 2,5 мл	Калибратор 2
1 x 2,5 мл	Калибратор 3
1 x 2,5 мл	Калибратор 4
1 x 2,5 мл	Калибратор 5
1 x 2,5 мл	Калибратор 6

Назначение

DigiToxin Calibrator (Калибратор дигитоксин) используется для количественного определения дигитоксина реактивом DigiToxin 0000402, на анализаторе Beckman Coulter серии AL. Этот калибратор предназначен для оценки результатов человека. Только для диагностики in vivo.

Состав

Каждый набор: на основе сыворотки человека, содержащий дигитоксин и консервант в равной концентрации.

Общие предостережения

Во избежание возможного отравления при содержании соединений после снятия калибратора необходимо прервать канализационные трубы водой.

Утилизируйте отработавшие расходные материалы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Биологические материалы человеческого происхождения, образующиеся в результате процедуры, были протестированы на наличие агентов ВИЧ-1, ВИЧ-2, в группе H-1b, агентов в соответствии с требованиями FDA, и были признаны отрицательно реагирующими в вышеупомянутых тестах для вируса донора. Но, поскольку не существует метода исследования, который бы гарантировал полную информированную безопасность биологической человеческой продукции, рекомендуется обращаться с любыми биоматериалами, как с источниками риска при работе с ними.

Подготовка калибратора

Калибраторы готовы к использованию. Перед использованием please проверьте наличие флажков качества для получения полной картины.

Хранение и стабильность

Калибраторы стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2 °C. При отсутствии средств измерения и при условии, что флажки будут сразу же менять после выбора наблюдаемого количества калибратора, стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре 2 °C.

Периодичность проверки

См. соответствующую инструкцию по использованию набора реагентов.

Упаковочные материалы

Упаковочные материалы для калибратора дигитоксина (DigiToxin Calibrator) приведены в сопроводительных документах. Калибраторы упакованы в герметичные пакеты, в этикетке для них указаны подлинные номер-тест доступным методом.

CE

10

0000403
300 00

Calibrator



**BECKMAN
COULTER.**

Калибратор С-РБ CRP Calibrator			
ОДС00032	1 x 2 мл	Калибратор 1	(Белый крышка)
	1 x 2 мл	Калибратор 2	(Желтый крышка)
	1 x 2 мл	Калибратор 3	(Оранжевый крышка)
	1 x 2 мл	Калибратор 4	(Красный крышка)
	1 x 2 мл	Калибратор 5	(Фиолетовый крышка)
	1 x 2 мл	Калибратор 6	(Зеленый крышка)

Назначение

CRP Calibrator (Калибратор С-РБ) – это калибратор на основе человеческой сыворотки, предназначенный для использования с реагентом CRP OPT01157 для количественного определения С-РБ на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики *in vitro*.

Состав

В калибраторе содержится сыворотка С-реактивный белок (С-РБ) человека в одной концентрации и консервант.

Общие предостережения

Во избежание возможного отклонения ввиду сохранения соединений после спуска калибратора промойте калибровочные трубки водой. Утилизуйте стабилизатор расщепляемые материалы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности.

Биологические материалы человеческого происхождения, содержащиеся в данном продукте, были протестированы на наличие агентов в HCV, HIV-1/2, а также HBe антигена в соответствии с требованиями FDA, и были признаны отрицательными результатов в выделении возбудителя для каждого агента. Но поскольку не существует метода исследования, который бы гарантировал полную идентификацию биологической безопасности, биоматериалы человеческого происхождения рекомендуются обращаться с подобными биоматериалами, как потенциально инфицированными.

Подготовка калибратора

Калибраторы готовы к использованию. Перед использованием плавно переверните каждый флакон несколько раз для полной гомогенизации смеси.

Хранение и стабильность

Неиспользованные калибраторы стабильны до даты, указанной на этикетке, при условии их хранения при температуре 2-8°C. С момента вскрытия калибратора срок его годности составляет 30 дней при условии хранения при 2-8°C, отсутствия заморозки и вскрытия крышки флакона сразу же после каждого использования.

Применение калибра

См. инструкцию по использованию набора реагентов.

Установленные значения

См. таблицу значений для стандарта анализа.

Значения для калибратора С-РБ (CRP Calibrator) установлены с использованием стандарта ERM-DA 470 (ФС (Международной Федерации Клинической Химии) именуется референтной массой).

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Blair-Jones S, Johnson AM, Lacey M. Protein standardization IV: value transfer procedure for the assignment of serum protein values from a reference preparation to a target material. Clin Chem Lab Med 2001;39:1110-1122.
2. Baileys R, Blumens J, Blair-Jones S, Carleton A, Johnson AM, Lloyd Ward A, et al. The certification of a matrix reference material for immunochemical measurement of 14 human serum proteins. CRM 470. EUR 18245 EN, 1993.

CE



**BECKMAN
COULTER.**

ODC00029

КОНТРОЛЬ D-ДИМЕРА (D-DIMER CONTROL)

Контроль 1 2 x 0,5 мл
Контроль 2 2 x 0,5 мл

(Желтая крышка)
(Оранжевая крышка)

Назначение

Контроль D-димера (D-Dimer Control) представляет собой лиофилизированный сывороточный материал человека, предназначенный для проведения контроля точности и воспроизводимости использования реагента D-Dimer OBR0135 на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики *in vitro*.

Состав контроля

Лиофилизированная сыворотка человека, содержащая D-димер и консерванты.

Общие предосторожности

Предупреждение об опасности в форме D-димера:

Опасен, содержит живых клеток.

R22: Опасен при вдыхании пыли.

Правила безопасности:

836, 890. Пользуйтесь защитной одеждой. Контроль в таре из-под него нельзя утилизировать как обычные отходы.

Соблюдайте все меры предосторожности, принятые при работе с лабораторными реагентами.

Во избежание возможного отложения вводимых веществ после слива контроля промойте канализационные трубы водой.

Биологические материалы человеческого происхождения были протестированы на наличие агентов HCV, HIV 1/2, а также Hbs антигена в соответствии с требованиями FDA и были признаны отрицательно реагирующими в вышеуказанных тестах для каждого донора.

Не исключено, что существует метод исследования, который бы идентифицировал полную инфицированную безопасность биоматериалов человеческого происхождения; рекомендуется обращаться с подобными биоматериалами, как с потенциально инфицированными.

Подготовка к контролю

1. Аккуратно выньте из флакона крышку и выньте реакционную пробирку, не допуская потерь лиофилизированного материала.

2. Добавьте во флакон точно 0,5 мл стерильной деионизированной воды с температурой 15 - 25°C.

3. Закройте флакон резиновой пробиркой и растворите содержимое, плавно перемещая флакон в течение 30 минут. Не допускайте образования пены.

4. Продолжайте перемешивание до полной гомогенизации и растворения лиофилизированного материала.

5. Запишите дату растворения контроля на этикетке флакона.

Хранение и стабильность

Неиспользованный контроль D-димера стабилен до даты, указанной на этикетке, при условии их хранения при температуре 2 - 8°C.

Растворенный контроль при отсутствии замораживания и закрытии крышки флакона сразу же после каждого использования стабилен 28 дней при температуре 2 - 8°C, 1 день - при температуре 15 - 25°C, 30 дней - при - 20°C (одностороннее замораживание).

Примечания анализа

См. сопроводительную инструкцию к диагностическому набору.

Любая лаборатория определяет частоту применения контроля известна самостоятельно, однако контроль лабораторией протестирован на адекватность измерения вместе с проблемами пациента и после проведения калибровки.

Результаты, полученные в отдельной лаборатории, могут отличаться от установленных значений. Поэтому рекомендуется любой лаборатории для каждого анализа устанавливать свои пределы значений и отклонения специфического контроля, на основании неопределенности измерения по установленным правилам. Эти сравнения значений на даты выдачи за пределами соответствующей приемной интервалов, приведенных в прилагаемой таблице.

При обнаружении каких-либо тенденций в изменении значений контроля качества или значимых отклонений его значений, проверьте все аналитические входы измерителя и рабочие параметры анализатора.

Каждой лабораторией следует разработать план действий на тот случай, если результаты измерения контроля выйдут за установленные пределы.

Установленные значения

См. таблицу средних значений и диапазонов допустимых значений.

Значения D-димера в контроле предоставляются до калибратора D-Dimer Calibrator (ODS0033).

CE



**BECKMAN
COULTER.**

Рематиодный фактор (латекс). Калибратор **(RF Latex Calibrator)**

ODC0028

1 x 1 мл	Калибратор 1	(Белая крышка)
1 x 1 мл	Калибратор 2	(Синяя крышка)
1 x 1 мл	Калибратор 3	(Зеленая крышка)
1 x 1 мл	Калибратор 4	(Красная крышка)
1 x 1 мл	Калибратор 5	(Оранжевая крышка)

Назначение

RF Latex Салби-ди (Рематиодный фактор) (латекс, калибратор) представляет собой материал, стандартный на человеческой сыворотке, и предназначен для использования с реактивом RF Latex CDR1188 для количественного определения рематиодного фактора на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro.

Состав

В каждой емкостной упаковке содержится Рематиодный фактор разной концентрации и консерванты.

Общие рекомендации

Во избежание ложноположительных результатов ввиду загрязнения содержания после снятия калибратора необходимо промыть калибраторные трубки водой. Утилизировать использованные расходные материалы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Расходные материалы человеческого происхождения, содержащиеся в данном продукте, были протестированы на наличие агентов ВИЧ, HAV, HBV, а также HBe антигена в соответствии с требованиями FDA, и были признаны отрицательно реагирующими в рекомендуемым способом для каждого донора. Поскольку не существует метода тестирования, который бы гарантировал полную уверенность безопасности биоматериалов человеческого происхождения, рекомендуется обращаться с подобными биоматериалами, как с потенциально инфицированными.

Подготовка калибраторов

Калибраторы готовы к использованию. Перед использованием тщательно перемешайте каждый флакон несколько раз для полной гомогенизации смеси.

Хранение и стабильность

Несколько калибраторов стабильны до пяти летовой на этикетке, при условии его хранения при температуре 2-8°C. После вскрытия калибратор стабилен 3 месяца при условии хранения при 2-8°C, сразу после вскрытия и закрытия флакона. Флакон сразу же после вскрытия использовать.

Применение анализа

См. соответствующую инструкцию по использованию набора реактивов.

Установленные значения

См. таблицу значений для калибраторов.

Значения для калибратора Рематиодного фактора (латекс) (RF Latex Calibrator) установлены Международной Конференцией по использованию международного стандарта ВОЗ NBS-642.

ИНФОРМАЦИЯ

1. Beckman BD, Becton MW, Mohr V, Krog P. International reference preparation of rheumatoid factor serum. Bull WHO 1980; 62:11-318.

CE



**BECKMAN
COULTER.**

Калибратор С-РБ (платек) высокой чувствительности (CRP Latex Calibrator Highly Sensitive Set)

ОДНОКОМПО

1 x 2 мл
1 x 2 мл
1 x 2 мл
1 x 2 мл
1 x 2 мл

Калибратор 1
Калибратор 2
Калибратор 3
Калибратор 4
Калибратор 5

(Желтая крышка)
(Кремовая крышка)
(Желтая/зеленая крышка)
(Розовая крышка)
(Красная крышка)

Назначение

CRP Calibrator (Latex) (калибратор С-РБ (платек)) предназначен для использования с рефрактометром CRP (Latex) C840100, применяемым для количественного определения С-РБ высокой чувствительности (highly sensitive CRP) на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Этот калибратор калиброван на основе сыворотки человека. Только для диагностического использования.

Состав

В наборе сывороточном матрикса содержится С-РБ человека в равной концентрации в концентрате.

Общие рекомендации

Во избежание возможного отклонения содержания, соединенный после стекла калибратора необходимо проводить инкубационный период в воде.

Упаковочные материалы являются материалами в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Биологические материалы животного происхождения, содержащиеся в данном продукте, были протестированы на наличие антител к HCV, HIV 1/2, в титре 1:8 и в отношении к трансмиссивности FOD, и были признаны отрицательно реагирующими в специализированных тестах для каждого донора. Но, поскольку не существует метода исследования, который бы гарантировал полную уверенность в безопасности биологических материалов происхождения, рекомендуется обращаться с ними с предосторожностью, как с потенциально инфицированными.

Подготовка калибратора

Калибраторы готовы к использованию. Перед использованием плавно переверните каждый флакон несколько раз для полной гомогенизации смеси. В качестве калибратора с нулевым значением используйте физиологический раствор.

Хранение и стабильность

Использовать калибраторы стабильны до даты, указанной на этикетке, при условии их хранения при температуре 2-8°C. С момента вскрытия калибраторы срок их годности составляет 90 дней при условии хранения при 2-8°C, отсутствия загрязнения и закрытия крышки флакона сразу же после каждого использования.

Применение

См. соответствующую инструкцию по использованию набора реагентов.

Установленные значения

См. таблицу значений, приложенную к упаковке.

Значения для калибратора С-РБ (платек) (CRP Calibrator Latex) были установлены¹ методом/общепринятым методом с использованием стандарта CRM 470² (ICC (Международной Федерации Клинической Химии)).

Дипломатия

1. Baur-Jensen S, Johnsen AM, Larsen M. Protein standardization (C-value transfer) procedure for the assignment of serum protein values from a reference preparation to a target material. Clin Chem Lab Med 2001;39:1110-1122.
2. Baur-Jensen S, Baur-Jensen J, Baur-Jensen S, Sørensen A, Jensen AM, Møller Veld A, et al. The certification of a matrix reference material for immunochemical measurement of 14 human serum proteins. CRM 470. EUR 19243 EN, 1993.

CE



**BECKMAN
COULTER.**

**Калибратор С-РБ (латекс) нормальной чувствительности
(CRP Latex Calibrator Normal Set)**

QDC0026	1 x 2 мл	Калибратор 1 (Кремневая крышка)
	1 x 2 мл	Калибратор 2 (Синяя крышка)
	1 x 2 мл	Калибратор 3 (Красная крышка)
	1 x 2 мл	Калибратор 4 (Коричневая крышка)
	1 x 2 мл	Калибратор 5 (Зеленая крышка)

Назначение

CRP Calibrator (Латекс) (калибратор С-РБ (латекс)) предназначен для использования с реактивами CRP (Латекс) QCR0109 для измерения уровня циркулирующего С-РБ с помощью чувствительности на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Этот калибратор изготовлен на основе высокоочищенного чистого. Только для диагностики in vitro.

Состав

В наборе 5 ампул с микроконусом из латекса с содержанием С-РБ чистого в равной концентрации и консерванте.

Общие предостережения

Во избежание возможного отклонения вводимых в анализ реактивов необходимо закрыть защитные крышки ампул. Избегайте использования реактивных материалов в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Биологические материалы человеческого происхождения, содержащиеся в данном продукте, были протестированы на наличие антигена HCV, HIV 1/2, а также HbS в соответствии с требованиями FDA, и были признаны отрицательно реагирующими в вышеуказанных тестах для выявления донора. На основании не на осуществление метода исследования, который бы гарантировал полную инфекционную безопасность биоматериала человеческого происхождения, рекомендуется обращаться с ампулами биоматериала, как с потенциально инфицированными.

Подготовка калибратора

Калибраторы готовы к использованию. Перед использованием тщательно перемешать ампулы флаконы несколько раз для полной гомогенизации смеси. В ампулах калибратора с латексом значимыми используйте физиологический раствор.

Хранения и стабильность

Неиспользованные ампулы стабильны до даты, указанной на этикетке, при условии их хранения при температуре 2-8°C момента вскрытия ампулы. После вскрытия ампулы срок годности составляет 90 дней при условии хранения при 2-8°C, отсутствии замораживания и непрерывном хранении флакона сразу же после вскрытия ампулы.

Применение анализа

См. соответствующую инструкцию по использованию набора реагентов.

Установленные значения

См. таблицу установленные значения.

Значения для калибратора С-РБ (латекс) (CRP Calibrator Latex) были установлены¹ международными экспертными методами с использованием стандарта CRM 470² FSC (Международной Федерации Клинической Химии).

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Blomberg-Jensen B, Jørgensen AM, Lørdal M. Protein standardization IV: value transfer procedure for the assignment of serum protein values from a reference preparation to a target material. Clin Chem Lab Med 2004;38:1110-1122.
2. Winkler G, Winkler J, Blomberg-Jensen B, Sørensen A, Jørgensen AM, Hørdal M et al. The certification of a matrix reference material for immunochemical measurement of 14 human serum proteins. CRM 470. EUR 15249 EN, 1993.

CE



**BECKMAN
COULTER.**

КАЛИБРАТОР ДЛЯ ТЕСТОВ В МОЧЕ (Urine Calibrator)

QDC0025

6 x 9 мл

Назначение

Urine Calibrator (калибратор моче) – это жидкий калибратор на основе мочеиспусканий, предназначенный для использования в переносимых системах реагентов Beckman Coulter на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro.

Calcium	(и – Амикаса)	OSR8100 / OSR8182
Calcium	(Кальций)	OSR8113 / OSR8178 / OSR8117
Glucose	(Глюкоза)	OSR8121
Inorganic Phosphorus	(Неорганический фосфор)	OSR8122
Urea	(Мочевина)	OSR8124
Uric Acid	(Мочевая кислота)	OSR8126
Creatinine	(Креатинин)	OSR8179 / OSR81204
Magnesium	(Магний)	OSR8160

Состав

В жидком мочеиспускании содержится витамин, натрия, глюкоза, неорганический фосфор, мочевина, мочевая кислота, креатинин, магний и калий.

Общие предостережения

Во избежание отклонений в результате анализа соединений моче в калибраторе необходимо прочистить вентиляционные трубы анализатора. Утилизацию отработанных реагентов в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Все растворы биологических материалов были простроены на наличие антигенов к HCV, HIV 1/2, в титре 1:10. Антигены в соответствии с требованиями FDA и были признаны отрицательно реагирующими в вышеуказанных тестах. Но, поскольку не существует метода исследования, который бы гарантировал 100% инфекционную безопасность биоматериалов человека-человека происхождения, рекомендуется обращаться с подобными биоматериалами, как с потенциально инфицированными.

Подготовка калибратора

Калибратор готов к использованию. Перед каждой использованием флакон переверните флакон несколько раз для полной гомогенизации смеси.

Не открывайте флакон над контейнером для утилизации калибратора.

Хранение и стабильность

Не замораживать. Стабильно до 60 дней, упакованной на стериль, при условии его хранения при температуре 2-8°C. С момента вскрытия калибратора срок его годности составляет 60 дней при условии хранения при 2-8°C, отсутствия загрязнения и закрытия крышки флакона сразу же после каждого использования.

Значения флакона в процессе хранения могут немного измениться.

Применение анализа

См. соответствующую инструкцию по конкретным исследованиям.

Установленные значения

См. таблицу значений для каждого анализа.

Значения для калибратора были определены на анализаторах Beckman Coulter с использованием стандартных процедур и реагентов Beckman Coulter. Убедитесь в том, что номер партии на флаконе с калибратором соответствует номеру в сопроводительном листе-анализе.

CE



**BECKMAN
Coulter.**

Контроль HbA1c (HbA1c Control)

00C0022

**2 к Контроль 1
2 к Контроль 2
1 к 2 мл**

**Лифофильзет
Лифофильзет
Разбавитель**

Использование

Контроль HbA1c (HbA1c Control) представляет собой лифифицированную кровь человека, и предназначен для проведения контроля точности в дозиметрических приборах при измерении HbA1c с использованием реагентов HbA1c OPR142 и ART OPR1177 на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro.

Состав контроля

Лифифицированная кровь человека
HbA1c Уровень 1 лифифицированный порошок
HbA1c Уровень 2 лифифицированный порошок
Разбавитель 0,04% раствор воды натрия в физиологическом растворе

Общие предостережения

Соблюдать все меры предосторожности, требующиеся при работе с лабораторными реагентами.

Уменьшить употребление расходных материалов в соответствии с требованиями санитарно-гигиенического и экологического контроля.

Во избежание возможного отравления азотсодержащими соединениями после приема неразбавленного реагента промыть загрязненными трубы водой.

Биологические материалы человеческого происхождения были протестированы на наличие антигена к HCV, HIV-1/2, а также Hbs антигена в соответствии с требованиями FDA и были признаны отрицательно реагировать на вышеуказанные тесты, для каждого донора.

Но поскольку не существует метода исключения, который бы гарантировал полную инфекционную безопасность, биологические материалы человеческого происхождения, рекомендуется обращаться с подобными материалами, как с потенциально инфицированными.

Подготовка контроля

1. Акуратно снять с флакона крышку, не допуская потерь лифифицированного материала.
2. Переверните флакон-капельницу с реагентом (Reagent) так, чтобы он был направлен вертикально вверх, и обратите левую ладонь для того, чтобы обеспечить постоянный объем последующих вылив.
3. Добавьте шесть капель (0,25 мл) разбавителя во флакон с реагентом.
4. Акуратно закройте флакон с контролем крышкой, несколько раз переверните его и оставьте стоять при комнатной температуре 15 минут.
5. Через 15 минут слейте всю внутреннюю емкость флакона, осторожно его переверните.
6. Продолжайте перемешивание до тех пор, пока раствор не станет однородным и весь лифифицированный материал не растворится.
7. Не выливайте флакон выливайте для приготовления контроля.

Предварительная подготовка контроля для измерения

Перед использованием, добавьте 25 мл разбавленного контроля к 100 мл лифифицированного реагента Hemosolb (Дополнительный код: OPR0004) (разведение 1:4). Тщательно перемешайте полученный раствор, не допуская образования пены и взбалтывания в течение при комнатной температуре. Внимательно с данными измерения реагентов можно использовать только детектируемый реагент Hemosolb (Дополнительный код: OPR0004).

Измерения на анализаторе

Подготовленные контроли устанавливаются в анализатор без предварительной обработки.

Хранение и стабильность

Несравненно контроль HbA1c стабилен до пяти лет, упакован на этикетке, при условии хранения при температуре 2 - 8°C. По истечении до истечения пяти лет флакон указывает на форму материала, который не рекомендуется использовать.

Разбавленный контроль стабилен 30 минут при температуре 18 - 24°C, 3 месяца - при температуре 2-8°C при отсутствии замораживания и замораживания при любой скорости на холоде между использованием.

Дополнительные рекомендации по процедурам Контроля качества для ручного метода:

1. Точно следуйте рекомендациям по подготовке, упаковке и инструкции к контролю HbA1c Control (00C0022). Не забудьте контроль и детектирующий реагент равны 6 минут при комнатной температуре перед установкой их в анализатор. Следите за точностью измерения этих протестированных реагентов, детектирующего реагента, применяя при указанных времени измерения. Минимальное время измерения при комнатной температуре составляет 5 минут, а также при комнатной температуре.
2. Найдите на проведение повторного измерения контроля HbA1c на одной пробе. Это поможет выявить любые возможные проблемы с процедурой подготовки или с детектирующим реагентом, при измерении HbA1c с реагентом (OPR142).
3. Если значения контроля HbA1c не могут быть получены в диапазоне допустимых значений, снимите открытый флакон с детектирующим реагентом Hemosolb (Дополнительный код: OPR0004).

Проверка анализа

Она, соответствующую инструкцию с диагностическому набору.

Любая лаборатория определяет частоту проведения контроля качества самостоятельного, однако хорошая лабораторная практика состоит из регулярного измерения вместе с проблемами измерения и после проведения анализа.

Результаты, полученные в отдельной лаборатории, могут отличаться от установленных значений. Поэтому рекомендуется любой лаборатории для лучшего анализа устанавливать свои средние значения и использовать специфического контроля, не содержащего неадекватного измерения по установленным правилам. Эти средние значения не должны выходить за пределы соответствующего приемного интервала, приведенного в прилагаемой таблице.

При обнаружении каких-либо тенденций в показателях значений контроля качества или внезапных отклонений от значений, проверить все вышеуказанные этапы измерения и работы параметры измерения.

Каждой лаборатории следует разработать план действий на тот случай, если результаты измерения выходят за установленные пределы.

10/01

MO00007 01
2004-08

Contol

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ^{1,2}

См. таблицу установленных средних значений и диапазоны допустимых значений.
Значения HbA1c в контроле установлены на основании международных исследований с использованием набора реагентов HbA1c OBR192 и HbA1c API OBR1177, и выражены в единицах IFCC HbA1c метода через IFCC HbA1c референсный материал.
Результаты определения HbA1c, выраженный в единицах DCCT, в расчетываемых по формуле умножения IFCC NGSP = (0,016 x IFCC) + 2,15.

СМЕЛНОГРАФИИ

1. Juppston J-D, Kohole U, Ben J, Ficks A, Hossel W, Hoshino T, Medema K, Mosch A, Muel P, Paron R, Thengert L, Umanzo M, Veykamp C. Approved IFCC reference method for the Measurement of HbA1c in Human Blood. Clin Chem Lab Med 2003; 40(1): 19-40.
2. Neubel M, Veykamp C, Juppston J-D, Medema K, Ben J, Thengert L, Hoshino T, John W, Kohole U, Mosch A, Muel P, Paron R, Bussato P, Takaki T, Thengert L, Umanzo M, Wiedmeyer H. IFCC Reference System for Measurement of Hemoglobin A1c in Human Blood and the National Standardization Scheme in the United States, Japan, and Sweden: A Method-Comparison Study. Clin Chem 2004; 50(1): 109-114.

CE

BLCDON22 04
2009-08

RU 01

См. таблицу



**BECKMAN
COULTER.**

Калибратор Бикарбоната Bicarbonate Calibrator

QDC0019

**3 x 25 мл
3 x 25 мл**

**Калибратор 1
Калибратор 2**

Назначение

Bicarbonate Calibrator (калибратор бикарбоната) предназначен для использования с реактентом Bicarbonate QDR6190 для количественного определения бикарбоната на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Этот калибратор представляет собой водный раствор бикарбоната натрия. Только для диагностики И ИБЛ.

Состав

Буферный раствор, содержащий карбонат натрия и консервант в разных концентрациях.

Общие предосторожности

Соблюдайте общепринятые меры предосторожности, принятые при работе с лабораторными реагентами.

Утилизацию отработанных расходных материалов в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Подготовка калибратора

Калибраторы готовы к использованию.

На этикетке флакона наклейте дату вскрытия флакона с калибратором.

Хранение и стабильность

Нескрытый калибратор стабилен до даты, указанной на этикетке, при условии его хранения при температуре 16...25°C. После вскрытия калибраторы стабильны в течение 35 дней при условии, флаконы при 15...25°C, отсутствии загрязнения и закрытии крышки флакона сразу же после каждого использования.

Применение калибратора

См. соответствующую инструкцию по использованию набора реагентов.

Установленные значения

Значения калибратора указаны на этикетке флакона.

Значения для калибратора Бикарбоната (Bicarbonate Calibrator) прослеживаются до стандартного образца (SRM 361) Национального института стандартов и технологий (NIST).

Примечание: Результаты калибровки следует сразу же проверить в меню анализатора Routine (Рутин), Calibration Monitor (Проверка калибровки), Calibration Check (Калибровочная проверка), Quality Control (Контроль качества). Сразу же после калибровки, в соответствии с принятой лабораторной практикой, следует провести анализ контрольного образца (Контроль качества).

CE



**BECKMAN
COULTER.**

ПА КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА 3 (ПА CONTROL SERUM 3)

ODC0018

6 x 2 мл

(Синий крышечка)

Назначение

ПА контрольная сыворотка (ПА Control Serum) – представляет собой искусственный материал, изготовленный на основе сыворотки человека, предназначенный для калибровки и верификации результатов ПА ODC0018 и ODC0019 для проведения контроля качества лабораторных тестов с реактивами Beckman Coulter на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики ИФА.

Реактив	Исходный	Номер по кат.	Реактив	Номер по кат.
α-1-глобулин	Исходный	OBR8182	Фактин	OBR0150 / OBR0158 / OBR01203
α-1-липопротеин	Исходный	OBR8183	Липолиполин	OBR8155
Анти-стрептолизин O	Исходный	OBR8184	ИгG	OBR8144 / OBR81171
β-2-микроглобулин	Исходный	OBR8185	ИгM	OBR8145 / OBR81172
Гаммаглобулин	Исходный	OBR8186	ИгA	OBR8146 / OBR81173
C3	Исходный	OBR8156	Гаммабулин	OBR8175
C4	Исходный	OBR8159	РФ (реактив)	OBR81108
C-РБ	Исходный	OBR0147 / OBR01157	Трансферрин	OBR8152
C-РБ (натрий)	Исходный	OBR8159		

Состав

ПА контрольная сыворотка (ПА Control Serum) изготовлена на основе сыворотки человека и содержит следующие компоненты человеческого происхождения:

Искусственный α-1-глобулин	Фактин
α-1-липопротеин	Липолиполин
Антистрептолизин O	ИгG
β-2-микроглобулин	ИгM
Гаммаглобулин	ИгA
C3	Гаммабулин
C4	РФ
C-РБ	Трансферрин

Также содержит консерванты и стабилизаторы.

Общие характеристики

Во избежание возможного отклонения результатов анализа, содержащий после срока годности проследите анализаторные трубы вводить. Утилизировать отработанные расходные материалы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Биологические материалы человеческого происхождения были протестированы на наличие антител к HCV, HBV 1/2, а также HIV, в течение 18 месяцев в соответствии с требованиями FDA и были признаны отрицательно реагирующими в вышеуказанных тестах для каждого донора. Но поскольку не существует метода исследования, который бы гарантировал полную инфекционную безопасность биоматериалов человеческого происхождения, рекомендуется обращаться с подобными биоматериалами, как с потенциально инфицированными.

Поставка и контроль

Контроль, относя к использованию, перед выданным использованием, должен проводиться физическим контролем раз для получения полной оценки. На этикетке флакона напечатаны дату вскрытия контроля.

Хранение и стабильность

После вскрытия контроль стабилен до даты, указанной на этикетке, при условии хранения при температуре 2...8°C. После вскрытия флакона контроль стабилен в течение 30 дней при условии хранения при 2-8°C, отсутствия заморозки и хранения в холодильнике. Флакон сразу же после вскрытия использовать.

Применение анализа

См. соответствующую инструкцию к диагностическому набору. Любая лаборатория определяет частоту проведения контроля качества самостоятельно, однако каждая лаборатория при этом должна учитывать следующие моменты: анализаторные материалы должны использоваться в течение срока годности и после проверки калибровки.

Результаты, полученные в отдельной лаборатории, могут отличаться от установленных значений. Поэтому рекомендуется любой лаборатории для каждого анализа устанавливать свои средние значения и отклонения специфического контроля, на основании многократного измерения по установленной программе. Эти средние значения не должны выходить за пределы соответствующего реактивного материала, приведенных в прилагаемой таблице.

При обнаружении каких-либо отклонений в значениях значений контроля известными причинами отклонения всех значений, проводить все аналитические эталоны измерения и рабочие параметры анализатора.

Каждой лаборатории следует разработать план действий на тот случай, если результаты измерения контроля будут не установленными значениями.

Установленные значения

См. таблицу установленных средних значений и диапазонов допустимых значений.

Значения анализа в ПА контрольной сыворотке (ПА Control Serum) установлены на анализаторах Beckman Coulter серии AU и используются для калибровки реактивов и верификации результатов. Проследите значения на реактивных материалах, указанных в соответствующем сопроводительном документе.

EE



ИТА КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА 1 (ITA CONTROL SERUM 1)

ODC0014

8 x 2 мл

(Желтая крышка)

Назначение

ИТА Контрольная Сыворотка (ITA Control Serum) – представляет собой жидкий контрольный материал, приготовленный на основе сыворотки человека, градуированный в соответствии с международными стандартами ИТА ODC0016 и ODC0018 для проведения контроля качества лабораторных тестов с реагентами Beckman Coulter на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Также для удобства в виде.

Компонент	Исходный материал	Номер по ист.	Компонент	Номер по ист.
α-1-глобулин	ОСВН182		Фибриноген	ОСВН150 / ОСВН1136 / ОСВН1213
α-1-липопротеин	ОСВН183		Гликопротеин	ОСВН185
Алиментальное белок	ОСВН184		IgA	ОСВН144 / ОСВН1171
α-2-макроглобулин	ОСВН181		IgG	ОСВН145 / ОСВН1172
Липиды	ОСВН186		IgM	ОСВН146 / ОСВН1173
С3	ОСВН188		Трансферрин	ОСВН175
С4	ОСВН189		РФ (реактив)	ОСВН1108
С-РБ	ОСВН147 / ОСВН1167		Уреаза	ОСВН152
С-РБ (позитив)	ОСВН180			

Состав

ИТА контрольная сыворотка (ITA Control Serum) приготовлена на основе сыворотки человека и содержит следующие компоненты: человеческого происхождения:

Кислотный α-1-глобулин	Фибриноген
α-1-липопротеин	Гликопротеин
Алиментальное белок	IgA
α-2-макроглобулин	IgG
Циркулирующие	IgM
С3	Трансферрин
С4	РФ
С-РБ	Трансферрин

Также содержит стабилизаторы и стабилизаторы

Область применения

Во избежание возможного отклонения результатов анализа современных после серии контрольных исследований рекомендуется использовать только одну ИТА контрольную сыворотку для каждого анализа.

Большинство материалов человеческого происхождения были протестированы на наличие антигена в HCV, HIV 1/2, а также Hbs, антигена в соответствии с требованиями FDA и были признаны отрицательными результатами в специфических тестах для каждого донора. Но поскольку не существует метода исследования, который бы гарантировал полную инфекционную безопасность. Поэтому при использовании ИТА контрольной сыворотки, рекомендуется обращаться к надежным биоматериалам, как к потенциально инфицированным.

Подготовка к контролю

Контроль готов к использованию. Перед каждым использованием флакон необходимо встряхнуть для получения гомогенной смеси. Не смешивать флаконы непосредственно перед началом контроля.

Хранение и стабильность

ИТА контрольная сыворотка стабильна до даты, указанной на этикетке, при условии хранения при температуре 2...8°C. После вскрытия флакона контроль стабилен в течение 30 дней при условии хранения при 2...8°C, отсутствия замораживания и размораживания крышки флакона сразу же после каждого использования.

Применение анализа

См. инструкцию по эксплуатации к диагностическому набору.

Любая лаборатория определяет частоту проведения контроля качества самостоятельно, однако любая лаборатория при тестировании должна использовать контроль качества вместе с пробой пациента и после проведения анализа.

Результаты, полученные в аналитической лаборатории, могут отличаться от установленного значения. Поэтому рекомендуется любой лаборатории для каждого анализа устанавливать свои средние значения и стандартные специфические значения, на основании лабораторного измерения по установленным процедурам. Эти средние значения не должны выходить за пределы соответствующей приемлемой погрешности, приведенной в прилагаемой таблице.

При обнаружении любых либо тенденций в изменении значений контроля качества или аномальных системных или случайных, проверить для диагностики значения измерения и рабочие параметры аналитического прибора.

Каждой лаборатории следует разработать план действий на тот случай, если результаты измерения контроля выходят за установленные пределы.

Установленные значения

См. таблицу установленных средних значений и диапазонов допустимых значений.

Значения, указанные в ИТА контрольной сыворотке (ITA Control Serum) установлены на анализаторах Beckman Coulter серии AU с использованием калибровки реагента и лаборатория, применяющая проставлять значения до референсных материалов, указанных в соответствующем сопроводительном документе.

CE

RU01

№ ODC0014-01
2008-08

Система



**Контрольная сыворотка С-РБ (латекс)
(CRP (Latex) Control Serum)**

ODC0013

Контроль 1
Контроль 2

2 x 3 мл
2 x 3 мл

(Белая крышка)
(Синяя крышка)

Назначение

Контрольная сыворотка С-РБ (латекс) CRP (Latex) Control Serum представляет собой жидкий контроль на основе человеческой сыворотки, предназначенный для проверки контроля латекса С-РБ нормальной и высокой чувствительности с использованием реагента CRP (Latex) ODR6199 на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro.

Система

Жидкая сыворотка человека, содержащая человеческий С-РБ в различных концентрациях и контроле.

Общие предостережения

Во избежание возможного отклонения в лабораториях: содержимое флакона сыворотки применять исключительно в виде воды. Утилизировать отработанные расходные материалы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и биологического контроля.

Биологические материалы человеческого происхождения, содержащиеся в данном продукте, были протестированы на наличие агентов в HCV, HIV 1/2, а также Hbs, включены в соответствии с требованиями FDA и были признаны отрицательно реагировать в вышеуказанных тестах для поиска donors. Но поскольку не существует метода исследования, который бы гарантировал полную инфекционную безопасность биоматериалов человеческого происхождения, рекомендуется обращаться с подобными биоматериалами, как с потенциально инфицированными.

Подготовка контроля

Контроль готов к использованию. Перед использованием флакона переворачивать флакон несколько раз для получения однородной смеси. Не следует флакон начинать дату вскрытия контроля.

Хранение и стабильность

Неиспользованный контроль стабилен до даты, указанной на этикетке, при условии хранения при температуре 2...8°C. После приготовления контроля, стабильно: 30 дней при условии хранения при 2-8°C, отработанный контроль не подлежит повторному использованию.

Процедура анализа

См. инструкцию к диагностическому набору.

Любая лаборатория определяет частоту проведения контроля качества самостоятельно, однако хороший лабораторный практик считает не менее чем шестью измерениями вместе с пробойми пациентами и тестом протекания калибратора.

Результаты, полученные в отдельной лаборатории, могут отличаться от установленных значений. Подпись рекомендуется любой лаборатории для каждого анализа устанавливать свои средние значения и отклонения специфического контроля, на основании независимого измерения по установленным параметрам. Эти средние значения не должны выходить за пределы соответствующего параметра интервала, приведенного в инструкции к набору.

При обнаружении любых-либо тенденций в анализе-каждый анализ контроля качества или изменений отклонений его значений, проверьте все аналитические этапы контроля и рабочие параметры анализатора.

Каждый лабораторный сотрудник разбираться, как действовать в том случае, если результаты измерения контроля выходят за установленные пределы.

Установленные значения

См. таблицу установленных средних значений и диапазоны допустимых значений.

Значения С-РБ в контрольной сыворотке были установлены с использованием набора реагентов CRP Latex ODR6199 и калибраторов CRP Calibrator (Latex) CDR3081 и ODC0027 со ссылкой на CRM 470, как описывается в инструкции к набору и калибратору.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Baudinet B, Bianchini J, Blom-Jensen B, Carlsson A, Johnson AM, Millard Ward A, et al. The certification of a matrix reference material for immunochemical measurement of 14 human serum proteins. CRM 470. EUR 16243 EN, 1993.

CE



**BECKMAN
Coulter.**

КАЛИБРАТОР ХОЛЕСТЕРИНА ЛПНП LDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR

ODC0012

2 x 1 мл

Назначение

LDL Cholesterol Calibrator (калибратор холестерина ЛПНП) предназначен для использования с реактивами LDL Cholesterol ODR6163 для количественного определения холестерина ЛПНП на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Этот калибратор изготовлен на основе стандарта чистого Трилона для диагностики in vitro.

Состав

Лиофилизированный стандарт человека, содержащий холестерин ЛПНП

Основные характеристики

Упаковка и обработка расфасованы материалы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и ветеринарного контроля.

Биологические материалы человеческого происхождения, содержащиеся в данном продукте, были протестированы на наличие антител к HCV, HIV 1/2, в титре 1:80, антител в соответствии с требованиями FDA, и были признаны отрицательно реагирующими в специализированных тестах для поиска донора. Не рекомендуется использовать методы использования, которые бы гарантировали полную инфекционную безопасность биологических материалов происхождения, рекомендованная обработка с плазмой-белым биологическим, при использовании биологических.

Показания к применению

1. Анализы сыворотки с флуоресцентным и радиоиммунным методами, калиброванными методами.
2. С помощью серийной разбавки в калибровочном материале титра 1:0 или стандартной калибровочной смеси конечной температуры (15 - 25°C).
3. Закрытые флаконы разбавить пробой и растворить содержимое, плавно встряхивая флакон в течение 30 минут. Не допускать образования пены.
1. Не смешивать флаконы, иначе это приведет к повреждению калибратора.

Упаковка и стабильность

Каждый калибратор стабилен до даты, указанной на этикетке, при условии его хранения при температуре 2-8°C. После приготовления калибратор стабилен в течение 7 дней при температуре 2 - 8°C. Калибратор может быть замораживан и однократно разморожен. Размороженный и замораженный калибратор стабилен 30 дней при температуре ниже -20°C.

Для обеспечения стабильности калибратора Beckman Coulter рекомендуются следующие процедуры: закрыть флаконы сразу после использования и соблюдать меры предосторожности при обращении с биологическими материалами.

Технические данные

См. сопроводительные инструкции по использованию набора реагентов.

Упаковочный материал

См. таблицу упаковки для калибратора.

Запросите для калибратора холестерин ЛПНП (LDL Cholesterol Calibrator) предоставить до референсного метода определения холестерина ЛПНП US CDC (данные по контролю над заболеваниями, США).¹

Ссылки

1. Beckman FS. Rapid Lipid Cholesterol Estimation Program recommended for measurement of low density lipoprotein cholesterol, executive summary. The National Cholesterol Education Program Working Group on Lipoprotein Measurement. Clin Chem 1989; 35: 1414 - 20.

CE



**BECKMAN
Coulter.**

КАЛИБРАТОР ХОЛЕСТЕРИНА ЛПВП) HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR

ODC8011

2 x 2 мм

Назначение

HDL-Специфичный Сайдлайн калибратор холестерина ЛПВП) предназначен для использования в реакторе HDL-Специфичный OD8017 для количественного определения холестерина ЛПВП) на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Этот калибратор предназначен для оценки содержания холестерина в сыворотке для диагностики и в кинезе.

Состав

Гидрофобизированные чистые холестерин, холестерин ЛПВП) холестерин

Область применения

Универсальная универсальная разбавленная матрица в соответствии с требованиями стандарта стандартизации и оценки качества контроля

Бюджетные материалы холестерина промышленной, образованной в данной продукции. Были протестированы на чистоте и стабильности в ИСМ, ИМ, ИМ, и были найдены в соответствии с требованиями FDA и были протестированы стабильностью и воспроизводимостью для целей анализа. На основании их структуры метода исследования, который был протестирован, чтобы подтвердить возможность биохимического измерения холестерина, результаты анализа с помощью Beckman Coulter, как с помощью инфракрасного.

Пакетная информация

1. Адекватно смешать с флуоресцентной и разбавленной пробой, на которую будет анализироваться холестерин
2. С помощью мерной пипетки добавить в лиофилизированную матрицу точно 1.0 мл стерильной дистиллированной воды комнатной температуры (16-25°C)
3. Закрыть флакон резиновой пробкой и растереть содержимое. Извлечь порцию флакона в течение 30 секунд. Не допускать образования пены
4. Предложить порцию флакона до тех пор, пока раствор не станет гомогенным и весь лиофилизированный материал не растворится
5. На этикетке флакона отметить дату приготовления калибратора

Хранение и стабильность

Неосвоенный калибратор стабилен до даты, указанной на этикетке, при условии его хранения при температуре 2-8°C. После приготовления калибратор остается стабильным 7 дней при температуре 2-8°C. Калибратор может быть анализирован и оценен повторно. Разбавленный и замороженный калибратор стабилен 30 дней при температуре -20°C.

Для обеспечения стабильности калибратора компания Beckman Coulter рекомендует хранить флакон с пробой сразу после использования и избегать повторного замораживания. Калибратор не требует охлаждения.

Примечания

См. дополнительные материалы на информационном сайте производителя

Указания по использованию

См. таблицу значений для калибратора

Значения для калибратора холестерина ЛПВП) (HDL-Специфичный OD8017) предназначены для референсного метода измерения холестерина ЛПВП) на CDC (данные из контроля над калибратором, США)

Ссылки

1. Mandel A, Kohn J, Lipid X, eds. Manual of laboratory procedures for lipid Research Clinical Program, lipid and lipoprotein analysis. 2nd ed. Bethesda, MD: U.S. Dept. Health and Human Services, 1982

CC



**BECKMAN
COULTER.**

DAU МУЛЬТИ КОНТРОЛЬ НАРКОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ (DAU MULTIDRUG CONTROL)

ODC0006

DAU Мульти контроль наркотических препаратов
3 x 5 мл
DAU Мульти контроль наркотических препаратов
3 x 5 мл

1 (низкий)

2 (высокий)

Назначение

DAU Мульти контроль наркотических препаратов (DAU Multi-Drug Control) – это удобный контроль на основе микрочипов, предназначенный для проведения контроля качества тестов с микрочипами-реактивами Beckman Coulter на анализаторе Beckman Coulter серии AU Tology для диагностики $10 \mu\text{L}$.

Реагент	Код, №
Алфатамины/Экстази (Amphetamine/Ecstasy)	ODN323
Барбитураты (Barbiturates)	ODN315
Бензодиазепины (Benzodiazepines)	ODN318
Кокаин (Cocaine)	ODN317
ЕДОР	ODN316
Метаксан (Mettaxan)	ODN319
* Опий 2К (Opium 2K)	Номер по каталогу Microplate 181529P/10088P/10008P
* ОРР	Номер по каталогу Microplate 181575P/10017P/10017P
* Препараты (Propoxyphane)	Номер по каталогу Microplate 189523P/19917P/10017P

* Тесты предназначены для использования только с реактивами Microplate.

Состав

DAU Контроль, приспособлен на основе микрочипов и содержит следующие компоненты:

4 Метаксана	ЕДОР	Препараты
Самбутилан	Метаксан	Кокаин
Натриум	Морфин	Стильматоры
Бензодиазепин	Феналфен	

Общие характеристики

Во избежание возможного отклонения выходящих параметров соединенной после смены контроля промышленные канализационные трубы водопровода.

Уменьшения отклонения расхода материала в трубопроводе санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Материалы человеческого происхождения были протестированы на HIV 1/2, гепатиты В и С. Результаты этих тестов были отрицательными. Следует помнить, что не существует методов, исключивших риск заражения на 100%. Материал следует рассматривать как образец, который и соблюдать все меры предосторожности как при работе с потенциально опасными материалами. В случае прямого контакта с этим материалом необходимо следовать инструкциям, выданным уполномоченными органами здравоохранения.¹²

Подготовка контроля

Контроль готов к использованию. Перед использованием плотно заверните каждый флакон насухо раз для получения положительной смеси.

На этикетке флакона налейте две капли в каждый флакон с контролем.

Хранение и стабильность

Не замораживать. Не испытывать контроль стабильности до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения $2 \pm 2^\circ\text{C}$. После вскрытия флазона контроль сохраняет стабильность в течение 30 дней при условии, что в нем отсутствуют загрязнения, флазона сразу же после каждого использования плотно закрыть, а температура хранения составляет $2 \pm 2^\circ\text{C}$.

Порядок выполнения

См. сопроводительную инструкцию к диагностическому набору.

Любая лаборатория определяет частоту проведения контроля качества самостоятельно, однако хорошая лабораторная практика считается из выданных измерений смеси с пробой пациентов и после проведения калибровки. Результаты, полученные в отдельной лаборатории, могут отличаться от установленных значений. Поэтому рекомендуется любой лаборатории для каждого анализа устанавливать свои предельные значения и отклонения специфического контроля, на основании непосредственного измерения на установленном приборе.

При обнаружении каких-либо отклонений в измерениях начальной контроля качества или аномальных отклонений его значений, проверить все выданные тесты намерения и рабочие параметры анализатора. Любая лаборатория должна разработать план действий на тот случай, если результаты измерения контроля выходят из установленных пределов.

Установленные значения

Значения для DAU Мульти контроля наркотических препаратов (DAU Multi-Drug Control) приведены в таблице ниже. Эти значения получены с использованием первичного градуировочного стандарта, значения последующих серий методом (XLMC).

№	Алфатамины/ Экстази мкг/мл	Барбитураты мкг/мл	Бензодиазепины мкг/мл	Кокаин мкг/мл	ЕДОР мкг/мл	Метаксан мкг/мл	Опий 2К мкг/мл	ОРР мкг/мл	Препараты мкг/мл
1	750	225	225	225	70	225	1800	16.75	225
2	1250	375	375	375	125	375	2500	31.25	375

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration, 29 CFR Part 1919.1000, Occupational Exposure to Bloodborne Pathogens, Final Rule Fed. Register 1991:56 64175-64182.
2. Council Directive (2002/95/EC), Official J. of the Europ. Communities. No L269 from Oct. 17, 2000

CE



**BECKMAN
COULTER.**

КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ХОЛЕСТЕРИНА ЛПВП/ЛПНП (HDL-DL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM)

0000005

**Контроль 1
Контроль 2**

**3 x 5 мл
3 x 5 мл**

Назначение

Контрольная сыворотка холестерина ЛПВП/ЛПНП (HDL-DL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM) представляет собой лиофилизированную сыворотку человека, предназначенную для определения контроля качества холестерина ЛПВП и ЛПНП в реактивах СЕ80187 и СЕ80188 соответственно, на анализаторах Бейман-Ковлтер серии AU. Только для диагностики in vitro.

Состав

Лиофилизированная человеческая сыворотка, содержащая холестерин ЛПВП и ЛПНП

Общие рекомендации

Упаковки сыворотки должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Бактериальные загрязнения лиофилизированной сыворотки не допускаются. В случае обнаружения в сыворотке в соответствии с требованиями FDA и Бейман-Ковлтер строгие рекомендации по использованию для каждого донора.

На упаковке не должно быть следов повреждения. В случае повреждения упаковки лиофилизированная сыворотка должна быть немедленно уничтожена.

Правила контроля

Анализ должен быть выполнен сразу и немедленно после вскрытия упаковки лиофилизированной сыворотки.

Добавьте не более 5,0 мл стерильной дистиллированной воды комнатной температуры (15 - 25°C).

Закройте флакон резиновой пробой и тщательно перемешайте, избегая образования пены. Не допускайте образования пены.

Перемешивание способствует более быстрому растворению лиофилизата и получению однородного раствора.

На этикетке контроля не должно быть следов повреждения.

Хранение и стабильность

Контроль холестерина ЛПВП и ЛПНП стабилен до даты, указанной на этикетке, при условии его хранения при температуре 2 - 8°C.

Растворенный контроль.

стабилен 1 день при температуре 2 - 8°C.

Контрольную сыворотку можно использовать в течение 30 дней (при температуре - 20°C).

При температуре - 20°C.

Для сохранения стабильности контроля Бейман-Ковлтер рекомендует тщательно закрывать флаконы сразу после использования и соблюдать меры предосторожности, предотвращающие contamination.

Примечания

См. прилагающую инструкцию к диагностическому набору.

Любая лаборатория, проводящая контроль качества самостоятельно, однако хорошей лабораторией является та, которая выполняет контроль качества вместе с другими лабораториями и имеет аккредитацию.

Результаты, полученные в отдельных лабораториях, могут отличаться от установленных значений. Поэтому рекомендуется любой

лаборатории для каждого анализа устанавливать свои средние значения и отсылать стандартного контроля, на основании

неоднократного измерения по установленным правилам. Эти средние значения не должны выходить за пределы соответствующих

пределах контроля, приведенных в прилагаемой таблице.

При обнаружении заниженных результатов в процессе измерения контроля качества или анализа отклонений от значений, проверьте

все анализаторы и методы измерения и работы лабораториями анализатора.

Каждой лабораторией следует разработать план действий на тот случай, если результаты контроля качества не соответствуют

предельным.

Установленные значения

См. таблицу установленных средних значений и диапазонов доступных значений.

Значения холестерина ЛПВП/ЛПНП в контрольной сыворотке холестерина ЛПВП/ЛПНП (HDL-DL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM)

предназначены для референсного метода L8 CDC (Центр контроля за заболеваниями) холестерина ЛПВП и ЛПНП.

Библиография

1. Haines A, Karon J, Lippel K, eds. Manual of laboratory operations in Lipid Research Clinics Program. Lipid and lipoprotein analysis, 2nd ed. Bethesda, MD: US Dept Health and Human Services, 1982.
2. Beckman RB, Ross JW, for the National Cholesterol Education Program Working Group on Lipoprotein Measurement. Guidelines on the measurement of low-density lipoprotein cholesterol executive summary. Clin Chem 1985; 31:14-22.

CE

RU01

BUCKMAN 01
1990-08

Coulter



**BECKMAN
COULTER.**

Контрольная сыворотка 2 (Control Serum 2)

ODC0004

20 x 5 мл

(Красная крышка)

Назначение

Контрольная сыворотка 2 (Control Serum 2) представляет собой лиофилированную сыворотку человека, предназначенную для использования в комбинации с Контрольной сывороткой 1 (Control Serum 1 ODC0003) для проведения контроля качества тестов, перечисленных в прилагаемой таблице, с реагентами Beckman Coulter на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики *in vitro*.

Состав

Лиофилированная сыворотка человека, содержащая минимальные добавки, субстраты и ферменты человеческого и животного происхождения. Сыворотка также содержит консерванты и стабилизаторы. Применение: концентрация выливается напрямую от партии к партии. Их значения приведены в сопроводительной таблице.

Область применения

Указанные отработанные расходные материалы в соответствии с требованиями биохимико-аналитического и иммунологического контроля.

Биохимические материалы человеческого происхождения были простерилизованы на наличие антигенов к HCV, HIV 1/2, а также Hbs антигена в соответствии с требованиями FDA и были признаны строго и тщательно регулируемыми в рекомендуемых тестах для каждого донора. Но поскольку не существует метода исследования, который бы гарантировал полную биофункциональную безопасность биоматериалов человеческого происхождения, рекомендуется обращаться с подобными биоматериалами, как с потенциально инфицированными.

Подготовка к контролю

Перед вскрытием флакона с лиофилизатом, вставьте флакон до комнатной температуры, для предотвращения образования конденсата во флаконе.

Перед вскрытием флакона, слегка постучите по крышке для того, чтобы высвободить лиофилизат, застрявший в пробке. Аккуратно снимите крышку с флакона, избегая попадания лиофилизата.

Добавьте во флакон точно 5 мл стерильной деионизированной воды комнатной температуры (около 20°C).

Соборно закройте крышку и несколько раз перемешайте флакон, избегая образования пены. Не трясите. Оставьте его при комнатной температуре на 30 минут для полного растворения лиофилизата.

Продолжайте перемешивать до полной концентрации раствора и полного растворения лиофилизата.

Не используйте флакон раньше чем через 2 часа после приготовления. Храните при температуре 2...8°C.

Примечание: При использовании контроля для измерения активности Щелочной фосфатазы, пригодность свежего раствора лиофилизата должна быть не менее 2 часов при температуре 2...8°C.

Хранение и стабильность

Несколько контрольных стабильных доз, указанных на этикетке, при условии хранения при температуре 2...8°C. После принятых мер контроль стабилен 7 дней при условии хранения при 2...8°C, отсутствия загрязнения и закрытия крышки флакона сразу же после каждого использования.

Примечание: В случае быстрого загрязнения флакона характерный запах, ускоренное таяние, изменение цвета. В таких случаях не используйте больше историчный контрольный материал.

Стабильность аналитов в контроле для Lci 0029

Стабильность в подготовленном контроле	2...8°C	-20°C
Общий и прямой билирубин (Bilirubin Total и Direct) (измерять в чашечном месте)	24 часа	6 дней
Холестерин (Cholesterol)	24 часа	2 дня
Щелочная фосфатаза (ALP)	24 часа	1 месяц
Щелочная фосфатаза (ALP), АЛТ (ALT), Аминотрансфераза (Aspartate, AST (AST), CK CK-NAC), ГГТ (GGT), ГлДГ (GLDH), ГЛДГ (GLDH), ЛДЛ (LDL), Липаза (Lipase), Неорганический фосфор (Inorganic Phosphorus), Триглицериды (Triglyceride)	2 дня	1 месяц
Альбумин (Albumin), Кальций (Calcium), Хлор (Chloride), Холестерин (Cholesterol), Креатинин (Creatinine), Глюкоза (Glucose), Холестерин ЛНП (LDL Cholesterol), Железо (Iron), Лактат (Lactate), Литий (Lithium), Натрий (Sodium), Калий (Potassium), Натрий (Sodium), Общий белок (Total Protein), ДЛСС (LBC), Моноамины (Urea), Моноамины (Urea Acid), IgA, IgG, IgM, Apo A1 (APO A1), Apo B (APO B)	7 дней	1 месяц

Стабильность аналитов в контроле для Lci 0029 и выше

Стабильность в подготовленном контроле	2...8°C	-20°C
Общий и прямой билирубин (Bilirubin Total и Direct) (измерять в чашечном месте)	24 часа	6 дней
Холестерин (Cholesterol)	24 часа	2 дня
Щелочная фосфатаза (ALP)	24 часа	1 месяц
Щелочная фосфатаза (ALP), АЛТ (ALT), Аминотрансфераза (Aspartate, AST (AST), CK CK-NAC), ГГТ (GGT), ГлДГ (GLDH), ГЛДГ (GLDH), ЛДЛ (LDL), Липаза (Lipase), Неорганический фосфор (Inorganic Phosphorus), Триглицериды (Triglyceride)	2 дня	1 месяц
Альбумин (Albumin), Кальций (Calcium), Хлор (Chloride), Холестерин (Cholesterol), Креатинин (Creatinine), Глюкоза (Glucose), Холестерин ЛНП (LDL Cholesterol), Железо (Iron), Лактат (Lactate), Литий (Lithium), Натрий (Sodium), Калий (Potassium), Натрий (Sodium), Общий белок (Total Protein), ДЛСС (LBC), Моноамины (Urea), Моноамины (Urea Acid), IgA, IgG, IgM, Apo A1 (APO A1), Apo B (APO B)	7 дней	1 месяц

* Стабилизатор для Щелочной фосфатазы, входящий в состав диагностического набора CDRB 101, ניתן להוסיף в этот контроль.

** В случае загрязнения, замораживания.



Средствата за износ са изключително важни за развитието на икономиката на страната. Средствата за износ са изключително важни за развитието на икономиката на страната.

Примечания анализа

См. соответствующую инструкцию к диагностическому набору

Каждая лаборатория определяет частоту проведения контроля качества самостоятельно, однако хорошей лабораторной практикой считается не менее одного измерения вкратце с пробойми пидментов и после проведения калибровки.

Результаты, полученные в отдельной лаборатории, могут отличаться от установленных значений. Поэтому рекомендуется любой набор данных для каждого анализа установить свои средние значения в отклоненный специфического контроля, на основании неопределенного измерения по установленным правилам. Эти средние значения не должны выходить за пределы соответствующим принятым интервалам, приведенным в прилагаемой таблице.

При обнаружении каких-либо отклонений в изменении значений контроля качества или выявлении отклонений его значений, проверить все аналитические этапы измерения и рабочие параметры анализатора.

Каждой лаборатории следует разработать план действий на тот случай, если результаты измерения контроля выйдут за установленные пределы.

Убедитесь в том, что новая партия на фактшане контроля соответствует номеру, указанному в Установочном Листе.

Установочные значения

См. таблицу установочных средних значений и допустимых диапазонов.

Эти значения предназначены для использования на анализаторах Vestmax S-Series серии AL. Значения представляют собой средние значения или натуральные измерения в не менее 5-ти независимых сериях, или трехкратное измерение в не менее 6-ти независимых сериях.

Диапазон представляет собой максимальное допустимое отклонение измеренного измерения, рассчитываемого RSD_{max}. Для анализа на фактшане в списке RSD_{max}, допустимый интервал дается как $\pm 25\%$ от установленного среднего значения.

При использовании программы контроля качества анализатора, каждая лаборатория должна сама определить стандартные отклонения для каждого анализа. Эти стандартные отклонения не должны выходить из установленного допустимого диапазона значений.

ВНИМАНИЕ

1. Vestmax.de Bundesärztekammer, ÖGK Klinische Chemie Mülheim 2001,326)

CE



**BECKMAN
COULTER.**

ЛИГ (LH)

OSR62168

16 x 48 мл

R1

Назначение

Фотометрический тест для полуквантитативного определения степени гиперхромности, истеричности и гемоглинов (ЛИГ) в сыворотке или плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для *in vitro* диагностики.

Клиническое значение

Различные заболевания и паразитические состояния могут быть причиной высокой концентрации в биологических жидкостях таких тестов как билирубин, гемоглобин и пигменты. Эти компоненты могут влиять на результаты других фотометрических тестов.

Производство реагентов для клинической химии ответственно за определение параметров, влияющих на процесс измерения при использовании на наборе.

При использовании реагента, оператор должен оценивать качество проб и определять потенциальные влияния компонентов в сыворотке. Такая оценка обычно проводится по показателям визуально. С использованием реагента ЛИГ эта процедура может быть выполнена на анализаторах Beckman Coulter серии AU.

Принцип определения

Проба пациента в анализаторах Beckman Coulter серии AU разводится реагентом ЛИГ, а затем проводится измерение на 6-ти различных длинах волны. Если в пробе обнаружен хромоген в концентрации, потенциально влияющей на результаты других тестов, соответствующие флаги будут присутствовать в бланке для данной пробы вместе с другими результатами. Эти флаги характеризуют вид хромогена (ЛИГ: желтушность, ИКТ: билирубин и ГЕМ: гемоглобин) и его приблизительную концентрацию (например, +, ++, +++ или, таблица ниже)

Флаги	Приблизительная концентрация хромогена		
	ЛИГ (мг/дл, мкмоль/л)	ИКТ (мг/дл, билирубин)	ГЕМ (мг/дл, гемоглобин)
Н	< 40	< 2.5	< 50
+	40 – 80	2.5 – 4.9	50 – 99
++	100 – 199	5.0 – 9.9	100 – 199
+++	200 – 299	10 – 19.9	200 – 299
++++	300 – 399	20 – 49	300 – 399
+++++	> 399	> 49	> 399

Если конкретная проба содержит один или более флагов, следует проверить вид и/или уровень хромогена, который потенциально может влиять на точность результатов других тестов в этой пробе. При проверке можно использовать информацию из инструкции, прилагаемой к каждому набору реагентов.

Реагенты

Состав в реакционной смеси:

Хлорид натрия

0.9%

Консерванты

Общие предосторожности

Соблюдайте все меры предосторожности, принятые при работе с лабораторными реагентами. Утилизуйте отработанные расходные материалы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Подготовка реагента

Реактив готов к использованию и может быть сразу установлен в анализатор.

Хранение и стабильность реагента

Накрытый реагент стабилен при условии его хранения при температуре 2-8 °C. После вскрытия реагент стабилен 90 дней при хранении в анализаторе.

Исследуемый материал
Сыворотка и плазма
Рассеиваются в течение 2 часов после взятия крови у
пациента.
Процедура анализа
См. Руководство пользователя и соответствующие инструкции по техническим вопросам.
Калибровка
Калибровка не требуется.
Расчет

Степень ЛМГ рассчитывается по формуле: $\text{ЛМГ} = \frac{\text{АУ2700}}{\text{АУ2700}} \times 100\%$ в анализаторах Beckman Coulter серии AU.

Соответствие методов

Линейность

При сравнении степеней линейности, полученных с использованием реагента ЛМГ OSR62106 на анализаторе AU2700, с биохимическим турбидиметрическим методом и визуальной оценкой тремя независимыми экспертами, были использованы сыворотки пациентов. Результаты сравнения:

Флаг	Частота появления флагов ЛМГ					
++++				0	0	2
+++				0	1	1
++			0	14	1	
+		0	6	0		
-	1	22	3			
N	478	4				
	50.2450	0.0151- 0.0400	0.0401- 0.0800	0.0801- 0.1200	0.1201- 0.2000	>0.2000
Чувствительность						

ЛМГ AU2700	+ VB	3	52
	- VB	268	20
	- VB	+ VB	
Визуальная оценка			

Интерференция

При сравнении степеней интерференции, полученных с использованием реагента ЛМГ OSR62106 на анализаторе AU2700, с биохимическим турбидиметрическим методом и визуальной оценкой тремя независимыми экспертами, были использованы сыворотки пациентов. Результаты сравнения:

Флаг	Частота появления флагов ЛМГ					
++++						4
+++				11		3
++			2	15	1	
+		1	20	10		
-	6	12	4			
N	498	1				
	<2.5	2.5- 4.99	5.0- 9.99	10.0- 19.9	20.1- 39.9	>40.0
Концентрация билирубина (мкмоль/л)						

ЛМГ AU2700	+ VB	7	74
	- VB	293	5
	- VB	+ VB	
Визуальная оценка			

Гемолит

При сравнении степеней гемолит, полученных с использованием реагента ЛМГ OSR62106 на анализаторе AU2700, с биохимическим турбидиметрическим методом и визуальной оценкой тремя независимыми экспертами, были использованы сыворотки пациентов. Результаты сравнения:

Флаг	Частота появления флагов ЛМГ					
++++						0
+++				15		
++				10		
+			24	3		
-		30	8			
N	358	28				
	<50	50 - 99	100 - 199	200 - 299	300 - 499	>500
Концентрация гемоглобина (г/дл)						

ЛМГ AU2700	+ VB	1	86
	- VB	288	4
	- VB	+ VB	
Визуальная оценка			

Влияние факторов:

Были получены следующие результаты исследований, проводимых для оценки чувствительности метода к влияющим факторам:

Степень гемолити	Не оказывают влияния значения гемоглобина до 40 мг/дл или 684 ммоль/л
Степень интерференции	Не оказывают влияния значения гемоглобина до 5 г/л
Степень гемоглобина	Не оказывают влияния значения гемоглобина до 5 г/л
	Значения гемоглобина 40 мг/дл могут снижать степень ГЕМ максимум на 2 класса – т.е. степень ГЕМ +++ может выдвигаться как ГЕМ ++
	Значения гемоглобина 500 мг/дл могут повышать степень ГЕМ максимум на 1 класс – т.е. степень ГЕМ + может выдвигаться как ГЕМ ++.

Обе влияния действия исключаются в линейной зависимости от концентрации гемоглобина и гематокрита

Ограничения

При появлении флагов АНМ следует проверить достоверность всех индексов.

- при сильной степени мутности, интерференции или гемоглобина, индекс ЛУТ, ГЕМ и ИКТ в пробе следует рассматривать как +++++.

- Если при визуальной оценке в пробе не выявлено окислений, её следует оценивать как нормальную

- В редких случаях при средней степени гемоглобина (от 20 до 50 мг/дл) может появиться флаг АНМ. Автоматически ЛУТ/ГЕМ в этих пробах могут быть занижены 10 - 20%

Обороты, помехи, влияние на точность корреляцию между стандартными и мутными пробами

Библиография

- Tietz HW. "Specimen Collection and Processing: Sources of Biological Variation," Textbook of Clinical Chemistry, 2nd Edition, W. B. Saunders, Philadelphia, PA (1994).
- National Committee for Clinical Laboratory Standards, Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens, Approved Guidelines, NCCLS publication H18-A, Villanova, PA (1990).
- Tietz HW. "Clinical Guide to Laboratory Tests," 3rd Edition, W. B. Saunders, Philadelphia, PA (1986).
- Henry JB ed. "Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods," 18th Edition, W. B. Saunders, Philadelphia, PA (1991).
- Friedman RS and Young DS. Effects of Disease on Clinical Laboratory Tests, 3rd Edition, AACCPress, Washington, D.C. (1997).
- Young DS. Effects of Preanalytical Variables on Clinical Laboratory Tests, 2nd Edition, AACCPress, Washington, D.C. (1997).

2004-09




ОКП 93 9800

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный Директор

ООО «Бекмен Культер»

Ян Поспишил.



Инструкция по эксплуатации

Реагенты *in vitro* диагностические и расходные материалы для
анализаторов серии AU и HITE

Соответствуют требованиям национальных и международных стандартов
ГОСТ Р 51088-97

2009



**BECKMAN
COULTER.**

СИСТЕМНЫЙ КАЛИБРАТОР (SYSTEM CALIBRATOR)

66300

20 x 1 мЛ

Назначение

Системный калибратор (системный калибратор) представляет собой калибратор на основе сыпучих порошков, предназначенный для использования с реактивами Beckman Coulter на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro.

Состав

Системные порошки с добавлением дополнительных веществ и компонентов для формирования микрочастиц, имитирующих или заменяющих природные частицы.

Область применения

Включенные материалы чистейшего происхождения, содержащиеся в данном продукте, были протестированы на наличие антигена к HCV, HCV, H2, и анти-H2b. Витрины в соответствии с требованиями FDA, и были приняты стандартные рекомендации в отношении использования. В связи с тем, что из одного флакона выводится материал на оборудование специального оборудования, оборудованный калибром в соответствии с требованиями производителя, а данные материалы следует обращаться так с потенциальными инфекционными агентами. Утилизировать отработанные реактивы материалы в соответствии с методами, рекомендованными санитарно-эпидемиологическим и экологическим контролем.

Положения калибратора

1. Во избежание образования конденсата во флаконе, перед открытием его следует проветрить до комнатной температуры.
2. Перед тем как открыть флакон, слегка постучите по крышке, чтобы удалить конденсат с нее.
3. Измерьте количество реактивов, добавьте в флакон точно 5,0 мл свежей деминерализованной воды, комнатной температуры (около 20°C). При необходимости можно добавить небольшое количество воды.
4. Закройте флакон пробкой, переверните несколько раз и оставьте на 10 мин. Для полного растворения, слегка перемешивайте флакон на вращающемся насадке в течение 30 минут. На крышке флакона, набрав образцы, сделайте пометки.
5. Продолжайте перемешивание до тех пор, пока раствор не станет однородным и все диспергированные материалы на растворятся.
6. На этикетке флакона напечатаны даты растворения калибратора. Храните при температуре 2...8°C.

Применение

1. Для определения Щелочной фосфатазы (Alkaline Phosphatase) разбавляют перед использованием растворенный калибратор выдерживать не менее 2 часов при температуре 2...8°C.
2. Для определения активности Щелочной фосфатазы (Alkaline Phosphatase) калибратор можно добавить стабилизатор. Стабилизатор состоит из набор реактивов и достаточно внести 1 каплю на 1 мл раствора. После добавления стабилизатора калибратор **используется** для измерения других тестов.
3. Липазу (Lipase) следует калибратор использовать обычным способом в режиме AB. См. инструкцию.

Важные замечания, касающиеся безопасности

Для получения достоверных результатов, при анализе материала следует использовать специализированные реактивы для анализа. Для предотвращения ложных результатов, используйте для анализа реактивы калибратора. После получения результатов анализа, при необходимости, используйте калибратор, который был использован для анализа. Для получения достоверных результатов, при анализе материала следует использовать специализированные реактивы для анализа. Для предотвращения ложных результатов, используйте для анализа реактивы калибратора. После получения результатов анализа, при необходимости, используйте калибратор, который был использован для анализа.

Хранение и стабильность

Материал калибратора при температуре хранения 2...8°C сохраняет стабильность до даты, указанной на этикетке.

Наша гарантия информации о стабильности компонентов реактивов калибратора при отсутствии бактериального загрязнения.

Щелочная фосфатаза (Alkaline Phosphatase), ALT (ALT), ACT (AST), Аминотрансфераза (Aspartate), CK (CK-MAC), ГГТ (GGT), ГФФ (HGF), ЛДГ (LDH), Креатинин (Creatinine), Протеин (Protein), Холестерин (Cholesterol), Глюкоза (Glucose), Панкреатин (Pancreatin), Липаза (Lipase), Общий белок (Total Protein), Триглицериды (Triglyceride), ИФК (IFC), Моноамины (Monoamines), Липиды (Lipids), Билирубин (Bilirubin), Калий (Potassium), Натрий (Sodium), Магний (Magnesium)	20°C ± 1	
	Не разбавляется	В 10 раз
Альбумин (Albumin), Протеин (Protein), Холестерин (Cholesterol), Глюкоза (Glucose), Панкреатин (Pancreatin), Липаза (Lipase), Общий белок (Total Protein), Триглицериды (Triglyceride), ИФК (IFC), Моноамины (Monoamines), Липиды (Lipids), Билирубин (Bilirubin), Калий (Potassium), Натрий (Sodium), Магний (Magnesium)	1 месяц	30 часов
Калий (Potassium), Натрий (Sodium), Магний (Magnesium)	1 месяц	1 неделя

* При оптимальном замораживании.

В Калибраторе до серийного номера 112 стабилизатор не использовался, поэтому были 1 неделя.

Использование

Калибратор (Alkaline Phosphatase) разбавляют перед использованием калибратора. Во избежание стабилизатора в течение 1 часа после его разведения или калибратора (Alkaline Phosphatase) и калибратора (Alkaline Phosphatase) (Total и Non-specific Acid Phosphatase). При добавлении стабилизатора калибратор можно использовать в течение 30 часов при температуре его хранения 2...8°C. Нельзя использовать калибратор после его замораживания.

** Билирубин (Bilirubin) после замораживания билирубин в калибраторе стабилен в течение 5 дней.

Полностью стабилизированный калибратор на свету, разбавляется в течение 30 минут, в том же флаконе, при использовании его для калибратора билирубина (Bilirubin).

Примечания

См. соответствующую инструкцию.

Установочные значения

Значения для калибратора устанавливаются на анализаторах Beckman Coulter серии AU с использованием стандартной процедуры и реактивов Beckman Coulter System Reagents. Убедитесь в том, что номер партии на флаконе калибратора соответствует номеру, указанному в таблице со значениями в списке-приложении.

CE

10

КАЛЬД
2018

0100



**BECKMAN
COULTER.**

АМФЕТАМИН-ЭКСТАЗИ (Amphetamine/Extasy)

СЕРИИ

2 x 15 мл
2 x
2 x 15 мл
2 x

R1 Буфер
R1 Fluo
R2 Буфер
R2 Fluo

Назначение

Качественное и полуколичественное ферментативное иммунологическое определение Амфетамина и Экстази в моче человека на анализаторе Beckman Coulter серии AU с Талией для диалитиков и виво.

Данный метод позволяет получить только предварительные результаты теста. Для подтвержденных результатов требуется использовать более специфичный иммунологический метод. В качестве подтверждающего метода предпочтительнее использовать метод газовой хромато-масс-спектрометрии (GC/MS). Положительные результаты теста любого характера, полученные при любом из методов, следует рассмотреть в соответствии с другими клиническими данными и лабораторными исследованиями.

Клиническое значение

Амфетамин и его производные, включая Экстази, относятся к классу стимуляторов ЦНС^{1,2}. Экстази, 3,4-метилфенил-2-метилпирролидин (MDMA) и 3,4-метилфенил-2-метилпирролидин (MDA) - метилфенилы выводят дисфетамин с резкими типичными замещающими группами в кольцо - наиболее распространенные наркотики на юго-востоке Европы³. Амфетамин вызывает физическую и психоэмоциональную зависимость. Соединения группы Амфетаминов повышают физическую активность, усиливают устойчивость, вызывают ощущение эйфории, возбуждения, снижают аппетит^{4,5}. В низких дозах - вызывают сонливость, раздражительность, бессонницу, снижение аппетита, повышение давления^{6,7}. В случае длительного приема или приема доз амфетамин могут развиваться психоэмоциональные нарушения, связанные со стимуляцией симпатической системы^{8,9}.

Амфетамин быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта и обнаруживается во всем теле¹⁰. Около 70% дозы выводится в моче в течение 24 часов после приема. В зависимости от pH мочи около 30% амфетамин выводится в неизмененном виде, оставшаяся часть в виде метаболитов. Около 62% метамфетамин выводится в моче в течение 24 часов после приема, 43% в неизмененном виде, оставшаяся часть - в виде метаболитов, в том числе амфетамин^{11,12}. Амфетамин обнаруживается в моче в течение 3-4 дней после приема⁹.

Принцип определения

Данный метод основан на использовании ферментативного фермента (галактооксидазы), купленного методом гелей на бумаге в виде двух неактивных фрагментов. Последнее спонтанно соединяется, образуя активный фермент, который в этом ферментном методе, расщепляет субстрат, имеющий окраску реакционной среды, что регистрируется фотометрически.

В данном методе, наркотик в пробе конкурентно за места связывания на антигене с одним из неактивных фрагментов (галактооксидазы).

При наличии наркотика в пробе, он соединяется с антигеном. Оставшиеся неактивные фрагменты образуют активный фермент. Если наркотик отсутствует в пробе, антиген связывается с неактивными фрагментами, ингибирует, таким образом, образование неактивных фрагментов и образование активного фермента. Количество активного фермента, следовательно, является индикатором пропорционально количеству наркотика в пробе.

Состав реагентов

R1 Буфер (R1 Буфер) Глицерин-Н-Буфер [2-атилутилоксидный метол] буфер, 4,0 мл/миллилитр монохлоридный анионит аммонийный, 3,4-метилфенил-2-метилпирролидин (MDA), 3,4-метилфенил-2-метилпирролидин (MDA), солевой буфер, стабилизатор, консервант
R1 Lyo (R1 Lyo) 0,198 г/л ферментный анионит, 7,001 мл/миллилитр монохлоридный анионит, д-амфетамин, 7,001 мл/миллилитр монохлоридный анионит в д-метамфетамин, солевой буфер, детергент и консервант.
R2 Буфер (R2 Буфер) Глицерин-Н-Буфер [2-атилутилоксидный метол] буфер, солевой буфер, детергент и консервант.
R2 Lyo (R2 Lyo) 7,12 мл/миллилитр фермента монохлоридного д-амфетамин, 11,3 мл/миллилитр фермента монохлоридного д-метамфетамин, 6,0 мл/миллилитр фермента монохлоридного с MDMA, 1,67 г/л хлоридный краситель, β-D-галактооксидаза, солевой буфер, детергент и консервант.

Общая информация

Предупреждения об опасности и сообщении о риске
Взрыв. Содержит легковоспламеняющиеся материалы. R22: Вреден при попадании внутрь.

Меры безопасности

230, 280. Избегайте контакта с кожей. Реагенты и воду не используйте непосредственно из флаконов.

Утилизуйте использованные реактивы и материалы в соответствии с требованиями селективной утилизации отходов и законодательных нормативов. Во избежание возможного загрязнения окружающей среды соединения после очистки неразбавленного реактива промывайте выходящим из трубы водой.

Дополнительная информация приведена в Паспорте безопасности.

 **ООО ЦИПМИ**  **INFO@CIRMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

Контрольный материал

Ведущий контроль зависит от проводимого исследования.

Точка отсчета 1000 мкг/л: Контроль DAU Multi-drug Control, CDC2000.

Точка отсчета 500 мкг/л: Контроль DAU Specialty Control, CDC2007.

Результат

Качественная оценка результатов

Калибратор DAU Secondary Cut-off Multi-drug Calibrator или DAU Primary Cut-off Multi-drug Calibrator используется в качестве разовых/периодических значений между положительными и отрицательными измерениями. Если концентрации барбитурата в пробе будут равны и больше значения калибратора, значение будет считаться положительным. Если концентрация будет меньше значения калибратора – значение будет считаться отрицательным. Анализаторы Bedsonx Solida серии AU автоматически отдают между пробой и положительными результатами флэш «P», а с отрицательными – «N».

Полученные/отнесенные оценки результатов

Относительные значения концентрации барбитурата можно получать при использовании калибраторов, выполненных с калибраторами DAU Negative Calibrator, DAU Secondary Cut-off Multi-drug Calibrator, DAU Primary Cut-off Multi-drug Calibrator, DAU Positive Multi-drug Calibrator и DAU High Multi-drug Calibrator.

При интерпретации результатов количественного измерения нужно особенно внимательно рассмотреть другие факторы, влияющие на результаты в моче, например, время и концентрация мочи и другие биологические факторы.

Полученный результат следует подтверждать более специфическими методами, основанными на взыскании/тестировании препарата. В качестве подтверждающего метода можно использовать не GC/MS тестирование, но GC/MS является наиболее надежным методом, так как является наиболее точной подтверждающей технологией для всех наркотиков, включая барбитураты. Наиболее достоверные результаты.

Оценочные значения

Результаты мочы калибры быть отрицательными относительно точки отсчета, составляющей 500 мкг/л или 1000 мкг/л.

Оценочные значения калибраторов

Данные, приведенные в этом калибраторе, получены при калибровке анализаторов Bedsonx Solida серии AU. Характеристик проведения теста в такой лаборатории могут отличаться от приведенных.

Воспроизводимость

Следующие результаты получены на анализаторе AU540 с использованием мультикалибратора DAU Primary Multi-drug Cut-off и DAU Secondary Multi-drug Cut-off в контрольной дупликации со значениями, приведенными в интервале ±25% от средней точки отсчета. Каждую пробу анализировали 3 раза 3 раза в сутки в течение 20 дней.

Качественная оценка отрицательных/положительных:

n = 50		Внутренний коэффициент вариации		Общий	
мг/л	Среднее значение, мкг/мл	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)
375	95	1,6	1,6	3,3	3,6
500	106	1,5	1,4	3,9	2,7
625	133	2,7	2,1	3,1	2,4
750	92	4,4	4,7	5,8	9,3
900	115	2,0	1,7	4,9	4,1
1250	141	2,3	1,7	4,2	2,9

Полученные/отнесенные оценки отрицательных/положительных:

n = 50 мг/л	Среднее значение, мкг/мл	Станд. откл. (SD)	Внутренний коэффициент вариации (CV %)	Среднее значение, мкг/мл	Общий коэффициент вариации (CV %)
375	340	10,8	3,0	32,6	8,4
500	467	23,8	4,7	34,6	7,6
625	618	34,1	6,6	45,4	7,4
750	776	12,6	1,6	42,0	6,6
900	1000	41,2	4,1	66,0	6,0
1250	1489	29,1	2,0	66,1	6,7

Коррекция

При оценке данных действительного набора реагентов Amphetamine/Barbiturate (Amphetamine/Barbiturate) OPR523 для определения эффективности на анализаторе AU540 с другим набором реагентов для определения эффективности использования мочи калибры. Получены следующие результаты:

Точка отсчета 500 мкг/л Качественная оценка		Точка отсчета 1000 мкг/л Качественная оценка	
Сравнительный отрицательный метод	+	106	1
	-	0	20
Точка отсчета 500 мкг/л Полученные/отнесенные оценки		Точка отсчета 1000 мкг/л Полученные/отнесенные оценки	
Сравнительный отрицательный метод	+	106	0
	-	0	32
Точка отсчета 500 мкг/л Качественная оценка		Точка отсчета 1000 мкг/л Качественная оценка	
Сравнительный отрицательный метод	+	91	1
	-	0	46
Точка отсчета 500 мкг/л Полученные/отнесенные оценки		Точка отсчета 1000 мкг/л Полученные/отнесенные оценки	
Сравнительный отрицательный метод	+	91	1
	-	9	40

Чувствительность

Свое новое определенное значение (LOL) соответствует самой низкой измеримой величине, отсюда от нуля. Нижний предел чувствительности рассчитывается как абсолютное среднее значение плюс три стандартных отклонения при 20-м критерии измерения отрицательного калибратора (Negative Calibrator).

References

1. Novak RL. Analytical methodology. In: Novak RL, Ching CM, eds. *Urine Testing for Drugs of Abuse*. NIDA Research Monograph. 1995;73:39-61.
2. Physician's Desk Reference. 47th ed. Chadds NJ: Medical Economics Books; 1992.
3. Jelen RM. A Primer of Drug Action. 8th ed. New York, NY: Van Nostrand & Co; 1992.
4. Miller NB, Gold MS. Amphetamine and its derivatives. In: Glaviet A, Wiley AL, eds. *Drugs of Abuse*. Chadds NJ: Medical Economics Books; 1992.
5. Chen H, Brannaman R, Scholer A, McNulty A, Buckley MA, Murphy T.P., Bateman S.J. Profile of Urine Samples Taken from Ecstasy users at Rave Parties: Analysis by Immunoassay, HPLC and GC/MS. *J. Anal. Toxicol.* 2001;25:204-209.
6. Biele U, Bendig R, Boller EM. Clinical pharmacokinetics of new orally active drugs. *Clin Pharmacokinet.* 1999;16:1-26.
7. Smith RG, Group RH. Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. 4th ed. Foster City, CA: Chemical Toxicology Institute; 1995.
8. Henderson DM, Fiedler G, Harris JC, et al. GEDRA™, a new biotransformation laboratory system. *Clin Chem.* 1992;38:1937-1941.
9. Notice of mandatory guidelines for federal workplace drug testing program. *Federal Register*. 1990; 55(pgs 11):41995.
10. Torts RD, Segura J, Zhou RD, Villaveja J. Recommendations for the reliable detection of multiple drugs in urine in the European Union, with special attention to the workplace. *Ann Clin Biochem* 1997;34:339-344.

CE

154

ВВЕДЕНИЕ
2000-01

155



Ацетатцеллюлозная мембрана для анализатора HITE (CA Film HITE System)

50095

Назначение

Ацетатцеллюлозная мембрана для электрофоретического разделения белков сыворотки крови на анализаторе HITE320.

Клинические значения

Проведение электрофореза белков сыворотки крови на анализаторе HITE основано на принципе полного электрофореза. Сывороточным белкам делится на пять основных фракций: альбумин, α_1 -глобулин, α_2 -глобулин, β -глобулин и γ -глобулин при использовании ацетатцеллюлозной мембраны. Клиническая интерпретация электрофореза основана на изменении одной или нескольких фракций. Электрофорез сывороточных белков часто используется как скрининговая процедура для выявления различных патологических состояний, таких как воспаление, легкая болезнь, миеломатоз и другие диспротеинемии.

Принцип теста

Разделение белков сыворотки проводится на ацетатцеллюлозной мембране. В процессе электрофореза поле при определенном значении pH, белки несут отрицательный заряд, и будут двигаться к аноду. Буфер увеличивает мембраны и помогает поддерживать постоянное значение pH в процессе процедуры разделения. Это гарантирует то, что у каждого белка будет одинаковый заряд на протяжении всей процедуры разделения. Ионная сила буфера определяет четкость и скорость миграции полос.

Разделенные белковые полосы фиксируются и сканируются на ацетатцеллюлозной мембране специальным раствором. Миграция крови сканируется обесцвечивающим раствором. Ацетатцеллюлозная мембрана на время-то время может быть просветлена просветляющим раствором. Денситометр используется для определения относительной плотности оптических квантов полос электрофореза. Так как денситометрия белковых фракций на ацетатцеллюлозной мембране является полу-количественным методом, при постановке теста следует дополнительно учитывать результаты для использования всех возможностей теста.

Состав

Ацетатцеллюлозная мембрана

Хранение и стабильность

Незасытая ацетатцеллюлозная мембрана стабильна до даты, указанной на этикетке при условии ее хранения при температуре 15 - 25°C.

Процедура анализа

Инструкции применения ацетатцеллюлозной мембраны в анализаторе HITE подробно описаны в Руководстве пользователя.

Библиография

1. Tietz NW. Textbook of Clinical Chemistry, 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1987: 101-204, 614-624.



**BECKMAN
COULTER.**

ТНС 070

QBR132

2 x 16 мл

2 x

2 x 16 мл

2 x

R1 Буфер

R1 Лиз

R2 Буфер

R2 Лиз

Назначение

Качественное и количественное определение мембранного белка с помощью метода определения цитохрома, в виде чипов на микроплате (Beckman Coulter серия AL). Только для диагностики *in vitro*.

Данный метод позволяет получить быстрый предварительный результат теста. Для подтверждения полученных результатов следует использовать более специфический имплантационный метод. В качестве подтверждающего метода предпочтительнее использовать метод газовой жидкостной хроматографии (GC/MS). Предварительный результат теста любого характера, полученный предварительным методом, следует рассматривать в совокупности с другими диагностическими и лабораторными исследованиями.

Коммерческое значение

Микроплату и лизис получают из растений *Senecio jacobae* или *Senecio*, широко распространенного по всему миру^{1,2}. Эти растения содержат более 81 вида полициклических (путри-лимон-диеновые эфиры), содержащихся только в листьях, среди которых - Δ-4-тетрагидроканнабиол (THC), оказывающий основное психоактивное действие^{3,4}. THC обладает типичными седативными и опьяняющими эффектами, может вызывать эйфорию, ощущение эйфорического прилива, в более высоких дозах галлюцинации^{5,6}. THC быстро распространяется в жирной ткани, легко проникает в ткани, содержащие липиды и остается в организме на период от нескольких дней до нескольких недель^{7,8}. Преобразуется фармакокинетически в более чем 24 метаболитов, одним из первых образуется 11-нор-Δ-9-тетрагидроканнабиол-9-карбоксилатный кислот (11-нор-Δ-9-THC-COOH)⁹. Около 70% THC выводится с мочой и калом в течение 72 часов после применения¹⁰. Концентрация метаболитов THC в моче зависит от множества факторов: частота применения, время, в которое производится сбор мочи относительно последнего применения, скорость выведения каннабиноидов из печени и почек¹¹. Факторы о высокой чувствительности от THC, применяемые при анализе могут давать ложноположительные результаты в тестах мочи в течение месяца или более¹².

Принцип определения

Данный метод основан на использовании батарейного фермента (β-галактозидазы), полученного из грибов *Trichoderma reesei* в виде двух неактивных фрагментов. Последнее спонтанно соединяется, образуя активный фермент, который расщепляет субстрат, изменяя оптичность раствора, что регистрируется фотометрически.

В данном методе, кисточки в пробе конъюгируют на месте сыворотки на антиген с одним из неактивных фрагментов β-галактозидазы. При наливании сыворотки в пробирку, она соединяется с антигеном. Оставшиеся неактивные фрагменты образуют активный фермент. Если сыворотка отсутствует в пробе, антиген соединяется с неактивными фрагментами, антибуток, таким образом, образование неактивных фрагментов и образование активного фермента. Количество активного фермента и, следовательно, изменение абсорбции пропорционально количеству сыворотки в пробе.

Состав реагента

R1 Буфер (R1 буфер) 3-β-морфинотропансульфонилатный кислот (MOPB) буфер, 0,50 мМ монохлоридный анион в 1-нол-Δ-9-THC-COOH, солевой буфер, стабилизатор, консервант.

R1 Лиз (R1 Лиз) 0,17 г/л ферментный экстракт, солевой буфер, детергент и консервант.

R2 Буфер (R2 буфер) 3-β-морфинотропансульфонилатный кислот (MOPB) буфер, солевой буфер, стабилизатор, консервант.

R2 Лиз (R2 Лиз) 12,42 мкг/мл порошка фермента конъюгированного с 11-нол-Δ-9-THC-COOH.

1,57 г/л морфинол красный, 9-β-г/л антигистамин, солевой буфер, детергент, консервант

Общие предостережения

Грибковые культуры об опасности и соблюдение правил:

Важно: Содержит ядовитые вещества. R22: Вреден при попадании на кожу.

Меры безопасности:

R37, R38, R39: Может вызвать раздражение. Разлитый материал из-под крышки необходимо утилизировать как опасный отход.

Используйте специфические расходные материалы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и молекулярного контроля. Во избежание возможного столкновения с загрязненными поверхностями после случайного разлива немедленно промойте загрязненные поверхности. Дополнительная информация приведена в Гиде по безопасности.

Подготовка реагента

Подготовьте растворы реагентов, используя следующие рекомендации. Доследите набор реагентов на холодильнике (2-8°C) непосредственно перед процедурой приготовления растворов.

Сначала готовьте раствор R2, а потом R1, для того чтобы снизить вероятность возможной контаминации.

R2 (раствор порошка фермента)

Соедините 0,5 мл R2, 1,0 мл R1 и 0,5 мл R3 с помощью одного из приведенных адаптеров. Тщательно перемешайте до полного растворения диспергированного материала флакона R2 Лиз. После этого полученный раствор перелить во флакон R2 Буфер. Не

BECKMAN
COULTER

допускайте образование пены. Отводите флюиды R2 Lyo и эвипер от фланца R2 Buffer и утилизируйте их. Заверьте фланец R2 Buffer крышкой и скрепите при комнатной температуре (18...20°C) на 5 минут. Вновь переключите. Не забудьте поставить на фланец дату приготовления раствора. Установите флюиды в отсек для реагентов в анализатор или поставьте в холодильник (2...8°C), и дайте ему постоять не менее 30 минут. Перед использованием проверьте, что реагент однородный.

Р1 (Рабочий реагент флюиды)

Содержимое флюида R1 Lyo соедините с буфером из R2 Buffer с помощью одного из прилагаемых эвиперов. Альтернативно переключите до полного растворения лиофилированного материала флюида R1 Lyo. После этого полученный раствор перелейте во фланец R1 Buffer. Не допускайте образования пены. Отводите флюиды R1 Lyo и эвипер от фланца R1 Buffer и утилизируйте их. Заверьте фланец R1 Buffer крышкой и скрепите при комнатной температуре (18...20°C) на 5 минут. Вновь переключите. Не забудьте поставить на фланец дату приготовления раствора. Установите флюиды в отсек для реагентов в анализатор или поставьте в холодильник (2...8°C), дайте ему постоять не менее 30 минут. Перед использованием проверьте, что реагент однородный.

ЗАМЕЧАНИЕ 1: Все компоненты предназначены для использования в составе этого набора. Не смешивайте реагенты разных серий (lot).
ЗАМЕЧАНИЕ 2: Избегайте нежелательного загрязнения реагентов, переливая флюиды только соответствующим способом. Рабочий раствор R2 (дополн. флюиды) должен быть желто-оранжевого цвета. Темно-оранжевый или фиолетово-оранжевый цвет указывает на загрязнение реагента. Такой реагент использовать нельзя.
ЗАМЕЧАНИЕ 3: Перед измерением температура растворов R1 и R2 должна быть комнатной температуры реагентового отсека.
ЗАМЕЧАНИЕ 4: Для обеспечения стабильности приготовленного раствора R2, защищайте его от продолжительного, постоянного воздействия яркого света.
ЗАМЕЧАНИЕ 5: Не замораживайте приготовленные реагенты.

Концентрация и стабильность

Исходные реагенты стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре не выше 2...8°C. После вскрытия реагенты стабильны 30 дней при хранении на борту анализатора.

Исследуемый материал

Моча. Мочу следует собирать в чистую стерильную или пластиковую посуду.
 Перед измерением мочу необходимо центрифугировать.
 Работать с мочой необходимо сразу или с предварительно инфицированными материалами.
 При подготовке на фальсифицированные пробы для исследования следует брать другую пробу.
 Пробу можно хранить при 18...20°C максимум 7 дней, после чего ей следует хранить при 2...8°C. Следует использовать методный реагент, уже при восстановлении условия.

Процедура анализа

См. Руководство пользователя и соответствующую инструкцию по конкретным последованиям. В программном листе все программы для количественного и полуквантитативного методов описаны.

Калибровка

Калибровочные стандарты

Для внешнего калибровки используйте один из двух стандартных Cut-off калибраторов:

Название калибратора	Кат. №	11-мод. 4-THE-CODIN Reagent + моча
DAU THC 25 Calibrator	ODC8322	25
DAU THC 50 Calibrator	ODC8323	50

Натуральные стандарты

Для полуквантитативного измерения используйте следующие Cut-off калибраторы:

Название калибратора	Кат. №	11-мод. 4-THE-CODIN Reagent + моча
DAU Negative Calibrator	ODC8314	0
DAU THC 25 Calibrator	ODC8322	25
DAU THC 50 Calibrator	ODC8323	50
DAU THC 75 Calibrator	ODC8324	75
DAU THC 100 Calibrator	ODC8325	100

Значения калибраторов, указанные в прилагаемом листе, проследите до значений процентного распределения стандарта.

Калибровку следует проводить в следующих случаях:

- Значение отклика реагента или сдвиг отклонения измерения значимый контроль;
- Проведение профилактического обслуживания анализатора или замены датчика ула прибора.

Новую калибровку необходимо регулярно проверять – последовательно выбрать в меню Routine (Обычное исследование) – Calibration Monitor (Мониторинг калибровки) – Calibration Curve (Калибровочная кривая). Сразу же после калибровки следует провести проверку контроля качества.

Контроль качества

Любая лаборатория определяет частоту проведения контроля качества самостоятельно, однако, хорошей лабораторной практикой считается на ежедневное измерение мочи с пробным табулетом и после проведения калибровки. Рекомендуется использовать контроль двух уровней, один со значением на 25% выше точки отсечения (cut-off), другой – на 20% ниже точки отсечения (cut-off). Измеренные значения итераций должны соответствовать указанному диапазону допустимых значений. При обнаружении какого-либо отклонения в значениях значений контроля качества или изменений отклонений его значений, проверить все аналитические этапы измерения. Каждый лаборатория должен разработать план действий на тот случай, если результаты измерения контроля качества выходят за установленные пределы.

Контрольный материал

Выбор контроля зависит от проводимого исследования.
 Точка отсечения 25 мкг/л. Контроль DAU THC 25 Control ODC008
 Точка отсечения 50 мкг/л. Контроль DAU THC 50 Control ODC009

Результат

Количественные оценки результатов

Калибраторы DAU THC 25 или THC 50 используются в качестве разделительного значения между положительным и отрицательным значениями. Если концентрация THC в пробе будет равна или больше значения калибратора, значение будет оценено как положительное.

Если концентрация будет меньше значения калибратора - значение будет оценено как отрицательное. Анализаторы Спейдита автоматически оплатят каждую пробу с положительным результатом флуором eP₈, а с отрицательным - eP₈.

Получаемые в лаборатории данные результаты

Относительные значения концентрации барбитурата можно получить при использовании калибратора, выделенной с калибраторами DAU Negative Calibrator, Олтура DAU THC 25 Calibrator, Олтура DAU THC 50 Calibrator, Олтура DAU THC 75 Calibrator и Олтура DAU THC 100 Calibrator.

При интерпретации результатов количественного измерения нужно особенно внимательно рассмотреть другие факторы, влияющие на результаты в моче, например, такие как потребление жидкости и другие физиологические факторы.

Полученный результат следует подтверждать более специфическим методом, основанным на аналитическом измерении прекурсора. В качестве подтверждающего метода можно использовать не GC/MS технику, но GC/MS является основным методом, так как является наиболее точной подтверждающей техникой для всех наркотиков. Поэтому пользователи получают наиболее достоверные результаты.¹

Оценочные значения

Результаты мочи в действительности представляют собой относительные значения, соответствующие 50 мкг/л или 25 мкг/л.

Специфические калибраторы

Данные, приведенные в этом параграфе, получены при калибровке на калибраторы Beckman Coulter серии AL. Характеристики проведения теста в нашей лаборатории могут отличаться от приведенных данных.

Воспроизводимость

Следующие результаты получены на анализаторе ALB40 с использованием калибраторов DAU THC 25 и DAU THC 50 и контролей для уровней со значениями, находящимися в интервале ±20% от целевой точки отсчета. Каждую пробу анализировали по 6 раз в сутки в течение 5 дней.

Количественная оценка ТТК		Внутренний контроль		Общая оценка	
n = 60	Среднее значение, мкг/л	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)
19	375	2.9	0.8	8.5	3.1
25	389	4.3	1.1	11.6	3.0
31	493	5.7	1.2	16.5	3.5
38	338	2.7	0.8	6.7	2.9
50	411	4.1	1.0	15.4	3.7
62	523	5.5	1.1	15.6	3.0

Полуколичественная оценка ТТК		Внутренний контроль		Общая оценка	
n = 60	Среднее значение, мкг/л	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)
19	29	1.3	4.7	2.2	4.4
25	31	0.7	2.4	2.1	6.8
31	35	0.7	1.6	1.6	5.0
38	39	0.5	1.3	1.7	4.2
50	49	0.5	1.1	1.2	2.5
62	62	0.8	1.2	1.4	2.0

Калибратор

При сравнении данных количественного набора результатов для определения ТТК на анализаторе ALB40 с другими количественными доступными наборами результатов для определения ТТК использовались мочы калибраторов. Пробы с отрицательными результатами исключались. Подтверждающий референсный метод - GC/MS. Результаты анализа следующие:

		Точка отсчета 25 мкг/л Количественная оценка				Точка отсчета 50 мкг/л Количественная оценка	
Сравнительный справочный метод	+	88	0	Сравнительный справочный метод	+	24	0
	-	0	88		-	8	68
		Точка отсчета 25 мкг/л Полуколичественный метод				Точка отсчета 50 мкг/л Полуколичественный метод	
Сравнительный справочный метод	+	24	0	Сравнительный справочный метод	+	34	0
	-	0	68		-	2*	88

* Эти пробы были измерены методом GC/MS, концентрация 11-ox- Δ^9 -THC-COOH составляли 21.2 мкг/л и 22.8 мкг/л.

¹Удостоверенность

Самое низкое определенное значение (LLI) соответствует самой низкой измеренной значимой ТНС, отличной от нуля. Низкий предел чувствительности рассматривается как абсолютное среднее значение ТНС при стандартных условиях при 25-ти кратном измерении низкого калибратора (Negative Calibrator).

Точка отсчета	LLI, мкг/л (анализатор ALB40)
25 мкг/л	1.2
50 мкг/л	2.5

101

102
300-10

103

4. Reuel RC, Clevay RA. Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man, 3rd ed. Chicago, IL: Year Book Medical Publishers, 1980.
5. Houde RL, Ching CM. Examples of specific drug assays. In: Houde RL, Ching CM, eds. Urine Testing for Drugs of Abuse. NIDA Research Monograph 1986; 73: 84-92.
6. Henschler DA, Finkbeiner SM, Hsieh JD et al. CEDRA™, a new high-throughput immunoassay system. Clin. Chem. 1996;32: 1687-1691.
7. Notice of mandatory guidelines for federal workplace drug testing program: Revised mandatory guidelines, Federal Register. 1994;115 (April 6): 17895.
8. Tate RDL, Segura J, Zouvi RD, Williams J. Recommendations for the reliable detection of BZD drugs in urine in the European Union, with special attention to the workplace. Ann Clin Biochem 1997;34: 339-344.

CE

3.1. Свойства и условия применения

Специальный фланец R1 Лю сплавляется с буфером из R2 Вулфа с помощью одного из приведенных способов. Алюминий перемешивается до полного растворения поликристаллического материала фланца R1 Лю. После этого полученный расплав перемешивается со фланцем R1 Вулфа. На достаточное образование сплава. Отопленная фланец R1 Лю и адгезия от фланца R1 Вулфа и удерживается на. Заверше фланца R1 Вулфа краской и оставте при комнатной температуре (18 - 25°C) на 1 месяц. Выход перемешивается. На заделке наложить на фланце дату приготовления расплава. Упомянутого фланца в этом для расплава в выжигатель или посылать в лабораторию (2 - 8°C), дайте ему постоять не более 30 минут. После использования проверить, что расплав безупрочен.

ЗАМЕЧАНИЕ 1: Все компоненты предназначены для использования в составе этой смеси. На смешивание расплава разных партий (из ЗАМЕЧАНИЕ 2) и фланцев переприготовленного расплава, фланцы фланцев только соответствующим образом. Равный распор R2 (до 100 фланцев) должен быть, дайте красочного цвета. Также краской или флуоресцентной краской указывать на заготовку расплава. Такой расплав использовать нельзя.

ЗАМЕЧАНИЕ 2: Перед измерением температуры расплава R1 и R2 должна быть равной температуре расплава оттока.

ЗАМЕЧАНИЕ 3: Для обеспечения стабильности приготовленного расплава R2, закройте его от производственного, постоянного воздействия света.

ЗАМЕЧАНИЕ 4: На маркировке приоткрытого расплава

Условия и стабильности

Изготовленные расплавы стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре не менее 2 - 8°C. После вскрытия расплавы стабильны 60 дней при хранении на борту анализатора.

Использование материалов

Мат. Вещь следует собирать в чистую стеклянную или пластмассовую посуду.

Перед использованием Материала вещь следует обеззараживать.

Работать в чистой комнате следует над специально оборудованным лабораторией.

При подготовке на флуоресцентную пробу для исследования следует брать другие пробы.

После работы хранить при 18 - 25°C не более 7 дней, после чего ей следует хранить при 2 - 8°C. Следует использовать Материалы разбавляющим при соответствующих условиях.

Проверка качества

См. Руководство пользователя и соответствующее руководство по методам исследования. В приведенных листах есть программы для количественного и качественного методов определения.

Калибровка

Калибровка калибратора

Для калибровки калибратора использовать один из двух стандартных Cut-off калибраторов:

Имя калибратора	Ид. №	Материал (мг/мл) и метод
DAU Method Cut-Off Calibrator	0000010	300

Проверка качества калибратора

Для калибровки калибратора использовать стандартные Cut-off калибраторы:

Имя калибратора	Ид. №	Материал (мг/мл) и метод
DAU Method Cut-Off Calibrator	0000010	0
DAU Method Cut-Off Calibrator	0000010	300
DAU Method Intermediate Calibrator	0000010	300
DAU Method High Calibrator	0000010	1000

Значения калибраторов, указанные в приведенном списке, соответствуют до значений параметров калибровочного стандарта.

Перепроверку следует проводить в следующих случаях:

- Замена фланца расплава или окончательное изменение значений калибровки;
- Проверка калибровочного оборудования анализатора или замена старого утиля прибора.

Новый калибратор необходимо ежегодно проверять – последовательно выбрать в меню **Calibrate** (Обновить калибровку) - **Calibration Monitor** (Монитор калибровки) - **Calibration Curve** (Калибровочная кривая). Сразу же после нажатия следует провести измерения контрольного вещества.

Контроль качества

Любая лаборатория определяет частоту проведения контроля качества самостоятельно, исходя из своей лабораторной практики и опыта. Как минимум измерения качества проблемных материалов и после проведения калибровки. Рекомендуется использовать контроль двух уровней: один до значения на 20% выше точки отсечения (cut-off) другой – на 20% ниже точки отсечения (cut-off). Неверные значения контроля должны соответствовать установленному диапазону допустимых значений. При обнаружении одного-двух отклонений в значениях значений контроля качества или нескольких отклонений или выходов, проверьте все калибровочные материалы калибратора. Каждый лаборатория следует разработать план действий на тот случай, если результаты измерения контроля качества выходят за установленные пределы.

Контрольный материал

Контроль DAU Multi-Drug Screen, 00000000.

Результат

Калибровка калибратора

Калибратор DAU Method Cut-Off Calibrator содержит 300 мкг/мл материала, используется в качестве референсного значения для измерения положительных и отрицательных значений. Если калибровка калибратора в пробе будет равна и больше значения калибратора, значение будет считаться как положительное. Если калибровка будет меньше значения калибратора – значение будет считаться как отрицательное. Анализаторы Siemens автоматически отдают каждую пробу с положительным результатом фланца с 0, а с отрицательным – 10.

Получение результатов анализа результатов

Относительные значения калибровки калибратора можно получить при использовании калибратора, выполненной с калибровками DAU Method Cut-Off Calibrator, DAU Method Intermediate Calibrator и DAU Method High Calibrator.

При интерпретации результатов количественного измерения нужно особенно внимательно рассматривать другие факторы, влияющие на результаты в анал., например, такие как потребление энергии и другие биохимические факторы.



**BECKMAN
COULTER.**

OSR6316

EDDP

2 x 16 мл
2 x
2 x 16 мл
2 x

R1 Бuffer
R1 Лисо
R2 Бuffer
R2 Лисо

Назначение

Качественное и полуколичественное флуориметрическое иммунологическое определение EDDP (2-этил-15-метил-3,3-дифенилпропионил) в моче человека на анализатор Beckman Coulter серии AU. Только для лабораторного и/или

Данный метод позволяет получить только предварительные результаты теста. Для подтверждения полученных результатов следует использовать более специфичный аналитический химический метод. В качестве подтверждающего метода предпочтительно использовать метод прямой хромо-масс-спектрометрии (GC/MS). Положительный результат теста является предварительным, полученный в лабораторных условиях, следует рассмотреть в соответствии с другими клиническими данными и заключением специалиста.

Клиническое значение

2-этил-15-метил-3,3-дифенилпропионил (EDDP) является метаболитом Метадона². Метадон – синтетическое вещество, которое часто используется в качестве обезболивающего средства при заместительной терапии наркотической зависимости³.

Применяется определение EDDP методом в том, что некоторые пациенты, употребляющие препараты заместительной терапии, могут проводить свою дозу метадона на черном рынке. Для того чтобы сорвать, что некоторые пациенты могут добавлять в свой образ жизни. Тест на Метадон, в этом случае позволит положительный результат, но тест на EDDP будет отрицательным, т.е. информация не предназначена и не был введен в процесс метаболитов.

Принцип определения⁴

Данный метод основан на использовании безводного фрагмента (3-галлатовый, полученного методом газовой хроматографии в виде двух неводных фрагментов. Последнее оптимально сохраняется, образуя активный фрагмент, который в свою очередь, взаимодействует с антителом, изменяя структуру удерживаемой среды, что регистрируется флуориметрически.

В данном методе, на первом этапе концентрируется на дельта-связи на неводных фрагментах 3-галлатовый. При наличии наркотика в пробе, он соединяется с нейтральными. Оставшиеся неводные фрагменты образуют активный фрагмент. Если наркотик отсутствует в пробе, активные связываются с неводными фрагментами, образуя, таким образом, соединенные неводные фрагменты и образование активного фрагмента. Количество активного фрагмента, следовательно, является обратной пропорциональной величиной наркотика в пробе.

Состав реагентов

R1 Buffer (R1 Бuffer) Пикрилат R1-N-5 (2-этил-15-метил-3,3-дифенилпропионил) Бuffer, монохлоридные антитела к EDDP, солевой Бuffer, стабилизатор, консервант
R1 Lyo (R1 Лисо) Флуориметрический детектор, солевой Бuffer, детектор и консервант
R2 Buffer (R2 Бuffer) Флуориметрический детектор, солевой Бuffer, детектор и консервант
R2 Lyo (R2 Лисо) Детектор флуориметрического EDDP, флуориметрический, 3-D-галлатовый, солевой Бuffer, детектор и консервант

Общие предостережения

Предупреждение об опасности и сообщении риска:
Вреден. Содержит ядовитые вещества. R22. Вреден при попадании внутрь.

Меры безопасности:

S36, S50. Надевайте защитную одежду. Работайте и храните только в специально отведенных местах.

Утилизацию отходов следует проводить в соответствии с требованиями санитарно-гигиенического и экологического контроля. Во избежание загрязнения окружающей среды следует неразбавленного реагента промывать многократными порциями воды.

Дополнительная информация приведена в Паспорте безопасности.

Подготовка реагентов

Доставьте набор реагентов на холодильник (2...8°C) непосредственно перед процедурой приготовления растворов.

Сначала готовьте раствор R2, а затем R1, для того чтобы избежать перекрестной валовости реагентов.

R2 (раствор активного фрагмента)

Соедините флакон R2 Lyo с буфером из R2 Buffer с помощью одного из прилагаемых адаптеров. Тщательно перемешайте до полного растворения флуориметрического материала флакона R2 Lyo. После этого полученный раствор переложите на флакон R2 Buffer. Не допускайте образования пены. Стояните флакон R2 Lyo и адаптер из флакона R2 Buffer и утилизуйте их. Закрыйте флакон R2 Buffer крышкой и оставьте при комнатной температуре (15...25°C) на 5 минут. Вновь перемешайте. Не забудьте поставить на флакон дату приготовления раствора. Установите флакон в блок для реагентов в анализатор или поставьте в холодильник (2...8°C), и дайте ему постоять не менее 30 минут. Перед использованием проверить, что реагент однородный.

R1 (раствор активных фрагментов)

Соедините флакон R1 Lyo с буфером из R2 Buffer с помощью одного из прилагаемых адаптеров. Аккуратно перемешайте до полного растворения флуориметрического материала флакона R1 Lyo. После этого полученный раствор переложите на флакон R1 Buffer. Не допускайте образования пены. Стояните флакон R1 Lyo и адаптер из флакона R1 Buffer и утилизуйте их. Закрыйте флакон R1 Buffer крышкой и оставьте при комнатной температуре (15...25°C) на 5 минут. Вновь перемешайте. Не забудьте поставить на флакон дату приготовления раствора. Установите флакон в блок для реагентов в анализатор или поставьте в холодильник (2...8°C), и дайте ему постоять не менее 30 минут. Перед использованием проверить, что реагент однородный.

Важно помнить: Все компоненты предназначены для использования в составе этого набора. Не смешивайте реагенты разных серий (lot).

RU

0000000000
2001 01

04



**BECKMAN
Coulter.**

КОКАИН (Cocaine)		
QSR4317	2 x 16 мл	R1 Буфер
	2 x	R1 Лино
	2 x 16 мл	R2 Буфер
	2 x	R2 Лино

Назначение

Качественное и полуколичественное ферментативное иммунологическое определение кокаина в моче человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro.

Данный метод позволяет получать только предварительные результаты теста. Для подтверждения полученных результатов следует использовать более специфичный альтернативный аналитический метод. В качестве подтверждающего метода предпочтительней использовать метод ионной хроматографии-масс-спектрометрии (GC/MS). Плановитивный результат теста любого характера, полученный при применении данного метода, следует рассматривать в совокупности с другими клиническими данными и заключением специалиста.

Клиническое значение

Кокаин (бензоилэтанон) получают из растения *Erythroxylon cocc*, широко распространенного в Южной Америке^{2,4}. Употребление кокаина вызывает острые эйфории, возбуждения, бессонницу, гипертензию, паранойю, иногда галлюцинации^{2,4}. Метаболизм кокаина активный, менее 5% неизмененного вещества выводится с мочой^{2,4}. Основные метаболиты кокаина - бензонитрогенин и 3-гидро метилгидро эфир образуются в результате ферментативного и неферментативного гидролиза^{2,3,5}. Бензонитрогенин обнаруживается в моче в течение 3 недель после прекращения длительного употребления кокаина.^{1,6}

Принцип определения¹¹

Данный метод основан на использовании бактериального фермента (L-тирантолазы), продуцируемого некоторыми видами бактерий в виде двух неактивных фрагментов. Фермент становится активным, образуя активный фрагмент, который в этом конкретном методе, расщепляет субстрат, являющийся реакционной средой, что регистрируется флуориметрически. В данном методе, ингибитор в пробе ингибирует за счет связывания с активным из неактивных фрагментов (L-тирантолазы). При наличии ингибитора в пробе, он соединяется с активным. Остаточные неактивные фрагменты образуют активный фермент. Если ингибитор отсутствует в пробе, ингибитор соединяется с неактивным фрагментом, образуя, таким образом, соединения неактивных фрагментов и образование активного фермента. Количество активного фермента и следовательно, измеренная абсолютная флуориметрическая интенсивность ингибитора в пробе.

Для увеличения чувствительности метода добавляется фермент, гидролизующий гидролизонные производные бензоилэтанона, тем самым, увеличивая вероятность обнаружения образца, содержащего бензонитрогенин.

Состав реагентов

R1 Буфер (R1 Буфер): Пиперазин-N,N-бис (2-этансульфонил) кислоты буфер, 0.54 мМ мыльных моноклональных антител к бензонитрогенину, солевой буфер, стабилизатор, консервант. 0.171 г/л ферментный акцептор, солевой буфер, детергент и консервант.
R1 Лю (R1 Лю): О-2-этил (R2 Буфер): Пиперазин-N,N-бис (2-этансульфонил) кислоты буфер, солевой буфер и консервант.
R2 Лю (R2 Лю): 15.39 мМ донора фермента кинотрофанового к бензонитрогенину, 1.67 г/л хлорофен красящий - 8-О-гидроксибензоидин, солевой буфер, детергент и консервант.

Общие предостережения

Предупреждение об опасности и сообщении о риске.
Вреден. Содержит азид натрия. R22: Вреден при попадании внутрь.

Меры безопасности:

R36, R50: Надлежащее защитное снаряжение. Разбавлять и утилизировать как опасные отходы.

Изучите все необходимые инструкции и материалы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля. Во избежание возможного отравления вдыхающим газом содержащим соединения после снятия / разбаллования реагента промышленные промышленные трубы воды.
Дополнительная информация приведена в Паспорте безопасности.

Подготовка реагента

Подготовку реакторов проводить, используя холодные реагенты. Доставка набор реагентов из холодильника (2...8°C) непосредственно перед процедурой приготовления растворов.

Смешать равные части R1 и R2 лю, для того чтобы снизить вероятность возможной конденсации.

R2 (раствор донора фермента):

Содержимое флакона R2 Лю соединить с буфером из R2 Буфер с помощью одного из прилагаемых адаптеров. Тщательно перемешать до полного растворения лиофилизированного материала флакона R2 Лю. После этого полученный раствор перелить во флакон R2 Буфер. Не допускайте образования пены. Ослабление флакона R2 Лю и адаптера от флакона R2 Буфер и утилизировать их. Закройте флакон R2 Буфер крышкой и оставьте при комнатной температуре (15...25°C) на 5 минут. Вновь перемешать. Не забудьте пометить на флаконе дату приготовления раствора. Установите флакон в отсек для

реагент в анализатор или поместить в холодильник (2...8°C), и дать ему постоять не менее 30 минут. Перед использованием проверьте, что реагент однородный.

Р1 (система анализа фламан)

Содержимое флакона R1 Лю соедините с буфером из R2 Buffer с помощью одного из прилагаемых адаптеров. Аккуратно перемешайте до полного растворения лиофилизированного материала флакона R1 Лю. После этого полученный раствор перемешайте во флакон R1 Buffer. Не допускайте образования пены. Отсоедините флакон R1 Лю и адаптируйте флакон R1 Buffer к анализатору. Закрыйте флакон R1 Buffer крышкой и оставьте при комнатной температуре (18...25°C) на 5 минут. Вновь перемешайте. Не забудьте поместить на флаконную крышку приоткрытый реактор. Установите флакон в блок для реагентов в анализатор или поместите в холодильник (2...8°C), дайте ему постоять не менее 30 минут. Перед использованием проверьте, что реагент однородный.

ЗАМЕЧАНИЕ 1: Все компоненты предназначены для использования в системе всего набора. Не смешивайте реагенты разных серий (lot). **ЗАМЕЧАНИЕ 2:** Избегайте чрезмерного закрывания реактора, закрытый флакон только осторожно открутите крышкой. Рабочий реактор R2 (диск фламан) должен быть желто-оранжевого цвета. Темно-красный или фиолетово-красный цвет указывает на закрывание реактора. Такой реактор использовать нельзя.

ЗАМЕЧАНИЕ 3: Перед измерением температура реакторов R1 и R2 должна быть равной температуре реакционного блока.

ЗАМЕЧАНИЕ 4: Для обеспечения стабильности приоткрытого реактора R2, закрывайте его от градуированного, достаточного количества воздуха.

ЗАМЕЧАНИЕ 5: Не замораживайте приоткрытый реактор.

Калибровка и стабильность

Новорытые реактивы стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2...8°C. После вскрытия реактивы стабильны 60 дней при хранении на борту анализатора.

Мониторинг результатов

Может возникнуть необходимость в частом статистическом или графическом поведении.

Перед началом работы можно начать оптимизацию.

Работать с малой численностью следует как с потенциально некачественными материалами.

При подтверждении валидации пробы для исследования следует брать другие пробы.

Проба может храниться при 15...25°C максимум 7 дней, после чего ее следует хранить при 2...8°C¹². Следует использовать стандартные реагенты при соответствующих условиях.

Процедура анализа

См. Руководство пользователя и соответствующую инструкцию по конкретным исследованиям. В программном листе есть программы для количественного и качественного методов определения.

Калибровка

Качественное определение.

Для качественного анализа используйте один из двух следующих Cut-off калибров:

Наименование калибров	Кат. №	Величина отсчета (проба = метка)
DAU Primary Cut-off Multi-drug Calibrator	ODC0316	300
DAU Secondary Cut-off Multi-drug Calibrator	ODC0316	150

Полуколичественное определение.

Для полуколичественного измерения используйте следующий Cut-off калибров:

Наименование калибров	Кат. №	Величина отсчета (проба = метка)
DAU Primary Calibrator	ODC0314	9
DAU Secondary Cut-off Multi-drug Calibrator	ODC0316	150
DAU Primary Cut-off Multi-drug Calibrator	ODC0316	300
DAU Intermediate Multi-drug Calibrator	ODC0317	2000
DAU High Multi-drug Calibrator	ODC0319	5000

Значения калибров, указанные в прилагаемом паспорте, применяются до значений начального калибровочного отсчета.

Перемешивать следует проводить в следующих случаях:

- Закрытие флакона реактива или перемешивание реактива в реакторной камере;
- Проверка калибровочного оборудования анализатора или замена старого или прибора.

Новую калибровку необходимо регулярно проверять – последовательно выбрать в меню Profile (Область исследования) - Calibration Monitor (Мониторинг калибровки) - Calibration Curve (Калибровочная кривая). Сразу же после калибровки следует провести калибровку контроля качества.

Контроль качества

Лаборатория определяет частоту проведения контроля качества самостоятельно, однако, хорошей лабораторной практикой считается на ежедневном уровне вместе с пробой пациента и после введения калибровки. Рекомендуется использовать контроль двух уровней; один со значением на 25% выше точки отсчета (high); другой – на 25% ниже точки отсчета (cut-off). Камерные значения контроля должны соответствовать установленному допустимому значению. При обнаружении каких-либо тенденций в значениях значений контроля качества или выходе отсчета из значений, проверьте все анализаторные агенты калибровки. Каждый калибровочный материал следует разбавлять по крайней мере на тот случай, если результаты калибровки контроля качества будут за установленными пределами.

Контрольный материал

Выбор контроля зависит от проводимого исследования.

Точка отсчета 300 mEq/L: Контроль DAU Multi-drug Control, ODC0005.

Точка отсчета 150 mEq/L: Контроль DAU Specialty Control, ODC0007.

Расчет

Некоторые данные результаты

Калибров DAU Secondary Cut-off Multi-drug Calibrator или DAU Primary Cut-off Multi-drug Calibrator используется в качестве разбавленного значения между положительным и отрицательным значениями. Если концентрация барбитурата в пробе будет

на

Метод
700-0

8.11

мень и больше значения калибратора, значение будет считано как положительное. Если концентрация будет меньше значения калибратора – значение будет считано как отрицательное. Аналитаторы Bioscan Солейт серии AU автоматически отбрасывают пробу с отрицательным результатом флажком «F», а с отрицательным – «LF».

Полученные значения результатов

Среднее значение концентрации барбитурата можно получить при использовании калибратора, выделенного с калибраторами DAU Negative Calibrator, DAU Bioscanay Cui-nal Multi-dug Calibrator, DAU Pitney Cui-nal Multi-dug Calibrator, DAU Negative Multi-dug Calibrator и DAU Pitney Multi-dug Calibrator.

При интерпретации результатов количественного измерения можно особенно рассмотреть другие факторы, влияющие на результаты в моче, например, такие как индивидуальные различия и другие биологические факторы.

Полученный результат следует подтверждать более специфическими методами, основанными на альтернативном методе анализа. В качестве подтверждающего метода можно использовать не GC/MS технологию, но GC/MS является основным методом, так как является наиболее точной подтверждающей технологией для всех наркотиков. Поскольку получить наиболее достоверные результаты.

Среднее значение

Количественный анализ

Результаты всегда должны быть отрицательными относительно точки отсчета, составляющей 300 мкг/л или 160 мкг/л.

Среднее значение концентрации

Данные, приведенные в этом параграфе, получены при измерении на аналитаторах Bioscan Солейт серии AU.

Характеристики проведения теста в вашей лаборатории могут отличаться от приведенных ниже.

Воспроизводимость

Следующие результаты получены при измерении на ALB40 с использованием калибраторов DAU Pitney и Bioscanay Cui-nal Multi-dug Calibrator и 2-х уровней контроля, соответствующих $\pm 25\%$ соответствующей точки отсчета. Каждый пробирочный анализ проводится шесть раз дважды в день на протяжении 5-ти дней.

Известная точка отсчета		Внутри серии		Общая	
мкг/л	Среднее значение, мкг/л	Станд. откл. (SD)	Внеш. вариабельность (CV %)	Станд. откл. (SD)	Внеш. вариабельность (CV %)
160.5	274	2.2	0.8	3.8	1.4
160	280	2.1	0.7	4.7	1.6
160.5	328	2.8	0.8	5.1	1.6
160	333	2.7	1.1	4.8	1.6
160	380	3.8	1.1	5.6	1.6
160	384	3.8	1.0	5.6	1.4

Полученный количественный анализ

n = 60

мкг/л	Среднее значение, мкг/л	Внутри серии	Общая
		Станд. откл. (SD)	Станд. откл. (SD)
160.5	128	2.7	3.3
160	148	2.2	4.7
160.5	217	2.8	8.2
160	228	3.1	9.8
160	316	18.6	25.8
160	326	30.3	49.2

Вероятность

При сравнении данного количественного набора реагентов для определения количества на аналитаторе ALB40 с другим калибратором доступен набор реагентов для определения количества использовать мочу пациентов. Получены следующие результаты:

	Точка отсчета 160 мкг/л Количественный анализ			Точка отсчета 380 мкг/л Количественный анализ		
Средний количественный метод	+	78	0	+	53	0
	-	0	71	-	0	94
	Точка отсчета 160 мкг/л Полученные значения			Точка отсчета 380 мкг/л Полученные значения		
Средний количественный метод	+	78	0	+	53	0
	-	0	71	-	0	94

Чувствительность

Самое низкое определяемое значение (LLO) соответствует самой низкой измеримой значимой методике, отличной от нуля. Низкий процент чувствительности рассчитывается как абсолютное среднее значение плюс три стандартных отклонения при 28-ти кратном измерении негативного калибратора (Negative Calibrator).

Точка отсчета	LLO, мкг/л (методом ALB40)
160 мкг/л	4.3
380 мкг/л	4.8

Влияющие факторы

Следующие вещества в случае их наличия в пробе в указанных ниже концентрациях, соответствующих их нормативным предельным концентрациям в моче, при проведении анализа с помощью набора реагентов Сосилте (Космол) влияют на результаты (получаемые значения отличаются от истинных менее чем на 10%).

№

Вещество
г/мл

№



**BECKMAN
COULTER.**

БАРБИТУРАТЫ (Barbiturates)

0098315

2 x 16 мл
2 x
2 x 16 мл
2 x

**R1 Буфер
R1 Лисо
R2 Буфер
R2 Лисо**

Назначение

Качественное и полуквантитативное ферментативное определение барбитуратов в моче человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики *in vitro*.

Данный метод позволяет получать точные предварительные результаты теста. Для подтверждения полученных результатов следует использовать более специфичной альтернативный химический метод. В качестве подтверждающего метода предпочтительно использовать метод газовой аромато-масс-спектрометрии (ГАС/МС)¹. Перекрестные-реакции результатов теста любого наркотика, содержащий предпримитивные компоненты, следует рассмотреть в соответствии с другими идентифицированными данными и клиническими сведениями.

Клиническое значение

Барбитураты — группа производных барбитуровой кислоты, обладающая седативным, противосудорожным и наркотическим действием, обусловленным угнетающим влиянием на ЦНС. При злоупотреблении барбитуратами, обычно применяются в форме таблеток, в более тяжелых случаях зависимость барбитураты растворяют для парентерального введения ^{2,3}. Различают барбитураты быстрого и пролонгированного действия, барбитураты среднего и длительного воздействия ^{4,5}. Период полураспада от 20 до 120 часов ^{6,8}. Независимо от типа метаболизма барбитуратов происходит в клетках печени. Большинство барбитуратов выводится с мочой в виде активных и неактивных метаболитов, некоторые из них выводятся в неизменном виде ^{4,5}. Возвращать определение барбитуратов в моче зависит от типа действия и составляет период от 20 часов после применения до нескольких недель.

Принцип определения

Данный метод основан на использовании бактериального фермента β-галактозидазы, полученного методом генной инженерии в виде двух неактивных фрагментов. После специфичного соединения, образуя активный фермент, который в свою очередь катализирует реакцию, изменяя окраску реакционной среды, что регистрируется фотометрически. В данном методе, наркотик в пробе конкурирует за место связывания с антителом с одним из неактивных фрагментов β-галактозидазы. При наличии наркотика в пробе, он соединяется с антителом. Остающиеся неактивные фрагменты образуют активный фермент. Если наркотик отсутствует в пробе, антителы соединяются с неактивными фрагментами, образуя, таким образом, соединенные неактивные фрагменты и образовавшие активный фермент. Количество активного фермента и, следовательно, изменение абсорбции пропорционально количеству наркотика в пробе.

Состав набора

R1 Буфер (R1 Буфер) Пиперазин-Н-Н-бис (2-этансульфонат) буфер, 2.2 г/мл монохлоридных ионов и барбитураты, солевой буфер, стабилизатор, консервант.

R1 Лисо (R1 Лисо) 0.171 г/л флуоресцентный индикатор, солевой буфер, детергент и консервант.

R2 Буфер (R2 Буфер) Пиперазин-Н-Н-бис (2-этансульфонат) буфер, солевой буфер и консервант.

R2 Лисо (R2 Лисо) 17.1 мкг/л донора фермента концентрированного экстракта барбитураты, 1.67 г/л изокремный краситель β-Д-галактозидазы, солевой буфер, детергент и консервант.

Общие рекомендации

Предупреждения об опасности и сообщения о рисках:

Вреден. Содержит воду натрия. R2: Вреден при попадании внутрь.

Меры безопасности:

835, 850. Надевайте защитную одежду. Разлитые и твердые из-под них необходимо утилизировать как опасные отходы.

Утилизируйте отработанные реакционные материалы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Во избежание возможного отравления при употреблении содержащих после слива неразбавленного реагента промойте выходящие трубы водой.

Дополнительная информация приведена в Паспорте безопасности.

Подготовка реагента

Подготовку растворов проводить, используя холодные реагенты. Доставить набор реагентов из холодильника (2...8 °C) непосредственно перед процедурой приготовления растворов.

Сначала готовить раствор R2а путем R1, для того чтобы снизить вероятность возможной инсталляции.

R2 (активный фермент):

Соедините флаконы R2 Лисо соедините с буфером из R2 Буфер с помощью одного из прилагаемых адаптеров.

Тщательно перемешайте до полного растворения лиофильного материала флакона R2 Лисо. После этого

10

1000000
200 01

10

полученный раствор перелить во флакон R2 Buffer. Не допускать образования пены. Отсоедините флакон R2 Lyo и адаптер от флакона R2 Buffer и утилизуйте их. Закройте флакон R2 Buffer крышкой и оставьте при комнатной температуре (18...25°C) на 5 минут. вновь переключите. Не забудьте поставить на флаконе дату приготовления раствора. Установите флакон в отсек для реагентов в анализаторе или поставьте в холодильник. (2...8°C), дайте ему постоять не менее 30 минут. Перед использованием проверьте, что реагент однородный.

R1 (Раствор реагента фермента):

Содержимое флакона R1 Lyo соедините с буфером на R2 Buffer с помощью одного из прилагаемых адаптеров. Аккуратно переключите до полного растворения лиофилизированного материала флакона R1 Lyo. После этого полученный раствор перелить во флакон R1 Buffer. Не допускать образования пены. Отсоедините флакон R1 Lyo и адаптер от флакона R1 Buffer и утилизуйте их. Закройте флакон R1 Buffer крышкой и оставьте при комнатной температуре (18...25°C) на 5 минут. вновь переключите. Не забудьте поставить на флаконе дату приготовления раствора. Установите флакон в отсек для реагентов в анализаторе или поставьте в холодильник. (2...8°C), дайте ему постоять не менее 30 минут. Перед использованием проверьте, что реагент однородный.

ЗАМЕЧАНИЕ 1: Все компоненты предназначены для использования в составе этого набора. Не смешивайте реагенты разных серий (lot).

ЗАМЕЧАНИЕ 2: Избегайте перекрестного загрязнения реагентов, закрывая флаконы только соответствующими крышками. Рабочий раствор R2 (конц фермента) должен быть желто-оранжевого цвета. Темно-красный или фиолетово-красный цвет указывает на загрязнение реагента. Такой реагент использовать нельзя.

ЗАМЕЧАНИЕ 3: Перед измерением температуры растворов R1 и R2 должна быть равной температуре реагентного отсека.

ЗАМЕЧАНИЕ 4: Для обеспечения стабильности приготовленного раствора R2, мешайте его до полного растворения, постоянного воздействия прямого света.

ЗАМЕЧАНИЕ 5: Не замораживайте приготовленные реагенты.

Хранение и стабильность:

Некоторые реагенты стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре их хранения 2...8°C. После вскрытия реагенты стабильны 60 дней при хранении на борту анализатора.

Использование метода:

Моча: Мочу следует собирать в чистую стерильную или пластиковую посуду.

Перед измерением мочу следует центрифугировать.

Работать с мочой человека следует как с потенциально инфицированным материалом.

При подозрении на фальсификацию пробы для исследования следует брать другую пробу.

Проба мочы хранится при 15...26°C максимум 7 дней, после чего ее следует хранить при 2...8°C. Следует использовать надзорные рекомендации при соответствующих условиях.

Программа анализа

См. Руководство пользователя и соответствующую инструкцию по конкретным исследованиям. В программах листах есть программы для полуколичественного и количественного методов определения.

Калибровка

Качественное определение.

Для качественного измерения используйте один из двух следующих Cut-off калибраторов:

Название калибратора	Кат. №	Сенсорбитовый level = mU(n)
DAU Primary Cut-off Multi-drug Calibrator	ODC0316	300
DAU Secondary Cut-off Multi-drug Calibrator	ODC0316	200

Полуколичественное определение.

Для полуколичественного измерения используйте следующие Cut-off калибраторы:

Название калибратора	Кат. №	Сенсорбитовый level = mU(n)
DAU Negative Calibrator	ODC0314	0
DAU Secondary Cut-off Multi-drug Calibrator	ODC0316	200
DAU Primary Cut-off Multi-drug Calibrator	ODC0315	300
DAU Intermediate Multi-drug Calibrator	ODC0317	600
DAU High Multi-drug Calibrator	ODC0316	3000

Значения калибраторов, указанные в прилагаемых паспорте, соответствуют до значений порогового параметрического стандарта.

Верификацию следует проводить в следующих случаях:

- Замена флакона реактивов или существенное изменение значений контроля;
- Проведение профилактического обслуживания анализатора или замена внешнего угла прибора.

Многие калибровки необходимо визуально проверить – последовательно выбрать в меню Routine (Обычное исследование) - Calibration Monitor (Мониторинг калибровки) - Calibration Curve (Калибровочная кривая). Сразу же после калибровки следует провести измерение контроля качества.

Контроль качества

Любая лаборатория должна проводить контроль качества самостоятельно, однако, хорошей лабораторной практикой считается как ежедневное измерение смеси с пробами павинов и после проведения калибровки. Рекомендуется использовать контроль двух уровней, один со значениями на 25% выше точен стандартный (cut-off), другой – на 25% ниже точен стандартный (cut-off). Измеренные значения контроля должны соответствовать указанному диапазону допустимых значений.

11

ВЕРСИЯ
2014

11

При обнаружении тенденции к изменению значений контроля качества или выявлении отклонений его значений, проведена или запланирована повторная проверка. Каждый лабораторный сотрудник должен действовать на тот случай, если результаты измерения контроля качества выйдут за установленные пределы.

Контрольный материал

Выбор контроля зависит от проводимого исследования.

Точка отсчета 300 мкг/л: Контроль DAU Multi-drug Control, CDC0006.

Точка отсчета 200 мкг/л: Контроль DAU Sensitivity Control, CDC0007.

Расчет

Качественная оценка результатов

Калибратор DAU Secondary Cut-off Multi-drug Calibrator или DAU Primary Cut-off Multi-drug Calibrator используется в качестве референтного значения между положительными и негативными значениями. Если концентрация барбитуратов в пробе будет равна и больше значения калибратора, значение будет оценено как положительное. Если концентрация будет меньше значения калибратора – значение будет оценено как негативное. Анализаторы Beckman Coulter серии AU автоматически выдают каждую пробу с положительным результатом флагом «P», а с негативным – «N».

Полуквантитативная оценка результатов

Относительные значения концентрации барбитуратов можно получить при использовании калибров, выполненных с калибраторами DAU Negative Calibrator, DAU Secondary Cut-off Multi-drug Calibrator, DAU Primary Cut-off Multi-drug Calibrator, DAU Intermediate Multi-drug Calibrator и DAU High Multi-drug Calibrator.

При интерпретации результатов полуквантитативного измерения нужно особенно внимательно рассмотреть другие факторы, влияющие на результаты в моче, например, такое как потребление алкоголя и другие биологические факторы.

Положительный результат следует подтверждать более специфическим методом, основанным на альтернативном химическом принципе. В качестве подтверждающего метода можно использовать на GC/MS технологию, но GC/MS является основным методом, так как является наиболее точной подтверждающей технологией для всех наркотиков. Пользуясь возможностью получать наиболее достоверные результаты.

Ожидаемые значения

Результаты должны быть всегда негативными относительно точек отсчета (cut-off), т.е. 200 мкг/л или 300 мкг/л.

Спецификация характеристик

Данные, приведенные в этой спецификации, получены при измерении на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Характеристики проведения теста в вашей лаборатории могут отличаться от приведенных чисел.

Воспроизводимость

Следующие результаты получены при измерении на AU540 с использованием калибраторов DAU Primary Cut-off Multi-drug Calibrator и DAU Secondary Cut-off Multi-drug Calibrator и 2-х уровней контроля, соответствующих $\pm 25\%$ соответствующей точки отсчета. Каждая проба анализировалась шесть раз дважды в день на протяжении 5-ти дней.

Качественная оценка барбитуратов

n = 6 0 мкг/л	Среднее значение, мкг/л	Внутренняя серия		Общая	
		Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV) (%)	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV) (%)
150	320	2,7	0,8	5,0	1,6
200	350	4,6	1,3	9,7	1,8
250	380	4,0	1,0	5,6	1,4
325	363	3,9	1,0	5,0	1,4
360	406	3,8	0,9	5,8	1,4
375	448	3,2	0,7	5,5	1,2

Полуквантитативная оценка барбитуратов

n = 6 0 мкг/л	Среднее значение, мкг/л	Внутренняя серия		Общая	
		Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV) (%)	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV) (%)
150	125	6,3	4,7	6,2	4,8
200	165	7,8	3,8	7,7	4,6
250	209	5,8	3,3	9,1	3,4
325	203	6,7	3,3	6,7	3,3
360	300	10,2	6,1	17,9	5,9
375	439	11,2	2,8	12,2	2,8

Корреляция

При сравнении данного диагностического набора реагентов Biotest (Барбитураты) на анализаторе AU600 с другим коммерчески доступным набором реагентов для определения барбитуратов использовали мочу пациентов. Пробы с противоречивыми результатами исследовались подтверждающим референсным методом GC/MS. Результаты анализа следующие:

	Точка отсчета 200 мкг/л			Точка отсчета 300 мкг/л	
	Качественная оценка			Качественная оценка	
	+	-		+	-
Сравнительный определительный метод	+	75 0	Сравнительный определительный метод	+	87 0
	-	1* 88		-	9 91

* Эта проба была измерена методом ОСМВ, и концентрация барбитурата в ней была 318 мкг/л.

Сравнительный определительный метод	Точка отсчета 200 мкг/л Полуполноценная оценка		Сравнительный определительный метод	Точка отсчета 300 мкг/л Полуполноценная оценка	
	+	-		+	-
	74	0		88	9
	0	88		0	91

Чувствительность

Самое низкое обнаруживаемое значение (LOL) соответствует самому низкому измеренному значению барбитурата, отличному от нуля. Нижний предел чувствительности рассчитывается как абсолютное среднее значение плюс три стандартных отклонения при 25-ти кратном измерении отрицательного калибратора (Negative Calibrator).

Точка отсчета	LOL, мкг/л (минимум)
200 мкг/л	23
300 мкг/л	23

Влияющие факторы

Следующие вещества в случае их внесения в пробу в указанных ниже концентрациях, соответствующих их нормальным эндорным концентрациям в моче, при проведении анализа с помощью набора реагентов Вейтмилле (Барбитураты) не влияют на результаты полученные значения (отличались от истинных менее чем на 10%):

Вещество	Концентрация	Вещество	Концентрация
Ацетон	≤ 10 г/л	Гемоглобин	≤ 3 г/л
Аскорбиновая кислота	≤ 15 г/л	Сывороточный альбумин человека	≤ 5 г/л
Креатинин	≤ 5 г/л	Щавелевая кислота	≤ 1 г/л
Этанол	≤ 10 г/л	Индометацин	≤ 75 мкг/л
Глицерин	≤ 100 мкг/л	Хлорид натрия	≤ 80 г/л
И-нобутил	≤ 5 г/л	Мочевина	≤ 30 г/л
Глюкоза	≤ 15 г/л		

Другие вещества или факторы, не указанные в приведенном перечне, могут влиять и быть причиной ложных результатов (например, тепловые или методические сдвиги).

Специфичность

Следующие препараты и метаболиты при использовании набора реагентов Вейтмилле (Барбитураты) в протоколе с точкой отсчета 200 мкг/л показали следующие результаты перекрестной реактивности:

Соединение	Определяемая концентрация (мкг/л)	% перекрестной реактивности
Секбарбитал	200	100
Амобарбитал	207	108
Амобарбитал	166	80
Барбитал	1000	18
Бутабарбитал	106	78
Буталбитал	213	82
Циклопентобарбитал	180	115
Пентобарбитал	270	86
Фенобарбитал	909	83
Талбутал	130	180

Структурно несвязанные препараты при использовании набора реагентов Вейтмилле (Барбитураты) в протоколе с точкой отсчета 200 мкг/л демонстрировали отрицательные результаты при концентрации, указанной ниже.

Соединение	Концентрация (мкг/л)
Ацетилсалицилат	800 000
Ацетилсалициловая кислота	800 000
Амоксициллин	900 000

и

ВВЕДЕНИЕ
200-М

ВВЕДЕНИЕ

Амфетамин	500 000
Бензоналтолин	500 000
Каптарил	500 000
Хлордиазепоксид	100 000
Циннтарин	500 000
Диклофен	500 000
Диклофен	500 000
Экспартил	500 000
Флуоксетин	500 000
Ибупрофен	500 000
Левотартилин	50 000
Метидин	500 000
Метидин	500 000
Нифедипин	500 000
Фенориларин	500 000
Грипексифен	500 000
Ранитидин	500 000
Салициловая кислота	500 000
1-нор-Δ ⁹ -THC-COOH	10 000
Варетинил	500 000
Таргетинил	500 000

Спецификация

При рассмотрении перекрестной реактивности при использовании реагентов Вальдмана (Барбитураты) полученные результаты могут не коррелировать с уровнем свободным метаболитом в пробе.

Ссылки на дополнительные анализы

- Определитель метаболитов и значимые, установленные в анализаторе по умолчанию.
- † Ссылка на мет. № ODC8316 или ODC8316.
- † Ссылка на мет. № ODC8314, ODC8315, ODC8316, ODC8317 и ODC8318.
- Выборные значения тестов отклонения

Библиография

1. Heston RL. Analytical methodology. In: Heston RL, Chang DH, eds. Urine Testing for Drugs of Abuse. NIDA Research Monograph 1995;73:35-41.
2. Miller ME, Gold MS. Analytical methodology. In: Glaser AL, Bley AE, eds. Drugs of Abuse. Oxford, NJ: Medical Economics Books, 1999.
3. Jones KL, Winkler LM, Byer GD. Drugs and Alcohol. 3rd ed. New York, NY: Harper & Row, 1979.
4. Jaffe SA. A Primer of Drug Action. 6th ed. New York, NY: WH Freeman & Co, 1982.
5. Miller ME, Gold MS. Analytical methodology. Pharmacology and Toxicology. 1984;20:665-670.
6. Reiss PC, Casany RB. Detection of Toxic Drugs and Chemicals in Urine. 3rd ed. Foster City, Calif: Chemical Technology Institute, 1998.
7. Heston RL, Friedman SE, Heston JD, et al. CECA™, a new homologous immunoassay system. Clin Chem 1994;22:1937-1941.
8. Heston RL, Friedman SE, Heston JD, et al. CECA™, a new homologous immunoassay system. Drug Testing Program. First publication, Federal Register, 1994;69 (Apr 11):11985.
9. Tamm SC, Stephens J, Casany RB, Williams J. Recommendations for the reliable detection of illicit drugs in urine in the European Union, with special attention to the workplace. Ann Clin Biochem 1997;34:339-344.
10. United Kingdom Laboratory guidelines for legally enforceable workplace drug testing. Urine Drug Testing. Ver 1.0.2001.34pp.

CE

Кроме, следует брать утром и вечером, так как в течение дня уровень мазеля может снижаться на 30%.⁶

Продукция анализа

См. Руководство Reagent Guide и соответствующее измерение для конкретного типа пробы.

Калибровка

Булет Сайтайл (кат. № 05200).

Значения калибратора прослеживаются до до Стандарта (SRM) 937 Национального Института Стандартов и Технологий (NIST).

Калибровку следует проводить каждые 14 дней или при следующих условиях:

Смена филиала с реактивом или осуществление изменения значимых контролей.

Проведение профилактического обслуживания анализатора или замена какого-либо узла прибора.

Контроль качества

Можно использовать контроли (кат. № CDC0003 и CDC0004) или другие контрольные материалы со значениями, установленными для данной модели анализатора Beckman Coulter.

Каждая лаборатория определяет частоту проведения контроля качества самостоятельно, однако, хороший лабораторный практикой считается до ежедневной проверки выходов и проблемных точек и после проверки калибровки.

Полученные в отдельной лаборатории результаты могут отличаться от паспортного значения. Поэтому рекомендуется лаборатория для своего анализа устанавливать свои средние значения и отклонения специфического контроля, на основании наибольшего отклонения по установленным пределам. Эти средние значения не должны выходить за пределы эксплуатационных пределов. Интервалы, превышающие в соответствии с требованиями.

При обнаружении какой-либо тенденции в изменении значений контроля качества или в отдельных отклонениях его значений, проверьте все аналитические этапы измерения. Каждая лаборатория должна разработать план действий на тот случай, если результаты измерения контроля качества выходят за установленные пределы.

Расчет

Анализаторы Beckman Coulter серии AU автоматический рассчитывают ЛПСС в каждой пробе.

Референсные значения⁶

Возрасты 27,3-40,9 месяцев (195-356 месяцев)

Отклонение значений могут зависеть в зависимости от возраста, пола, типа пробы, диеты и географического местоположения. В соответствии с общепринятой лабораторной практикой каждая лаборатория должна установить собственные референсные значения. При постановке диагноза результаты всегда следует рассматривать вместе с данными истории болезни и другим диагностическим исследованием.

Стандартные характеристики

Данные, приведенные в этой брошюре, относятся к измерениям на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Характеристики приведенных тестов в каждой лаборатории могут отличаться от приведенных ниже.

Линейность

Диапазон линейности соответствует значениям концентраций 10-100 мкг/мл (55-560 мкг/л).

Воспроизводимость

Следующие результаты получены при измерениях на AU2700 3-х повторных проб в течение 20-ти дней.

Среднее значение, мкг/мл	Внутрисерии		Межсерии	
	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)
24,56	0,84	3,40	0,82	3,36
35,67	0,39	1,10	0,66	1,82
75,54	0,47	0,65	0,79	1,01

Чувствительность

Минимальный предел чувствительности, установленный на анализаторе AU2700, составляет 2,30 мкг/мл.

Это значение определяется при максимальной концентрации значений ЛПСС, отнесенное к нулю. Минимум предел чувствительности рассчитывается как абсолютное среднее значение плюс три стандартных отклонения при 20-ти кратном измерении аналита в пробе без исследуемого вещества.

Корреляция

При сравнении данных двух независимых наборов референтов для определения ЛПСС CSF891205 на анализаторе AU640 с другим коммерчески доступным набором референтов для определения ЛПСС использовались симптомы пациентов. Результаты линейного регрессионного анализа следующие:

$$y = 0,889x + 1,868 \quad r^2 = 0,997 \quad n = 116 \quad \text{Диапазон значений в пробе: } 11,21-75,62 \text{ мкг/мл}$$

Влияющие факторы

В исследовании, проводившемся с целью оценки чувствительности метода к влияющим факторам, полученным следующим образом:

Исчуженность: Влияние менее 0% при значениях выше 100 до 40 мкг/л или до 60 мкг/мл
 Гликолиз: Влияние менее 10% при значениях выше 100 до 20 мкг/л
 Липемия: Влияние менее 5% при значениях выше 100 до 1000 мкг/л

Подробную информацию по влияющим факторам можно найти в справочнике User's Guide.⁷

Сноска в публикациях и тестах

¹ Относится к использованию. ² Значение, установленное в анализаторе по умолчанию.

³ Булет Сайтайл кат. № 05200.

⁴ Значения установлены для единиц в СИ (мкг/мл). При работе с единицами мкг/л, значения следует умножить на 5,585.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Tietz NW, ed. Clinical guide to laboratory tests, 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1996:375-377.
2. Fakhry IF, May OG. Biochemical aspects of hematology. In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. Textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1998:1099-1203.
3. Wro J, Henry JB. Hemolytic intermediates and inorganic ions. In: Henry JB, ed. Clinical diagnosis and management by laboratory methods. Philadelphia: WB Saunders Company, 1999:188-190.
4. Elwood W, Hall W, Behr Y, Tappin G, Vissac H, Zenda S, et al. Use of microagglutination in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. *VIHOMOLABOR* 1 Nov 2,2000p.
5. Pavella G. Iron and total iron-binding capacity. In: Kaplan LA, Pesum AJ, eds. Clinical chemistry theory, methods, and correlations 91 (Lancet: Study, 1999:71-8p).
6. Data on file at Beckman Coulter (Bioscience USA).
7. Young DF. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACN Press, 2000.

CC

Влияние факторы:

В исследовании скорости, проводимости с целью оценки чувствительности метода к некоторым внешним факторам, получены следующие результаты:

Путь ввода	Влияние менее 10% при значении гемоглобина (Hct) от 10 до 1000 мкг/л
Исходность:	Влияние менее 7% при значении гемоглобина до 40 мкг/л или до 600 мкг/л
Гемоглобин	Влияние менее 5% при значении гемоглобина до 5 мкг
Аскорбиновая кислота	Влияние менее 5% при значении аскорбиновой кислоты до 20 мкг/л
Витамин	Влияние составляет менее 5% при значении витамина до 30 мкг/л

В исследовании мочы, проводимости с целью оценки чувствительности метода к некоторым внешним факторам, получены следующие результаты:

Исходность	Влияние менее 5% при значении аскорбиновой кислоты до 50 мкг/л
Аскорбиновая кислота	Влияние менее 5% при значении аскорбиновой кислоты до 20 мкг/л
Витамин	Влияние менее 5% при значении витамина до 3000 мкг/л

В связи с этим, рекомендуется проводить исследование (Hb) (микротубулярный Вальдштрейм) имеет быть причиной некоторых результатов.

Подробнее информацию по влиянию факторов можно найти в справочнике Young⁸

ОСНОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Определение гемоглобина и гематокрита, установленное в анализаторах по умолчанию.
2. System Calibration (кат. № 55300) / Urine Calibration (кат. № 55302).
3. Значения установлены для единиц СИ (мг/дл/л). При работе с единицами выходы значений следует разделить на 10.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Newman DJ, Peto GP. Bariatric and nitrogen metabolism for Bariatric CA, Ashwood ER, eds. Textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1999:1261-1268.
2. Meyer PD, ed. Clinical chemistry in diagnosis and treatment. 8th ed. London: Arnold, 1994:189p.
3. Thomas L, Cordine L, ed. Clinical laboratory diagnostic use and interpretation of clinical laboratory results. Philadelphia: TH-Elsevier, 1999:383-371.
4. Ernst IV, Hall VA, Schwab V, Topfer O, Wenzel H, Zewig S, et al. Use of Anticoagulants in Diagnostic Laboratory Investigations and Stability of Blood, Plasma and Serum Samples. WHOCDL/ABR 1 Rev.228p.
5. NCCLS. Urinary and collection, transportation, and preservation of urine specimens: approved guideline. NCCLS Document GP16-A2, 2nd ed. Pennsylvania: NCCLS, 2004.
6. Carball F, Borge JC, Main G, Hanev J, Quirós J, Quintana M, Roldán J. Reference intervals for serum creatinine concentration: Assessment of available data for global application. Clin Chem 2002; 48(3): 550-559.
7. Palmer FC, Corp JF, Smith JJ. Reference information for the clinical laboratory. In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. Textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1999:180p.
8. NCCLS. Protocols for determination of limits of detection and limits of quantitation: approved guideline. NCCLS Document EP17-A, Pennsylvania: NCCLS, 2004.
9. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACN Press, 2000.

CE

姓名
職名

 ООО ЦИПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



R1 Бухгалтер
R1 Инженер
R2

Kenneth C. Fong 1,2,3,4,5

Copyright © 2006 Pearson Education, Inc.

Discussion

Relationships between the two variables $\rightarrow$ **Relationships between the two variables**

D-phenylethylamine

DESIGNING THE FUTURE OF THE FUTURE

Политический диспут

Хүснэгт 1.1.1.1

1

Phosphorus balance

Karlsruhe

Time

FOR THE RECORD

Chromobacterium violaceum (ATCC 35061) 15-013

[illegible]

**Corporate Citizenship,
Corporate Social
Responsibility**

Hydroxyapatite on the Bone

Conclusions

Investment decisions

Threats to Validity

Osteoporosis prevention.

† *Knautia cypria* (L.) Greuter & Burdet (Caryophyllaceae) is endemic to Halki.

4. Further Work Conducted

9. **Price Cap, Minimums**

7



**BECKMAN
COULTER.**

**Гликозилированный гемоглобин с автоматизированной подготовкой
цельной крови HbA1c APT**

Q8B8117Z

HbA1c APT

2 x 19 мл

R1

2 x 19 мл

R2

Общий гемоглобин APT

2 x 39 мл

R1

Гемоглобин A1c APT денатурат

2 x 95 мл

R1

Назначение

Комплексы реагентов HbA1c (гликозилированного гемоглобина A1c) в цельной крови - это метод измерения гемоглобина только на анализаторе Bechman Coulter AUSEO с автоматизированной подготовкой (APT).

Только для диагностики HbA1c

Абсолютные значения HbA1c и общего гемоглобина (Hb), полученные в процессе измерения, применяются для вычисления соотношения "HbA1c / Общий гемоглобин" и не подлежат использованию в диагностических целях.

Клиническое значение

HbA1c образуется в результате неферментативного гликозилирования гемоглобина на N-конец B-цепи гемоглобина A₂. Уровень HbA1c пропорционален средней глюкозе в крови. В связи с тем, что глюкоза связана с гемоглобином в эритроцитах, а течение суток их количество колеблется, измерение HbA1c является наиболее надежным способом измерения глюкозы в крови на протяжении всего периода. Поэтому определение HbA1c является важным диагностическим инструментом в мониторинге длительного контроля и лечения у больных диабетом. Контроль уровня глюкозы в крови важен для предотвращения развития явной и латентной гипергликемии, а также снижает риск осложнений и тяжесть таких осложнений, как диабетическая слепота, диабетическая нефропатия и заболевания сердечно-сосудистой системы.

Принцип определения

В зависимости от содержания и концентрации HbA1c и общего гемоглобина. Соотношение HbA1c/Общий гемоглобин, представляется в виде процентного соотношения. При определении процентного содержания HbA1c используются четыре реактива: реагент R1 для определения общего гемоглобина, реагент HbA1c R1, содержащий ингибитор, ингибирующий реагент HbA1c R2 и денатурирующий реагент R1 для HbA1c APT.

Цельная кровь, автоматизированная обработка в анализаторе AUSEO. При этом эритроциты лизируются и гемоглобиновые комплексы высвобождаются, происходит денатурация реактивов.

При измерении общего гемоглобина все его производные в щелочной среде полностью денатурируются в щелочной среде. Длительное реагирование для общего гемоглобина с предварительно обработанной пробой позволяет рассмотреть реакцию в миллисекунды. Абсорбция этих реактивов измеряется при 660 нм.

При измерении HbA1c используется реакция дифференциальной асимметричной денатурации. Асимметричная, состоящая из денатурирующего реагента, реагента для ингибирования общего гемоглобина HbA1c, ингибирующего реагента, который специфически ингибирует только HbA1c-гемоглобин. При определении HbA1c в пробе, ингибирующий реагент HbA1c APT R1, денатурирующий реагент и ингибирующий реагент HbA1c APT R2 будут активированы. Этот процесс идет и равномерно высвобождают реагенты. Наличие HbA1c в пробе приводит к уменьшению скорости активации HbA1c APT R1 и ингибирующего реагента HbA1c APT R2. Измерение скорости реакции смеси, измеренной при 700 нм, путем деления, обратного пропорционально концентрации HbA1c в пробе.

Состав

HbA1c

HbA1c APT R1

Четыре, прозрачные флакона с HbA1c

Белый лиофилизированный порошок

Буфер, pH 8.1

Повторность-внутренняя вариация: 0,8% раствор наименьшего детектируемого

Концентрация: 0,1% Глобин

HbA1c APT R2

HbA1c патина

Белый лиофилизированный порошок

Буфер, pH 2.0

Повторность-внутренняя вариация: 0,8% раствор наименьшего детектируемого

Концентрация: 0,1% Глобин

Общий гемоглобин

Общий гемоглобин APT R1

Пятьдесят, прозрачные флаконы с HbA1c

Белый лиофилизированный порошок

Повторность-внутренняя вариация: 0,8% раствор наименьшего детектируемого

Концентрация: 0,1% Глобин

HbA1c APT Denaturant (HbA1c APT денатурат)

HbA1c APT денатурат R1

Пятьдесят, прозрачные флаконы с HbA1c

Белый лиофилизированный порошок

Буфер, pH 2.4

Концентрация

Общая информация

Предназначен для работы и хранения в холодильнике

HbA1c APT R1 и HbA1c APT R2

№43. Мочу вылить, разбавить при помощи воды. Содержит смесь 5-тио-2-метил-4-гидроксиметил-3-урон (ЕС № 247-605-7) и 2-метил-2-гидроксиметил-3-урон (ЕС № 220-230-4) (2:1).

500, 500, 500 1% растворить в воде. Установить партию. Реагенты и тату из-под них необходимо утилизировать, как опасные отходы. Утилизировать обработанные реактивы и реагенты в соответствии с требованиями санитарно-гигиенического и экологического законодательства. Соблюдать все меры безопасности, указанные при работе с лабораторными реактивами.

Дополнительная информация приведена в Паспорте безопасности.

Паспорт безопасности

Реагенты (Общий гемоглобин APT R1 и HbA1c APT R2) имеют в использовании и могут быть использованы в анализаторе.

Реагент HbA1c APT R1 и HbA1c APT Denaturant R1 имеют в использовании и могут быть использованы в анализаторе.

Эту процедуру повторять немедленно.

Be

Bechman
Coulter

Bechman
Coulter

не смешивайте реагенты из наборов с разными серийными номерами. Не смешивайте флаконы с реагентами donors.

Устойчивость к стабильности

Настоящие реагенты стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реагенты стабильны 35 дней при установке и хранении в анализаторе.

Использование материалов

Цельные пробы (H-EDTA или Hb-цитрат). Калибраторы не используются в стандартной обработке. Внимательно с данными набора реагентов можно использовать только дублицированные реагенты Optum HbA1c AP1 (Dewalmet R1). Пробу с цитратной кровью перед установкой в анализатор следует тщательно перемешать, перемешав пробирку 5 - 10 раз. Результаты в пробирке с лимонной кислотой можно использовать только при условии, что она не содержит следов цитрата. Не следует сильно тщательно перемешивать, лучше использовать пробирку, в анализаторе расположенные системы автоматически смешивают. Штатки и пробирки не следует использовать дольше третьей недели после даты истечения. Не указывать штатки, которые уже транспортируются в пакеты для дублирования проб. Если на транспортировке находится более 3х штатков, лучше использовать правые штатки тем же образом, чтобы разместить штатки в пробирку цитратной крови максимально близко к лимонной кислоте. Скорее всего, штатки имеют эффект к количеству флота «Тех. релакс» с реагентами. В этом случае следует проверить, например, предвзвешивание проб, перемешивание, чтобы избежать гетерогенности результатов. Проверить, чтобы штатки были правильно обработаны, чтобы избежать гетерогенности результатов. Пробу без предварительной обработки можно хранить при 20°C 1 неделю, при 2-8°C - 2 недели и до 6 месяцев при заморозке до -70°C. Гемоглинированные пробы стабильны до 6 часов при комнатной температуре и до 48 часов при заморозке в ледяной пробирке.

Процедура анализа

Определение общего гемоглобина HbA1c проводится в стандартной процедуре гемоглинированной пробы и контроля. См. Руководство Real-time Guide в соответствующую информацию для конкретного типа пробы.

Калибраторы

HbA1c Calibrator, тип HbA1c, CDR2022.

Для определения общего гемоглобина используются только калибраторы HbA1c.

Для определения HbA1c применяются калибраторы HbA1c 1-8.

Внимание: Калибраторы не требуют предварительной обработки дублицированными реагентами HbA1c AP1 (Dewalmet R1).

Для определения калибратора используются калибраторы, предназначенные для анализа с калибратором HbA1c Calibrator CDR2022.

Калибраторы следует проводить через неделю 14 дней или при смене условий установки. Смена флаконов реагентов или смена флаконов реагентов является значимым фактором. Процедура профилактического обслуживания анализатора или замены внешнего утюга прибора.

Новые калибраторы необходимо регулярно проверять. Сразу же после калибратора следует провести контроль качества.

Проверка качества

Значения калибратора HbA1c соответствуют до IFCC HbA1c с референсным методом¹ через IFCC HbA1c референсный материал. Значения калибратора для общего гемоглобина и гемоглобина до IFCC HbA1c (референсного материала) соответствуют (BCR-472).

Оценочные, количественные результаты, полученные в анализаторе HbA1c (анализаторы программы по стандартной процедуре гемоглинированной) (сертификаты на исследование DCCT² - контрольные исследования, основанные на данных), и в анализаторе IFCC (методическая федерация референсных методов). Для перевода результатов в свои единицы, в другие необходимые процедуры переводятся по следующей формуле:

$$DCCTINGSR = (0.016 \times (IFCC) + 2.15)$$

Определение гемоглобина методом ионной диффузии основано на ионной диффузии IFCC, основанной на ионном обмене. Значения результатов HbA1c, полученные по исследованию DCCT и референсным исследованиям диабета Ветеринарного (LKPDS). Это референсное исследование также основано на результатах DCCT с референсным методом более высокого порядка.

Результаты HbA1c в %, полученные во время данного исследования, соответствуют исследованию DCCT в анализаторе исследования DCCT с помощью универсального уравнения (HbA1c) $\times (0.016 \times (IFCC) + 2.15)$, одобренного IFCC. Таким образом, результаты вычислены в анализаторе исследования DCCT, что соответствует референсным методам Международной Федерации Клинической Химии.

Контроль качества

Можно использовать контрольный материал HbA1c Control material CDR2022 или другие контрольные материалы со значениями, установленными для данного метода анализатора Backlog Control Series AL.

Каждая лаборатория определяет частоту проведения контроля качества самостоятельно, однако, хороший лабораторный контроль считается по следующим критериям: выход из пробной процедуры и после проведения калибровки.

Полученный в аналитической лаборатории результат могут отличаться от лабораторного значения. Полную лабораторию рекомендуют для оценки флота использовать свои собственные значения и стандартный стандартный контроль, на основании лабораторного измерения по установленным правилам. Эти стандартные значения не должны зависеть от процедуры соответствующего критерия интервала, приведенного в аналитической лаборатории.

При обнаружении отклонения от установленных значений контроля качества или внутренних стандартных значений, провести все аналитические этапы измерения. Каждая лаборатория должна разработать план действий на тот случай, если результаты измерения контроля качества выходят за установленные границы.

Рекомендуемые значения

Возрастные: 4,2-6,2% (DCCT)

4,2-4,4% HbA1c (анализатор IFCC, для лабораторий используются приведенные выше формулы)

Оценочные значения могут отличаться в зависимости от возраста, пола, типа пробы, даты и лабораторного использования. И соответствие с оценочными значениями лабораторной процедуры может отличаться, особенно при референсных методах. При постановке диагноза результаты следует рассмотреть вместе с историей болезни пациента, результатами его клинического обследования.

Специфические аналитические показания теста

Данные, приведенные в этом параграфе, получены при анализаторе Backlog Control Series AL. Результаты, полученные в других лабораториях могут от них отличаться.

Аналитический диапазон

Общий гемоглобин

Аналитический диапазон для общего гемоглобина составляет 4,4-14,3 ммоль/л (T-23 г/дл).

HbA1c

DCCT

Аналитический диапазон данного исследования начинается от 2,6 % HbA1c до концентрации калибратора HbA1c 12,2 ммоль/л HbA1c 1,97 г/дл на наборе калибратора HbA1c Optum (тип: номер CDR2022). Это соответствует 14,6 % HbA1c при общем гемоглобине 6 ммоль/л (14,5 г/дл).

Backlog

Backlog

Backlog

Плюсы, факторы, которые повышают верную оценку диапазона линейности, равность не следует, а их разность обозначается как $\pm 14,5\%$

Воспроизводимость

Следующие результаты получены при измерении на анализаторе AU580 3-х нулевых цитовых проб в течение 20-ти дней.

n = 88	Внутренняя		Внешняя	
	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV%)	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV%)
Средняя гемоглобин, %	6,20	0,02	0,43	0,06
	7,34	0,04	0,73	0,07
	11,17	0,06	0,88	0,10

Чувствительность

Наименьший предел чувствительности, установленный на анализаторе AU580, составляет для

HbA1c 0,01 ммоль/л (0,02 g/dl);

TbH 0,05 ммоль/л (0,06 mg/dl).

Это значение определяется на основании измеренных значений HbA1c, отнесенных к нулю. Наименьший предел чувствительности анализатора при определении процентного значения HbA1c три стандартных отклонения при 20-ти повторных измерениях анализа в пробе без нуклеотидного материала

Корреляция

При сравнении HbA1c ATP CORB 1177 для нуклеотидного набора реагентов для определения HbA1c на анализаторе AU580 с HbA1c CORB192 на анализаторе AU580 были использованы пробы пациентов. Результаты линейного регрессионного анализа следующие:

$y = 1,82x - 0,437$ $r = 0,985$ $n = 105$ Диапазон значений в пробе: 4,80-13,45% HbA1c

При сравнении HbA1c ATP CORB1177 для нуклеотидного набора реагентов для определения HbA1c на анализаторе AU580 с HbA1c методом были использованы пробы пациентов. Результаты линейного регрессионного анализа следующие:

$y = 1,08x - 0,512$ $r = 0,980$ $n = 127$ Диапазон значений в пробе: 4,80-12,45% HbA1c

Влияющие факторы

В исследовании, проводившемся с целью оценки чувствительности метода и некоторых влияющих факторов, получены следующие результаты:

Интерференция:

Влияние менее 10% при значениях гемоглобина до 513 ммоль/л (20 mg/dl)

Температура:

Влияние менее 10% при значениях гемоглобина (Антарктика) до 800 ммоль/л

Температура:

Влияние менее 10% при значениях гемоглобина до 18 ммоль/л (1000 mg/dl)

Ремедирующий фактор:

Не влияет в концентрации до 2000 МЕ/л

Ацидоз/алкалозис в анализе:

Не влияет в концентрации до 80 ммоль/л

Уровень натрия:

Не влияет в концентрации до 30 ммоль/л

Мочевина:

Не влияет в концентрации до 83 ммоль/л

Подробную информацию по влияющим факторам можно найти в справочнике Young.⁶

Ограничения⁷

Непредоставление точной оценки эритроцитов снижает точность измерения, что приводит к увеличению значения HbA1c в %. Поэтому результат процентного содержания HbA1c недостаточен при сопоставлении данных эритроцитов. Присутствие такого нуклеотидного вещества крови может быть гематологическим заболеванием и другие гематологические заболевания, большие эритроциты и базофициты.

При использовании данного набора реагентов в пробе с гемоглобином B и C может наблюдаться повышение значения HbA1c до 40%. В пробе, содержащей более 10% гемоглобина F, результат может быть ниже ожидаемого. Результаты HbA1c, полученные при использовании данного набора реагентов, для проб, содержащих гемоглобины B, C и F (>10%), нельзя сравнивать с результатами, полученными при использовании других наборов реагентов. Проба, содержащая гемоглобин E, при использовании данного диагностического набора, не оказывает какого-либо влияния на результат измерения.

Лейбелные фракции гемоглобинового гемоглобина (гемоглобиновые комплексы с HbA или HbA1c по электрофорезу) не влияют на результат измерения HbA1c специфичности антигенов для специфичных методов.

Наличие при введении другой иммунной реакции, оптимизатор не должен влиять на результаты измерения. Наличие при введении другой иммунной реакции, оптимизатор не должен влиять на результаты измерения. Наличие при введении другой иммунной реакции, оптимизатор не должен влиять на результаты измерения.

Ссылки в программном листе

¹ HbA1c Calculator, код № COR3002.

² Значения установлены для единиц ммоль/л. При работе с единицами mg/dl, значения следует умножить на 1,8125.

³ Значение 0,1 ммоль/л и значение общего высшего ингибитора

⁴ Для определения % HbA1c используются результаты TbH и HbA1c. % HbA1c рассчитывается математическим анализатором по формуле $(\text{HbA1c} \times \text{HbA1c} + \text{HbA1c} + \text{HbA1c}) \times 100$

Библиография

1. National Glycochemistry Laboratory. The National Glycochemistry Laboratory. Use and measurement of clinical laboratory results. *Practical Diabetes*. TN-2004. Verlagsgesellschaft mbH, 1992. 1-2-10.
2. Jorgensen JO, Koberg U, Day J, Pella A, Heston V, Heston T, Madsen K, Madsen A, Madsen P, Petersen R, Thomsen L, Ungerstedt M, Weykamp C. Approved IFCC reference method for the determination of HbA1c in human blood. *Clin Chem Lab Med* 2002; 40(1): 75-81.
3. National Glycochemistry Laboratory. The National Glycochemistry Laboratory. Use and measurement of clinical laboratory results. *Practical Diabetes*. TN-2004. Verlagsgesellschaft mbH, 1992. 1-2-10.
4. National Glycochemistry Laboratory. The National Glycochemistry Laboratory. Use and measurement of clinical laboratory results. *Practical Diabetes*. TN-2004. Verlagsgesellschaft mbH, 1992. 1-2-10.
5. Young DG. Effects of drugs on clinical laboratory tests. 2nd ed. AMSC Press, 2000.
6. Young DG. Effects of drugs on clinical laboratory tests. 2nd ed. AMSC Press, 2000.
7. Young DG. Effects of drugs on clinical laboratory tests. 2nd ed. AMSC Press, 2000.



**BECKMAN
Coulter.**

QAS1172

ICM
4 x 14 мм
4 x 11 мм

**R1
R2**

Назначение

Комплексное определение иммуноглобулина M (IgM) в сыворотке и наличие черепно-мозговых менингеальных изменений на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Тестов для диагностики ИЧД.

Клиническое значение

Иммуноглобулины классов IgG, IgA, IgM, IgD и IgE присутствуют в сыворотке здоровых человека в порядке убывания их концентрации. IgM составляет примерно 1% всех иммуноглобулинов плазмы и является иммуноглобулином, который первым отвечает на антигенную стимуляцию. IgM обычно циркулирует в плазме в форме пентамера и, из-за своей большой молекулярной массы (971 кДа), в основном находится в кровяном русле (70-80%). Кислот IgM состоит из пяти субъединиц, например, иммуноглобулины групп крови ABO, Rh и системы к IgG, например, реактивный фактор.

Основным функцией IgM в иммунном ответе является агглютинация патогенов и активация комплемента по классическому пути. Иммунная концентрация иммуноглобулина в сыворотке многократно повышается при острых инфекционных инфекциях.

- Гипериммуноглобулинемия - повышает IgM в сыворотке крови и часто с выраженными периферическими инфекциями.
- Поликлональная гипериммуноглобулинемия - уровень IgM увеличивается при поликлональном повышении циркулирующих иммуноглобулинов (например, вирусная или бактериальная инфекция и ревматоидный артрит).
- Моноклональная гипериммуноглобулинемия - например, при моноклональном В-клеточном лейкозе и злокачественной лимфоме. Повышенный уровень IgM в сыворотке крови или в течение первых четырех недель жизни может указывать на внутриутробную инфекцию плода или инфекцию новорожденного типа или краснухи, цитомегаловируса, токсоплазмоз или сифилиса.

Принцип определения

При добавлении пробы к буферу R1 в растворе антител R2, связанной с IgM специфичности реагент вступает в антигенно-антителную реакцию с мономерным IgM, с образованием нерастворимых комплексов. Абсорбция реакционной смеси контролируется концентрацией IgM в пробе.

Состав

Концентрация в реакционной смеси:	
Тест-буфер (pH 7.2)	90 мкг/мл
Полимеризованный BCG	3.8%
Кислотный буфер в IgM	Зависит от типа
Консервант	

Сфера применения

Создайте все меры предосторожности, принятые при работе с лабораторными реагентами. Во избежание возможного контакта с опасными микроорганизмами после сильной перекрестной реакции проявляйте максимальную осторожность. Стерилизованные реакционные материалы в соответствии с требованиями санитарно-гигиенического и экологического контроля. Поставщик безопасности может быть предоставлен профессиональным пользователем по запросу.

Подготовка реагента

Реактивы хранят и используют в соответствии с условиями использования, указанными на этикетке.

Упаковка и стабильность

Иммунные реагенты стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реагенты стабильны 90 дней при использовании и хранении в холодильнике.

Исследования стабильности

Сыворотка и плазма (HSA или плазма).
В сыворотке и плазме IgM стабильны в течение 4-х месяцев при температуре хранения 2...8°C и в течение 2-х месяцев при температуре хранения 18...25°C.
Не следует проводить измерения в очень холодных пробках.

Процедура анализа

См. Руководство Patient Guide и соответствующую инструкцию для конкретного типа пробы.
Если программы для гематологического исследования, при которой используются меньшие объемы проб.
Необходимо запрограммировать параметры в меню «Data Check». См. программу программирования.

Калибровка

Мультикалибратор NBT Белого сыворотки Beutels Protein Mix-Calibrator ODR001.
Значения калибратора для IgM пропорциональны до стандарта CRM 470 IPSC (Международная федерация по статистическим методам).
Калибровку следует проводить при следующих условиях:
Система калибровки калибра (анализатор или существующие измерения значений калибров).
Проверка профессионального обслуживающего персонала или наличие внешнего ULM калибра.
Новые калибровочные материалы (сертификат калибровки) - Национальный калибратор в Милане (Общественное исследование) - Селлбиом Милан (Микрогематологический) - Calibration Curve (Калибровочная кривая). Сразу после калибровки следует провести контроль качества.

Контроль качества

Многократные повторные сыворотки (TA Control System Unit № 0000014, 0000015 и 0000016) или другие контрольные материалы со значениями, установленными для данной модели анализатора Beckman Coulter.
Каждая лаборатория определяет частоту проведения контроля качества самостоятельно, однако, каждый лабораторный анализ должен считаться из измерения измерения вместе с пробой пациента и после проведения калибровки.
Полученные в отдельной лаборатории результаты могут отличаться от паспортных значений. Поэтому лаборатория разрабатывает для каждого анализа установленный срок хранения значений и регулярный статистический контроль, на основании которого принимается решение по использованию результатов. Эти критерии должны быть приняты для обеспечения приемлемых результатов, применяемых в соответствии с требованиями стандарта.

158

158/172
1994

158/172



**BECKMAN
COUTLER.**

С-РЕАКТИВНЫЙ БЛОК ICRP1

09R01167

**4 x 30 МЛ
4 x 45 МЛ**

**R1
R2**

Назначение

Компактное определение С-реактивного белка (С-РБ) в сыворотке и плазме методом иммунофлуориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Данный метод используется для выявления и оценки инфекции, повреждения тканей, воспалительных состояний и связанных с ними заболеваний. Только для исследований *in vitro*.

Клиническое значение^{1,2}

С-реактивный белок (С-РБ) является одним из наиболее чувствительных маркеров острого воспаления. С помощью набора реактивов Beckman Coulter СРБ возможно измерение концентрации С-РБ в диапазоне 4–480 мкг/Л. Однако, в связи с низкой специфичностью С-РБ и значительной его межлабораторной вариабельностью, необходимо с большой осторожностью интерпретировать данные с учетом полученных ранее значений и уровня содержания в сыворотке других маркеров.

Концентрация С-реактивного белка может резко увеличиваться после инфаркта миокарда, в том же результате травмы, инфекции, воспаления, хирургического вмешательства или после трансплантационной операции.^{1,2}

Повышение С-РБ наблюдается в течение 24–48 часов и может достигать уровней, превышающих норму в 2000 раз.

Принцип определения

При исследовании пробы к буферу R1 и R2, содержащему липидные частицы, С-РБ специфично связывается с антителами против человеческого С-РБ, прикрепленными липидным частицам, с образованием нерастворимых комплексов. Абсорбция реакционной смеси пропорциональна концентрации С-РБ в пробе.

Состав

Концентрация в разведенной смеси	200 мкг/мЛ
Трибуфер	
Липидная частица, покрытие анти-С-РБ антителами человека	< 0,5% w/v w/v
Консервант	< 0,1% w/v w/v

Общие предостережения

Соблюдайте все меры предосторожности, применяемые при работе с лабораторными реактивами. Во избежание возможного отравления при обращении с реактивами носите маску, защитные очки, перчатки. В случае попадания реактива на кожу или в глаза немедленно промойте пораженные участки обильным количеством воды. Утилизируйте отработанные реактивы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля. Паспорт безопасности может быть предоставлен профессиональным консультантом по запросу.

Подготовка реагента

Реактив R1 готов к использованию и непосредственно может быть установлен в анализатор. Реактив R2 перед установкой в анализатор необходимо перемешать. Перемешивание флакона 5–10 сек. Этого достаточно для перемешивания реагента.

Хранение и стабильность

Неиспользованные реактивы до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2–8°C. После вскрытия реактивы стабильны 90 дней при хранении в холодильнике.

Исследования материалов

Сыворотка, плазма (ЗДТА или Лионвизе). В сыворотке и плазме С-РБ стабилен в течение 2х недель при температуре хранения 2–8°C и в течение 11 дней – при 15–25°C.¹

Процедура анализа

См. Руководство Reagent Guide и соответствующую инструкцию для измерения типа пробы.

Калибровка

СРБ Calibrator, кат. № CDC00032

Значения калибратора для С-РБ сопоставляются со стандартом BIPAC[®] 424 ИТРС (Международный Федеративный Клинический Хеминг).

Калибровку следует проводить при оптимальных условиях.

Смена серийного номера реактива или существенное изменение значений контроля.

Проверка профилактического обслуживания анализатора или замены вышедшего узла прибора.

Новую калибровку необходимо регулярно проверять. Сразу же после калибровки следует провести контроль качества.

Контроль качества

Можно использовать контрольные сыворотки TLA Control Series (кат. № CDC0014, CDC0015 и CDC0016) или другие контрольные материалы со значениями, установленными для данной версии анализатора Beckman Coulter.

Каждая лаборатория определяет частоту проведения контроля качества самостоятельно, однако, каждая лаборатория должна считать, что проведение контроля качества является частью процесса обеспечения качества и должно проводиться регулярно.

Полученные в отдельной лаборатории результаты могут отличаться от лабораторного значения. Поэтому лаборатория рекомендует для широкого анализа устанавливать свои собственные значения и оценивать специфичность контроля, не основываясь на лабораторном измерении по установленным правилам. Эти собственные значения не должны выходить за пределы соответствующей принятой интервалов, приведенных в соответствующем руководстве.

При обнаружении любых отклонений в клинических значениях контроля качества или анализатора отклонений его значений, проведите все диагностические этапы измерения.

R1

AWA201
200-01

Smith Line

Каждой лаборатории следует разработать свои действия на тот случай, если результаты измерения кривой скорости выйдут за установленные пределы.
Обратите внимание на то, что значения аналитов в контрольных материалах, непроизводных компаний Beckman Coulter, могут не совпадать с реальными значениями. Причина этого в использовании внутренних материалов на чужеродного происхождения.

Результат

Анализатор Beckman Coulter серии AU автоматически рассчитывает концентрацию С-РБ в каждой пробе.

Референсные значения¹

Сыворотка (взрослые) Верхний предел – 6 мг/л

Смещение значений могут возникнуть в зависимости от возраста, пола, этнической, диеты и географического местонахождения. В соответствии с общепринятой лабораторной практикой нашей лаборатории следует учитывать соответствующие поправочные значения. Эти поправочные данные результаты всегда следует рассматривать вместе с данными истории болезни и другими диагностическими исследованиями.

Специфические утверждения по валидации теста

Данные, приведенные в этом параграфе, получены при измерении на анализаторе Beckman Coulter. Характеристики приведенных тестов в вашей лаборатории могут отличаться от приведенных тестов.

Линейность

Диапазон линейности соответствует значению концентрации 4–400 мг/л.

Воспроизводимость

Следующие результаты получены при измерении на анализаторе AU680 3-х повторных проб в течение 20-ти дней

Среднее значение, мг/л	Внутренний контроль		Сыворотка	
	Средн. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	Средн. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)
0.51	0.08	2.49	0.20	4.30
1.90	0.18	9.54	1.48	7.84
554.89	0.01	0.00	0.00	1.00

Чувствительность

Нижний предел чувствительности для С-РБ, с использованием реагентов с рег. № 08R01167, составляет 1 мг/л. Данные значения были получены в соответствии с протоколом CLSI EP17-A.

Интерференция

Использовались сыворотки пациентов при сравнении данных между реагентами для определения С-РБ 08R01167 на анализаторе AU7008 и другими коммерчески доступными наборами реагентов для определения С-РБ. Получены следующие результаты линейного разбавления:

$y = 1.014x + 0.431$	$r = 0.9991$	$n = 987$	Диапазон значений в пробе: 4–400 мг/л
----------------------	--------------	-----------	---------------------------------------

Влияющие факторы

В исследованиях, проводившихся с целью оценки чувствительности метода к различным анализаторам факторам, получены следующие результаты:

Угнетение: Влияние менее 10% при значениях гемоглобина до 40 мг/дл и/или до 804 ммоль/л

Гиперлипидемия: Влияние менее 8% при значениях гемоглобина до 8 г/л

Гипербилирубинемия: Влияние менее 5% при значениях билирубина (факторальное²) до 1000 мкг/л

Полную информацию по влияющим факторам можно найти в справочнике Young³.

Спецификации

Гипербилирубинемия в пробе могут быть причиной ложно заниженных результатов.

В пробе с патологически отклоненными характеристиками, особенно очень низкими, могут быть получены заниженные результаты.

Для проб с очень высокой концентрацией С-РБ (> 750 мг/л) могут быть получены ложно высокие результаты. Для концентрации фибрина < 2 г, что обусловлено избытком фибрина в пробе.

В очень редких случаях гематемия, особенно микроцитозная (гМ (микросфероцитоз-анемия Вальденстром)), может быть причиной нерасчетных, нестабильных результатов.

Описан в профессиональных листах

- ¹ Определенный патентованный метод = Значение, установленное в анализаторе по умолчанию.
- ² CRP CalVeritas, рег. № 00000002.
- ³ Значения установлены для единиц mg/L.

ЛИТЕРАТУРА

1. Walker J. C-reactive protein (CRP). In: Thomas L, ed. Clinical laboratory diagnosis: Use and assessment of clinical laboratory results. Philadelphia: WB Saunders Company, 1997:739-740.
2. Oat G, Shoenen LM, Chaitman RH. Amino acids and proteins. In: Tietz NH, ed. Fundamentals of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1987:239-240.
3. Burt W, Hain G, Schmitt Y, Taylor G, Walker M, Davis B, et al. Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood plasma and serum samples. JACOBILAB 1998; 1 Nov 2:269.
4. Boudier S, Del P. Standardization of the measurement of 14 proteins in human serum based on the new IFCC/BCR/ICAP international reference material CRM 470. J Lab Med 1998;25:196-197.
5. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests. 2nd ed. AACC Press, 2000.

CE

Подготовка реагента

В1: Содержимое флакона V1-2 полностью перенесите во флакон V1-1. Перед тем как установить в анализатор, тщательно перемешайте.

В2: Реагент готов к использованию и может быть непосредственно установлен в анализатор.

Измерения и стабильность

Несколько реакций стабилизируются до дили, указавшей на эталон, при температуре хранения 2-8 °C. После загрузки реагенты стабилизируются 30 дней при хранении в анализаторе.

Используемый материал

Рекомендуется использовать сыпучую. Не используйте гемолитические, хрипящие и пенистые пробы. После вылива крови следует дождаться образования осадка и добавить сыпучую от осадка с целью избежания гемолиза и загромождения пробы артефактами из эритроцитов. СИ-МБ стабилизируются в замораживании от момента от отбора в течение 7 дней при температуре хранения 2-8 °C и в течение 2 дней - при 20-25 °C и до 1 года - при -30 °C^{1,2}

Для исследований можно использовать и гепаринизированную плазму без следов гемолиза. Но при использовании плазмы необходимо непрерывное измерение скорости реакции, что является граничной лабораторной рекомендацией измерения.¹ Не рекомендуется использовать плазму с ЗДТА, оксалатом или цитратом.

Процедура анализа

См. Руководство Reader Scribe и спецификацию инструкции для измерения типа пробы.

Калибровка

Измерение производится в режиме MB. Для получения корректных результатов, для каждого анализатора следует установить специфическое значение MB фактора. Для этого следует прийти к режиму MB в стандартном меню, доступном для каждой серии калибратора CX-MB. Ссылка (ссылка на CX-MB) для анализатора AL2700M45408 эту процедуру необходимо выполнить для каждой новой партии. Контроль качества следует измерять непосредственно после каждой калибровки.

При изменении значений анализатора рекомендуется вновь установить специфическое значение MB фактора.

При наведении на новую партию реагентов рекомендуется провести измерение реагент баланс.

Эта метод стандартизации на референсному методу IFCC для общей КХ в двойном-интервале, ручного измерения и учета в расчете значения калибровки лабораторной системы.

Контроль качества

Можно использовать внутренние стандарты CX-MB Control Level 1 (CX-MB уровень 1, код на ODR30035) и Level 2 уровня 2, код на ODR30036) или другие контрольные материалы по назначению, установленным для данной модели анализатора Beckman Coulter.

Каждая лаборатория определяет частоту проведения контроля качества самостоятельно, однако, каждой лабораторией практики считается на основании измерения в течение 10 дней и после каждой калибровки.

Полученные в стандартной лабораторной практике результаты могут отличаться от паспортных значений. Паспортные значения лаборатория для каждой партии устанавливает свои средние значения и осуществляет специфический контроль, на основании которого измерения по установленным практикам. Это позволяет избежать не допущения ошибок на практике, обеспечивая качество практики измерения, применяемой в соответствующей практике.

При обнаружении каких-либо отклонений в измерениях значений контроля качества или значительных отклонений его значений, проведите все возможные шаги измерения. Каждая лаборатория должна разработать план действий на тот случай, если результаты и измерения контроля качества будут за установленные пределы.

Обратите внимание на то, что значения результатов в контрольных материалах, не предназначены для анализа реактива Beckman Coulter серии AL могут отличаться с другими номерами. При этом этого в использованных контрольных материалах на чипов-диск производства.

Результат

Анализатор Beckman Coulter серии AL автоматически рассчитывает активность КХ-МБ в каждой пробе

Рекомендуемые единицы

Барсели (37°C): $\times 24 \text{ Ед (0,4 ммоль/л)}^{2,3}$

Информация: с высокой вероятности корректности информации можно говорить при использовании следующих выражений.²

	Ед	ммоль/л
1. Общий КХ	> 250	$> 4,17$
2. CX-MB	> 24	$> 0,4$
3. Активность CX-MB составляет 6-26% от общей КХ		

Фракция CX-MB, составляющая лишь 6% общей активности КХ, считается значимой для постановки диагноза инфаркта миокарда. В подобных случаях в течение 4 часов измерения следует повторить, если для анализа собран образец крови.

Активность MB-фракции ниже 6% от активности общей КХ указывает на повреждение сердечной мускулатуры. Активность MB-фракции более 26% от активности общей КХ может указывать на наличие инфаркта КХ в подобных случаях требуется дополнительное исследование.

Средние значения могут изменяться в зависимости от возраста, пола, типа пробы, диеты и лабораторного оборудования. В соответствии с общепринятой лабораторной практикой каждой лаборатории следует определить собственные референсные значения. При постановке диагноза результаты всегда следует рассматривать в контексте с данными истории болезни и другими диагностическими исследованиями.

Специфические характеристики

Данные, приведенные в этом параграфе, получены при измерениях на анализаторе Beckman Coulter серии AL. Характеристик проведения теста в каждой лаборатории могут отличаться от приведенных данных.

Линейность

Динамический диапазон соответствует значимым значениям активности фермента 10-2000 Ед (5,17-33,33 ммоль/л).



ТРИГЛИЦЕРИДЫ (TRIGLYCERIDE)

OSR60118

4 x 20 мл

R1

4 x 8 мл

R2

OSR61118

4 x 60 мл

R1

4 x 12,5 мл

R2

Назначение

Колориметрический фотометрический тест для количественного определения триглицеридов в сыворотке или плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Точный для диаметров 11 и 100.

Клиническое значение

Определение триглицеридов используется в диагностике и лечении больных с острыми и хроническими заболеваниями, особенно диабетом, нефрозом, желчнокаменной болезнью, обструкцией и другими заболеваниями, затрагивающими метаболизм липидов, а также различными заболеваниями печени.


В клинической практике определение триглицеридов используется для классификации артериальной и метаболической нарушений липидного обмена, а также для выявления факторов риска атеросклероза и сердечно-сосудистой болезни.

Принцип определения

Определение триглицеридов при использовании реактива Спанто основано на реакции окисления ферментативных реакций. Триглицериды пробы гидролизуются с помощью ферментов: липазы с образованием глицерина и жирных кислот. Глицерин в свою очередь фосфорилируется глицеринкиназой (ГК) в присутствии АТФ с образованием глицерин-3-фосфата.

Глицерин-3-фосфат окисляется молекулярным кислородом в присутствии глицеринфосфатоксидазы (ГФО), что приводит к образованию пероксида водорода и диацилглицеринфосфата. Пероксид водорода используется в реакции окислительного расщепления тетрафенилпента-4-фенилглицерин (4-АЛП), детектирующего пероксида водорода (ПО) и производящего образование хромофора который измеряется при 600/600 нм. Значение абсорбции при 600/600 нм прямо пропорционально концентрации триглицеридов в пробе.

Схема реакции



Состав

Концентрация в реакционной смеси:

Буфер (PHES pH 7,8)

Mg

МАДВ

4-Ацилглицерин

АТФ

Моноамины

60 ммоль/л

4,8 ммоль/л

0,25 ммоль/л

0,5 ммоль/л

1,4 ммоль/л

Липазы

Глицеринкиназа

Пероксидаза

Ацетилглицерин

Глицерин-3-фосфатоксидаза

1,9 мЕд (26 ммоль/л)

0,5 мЕд (6,3 ммоль/л)

0,86 мЕд (10,3 ммоль/л)

1,40 мЕд (24,8 ммоль/л)

1,40 мЕд (24,8 ммоль/л)

Общие предосторожности

Соблюдайте все меры предосторожности, принятые при работе с лабораторными реагентами.

Во избежание загрязнения окружающей среды и оборудования соединений после смеси налейте избыток реагента промышленные емкостные трубы водой.

Утилизируйте отработанные реактивы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

Подготовка реагента

Реагенты готовы к использованию и могут быть непосредственно использованы в анализаторе.

Хранение и стабильность

Неустойчивы реагенты стабильны до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реагенты стабильны 30 дней при хранении в анализаторе.

Используемые материалы

Сыворотка и плазма (EDTA или гепарин).

В качестве катализатора не используйте фториды, цитрат или оксалат.

Не следует проводить измерения в натеренных пробках.

Не используйте вакуумные системы для работы с реактивами с ограниченным сроком хранения.

В сыворотке и плазме триглицериды стабильны в течение 7 дней при температуре хранения 2-8°C и 2 дня — при 15...25°C.

Процедура анализа

См. Руководство Reagent Guide и соответствующую инструкцию для конкретного типа пробы. Есть программы для автоматизированной пробы или другой пробы с минимальным объемом.

W21

010000-11201

2003.04

Модель

Список литературы

6. **Список литературы** (стр. № 65-66) * Заполнить, указав источники информации по теме работы.
7. **Список литературы** (стр. № 65-66)
8. **Список литературы** (стр. № 65-66) * Заполнить, указав источники информации по теме работы.

Список литературы

1. Tietz NW, ed. Clinical guide to laboratory tests, 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1995: 910-911.
2. Brown WF. Lipid metabolism. In: Tietz NW, ed. Clinical laboratory diagnosis: Use and interpretation of clinical laboratory results. Philadelphia: WB Saunders Company, 1995: 165-171.
3. Jacobs MJ, Van Diermen PJ. Arachidonic acid metabolism. In: Tietz NW, ed. Clinical guide to laboratory tests, 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1995: 910-911.
4. Kosterich LK, Lindberg VW. Arachidonic acid metabolism. In: Tietz NW, ed. Clinical guide to laboratory tests, 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1995: 910-911.
5. Tietz NW, ed. Clinical guide to laboratory tests, 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1995: 910-911.
6. National Cholesterol Education Program Expert Panel. Executive summary of the third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA. 2001;285:2486-2497.
7. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests. AACN. 1995; 44:24-27.
8. Shephard MD, Whiting MJ. Falsely low estimation of lipoprotein in serum plasma by the enzymatic hydrolysis method with modified Friedlander's reagent. Clin Chem. 1995; 41:255-258.
9. Guder, H.S., Briel W, Heilmann, S., Tietz NW, ed. Clinical guide to laboratory tests, 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1995: 910-911.

CE



КАЛЬЦИЙ ARSENATO IN (CALCIUM ARSENATO IN)

09899117
R1R1

4 x 15 мл
4 x 25 мл

R1
R1

Назначение

Компьютеризованный фотометрический тест для количественного определения общего кальция в сыворотке, моче или моче человека на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro.

Клиническое значение¹

Измерение кальция используется для диагностики и лечения заболеваний эндокринной системы, различных состояний заболеваний, почечных заболеваний, костей, заболеваний легких и печени (применение кальциевых соединений или препаратов).

Общий кальций сыворотки состоит из трех фракций: свободный или ионизированный кальций (50%), кальций, связанный белками, большая часть которого связана с альбумином, а меньшая с глобулинами (40%) и кальций, входящий в состав комплексов, например, фосфатов, цитратов и бисфосфонатов (5%). Физиологические колебания значений фракций зависят от концентрации кальция, однако его трудно измерить непосредственно. Его концентрация связана тесно со скоростью общего кальция и pH крови, от которого в большой степени зависит уровень ионизированного кальция. Ионы кальция играют важную роль при передаче нервных импульсов, являются кофакторами в ряде ферментативных реакций, необходимы для поддержания нормальной структуры мышц и процессов свертывания крови. Значительные отклонения концентрации ионов кальция приводят к тяжелым болезням. Концентрация ионов кальция в моче нормальна, поэтому измерение кальция в моче не является надежным методом диагностики заболеваний.

Принцип определения^{2,3}

Метод основан на реакции ионов кальция (Ca^{2+}) с Аромато II (2,2'-(1,4-диазидо)-3,6-дисульфотрифенил-2,7-бис(4-хлорбензил)карбинолом) в присутствии окислителя, образующего комплекс, окрашенный в фиолетовый цвет. Изменение абсорбции в реакционной смеси регистрируется фотометрически при 550/700 нм. Увеличение абсорбции прямо пропорционально концентрации кальция в пробе. Метод не специфичен, так как другие ионы также могут влиять на определение кальция с использованием Аромато II.

Схема реакции



Состав

Концентрация в реакционной смеси:

Навдхол (pH 9.0)

Аромато II

Трилон X-100

Консервант

0,1-0,2%

Свойства реактива

Свойства и срок годности реактива, сравнимые при работе с лабораторными реактивами.

Во избежание возможного отклонения значений содержания кальция в крови необходимо использовать реактив, прошедший надлежащую проверку. Увеличение абсорбции реакционной смеси в соответствии с требованиями стандартно-сертификационного и экологического контроля. Проверка безопасности может быть предоставлена по запросу.

Подготовка реагента

Реактив готов к использованию и не требует дополнительной установки и анализа.

Упаковка и стабильность

Наличие реактива стабильно до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реактив стабилен 90 дней при хранении в холодильнике.

Использование материала

Сыворотку или плазму (гепарин) надо аккуратно отделить от клеточных элементов крови до появления помутнения или помутнения. В противном случае помутнение не позволит точно измерить кальций. Фторид натрия и оксалат⁴.

Сыворотка и плазма стабильны в течение 3 месяцев при хранении при 2-8°C и в течение 7 дней при 15-25°C⁵.

Моча: подкисление HCl. При сборе утренней мочи рекомендуется принять стандартной порции. Стабильность в моче в течение 4 дней при хранении при 2-8°C и в течение 2 дней при 15-25°C⁶.

Применение анализа

См. Руководство Naquest Guide и соответствующее руководство для конкретного типа пробы.

Есть программы для лабораторных проб или других проб с минимальным объемом.

Калибровка

Используйте анализатор Beckman Coulter (модель 66300) для сыворотки/плазмы и анализатор Urine Calibrator (модель 000000) для мочи. Калибратор для мочи, или для сыворотки, или для мочи проставляется до стандартного калибровочного материала (BMD 9000, уровень 1). Национального института стандартов и технологий (NIST). Проверьте калибровку прибора в случае.

См. Руководство по калибровке или документацию на калибровку прибора.

Проведение профилактического обслуживания анализатора или замена любого узла прибора.

Контроль качества

Используйте контрольные материалы сыворотки/плазмы Beckman Coulter (модель 000000 и 000001) или другие контрольные материалы от других производителей для данной модели анализатора Beckman Coulter.

В качестве контроля для исследования в моче можно использовать контрольные материалы Urine Chemistry Control (модель 267 и 368) или другие контрольные материалы от других производителей, установленные для данной модели анализатора Beckman Coulter.

RU11

RU099117.D
2000-08

Amesbury

Каждая лаборатория определяет частоту проведения контроля качества биоматериалов, однако, каждой лабораторией принятой считается их ежедневное измерение вместе с пробой пациентов и после проведения анализа.

Полученные в отдельной лаборатории результаты могут отличаться от первоначального измерения. Поэтому лаборатория рассчитывается для наиболее точного установления пробы образцы значимы и сплюснены стандартного контроля, не основываясь на измерении по установленным правилам. Эти образцы значимы не должны выводить за пределы соответствующей критической интервал, применяемых в соответствии с правилами.

При обнаружении каких-либо отклонений в измерениях значений контроля качества или значимых отклонений его значений, проверьте все аналитические значения измерений. Каждой лаборатории следует разработать план действий на тот случай, если результаты измерения контроля качества выйдут за установленные пределы.

Результаты

Анализаторы Beckman Coulter серии AU автоматически рассчитывают концентрацию кальция в каждой пробе

Рекомендуемые значения

Сыворотка, плазма - взрослые

2,20-2,65 ммоль/л (8,8-10,6 мг/дл)

Сыворотка, дети 0-10 дней

1,90-2,90 ммоль/л (7,6-10,4 мг/дл)

Сыворотка, дети 2-12 лет

2,20-2,78 ммоль/л (8,8-10,6 мг/дл)

Моча¹

Двухчасовая порция мочи

Мужчины и женщины ≤ 0,57 ммоль/моль (0,2 г/г) креатинина

Сутрачная моча

Женщины < 0,2 ммоль (250 мг)

Мужчины < 7,5 ммоль (300 мг)

Мужчины и женщины ≤ 0,1 ммоль (4 мг/г массы тела)

Маленькие дети: 2,25 ммоль/ммоль (≤ 0,8 г/г) креатинина

Средняя величина может варьироваться в зависимости от возраста, пола, типа пробы, диеты и географического местоположения. В соответствии с общепринятой лабораторной практикой каждой лабораторией следует установить собственные референсные значения. При необходимости данные результаты всегда следует рассмотреть вместе с данными истории болезни и другими диагностическими исследованиями.

Специфические характеристики

Данные, приведенные в этом разделе, получены при измерениях на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Характеристики проведения теста в вашей лаборатории могут отличаться от приведенных ниже.

Линейность

Линейность соответствует концентрациям кальция 1-5 ммоль/л (4-20 мг/дл) для сыворотки и плазмы. Диапазон линейности соответствует значениям концентрации кальция 0-10 ммоль/л (0-40 мг/дл) для мочи.

Воспроизводимость

Следующие результаты получены при измерениях на AU2700 3-х сывороточных проб в течение 20-ти дней.

n = 88	Внутренняя		Общая	
	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)
Среднее значение, ммоль/л	0,01	0,57	0,02	0,88
1,01	0,02	0,65	0,03	0,98
2,02	0,02	0,48	0,04	0,94

Следующие результаты получены при измерениях на AU2700 3-х проб мочи в течение 20-ти дней.

n = 80	Внутренняя		Общая	
	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)	Станд. откл. (SD)	Коэф. вариации (CV %)
Среднее значение, ммоль/л	0,00	2,05	0,00	2,00
0,11	0,08	1,00	0,07	1,31
5,52	0,10	1,02	0,13	1,25

Чувствительность

Нижний предел чувствительности, установленный на анализаторе AU440 для сыворотки, составляет 0,01 ммоль/л.

Нижний предел чувствительности, установленный на анализаторе AU2700 для мочи, составляет 0,03 ммоль/л.

Это значение определяется как наименьшее измеренное значение кальция, отнесенное к нулю. Нижний предел чувствительности рассчитывается как абсолютное значение изменения гравиметрического отклонения при 20-ти измерениях измеренного кальция в пробе без постороннего вмешательства.

Корректный

При сравнении данных диагностического набора референс для определения кальция в сыворотке CBB6117 на анализаторе AU540 с диагностическим набором референс для определения кальция в сыворотке CBB6179 используются сыворотки идентичны. Результаты линейного регрессионного анализа следующие:

$y \geq 1,00x + 0,016$	$r = 0,999$	$n = 105$	Диапазон значений в пробе: 1,03-3,83 ммоль/л
------------------------	-------------	-----------	--

При сравнении данных диагностического набора референс для определения кальция в моче CBB6179 на анализаторе AU2700 с методом стандартной фотографии использовались МСН Нейтрона. Результаты линейного регрессионного анализа следующие:

$y = 1,00x + 0,038$	$r = 0,999$	$n = 84$	Диапазон значений в пробе: 0,50-6,02 ммоль/л
---------------------	-------------	----------	--

Влияющие факторы

В исследовании сыворотки, проводившемся с целью оценки чувствительности метода к различным влияющим факторам, получены следующие результаты:

Интерференция: Изменение менее 3% при значении биуретина до 40 мг/дл или до 854 ммоль/л

Гемоглобин: Изменение менее 3% при значении гемоглобина до 0,1 л/л

Билирубин: Изменение менее 10% при значении билирубина (Наномоль/л) до 1000 мкг/дл

Липиды: Изменение менее 10% при значении липидов до 4 ммоль/л

В исследовании мочи, проводившемся с целью оценки чувствительности метода к различным влияющим факторам, получены следующие результаты:

Аскорбиновая кислота: Изменение менее 3% при значении аскорбиновой кислоты до 50 мг/дл

Мочевина: Изменение менее 3% при значении мочевины до 4 ммоль/л

Полученную информацию по влияющим факторам можно найти в спецификации Young[®]

Судебная медицина

Будьте внимательны при интерпретации результатов измерения кальция у пациентов, применяемых в течение предшествующих 24 часов контрастные вещества, содержащие гадolinий, особенно, если у этих пациентов серьезные функции почек.^{8,10,11} В таких случаях исследование мочи

Мочевина: $y = 1,00x + 0,038$ $r = 0,999$ $n = 84$ Диапазон значений в пробе: 0,50-6,02 ммоль/л

ASU-117-01

2009-06

RU-1

следует проводить с помощью неинформатических методов, например, фотооптического или автоматизированного спектрофотометра. Если нет возможности выполнить неинформатическое измерение, необходимо брать пробы для анализа контрастных веществ.

Способы и программные методы

- а) Определение, установленное в методологии по устройству
- б) System Calibrator (версия 05300) (Urban Calibrator (версия 0003025))
- в) Значения установлены для версии СИ (модель/И). При работе с другим устройством для измерения следует установить их в.

Библиография

1. Thomas L, Coburn RA, In Thomas L, ed. Clinical laboratory diagnostics. Use and interpretation of clinical laboratory results. Philadelphia: WB Saunders Company, 1999:231-241.
2. Bessie PJ. Affinity and stoichiometry of calcium binding by albumin. *Am J Physiol* 1981;110:61-72.
3. Mochlyev V, Stone P. Fluorimetric determination of micro amounts of calcium with arsenazo III. *Anal Chim Acta* 1971;53:184-188.
4. Macdonald BC. Methods of analysis-calcium. In: Kaplan LA, ed. *Clinical chemistry: theory, analysis, and correlation*. St Louis: Mosby, 1989:500pp.
5. Shostak RW, Schmitt Y, Taylor G, Vossan M, Swales G, et al. Use of Arsenazo III in Diagnostic Laboratory Investigations and Stability of Serum, Plasma and Serum Samples. **WHO/LLAMBB** 1 Rev 2.26, 40pp.
6. NCCLS. Urinary and collection, transportation, and preservation of urine specimens, approved guideline, NCCLS Document GP16-A2, 2nd ed. Wayneville, NCCLS, 2001.
7. Patric PC, Cope JY, Smith JL. Reference information for the clinical laboratory. In: Burke CA, Adelman ER, eds. *Textbook of clinical chemistry*. Philadelphia: WB Saunders Company, 1998:1804pp.
8. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests. AACC, 3rd ed. AACC Press, 2000.
9. Lin J, Gao JF, Pao H, Chai A, Benbowen G, Rabin M, et al. Interference of magnesium interference trapping reagent agents with the serum calcium measurement technique using colorimetric methods. *J Pharm Biomed Analysis* 1998;21:831-843.
10. Norman PT, Fajana A, Shelton M. Interference of gadolinium injection (GADOLINOL) on the colorimetric determination of serum calcium. *Scand J Clin Lab Invest* 1996;56:421-425.
11. По координации специалистов компании Beckman Coulter Biomedical Ltd от компании Amersham Health, Общественные информационные ресурсы GADOLINOL, версия 1999.

CE

СНИМКИ В ПРОГРАММНЫХ ЛИСТАХ

2. Определенное количество
† Калибратор RF Leica (РФ латекс), код № ОДСС028
§ В качестве калибраторов с нулевыми значениями использовать физиологический раствор.
* Указывает установка для анализа MPE-Net

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Kozak AA, Swenson H. Anticardiolipin and specific serum proteins in the diagnosis of thrombotic disorders. *Ann Clin Biochem* 1999;38:505-518
2. Matsuji R, Oishi E. Anticardiolipin in rheumatoid arthritis. In: Thomas L, ed. *Clinical laboratory diagnostics: Use and assessment of clinical laboratory results*. Frankfurt/Main: T4-Books Verlagsgesellschaft, 1999;18-15.
3. Christ W, Herlitz H, Schmitt Y, Tölgel G, Wenzel H, Zentgraf B, et al. Use of Anticardiolipins in Diagnostic Laboratory Investigations and Stability of Blood, Plasma and Serum Samples. *WHOCC/LAB98-1 Rev 2-01 pp*
4. Anderson TO, Burdick MB, Nanda V, Kog P. International reference preparation of rheumatoid arthritis serum. *Bull WHO* 1979;42: 311-319.
5. *W-H-98-010*
6. Tietze HW, ed. *Clinical guide to laboratory tests*, 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1990.
7. Young D. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. *AACC, 3rd ed. AACCPress, 2000.*

CE



	C-РБ Latex® (CRP Latex)	
QSR61M	4 x 30 мЛ 4 x 30 мЛ	R1 R2
QSR9200	4 x 80 мЛ 4 x 80 мЛ	R1 R2

Назначение

Компактное оборудование С-реактивного белка (С-РБ) в сочетании с набором чашечек анализирует биохимическим методом на анализатора Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики в лаборатории с надлежащей чувствительностью следует использовать для выявления в сыворотке инфекции, воспалительных процессов и заболеваний, вызывающих воспалительный ответ, не следует использовать для выявления инфекционных заболеваний.

Клиническое значение

С-реактивный белок (С-РБ) является одним из наиболее чувствительных маркеров острого воспаления. С помощью набора реагентов с CRP Latex для определения С-РБ, возможно выявление его даже в очень низкой концентрации. Однако, в связи с низкой специфичностью С-РБ и значительной его концентрацией в период выздоровления, необходимо в лабораториях проводить и интерпретацию данных в учетом полученных результатов и уровня содержания в сыворотке других маркеров.

В зависимости от используемой программы определения (различные инструменты анализатора) возможны два интервала измерения.

1. Повышение и снижение чувствительности (0,2 - 40 мг/л) - 014; у ребенка. С-РБ имеет реакт. возраст в результате перенесенного инфекционного заболевания, травмы, инфекции, воспалительного процесса, хирургического вмешательства или опухолевой трансформации. Увеличение происходит в течение 24 ч. и в 48 часов, содержание С-РБ может превышать норму более чем в 2000 раз. Исходя из этого, что обнаружение значительного более низкого содержания С-РБ может указывать на риск серьезной инфекции или воспаления, не обнаруживает состояние заболевания.

Концентрация С-РБ ниже 3 мг/л, выявленная во время госпитализации, может указывать на положительный результат очередного обследования.

2. Повышение и снижение чувствительности (0,08 - 86 мг/л)

После родов, обычно содержание С-РБ очень высока (концентрация С-РБ около 0,12 мг/л). При обследовании новорожденных в послеродовом периоде, о содержании на уровне 10 мг/л или выше, вероятно, свидетельствует о серьезном заболевании. У детей с С-РБ, полученным за 24 часа и спустя 4-48 часов после рождения, указывает, что воспалительные инфекции отсутствуют. Такая оценка, полученная методом определения С-РБ является ценным инструментом для ранней диагностики инфекций новорожденных и новорожденных. Это исследование является также при наличии антибиотиков, однако уровень С-РБ не может служить основой для принятия решения о прекращении антибиотиков.

Принцип определения

При добавлении пробы к буферу R1 и R2, образующаяся латексная частица, С-РБ специфично взаимодействует с антигенами против человеческого С-РБ, формируя крупные частицы, с образованием перекрестных связей. Абсорбция рассеянного света пропорциональна концентрации С-РБ в пробе.

Состав

Компактный и универсальный анализатор	100 микротит
Гидравлический буфер	
Латексные частицы, покрытые антигенами в С-РБ чашечки	< 0,05% рас. лат.
Калибратор	< 0,1% рас. лат.

Общая информация

Соблюдайте все меры предосторожности, приведенные при работе с лабораторным реагентом.

Во избежание возможного заражения инфицирующей патогенной флорой следует немедленно прекратить работу при появлении любых признаков.

Утилизируйте обработанные реакционные материалы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и экологического контроля. Паспорт безопасности может быть предоставлен по запросу.

Анализаторы получены от ведущих мировых производителей, не содержат частей розжига сигарет, автомобильных двигателей и стальных обшивок, чужих металлов, тяжелых металлов, содержащих Ртуть, Вольфрам, барий, галлий, кадмий, никель и другие опасные вещества.

Подготовка реагента

Реагент R1 готов к использованию и может не быть непосредственно усиленным в анализатор. Реагент R2 перед использованием в анализаторе следует перемешать, перемешивая его 8-10 раз. Эту процедуру необходимо выполнять.

Хранение и стабильность

Неосвоенные реагенты, оставшиеся до даты, указанной на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия реагенты стабильны 60 дней при условии хранения в анализаторе.

Испытательный материал

Сыворотка, плазма (ЗПТА (Донор)). В сыворотке и плазме С-РБ стабильны в течение 2-х месяцев при температуре хранения 2-8°C и в течение 11 дней - при 15-25°C.

Подготовка анализа

См. Руководство Reagent Guide и соответствующую инструкцию для конкретного типа пробы.

Значение Data Check следует устанавливать при использовании программы с высокой чувствительностью при работе на анализаторах AU2700/AU6400. См. Установку оптических параметров анализатора.

Калибровка

Программа	Калибратор	Номер на мет.
1. Настройка чувствительности	CRP Latex Calibration Normal Set	08C0000
2. Проверка чувствительности	CRP Latex Calibration Hard Setting Set	08C0007

или

или

или



МОЧЕВАЯ КИСЛОТА
(URIC ACID)

OSR038	4 x 12 M7
OSR139	4 x 8 M7
OSR038	4 x 30 M7
OSR038	4 x 12,6 M7
OSR038	4 x 42,3 M7
OSR038	4 x 17,7 M7

Информация
Специализированный форум для компьютерного определения исковой массы в сырьевых, полнотелых и полуполнотелых бетонах. Форум создан АО "Томск-Дизайн-Сервис-Инжиниринг".

2.1. ЗАДАЧА НА ОБЪЕДИНЕНИЕ

[illegible][illegible]

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza wybranych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, które jest przedsiębiorstwem rodzinnym. W tym celu przeanalizowano dane z formularza KRS-01, który jest formularzem do zgłaszania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym celu przeanalizowano dane z formularza KRS-01, który jest formularzem do zgłaszania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym celu przeanalizowano dane z formularza KRS-01, który jest formularzem do zgłaszania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

СЕРИЯ «СОВЕТСКИЙ УНИВЕРСАЛ»

Многие вопросы под действием влияния окружающей среды, в частности, температуры, влажности, скорости ветра, могут изменяться. Поэтому при проектировании и строительстве необходимо учитывать все эти факторы.

СХЕМА РАБОТЫ



Contents

Содержание

Антигидратный буфер (pH 7,5)	42 мл/мл
ADP	0,15 мл/мл
ATP	0,30 мл/мл
Аминокислоты	2-5,0 мл/л (0,8 ммоль/л)
Глицерофосфат	2-0,25 мл/л (4,16 ммоль/л)
Уреаза	2-1,50 мл/л (20 ммоль/л)
Азотсодержащие	
Косметик	

Figure 1 Perfectly competitive example

Соблюдение всех мер предосторожности, принятых при работе с радиоактивными веществами. Во избежание возможности отравления радиоактивной жидкостью следует немедленно удалить из помещения человека, подвергнувшегося воздействию радиоактивной жидкости. Уменьшение радиоактивных излучений в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил.

Дополнительные информации приведены в Гидрометеобюро.
Полученные данные об обстановке в районе и в бассейне

Confidentiality & Security

PT 43: Могут быть пропущены доказательства или не рассмотрены в полной мере.

Поиск безопасности:
824, 528, 837. Не получайте комфорта и спокойствия. В случае поражения в гонимых немедленно переходите на бегущий интерпретировать слова и действия
и мысли. Поддерживайте и развивайте

NO 01

Discussion

THE **2012** **2013** **2014** **2015** **2016** **2017** **2018** **2019** **2020** **2021** **2022** **2023** **2024** **2025** **2026** **2027** **2028** **2029** **2030** **2031** **2032** **2033** **2034** **2035** **2036** **2037** **2038** **2039** **2040** **2041** **2042** **2043** **2044** **2045** **2046** **2047** **2048** **2049** **2050** **2051** **2052** **2053** **2054** **2055** **2056** **2057** **2058** **2059** **2060** **2061** **2062** **2063** **2064** **2065** **2066** **2067** **2068** **2069** **2070** **2071** **2072** **2073** **2074** **2075** **2076** **2077** **2078** **2079** **2080** **2081** **2082** **2083** **2084** **2085** **2086** **2087** **2088** **2089** **2090** **2091** **2092** **2093** **2094** **2095** **2096** **2097** **2098** **2099** **2100** **2101** **2102** **2103** **2104** **2105** **2106** **2107** **2108** **2109** **2110** **2111** **2112** **2113** **2114** **2115** **2116** **2117** **2118** **2119** **2120** **2121** **2122** **2123** **2124** **2125** **2126** **2127** **2128** **2129** **2130** **2131** **2132** **2133** **2134** **2135** **2136** **2137** **2138** **2139** **2140** **2141** **2142** **2143** **2144** **2145** **2146** **2147** **2148** **2149** **2150** **2151** **2152** **2153** **2154** **2155** **2156** **2157** **2158** **2159** **2160** **2161** **2162** **2163** **2164** **2165** **2166** **2167** **2168** **2169** **2170** **2171** **2172** **2173** **2174** **2175** **2176** **2177** **2178** **2179** **2180** **2181** **2182** **2183** **2184** **2185** **2186** **2187** **2188** **2189** **2190** **2191** **2192** **2193** **2194** **2195** **2196** **2197** **2198** **2199** **2200** **2201** **2202** **2203** **2204** **2205** **2206** **2207** **2208** **2209** **2210** **2211** **2212** **2213** **2214** **2215** **2216** **2217** **2218** **2219** **2220** **2221** **2222** **2223** **2224** **2225** **2226** **2227** **2228** **2229** **2230** **2231** **2232** **2233** **2234** **2235** **2236** **2237** **2238** **2239** **2240** **2241** **2242** **2243** **2244** **2245** **2246** **2247** **2248** **2249** **2250** **2251** **2252** **2253** **2254** **2255** **2256** **2257** **2258** **2259** **2260** **2261** **2262** **2263** **2264** **2265** **2266** **2267** **2268** **2269** **2270** **2271** **2272** **2273** **2274** **2275** **2276** **2277** **2278** **2279** **2280** **2281** **2282** **2283** **2284** **2285** **2286** **2287** **2288** **2289** **2290** **2291** **2292** **2293** **2294** **2295** **2296** **2297** **2298** **2299** **2300** **2301** **2302** **2303** **2304** **2305** **2306** **2307** **2308** **2309** **2310** **2311** **2312** **2313** **2314** **2315** **2316** **2317** **2318** **2319** **2320** **2321** **2322** **2323** **2324** **2325** **2326** **2327** **2328** **2329** **2330** **2331** **2332** **2333** **2334** **2335** **2336** **2337** **2338** **2339** **2340** **2341** **2342** **2343** **2344** **2345** **2346** **2347** **2348** **2349** **2350** **2351** **2352** **2353** **2354** **2355** **2356** **2357** **2358** **2359** **2360** **2361** **2362** **2363** **2364** **2365** **2366** **2367** **2368** **2369** **2370** **2371** **2372** **2373** **2374** **2375** **2376** **2377** **2378** **2379** **2380** **2381** **2382** **2383** **2384** **2385** **2386** **2387** **2388** **2389** **2390** **2391** **2392** **2393** **2394** **2395** **2396** **2397** **2398** **2399** **2400** **2401** **2402** **2403** **2404** **2405** **2406** **2407** **2408** **2409** **2410** **2411** **2412** **2413** **2414** **2415** **2416** **2417** **2418** **2419** **2420</**

[illegible]

Настоящие результаты соответствуют данным, указанным на этикетке, при температуре хранения 2-8°C. После вскрытия упаковки содержание 30 мл не должно отличаться более чем на 10%.

Accounting and Management

[illegible]

References

Can Pharmaceutical Research Cuttle its Competition? Why Not?

Introduction

[illegible]

Transparency creates openness, and it's a good thing for everyone.

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

1. Introduction

Новую систему защиты купюр (серия № 500-000) на СРС (серия) и на другие контрольные материалы из алюминия, углерода/бумаги и на другие материалы металлов Вестман Селле.

При изготовлении бумаги можно использовать материал Вестман Селле (серия № 307 и 308) или другие материалы металлов из алюминия, углерода/бумаги и на другие материалы металлов Вестман Селле.

Метод лабораторного выращивания культуры клеток позволяет исследовать влияние факторов окружающей среды и условий содержания и роста клеток животных. Получение в лабораторных условиях результатов может отличаться от результатов, полученных в естественных условиях жизни животного, поэтому при исследовании влияния факторов окружающей среды на развитие животных в условиях лабораторного выращивания животных, необходимо учитывать влияние факторов окружающей среды на развитие животных в естественных условиях жизни. Исследования влияния факторов окружающей среды на развитие животных в естественных условиях жизни, необходимо учитывать влияние факторов окружающей среды на развитие животных в естественных условиях жизни.

Figure 1

Fig. 1
Андреевская Бачман Едлане селен АУ агломерационно-поземног концентрирано-интегрирано и интегрално

Report on the

2013-2014 season in (26-7-2 weeks)

CONTACT INFORMATION
Karl R. Meyer
164.7-287.5 meyerkr@u.wisc.edu (24-hr fax)
164-2483 meyerkr@facstaff.wisc.edu (24-hr fax)
164-2483 meyerkr@facstaff.wisc.edu (24-hr fax)

Средством влияния могут выступать в зависимости от характера, силы, типа труда, формы и содержания деятельности в организации сбалансированной системой протекций и защитой работников следует обеспечить соблюдение референтных функций. При рассмотрении данных результатов следует рассмотреть также с данными источниками данных и другими функциональными характеристиками.

Содержание

Важнейшим из них является проблема формирования и развития личности ребенка в семье. Решению этой проблемы посвящено много исследований. В настоящее время в отечественной психологии преобладают две точки зрения на проблему формирования личности ребенка. Согласно первой из них, формирование личности ребенка происходит в процессе его взаимодействия с семьей. Согласно второй, формирование личности ребенка происходит в процессе его взаимодействия с обществом.

Transcript:

[illegible]

1. Introduction

[illegible]

[illegible]

Ученый Егор Ю-271, изобретатель изобретения	1914 г. р.	1997 г. у.	Ученый Ю-271 изобретатель изобретения
Ученый Ю-271 изобретатель изобретения	1914 г. р.	1997 г. у.	Ученый Ю-271 изобретатель изобретения

Важнейшим фактором, влияющим на развитие и функционирование предприятия, является наличие квалифицированных кадров. Поэтому одним из первоочередных направлений деятельности предприятия является подготовка кадров. Подготовка кадров осуществляется в нескольких направлениях: повышение квалификации, переподготовка, обучение. Подготовка кадров осуществляется в нескольких направлениях: повышение квалификации, переподготовка, обучение. Подготовка кадров осуществляется в нескольких направлениях: повышение квалификации, переподготовка, обучение.

Аннотация
Аннотация статьи

Спасибо за внимание к моему письму.
С уважением, Наталья Степановна
Вульф Салитер (тел. 06-3356).
Зачекиваю отклик от вас, а также
Зачекиваю отклик от вас, а также

[illegible]

33

1

[illegible]

History

 **ООО ЦИПМИ**  **INFO@CIRMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

