





022





3 «ВладМиВа» можно приобрести в интернет-магазине


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материала стоматологического
на основе стабилизированного раствора гипохлорита
для химического расширения и антисептической обработки кор
«БЕЛОДЕЗ»
по ТУ 21.20.24-092-45814830-2022

на основе стабилизированного раствора гипохлорита
корневых каналов зубов «Белодез» (далее по текст
ющих исполнений: «Белодез» жидкость 3 % и «Белод
лодес активатор» и/или «Белодес активатор плюс», и
уска)).

ачен для химического расширения и антисептической
применения квалифицированным медицинским
ия. Область применения – стоматология.
назначением материала «Белодез».
ая чувствительность пациента к компонентам материала
СВОЙСТВА








022
3 «ВладМиВа» можно приобрести в интернет-магазине

на основе стабилизированного раствора гипохлорита
корневых каналов зубов «Белодез» (далее по текс
ющих исполнений: «Белодез» жидкость 3 % и «Белод
дес активатор» и/или «Белодес активатор плюс», и
уска»).

*Инструкция по использованию флакона
/ *Instruction for use flask with ad



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

www
ВЛАДИВА

Материал стоматологический
на основе стабилизированного
раствора гипохлорита натрия
для химического расширения и
антисептической обработки
корневых каналов зубов «Белодез»

Белодез

Жидкость 3%

Жидкость	1 л
----------	-----


НАЗНАЧЕНИЕ: для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов. Область применения - стоматология. Для применения стабилизированный материал предназначен в условиях лечебно-профилактического учреждения.
Материал «Белодез» выпускается в следующих исполнениях:
- «Белодез» жидкость 3 % (или 5,2 %), включающая в состав «Белодез активатор» и «Белодез активатор плюс» (при необходимости).
- «Белодез» гель 3 %.

Хранить при t от +5°C до +25°C
Срок годности 2 года
Транспортировать при t
от -10°C до +30°C


ТУ 21.20.24-092-45814830-2022
РУ № ФСР 20/08/02586 от

Производитель: Акционерное общество
«Владивостокские химические заводы»
«Владивосток» (АО «ВХЗ «Владивосток»)
208023, Россия,
г. Владивосток,
ул. Студенческая, 19
72 4722 200-555

www.vladmiva.ru



47 01 2022 01
EXP. 2024 01



СОСТАВ: «Белодез» жидкость (3 % или 5,2 %) представляет собой стабилизированный водный раствор гипохлорита натрия с содержанием активного хлора 3 % (или 5,2 %). «Белодез» гель 3 % изготовлен на основе стабилизированного водного раствора гипохлорита натрия (содержание активного хлора 3 %) с добавлением гелеобразователя карбола, придающего раствору гелеобразную структуру.

«Белодез активатор» и «Белодез активатор плюс» представляют собой водные растворы поверхностно-активных веществ (ПАВ): амфотерного ПАВ (лицил имид) и катионного ПАВ (катионный эфирный комплекс), с добавлением диатриевой соли МТА и предназначены для повышения твердости иононаполненных жидкостей «Белодез» с целью повышения эффективности их действия. «Белодез активатор» усиливает действие и «Белодез» жидкости при ручной ирригации и при работе с прибором для ирригации, если необходимо значительно снизить концентрацию гипохлорита натрия в ирригационном растворе. «Белодез активатор плюс» добавляет в «Белодез» жидкость при ручной ирригации для улучшения проникающих свойств ирриганта без значительного понижения в нем концентрации гипохлорита натрия.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для антисептической обработки корневых каналов

«Белодез» жидкость 3 % набрать в шприц, установить игольчатую иглу и под небольшим давлением более глубокие выходы жидкости (за иглу) пропустить по каналу, затем промывать каналы дистиллированной водой.

Для антисептической обработки полости зуба перед пломбированием, внести небольшое количество «Белодез» жидкости (3 %) или «Белодез» геля (3 %) в полость зуба на 30-60 сек., затем смыть дистиллированной водой.

«Белодез» жидкость 5,2 % внести в канал на 10-30 сек (не более 60 сек) на второй туроригации, затем промывать канал дистиллированной водой. Для проведения ручной ирригации «Белодез» жидкостью 5,2 % не необходимо разбавить дистиллированной водой до оптимальной концентрации или использовать, как не разбавленный «Белодез активатор» в обычном соотношении 1:1.

Для антисептической обработки корневых каналов с применением активаторов

При ручной ирригации смешать «Белодез активатор» и «Белодез» жидкость 3 % (или 5,2 %) в соотношении 1:1, или «Белодез активатор плюс» и «Белодез» жидкость 3 % (или 5,2 %) в соотношении 1:2,5. Иными словами, приготовить 1 мл «Белодез активатор» и 1 мл «Белодез» жидкости 3 % или 2,5 мл «Белодез активатор» и 1 мл «Белодез» жидкости 3 %.

При работе с прибором для ирригации использовать «Белодез активатор» и «Белодез» жидкость 3 %, которые составят ирригационный прибор на ирригационный шприц в соотношении 1:1 при подаче в корневую канал.

Для расширения каналов и давления поверхности стенок канала

Полностью обработать каналы «Белодез» жидкостью (3 % или 5,2 %) (при необходимости с активатором) и материалом на основе МТА для химического расширения каналов (в зависимости от их изгиба).

Перед использованием ступенчатых или металлических штифтов при постоянном ретроградном канале рекомендуется обработать их «Белодез» жидкостью (3,2 %), промыть для стабилизации воды и просушить.

Внимание! При попадании материала «Белодез» на слизистые оболочки промывать водой. При случайном попадании материала на кожу промывать водой. При попадании материала на слизистые оболочки промывать водой. При попадании материала на слизистые оболочки промывать водой.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Полностью обработать каналы «Белодез» жидкостью (3 % или 5,2 %) (при необходимости с активатором) и материалом на основе МТА для химического расширения каналов (в зависимости от их изгиба).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Полностью обработать каналы «Белодез» жидкостью (3 % или 5,2 %) (при необходимости с активатором) и материалом на основе МТА для химического расширения каналов (в зависимости от их изгиба).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Полностью обработать каналы «Белодез» жидкостью (3 % или 5,2 %) (при необходимости с активатором) и материалом на основе МТА для химического расширения каналов (в зависимости от их изгиба).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Полностью обработать каналы «Белодез» жидкостью (3 % или 5,2 %) (при необходимости с активатором) и материалом на основе МТА для химического расширения каналов (в зависимости от их изгиба).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Полностью обработать каналы «Белодез» жидкостью (3 % или 5,2 %) (при необходимости с активатором) и материалом на основе МТА для химического расширения каналов (в зависимости от их изгиба).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Полностью обработать каналы «Белодез» жидкостью (3 % или 5,2 %) (при необходимости с активатором) и материалом на основе МТА для химического расширения каналов (в зависимости от их изгиба).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Полностью обработать каналы «Белодез» жидкостью (3 % или 5,2 %) (при необходимости с активатором) и материалом на основе МТА для химического расширения каналов (в зависимости от их изгиба).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Полностью обработать каналы «Белодез» жидкостью (3 % или 5,2 %) (при необходимости с активатором) и материалом на основе МТА для химического расширения каналов (в зависимости от их изгиба).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Полностью обработать каналы «Белодез» жидкостью (3 % или 5,2 %) (при необходимости с активатором) и материалом на основе МТА для химического расширения каналов (в зависимости от их изгиба).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Полностью обработать каналы «Белодез» жидкостью (3 % или 5,2 %) (при необходимости с активатором) и материалом на основе МТА для химического расширения каналов (в зависимости от их изгиба).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Полностью обработать каналы «Белодез» жидкостью (3 % или 5,2 %) (при необходимости с активатором) и материалом на основе МТА для химического расширения каналов (в зависимости от их изгиба).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Полностью обработать каналы «Белодез» жидкостью (3 % или 5,2 %) (при необходимости с активатором) и материалом на основе МТА для химического расширения каналов (в зависимости от их изгиба).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Полностью обработать каналы «Белодез» жидкостью (3 % или 5,2 %) (при необходимости с активатором) и материалом на основе МТА для химического расширения каналов (в зависимости от их изгиба).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Полностью обработать каналы «Белодез» жидкостью (3 % или 5,2 %) (при необходимости с активатором) и материалом на основе МТА для химического расширения каналов (в зависимости от их изгиба).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Полностью обработать каналы «Белодез» жидкостью (3 % или 5,2 %) (при необходимости с активатором) и материалом на основе МТА для химического расширения каналов (в зависимости от их изгиба).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



Полностью обработать каналы «Белодез» жидкостью (3 % или 5,2 %) (при необходимости с активатором) и материалом на основе МТА для химического расширения каналов (в зависимости от их изгиба).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Полностью обработать каналы «Белодез» жидкостью (3 % или 5,2 %) (при необходимости с активатором) и материалом на основе МТА для химического расширения каналов (в зависимости от их изгиба).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Полностью обработать каналы «Белодез» жидкостью (3 % или 5,2 %) (при необходимости с активатором) и материалом на основе МТА для химического расширения каналов (в зависимости от их изгиба).



022

03 «ВладМиВа» можно приобрести в интернет-магазине

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материала стоматологического
на основе стабилизированного раствора гипохлорита
для химического расширения и антисептической обработки кор-
невых каналов зубов «БЕЛОДЕЗ»




по ТУ 21.20.24-092-45814830-2022

на основе стабилизированного раствора гипохлорита
корневых каналов зубов «Белодез» (далее по текст
ующих исполнений: «Белодез» жидкость 3 % и «Белод
дез активатор» и/или «Белодез активатор плюс», и
уска»).

ачен для химического расширения и антисептической
применения квалифицированным медицинским
я. Область применения – стоматология.
азначением материала «Белодез».

ая чувствительность пациента к компонентам материала
СВОЙСТВА





*Инструкция по использованию флакона / *Instruction for use flask with adapter

ВНИМАНИЕ: В комплектность флаконов 100 мл входит из вспененного полиэтилена, фиксирующее кольцо с крышкой (см. Рис. 1).





ATTENTION: The completeness of 100 ml flask includes polyethylene foam, fixing ring and adapter for syringe.

ВНИМАНИЕ: Цвет комплектующих может отличаться от рисунка. / **ATTENTION:** The color of the accessories may differ from the picture.

Варианты использования флаконов: / Flasks usage options:

Вариант 1. Проколоть иглой транспортную подушку необходимого количества раствора. (см. Рис. 2) / **Option 1.** Pierce the transport pad with needle through the needle into the syringe. (see Fig. 2)

Рис. 1 / Fig. 1



Материал стоматологический
на основе стабилизированного
раствора гипохлорита натрия
для химического расщирения и
антисептической обработки
корневых каналов зубов «Белодез»

Жидкость 5.2%

НАЗНАЧЕНИЕ. Для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов. Область применения – стоматология. Для применения культивированных мезенхимных стволовых клеток в условиях лаборатории профилактического учреждения. Материал «Билодент» выпускается в следующей упаковке:


- «Билодент» – жидкость, 3 г (или 5,2 г), входящая в состав «Билодент активатора» / «Билодент активатор плюс» (необязательный).
- «Билодент гель», 3 г.

Хранить при t от +5°C до +25°C
Срок годности 2 года
Транспортировать при t
от -10°C до +30°C

TY 21.20.24-092-45814830-2022
PY № ФСР 2008/02586 от

Производитель: Акционерное общество
«Опытно-экспериментальный завод
«ВладМиВа»» (АО «ОЭЗ «ВладМиВа»»)
308023, Россия
г. Белгород
ул. Студенческая, 19
т. 4722-200-555

www.vladmiva.ru



47 01 2022 01
EXP. 2024 01

«Белодра» имеет структуру:

«Белодра» активаторы и «Белодра» активатор волос представляют собой водные растворы лекарственных активных веществ (ПАВ) амфотерного ПАВ (оксид диметил) и катионного ПАВ (тетраметил аммоний хлорид оксидирующий), с добавлением глицерина, этилового спирта, ДТА и преднизолона. «Белодра» активатор волос представляет собой водные растворы ПАВ с целью повышения эффективности действия, «Белодра» активатор волос рекомендуется добавлять к «Белодра» мази при ручной эпиляции и при работе с воском. «Белодра» активатор волос, если необходимо значительно снижает концентрацию глицерина натрия и вкорректированный раствор. «Белодра» активатор волос - добавляет к «Белодра» мази при ручной эпиляции для улучшения проникающих свойств волоса без анализа глицерина в нем. Концентрация глицерина натрия.

Для описательской обработки исходных данных

«Беладет» жидкость 3 % набрать в шприц, установить эндодонтическую иглу и под небольшим давлением (для избежания вытока жидкости за апекс) бросить каждый канал, затем промыть каналы дистальными порциями жидкости.

Для антисептической обработки полости зуба перед пломбированием внести небольшое количество «Белодеза» жидкости (3 %) или «Белодеза» геля (3 %) в полость зуба на 30-60 сек, затем смыть физиологическим раствором.

«Беллоэз» жидкость 5,2 % внести в канал на 10-30 сек (не более 60 сек) на ватный турунд, затем промыть канал дистиллированной водой. Для проведения ручной ирригации «Беллоэз» жидкостью 5,2 %.

5,2 % ее необходимо разбавить дистиллированной водой до необходимой концентрации или использовать в виде раствора.

Для ферментативской обработки концевых конзол с пониженным активатором

При ручной иригации смешать «Белорет» активатор» и «Белорет» жидкость 3 % (или 5,2 %) в соотношении 1:1.

объемном соотношении 1:1, или «Белодез» активатор (глюкс) и «Белодез» жидкость 3 % (или 5,2%) в объемном соотношении 1:25. Дозировка: 1 мл активатора + 25 мл жидкости (или 1 мл активатора + 1 мл жидкости).

При работе с прибором для ирригации использовать «Белодент» активатор и «Белодент» жидкость.

1 X, которые согласно инструкции прибора по эксплуатации (медавируются в соотношении 17 г/г) плодятся в крошечные комки.

Для расширения ячеек и увеличения производительности моделирования

После очередного обращения каналы «белого» жидкостью (3 % или 5,2%) (при необходимости с активатором).

актавтурими) и материалом на основе ЗДТА для химического расширения калов (•З-доЖИ 10 24, •Эндельс•)

Перед установкой гуттаперчевых или металлических штифтов при постоянном пломбировании

канала рекомендуется обработать их «Белодез» жидкостью (5,2%), промыть дистиллированной водой и просушить.

Внимание! При попадании материала «Бепантен» на слизистые оболочки промывать водой. При

Случайной экстрактом материала за верхушку корня зуба активировать сорбционные свойства

качала, промывать его физиологическим раствором. При необходимости назначать дальнейшее лечение.

УТМ-Литмобил-01

УПАКОВКА: как отходы класса А по СанПиН 2.1.3684-21
ФОРМА ВЫПУСКА

1. «Белодоза» жидкость 3 % (или 5,2 %), в составе

Флакон с жидкостью «Белосор» (30 мл/100 мкг/250 мл /500 мкг/л) - 1 шт.

инструкция по применению	- 1 шт.
адаптер (по необходимости)	- 1 шт.

Инструкция по использованию флакона с адралером (при необходимости) - 1 шт.

«Белоез затвора», при необходимости в составе

Флакон с белосодержателем (30мл/100мл/250мл/500мл/1л) - 1 шт.

элементы на «белом» активаторе	1 шт.
адаптер (при необходимости)	1 шт.

Инструкция по использованию Фандока с аддитивом (при необходимости) 1 шт.

*Белоез активатор тиски, при необходимости, в составе
шпатель с «Белоез активатором тиски» - 0,001/0,001/0,001



— 1 шт. «Белоснежка» активатор плоский	5000/1000/20000	1 шт.
— 1 шт. «Белоснежка» активатор плоский	5000/1000/20000	1 шт.

2. «Белодуга» галь. 3 м, в составе
песчаной с галью «Белодуга» 3 м (2, 3)

WITTE (K. Schmitt)

инструкция по применению

Report No. 10-1000






Этикетка	
понижения поверхностного натяжения эндодонтических ирригантов «Белодез активатор» и «Белодез активатор плюс» предназначены для понижения поверхностного натяжения раствора гипохлорита натрия для обработки каналов зубов «Белодез», регистрационное удостоверение № 74722.200-555 Хранить в темном месте при t от +5°C до +25°C Срок годности 3 года	
Показателя	Белодез активатор

***Инструкция по использованию флакона**
/ *Instruction for use flask with ad

ВНИМАНИЕ: В комплектность флаконов 1 из вспененного полиэтилена, фиксирующее ко с крышкой (см. Рис. 1).
/ ATTENTION: The completeness of 100 ml a of polyethylene foam, fixing ring and adapter for s

ВНИМАНИЕ: Цвет комплектующих может о
/ ATTENTION: The color of the accessories m

Варианты использования флаконов: / F
Вариант 1. Проколоть иглой транспортную необходимое количество раствора. (см. Рис. 2)
/ Option 1. Pierce the transport pad with need through the needle into the syringe. (see Fig. 2)



***Инструкция по использованию флакона**
/ *Instruction for use flask with ad

ВНИМАНИЕ: В комплектность флаконов 1 из вспененного полиэтилена, фиксирующее кольцо с крышкой (см. Рис. 1).
/ **ATTENTION:** The completeness of 100 ml a of polyethylene foam, fixing ring and adapter for s

ВНИМАНИЕ: Цвет комплектующих может о
/ **ATTENTION:** The color of the accessories m




Варианты использования флаконов: / F

Вариант 1. Проколоть иглой транспортную
необходимое количество раствора. (см. Рис. 2)

Option 1. Pierce the transport pad with need
through the needle into the syringe. (see Fig. 2)



Рис. 1 / Fig. 1



Этикетка

понижения поверхностного натяжения эндодонтических
«Белодез активатор» и «Белодез активатор плюс»
ватор плюс» предназначены для понижения поверхностно
жкость 3% или «Белодез» жидкость 5,2 %) по ТУ 21.20.24-
билизированного раствора гипохлорита натрия для
каналов зубов «Белодез», регистрационное удостоверение
КИ
стного натяжения эндодонтических ирригантов «Белодез»
ыпускаются по ТУ 21.20.24-092-45814830-2022.

показателя

Белодез
активатор

ВЛАДИВА

Материал стоматологический
на основе стабилизированного
раствора гипохлорита натрия
для химического расширения и
антисептической обработки
корневых каналов зубов «Белодез»

Белодез активатор

Раствор для понижения поверхностного
натяжения материала «Белодез»


Жидкость 500 мл

Хранить при 1 от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года
Транспортировать при
1 от -10°C до +30°C



TU 21.20.24-092-45814830-2022
РФ № ФСР 2008/02586 от

Производитель: Акционерное общество
«Специально-экспериментальный завод
«ВладМива» (АО «ОЗЗ «ВладМива»)
308023, Россия
г. Белгород
ул. Студенческая, 19
Т: +7 (22) 200-555

www.vladmiva.ru



47 01 2022 01
EXP. 2025 01



НАЗНАЧЕНИЕ: «Белодез активатор» предназначен для
понижения поверхностного натяжения материала
«Белодез» с целью увеличения эффективности его
применения.

СОСТАВ: «Белодез активатор» представляет собой
водный раствор поверхностно-активных веществ (ПАВ):
амфотерного и катионных ПАВ с добавлением
динатриевой соли ЭДТА. Применяется с материалом
«Белодез» (3 % и 5,2 % жидкости) в соответствии с
инструкцией по применению материала «Белодез».

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: «Белодез активатор» смешать
с материалом «Белодез» жидкость (3 %/ 5,2 %) в объемном
соотношении 1:1. Ирригацию проводить с помощью
шприца и эндодонтической иглы согласно
общепринятому протоколу.

При работе с прибором для ирригации корневых
каналов специальные емкости с «Белодез активатором» и
материалом «Белодез» жидкость 3 % установить в
держатель на блоке управления. Подачу раствора
регулировать в соответствии с Инструкцией по
эксплуатации прибора.

УТИЛИЗИРОВАТЬ как отходы класса А по СанПиН
2.1.3684-21

ФОРМА ВЫПУСКА:

1. «Белодез активатор», в составе:
- | | |
|--|-------|
| - флакон с «Белодез активатором» (30 мл/ 100 мл / | |
| 250 мл/ 500 мл/ 1л) | 1 шт. |
| - этикетка | 1 шт. |
| - адаптер (при необходимости) | 1 шт. |
| - инструкция по использованию флакона с адаптером (при
необходимости) | 1 шт. |

2. «Белодез активатор плюс», в составе:
- | | |
|---|-------|
| - шприц с «Белодез активатором плюс» (5 мл/ 10 мл / | |
| 20 мл) | 1 шт. |
| - этикетка | 1 шт. |

Версия № 01.0001

ВЛАДМИВА

Материал стоматологический
на основе стабилизированного
раствора гипохлорита натрия
для химического расширения и
антисептической обработки
корневых каналов зубов «Белодез»

Белодез активатор

Раствор для понижения поверхностного
натяжения материала «Белодез»


Жидкость	1 л
----------	-----

Хранить при t от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года
Транспортировать при
t от -10°C до +30°C


TU 21.20.24-092-45814830-2022
РУ № ФСР 2008/02586 от

Производитель: Акционерное общество
«ВладМиВа» (АО «ВЛДМВ») (АО «ВЛДМВ»)
706023, Россия
г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru



47 01 2022 01
EXP. 2025 01



НАЗНАЧЕНИЕ: «Белодез активатор» предназначен для
понижения поверхностного натяжения материала
«Белодез» с целью увеличения эффективности его
применения.

СОСТАВ: «Белодез активатор» представляет собой
водный раствор поверхностно-активных веществ (ПАВ):
амфотерного и катионных ПАВ с добавлением
динатриевой соли ЭДТА. Применяется с материалом
«Белодез» (3 % и 5,2 % жидкости) в соответствии с
инструкцией по применению материала «Белодез».

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: «Белодез активатор» смешать
с материалом «Белодез» жидкость (3 %/5,2 %) в объемном
соотношении 1:1. Ирригацию проводить с помощью
шприца и эндодонтической иглы согласно
общепринятому протоколу.

При работе с прибором для ирригации корневых
каналов специальные емкости с «Белодез активатором» и
материалом «Белодез» жидкость 3 % установить в
держатель на блоке управления. Подачу растворов
регулировать в соответствии с Инструкцией по
эксплуатации прибора.

УТИЛИЗИРОВАТЬ как отходы класса А по СанПин
2.1.3684-21

ФОРМА ВЫПУСКА:

1. «Белодез активатор», в составе:
- флакон с «Белодез активатором» (30 мл/ 100 мл /
250 мл/ 500 мл/ 1л) 1 шт.;
 - этикетка 1 шт.;
 - адаптер (при необходимости) 1 шт.;
 - инструкция по использованию флакона с адаптером (при
необходимости) 1 шт.;
2. «Белодез активатор плюс», в составе:
- шприц с «Белодез активатором плюс» (5 мл/ 10 мл/
20 мл) 1 шт.;
 - этикетка 1 шт.;

Версия № 01/2022

Производитель:
АО «ОЗ «ВладМиВа»
308023, Россия
г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200 555
www.vladmiva.ru

Хранить при t от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года

TU 21.20.24-092-45814830-2022
PV № ФСР 2008/02586 от



Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия
для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов «Белодез»

Белодез® активатор ПЛЮС

Раствор для понижения поверхностного натяжения материала «Белодез»

Жидкость	20 мл	Эндодонтические материалы
----------	-------	---------------------------

Белодез активатор плюс

Раствор для понижения
поверхностного натяжения



Жидкость 20 мл

Этикетка

понижения поверхностного натяжения эндодонтических
«Белодез активатор» и «Белодез активатор плюс»
«Белодез активатор плюс» предназначены для понижения поверхностного
натяжения 3% или «Белодез» жидкость 5,2 %) по ТУ 21.20.24-
стабилизированного раствора гипохлорита натрия для
каналов зубов «Белодез», регистрационное удостоверение
КИ
стного натяжения эндодонтических ирригантов «Белодез»
выпускаются по ТУ 21.20.24-092-45814830-2022.
активаторов

показателя

Белодез
активатор





Этикетка

понижения поверхностного натяжения эндодонтических
«Белодез активатор» и «Белодез активатор плюс»
«Белодез активатор плюс» предназначены для понижения поверхностного
натяжения 3% или «Белодез» жидкость 5,2 %) по ТУ 21.20.24-
стабилизированного раствора гипохлорита натрия для
каналов зубов «Белодез», регистрационное удостоверение
КИ

поверхностного натяжения эндодонтических ирригантов «Белодез»
выпускаются по ТУ 21.20.24-092-45814830-2022.
активаторов

показателя	Но Белодез активатор
------------	----------------------------




Этикетка



понижения поверхностного натяжения эндодонтических
 «Белодез активатор» и «Белодез активатор плюс»
 ватор плюс» предназначены для понижения поверхностно
 жкость 3% или «Белодез» жидкость 5,2 %) по ТУ 21.20.24-
 билизованного раствора гипохлорита натрия для
 каналов зубов «Белодез», регистрационное удостоверение
 СИ
 стного натяжения эндодонтических ирригаторов «Белодез»
 выпускаются по ТУ 21.20.24-092-45814830-2022.
 ваторов



показателя	Но
	Белодез активатор











022
3 «ВладМиВа» можно приобрести в интернет-магазине

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материала стоматологического
на основе стабилизированного раствора гипохлорита
для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов
«БЕЛОДЕЗ»
по ТУ 21.20.24-092-45814830-2022






на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия для обработки корневых каналов зубов «Белодез» (далее по тексту – «Белодез»).
Существуют следующие исполнения: «Белодез» жидкость 3 % и «Белодез активатор» и/или «Белодез активатор плюс», и «Белодез активатор плюс» (далее по тексту – «Белодез активатор плюс»).

Используется для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов. Применение квалифицированным медицинским персоналом. Область применения – стоматология. Назначением материала «Белодез».

При повышенной чувствительности пациента к компонентам материала «Белодез».

СВОЙСТВА





Белодез



Dental material based
on stabilized solution of
sodium hypochlorite used
for chemical expansion and
antiseptic treatment of tooth
root canals «Belodez»



Belodez

Liquid 3 %

Liquid 30 ml
Endodontic
materials


VLADMIVA

Manufacturer:
JSC "VladMiVa"
Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Store in a dark place
at t of +5°C to +25°C

2 years shelf-life



Материал
стоматологический на
основе стабилизированного
раствора гипохлорита натрия
для химического расширения и
антисептической обработки
корневых каналов зубов «Белодез»



Белодез®

Жидкость 3 %

Жидкость 30 мл
Эндодонтические
материалы

ВЛАДМИВА

Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия
г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Хранить в темном месте
при t от +5°C до +25°C

Срок годности 2 года

TU 21.20.24-092-45814830-2022
РУ № ФСР 2008/02586
от



Версия/Version: № , 01.2022



4 607158 775093

Белодез



Dental material based on stabilized solution of sodium hypochlorite used for chemical expansion and antiseptic treatment of tooth root canals «Belodez»



VLADMIVA

Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов «Белодез»



ВЛАДМИВА

Belodez
Liquid 3 %

Manufacturer:
JSC "VladMiva"
Experimental Plant

Studenetskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555
www.vladmiva.ru

Белодез®
Жидкость 3 %

Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМива»
308023, Россия
г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555
www.vladmiva.ru

Store in a dark place
at t of +5°C to +25°C
2 years shelf-life

Хранить в темном месте
при t от +5°C до +25°C
Срок годности 2 года

Liquid 100 ml
Endodontic
materials



Жидкость 100 мл
Эндодонтические
материалы



Версия/Version: № , 01.2022

Белодез



Dental material based on stabilized solution of sodium hypochlorite used for chemical expansion and antisepsis treatment of tooth root canals «Belodez»




VLADMIVA

Belodez
Liquid 3 %

Manufacturer:
JSC "VladMiVa"
Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Store in a dark place
at t of +5°C to +25°C
2 years shelf-life



Liquid 250 ml
Endodontic materials



Материал, основанный на стабилизированном растворе гипохлорита натрия для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов «Белодез»



ВЛАДМИВА

Белодез®
Жидкость 3 %

Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия
г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Хранить в темном месте
при t от +5°C до +25°C
Срок годности 2 года

TU 21.20.24-092-45814830-2022
РУ № ФСР 2008/02586
от



Жидкость 250 мл
Эндодонтические материалы

Версия/Version: №, 01.2022

ВЛАДИВА

Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов «Белодез»

Белодез®

Жидкость 3 %

Жидкость 500 мл

Хранить при t от -5°C до +25°C
Срок годности 2 года
Транспортировать при
t от -10°C до +30°C

TU 21.20.24-092-45814830-2022
РУ № ФСР 2008/02586 от

Производитель: Акционерное общество
«Опытный экспериментальный завод
«ВладМиВа» (АО «ОЭЗ «ВладМиВа»)
308023, Россия
г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200 555

www.vladmiva.ru



НАЗНАЧЕНИЕ. Для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов. Область применения – стоматология. Для применения квалифицированным медицинским персоналом в условиях лечебно-профилактического учреждения.

Материал «Белодез» выпускается следующих исполнений:

«Белодез» жидкость 3 % (или 5,2 %) включенная в состав «Белодез активатор» и/или «Белодез активатор плюс» (при необходимости);

«Белодез» гель 3 %;

СОСТАВ: «Белодез» жидкость (3 % или 5,2 %) представляет собой стабилизированный водный раствор гипохлорита натрия с содержанием активного хлора 3 % (или 5,2 %) «Белодез» гель 3 % изготовлен на основе стабилизированного водного раствора гипохлорита натрия (содержание активного хлора 3 %) с добавлением гелеобразователя «карбоплаз», придающего раствору гелеобразную структуру. «Белодез активатор» и «Белодез активатор плюс» представляют собой водные растворы поверхностно-активных веществ (ПАВ) амфотерного ПАВ (оксида экина) и катионных ПАВ (четвертичных аммониевых соединений), с добавлением диоксидной соли ЭДТА и предназначены для понижения поверхностного натяжения жидкостей «Белодез» с целью повышения эффективности их действия. «Белодез активатор» рекомендуется добавлять к «Белодез» жидкости при ручной ирригации и при работе с прибором для ирригации, если необходимо значительное снижение концентрации гипохлорита натрия в ирригационном растворе; «Белодез активатор плюс» - добавлять к «Белодез» жидкости при ручной ирригации для улучшения проникающих свойств ирриганта без значительного понижения в нем концентрации гипохлорита натрия.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для антисептической обработки корневых каналов

«Белодез» жидкость 3 % набрать в шприц, установить эндодонтическую иглу и под небольшим давлением (для избегания выхода жидкости за апекс) оросить каждый канал, затем промыть каналы дистиллированной водой.

Для антисептической обработки полости зуба перед пломбированием внести небольшое количество «Белодез» жидкости (3 %) или «Белодез» геля (3 %) в полость зуба на 30-60 сек, затем смыть дистиллированной водой.

«Белодез» жидкость 5,2 % внести в канал на 10-30 сек (не более 60 сек) на ватной турунде, затем промыть канал дистиллированной водой. Для проведения ручной ирригации «Белодез» жидкостью 5,2 % не обязательно разбавить дистиллированной водой до необходимой концентрации или использовать после смешивания с «Белодез активатором» в объемном соотношении 1:1.

Для антисептической обработки корневых каналов с применением активаторов

При ручной ирригации смешать «Белодез активатор» и «Белодез» жидкость 3 % (или 5,2 %) в объемном соотношении 1:1, или «Белодез активатор плюс» и «Белодез» жидкость 3 % (или 5,2%) в объемном соотношении 1:25. Ирригацию проводить с помощью шприца и эндодонтической иглы.

При работе с прибором для ирригации использовать «Белодез активатор» и «Белодез» жидкость 3 %, которые согласно инструкции прибора по эксплуатации смешиваются в соотношении 1:1 при подаче в корневой канал.

Для расширения каналов и удаления поверхностно-смазанного слоя

Попеременно обрабатывать каналы «Белодез» жидкостью (3 % или 5,2%) (при необходимости с активатором) и материалом на основе ЭДТА или химического расширения каналов («ЭндаЖи №2», «Эндоголь»).

Перед установкой гуттаперчевых или металлических штифтов при постоянном пломбировании канала рекомендуется обработать их «Белодез» жидкостью (5,2 %), промыть дистиллированной водой и просушить.

Внимание! При попадании материала «Белодез» на слизистые оболочки промывать водой. При случайной экстремальной ситуации материала за верхушку корня зуба аспирировать содержимое корневого канала, промыть его физиологическим раствором. При необходимости назначить дальнейшее лечение.

Противопоказания. Повышенная чувствительность пациента к компонентам материала.

УТИЛИЗИРОВАТЬ как отходы класса А по СанПиН 2.1.3684-21

ФОРМА ВЫПУСКА:

1. «Белодез» жидкость 3 % (или 5,2 %), в составе:

- флакон с жидкостью «Белодез» (30 мл/100 мл/250 мл/500 мл/1 л)

- инструкция по применению

- адаптер (при необходимости)

- инструкция по использованию флакона с адаптером (при необходимости)

- крышка-капельница (при необходимости)

- «Белодез активатор», при необходимости, в составе:

- флакон с «Белодез активатором» (30 мл/100 мл/250 мл/500 мл/1 л)

- этикетка на «Белодез активатор»

- адаптер (при необходимости)

- инструкция по использованию флакона с адаптером (при необходимости)

- «Белодез активатор плюс», при необходимости, в составе:

- шприц с «Белодез активатором плюс» (5 мл/10 мл/20 мл)

- этикетка на «Белодез активатор плюс»

2. «Белодез» гель 3 %, в составе:

- шприц с гелем «Белодез» 3 % (3 г)

- иглы (канюли) (при необходимости)

- инструкция по применению

- 1 шт.

- 1 шт.

- 1 шт.

- 1 шт.

- 1 шт.

- 1 шт.

- 1 шт.

- 1 шт.

- 1 шт.

- 1 шт.

- 1 шт.

- 1 шт.

- 1 шт.

- 1 шт.

- 3-5 шт.

- 1 шт.

ВЛАДИВА

Материал стоматологический
на основе стабилизированного
раствора гипохлорита натрия
для химического расширения и
антисептической обработки
корневых каналов зубов «Белодез»

Белодез

Жидкость 3 %

Жидкость	1 л
----------	-----

НАЗНАЧЕНИЕ: Для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов. Область применения - стоматология. Для применения квалифицированным медицинским персоналом в условиях лечебно-профилактического учреждения. Материал «Белодез» выпускается с следующим содержанием:
«Белодез» жидкость 3 % (или 5,2 %), включенная в состав «Белодез активатор» и/или «Белодез активатор плюс» (при необходимости), «Белодез» гель 3 %.


Хранить при t от +5°C до +25°C
Срок годности 2 года
Транспортировать при
t от -10°C до +30°C

TU 21.20.24-092-45814830-2022
РФ № ФСР 2008/02586 от

Производитель: Акционерное общество
«Опыт» - экспериментальный завод
«ВладМиВа» (АО «ОЗ «ВладМиВа»)
308023, Россия
г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200 555

www.vladmiva.ru

Packer LOT



СОСТАВ: «Белодез» жидкость 3 % или 5,2 % представляет собой стабилизированный водный раствор гипохлорита натрия с содержанием активного хлора 3 % (или 5,2 %). «Белодез» гель 3 % изготовлен на основе стабилизированного водного раствора гипохлорита натрия (содержание активного хлора 3 %) с добавлением гелеобразователя - карбопола, придающего раствору гелеобразную структуру.

«Белодез активатор» и «Белодез активатор плюс» представляют собой водные растворы поверхностно-активных веществ (ПАВ): амфотерного ПАВ (оксид амина) и катионных ПАВ (четвертичных аммониевых соединений), с добавлением динатриевой соли ЭДТА и предназначены для повышения поверхностного натяжения жидкостей «Белодез» с целью повышения эффективности их действия. «Белодез активатор» рекомендуется добавлять к «Белодез» жидкости при ручной ирригации и при работе с прибором для ирригации, если необходимо значительное снижение концентрации гипохлорита натрия в ирригационном растворе; «Белодез активатор плюс» - добавляет к «Белодез» жидкости при ручной ирригации для улучшения проникающих свойств ирриганта без значительного понижения в нем концентрации гипохлорита натрия.

ПОСКОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для антисептической обработки корневых каналов

«Белодез» жидкость 3 % набрать в шприц, установить эндодонтическую иглу и под небольшим давлением (для избежания выхода жидкости за апекс) оросить каждый канал, затем промыть каналы дистиллированной водой.

Для антисептической обработки полости зуба перед планированием внести небольшое количество «Белодез» жидкости (3 %) или «Белодез» геля (3 %) в полость зуба на 30-60 сек, затем смыть дистиллированной водой.

«Белодез» жидкость 5,2 % ввести в канал на 10-30 сек (не более 60 сек) на ватной турунде, затем промыть канал дистиллированной водой. Для проведения ручной ирригации «Белодез» жидкостью 5,2 % не необходимо разбавить дистиллированной водой до необходимой концентрации или использовать насос смещения с «Белодез активатором» в обычном соотношении 1:1.

Для антисептической обработки корневых каналов с применением активаторов

При ручной ирригации смешать «Белодез активатор» и «Белодез» жидкость 3 % (или 5,2 %) в обычном соотношении 1:1, или «Белодез активатор плюс» и «Белодез» жидкость 3 % (или 5,2 %) в обычном соотношении 1:25. Ирригацию проводить с помощью шприца и эндодонтической иглы. При работе с прибором для ирригации использовать «Белодез активатор» и «Белодез» жидкость 3 %, которые согласно инструкции прибора по эксплуатации смешиваются в соотношении 1:1 при подаче в корневой канал.

Для расширения каналов и удаления поверхностно-смазанного слоя

Последовательно обрабатывать каналы «Белодез» жидкостью 3 % или 5,2% (при необходимости с активатором) и материалом на основе ЭДТА для химического расширения каналов («Эндоджи не 2», «Эндодель»).

Перед установкой гуттаперчевых или металлических штифтов при постоянном планировании канала рекомендуется обработать их «Белодез» жидкостью (5,2 %), промыть дистиллированной водой и просушить.

Внимание! При попадании материала «Белодез» на слизистые оболочки промыть водой. При случайной экструзии материала за верхушку корня зуба аспирировать содержимое корневого канала, промыть его физиологическим раствором. При необходимости назначить дальнейшее лечение.

Противопоказания: Повышенная чувствительность пациента к компонентам материала.

УТИЛИЗОВАТЬ как отходы класса А по СанПин 2.1.3.684-21

ФОРМА ВЫПУСКА

1. «Белодез» жидкость 3 % (или 5,2 %) в составе:

- флакон с жидкостью «Белодез» (30 мл/100 мл/250 мл/500 мл/1 л) - 1 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.
- адаптер (при необходимости) - 1 шт.
- инструкция по использованию флакона с адаптером (при необходимости) - 1 шт.
- крышка-капельница (при необходимости) - 1 шт.
- «Белодез активатор», при необходимости, в составе:
- флакон с «Белодез активатором» (30мл/100мл/250мл/500мл/1л) - 1 шт.
- этикетка на «Белодез активатор» - 1 шт.
- адаптер (при необходимости) - 1 шт.
- инструкция по использованию флакона с адаптером (при необходимости) - 1 шт.
- «Белодез активатор плюс», при необходимости, в составе:
- шприц с «Белодез активатором плюс» (5мл/10мл/20мл) - 1 шт.
- этикетка на «Белодез активатор плюс» - 1 шт.

2. «Белодез» гель 3 %, в составе:

- шприц с гелем «Белодез» 3 % (3 г) - 1 шт.
- иглы (канюли) (при необходимости) - 3-5 шт.
- инструкция по применению - 1 шт.

Всего: № от 01.2022

Белодез



Dental material based on stabilized solution of sodium hypochlorite used for chemical expansion and antiseptic treatment of tooth root canals «Belodez»



Belodez

Liquid 5,2 %

Liquid 30 ml
Endodontic materials


VLADMIVA

Manufacturer:
JSC "VladMiVa"
Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Store in a dark place
at t of +5°C to +25°C

2 years shelf-life



Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов «Белодез»



Белодез®

Жидкость 5,2 %

Жидкость 30 мл
Эндодонтические материалы

ВЛАДМИВА

Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия
г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Хранить в темном месте
при t от +5°C до +25°C

Срок годности 2 года

ТУ 21.20.24-092-45814830-2022
РУ № ФСР 2008/02586
от



Версия/Version: № , 01.2022

Белодез



Dental material based on stabilized solution of sodium hypochlorite used for chemical expansion and antiseptic treatment of tooth root canals «Belodez»




VLADMIVA


Belodez
Liquid 5,2 %

Manufacturer:
JSC "VladMiva"
Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555
www.vladmiva.ru

Store in a dark place
at t of +5°C to +25°C
2 years shelf-life



Liquid	100 ml
Endodontic materials	



Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов «Белодез»




ВЛАДМИВА


Белодез®
Жидкость 5,2 %

Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия
г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555
www.vladmiva.ru

Хранить в темном месте
при t от +5°C до +25°C
Срок годности 2 года



Жидкость	100 мл
Эндодонтические материалы	



Версия/Version: № , 01.2022

Белодез



Dental material based
on stabilized solution of
sodium hypochlorite used
for chemical expansion and
antiseptic treatment of root
and canal's «Belodez»




VLADMIVA

Belodez
Liquid 5,2 %

Manufacturer:
JSC "VladMiVa"
Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Store in a dark place
at t of +5°C to +25°C
2 years shelf-life



Liquid 250 ml
Endodontic
materials



Материал на основе стабилизированного
раствора гипохлорита натрия
для химической экспансии и
антисептической обработки
корневых каналов зубов «Белодез»



ВЛАДМИВА


Белодез®
Жидкость 5,2 %

Производитель:
АО «ОЭЗ «ВладМиВа»
308023, Россия
г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Хранить в темном месте
при t от +5°C до +25°C
Срок годности 2 года

ТУ 21.20.24-092-45814830-2022
РУ № ФСР 2008/02586
от



Жидкость 250 мл
Эндодонтические
материалы

Версия/Version: №. 01.2022

ВЛАДМИВА

Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов «Белодез»

Белодез®

Жидкость 5,2 %


Жидкость 500 мл

Хранить при t от +5°C до +25°C
Срок годности 2 года
Транспортировать при t от -10°C до +30°C

TU 21.20.24-092-45814830-2022
РУ № ФСР 2008/02586 от

Производитель: Акционерное общество «Опытный экспериментальный завод «ВладМиВа» (АО «ОЭЗ «ВладМиВа») 308023, Россия
г. Белгород
ул. Студенческая, 14
+7 4722 200 555

www.vladmiva.ru



НАЗНАЧЕНИЕ. Для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов. Область применения - стоматология. Для применения квалифицированным медицинским персоналом в условиях лечебно-профилактического учреждения.

Материал «Белодез» выпускается следующих исполнений:

- «Белодез» жидкость 3 % (или 5,2 %), включающая в состав «Белодез активатор» и/или «Белодез активатор плюс» (при необходимости);
- «Белодез» гель 3 %.

СОСТАВ. «Белодез» жидкость (3 % или 5,2 %) представляет собой стабилизированный водный раствор гипохлорита натрия с содержанием активного хлора 3 % (или 5,2 %). «Белодез» гель 3 % изготовлен на основе стабилизированного водного раствора гипохлорита натрия (содержание активного хлора 3 %) с добавлением гелеобразователя - карбопала, придающего раствору гелеобразную структуру. «Белодез активатор» и «Белодез активатор плюс» представляют собой водные растворы поверхностно-активных веществ (ПАВ) - эфетерного ПАВ (рискид-эмакс) и катионных ПАВ (натуральные эфирные соединения), с добавлением диметилсульфоксида (ДМСО) и предназначены для понижения поверхностного натяжения жидкостей «Белодез» с целью повышения эффективности их действия. «Белодез активатор» рекомендуется добавлять к «Белодез» жидкости при ручной ирригации и при работе с прибором для ирригации, если необходимо значительное снижение концентрации гипохлорита натрия в ирригационном растворе; «Белодез активатор плюс» - добавлять к «Белодез» жидкости при ручной ирригации для улучшения проникающих свойств ирриганта без значительного понижения в нем концентрации гипохлорита натрия.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для антисептической обработки корневых каналов

«Белодез» жидкость 3 % набрать в шприц, установить эндодонтическую иглу и под небольшим давлением (для избежания выхода жидкости за apex) оросить каждый канал, затем промыть каналы дистиллированной водой.

Для антисептической обработки полости зуба перед пломбированием внести небольшое количество «Белодез» жидкости (3 %) или «Белодез» геля (3 %) в полость зуба на 30-60 сек, затем смыть дистиллированной водой.

«Белодез» жидкость 5,2 % внести в канал на 10-30 см (или более 60 см) на вытальной турунде, затем промыть канал дистиллированной водой. Для проведения ручной ирригации «Белодез» жидкостью 5,2 % её необходимо разбавить дистиллированной водой до необходимой концентрации или использовать после смешивания с «Белодез активатором» в объемном соотношении 1:1.

Для антисептической обработки корневых каналов с применением активаторов

При ручной ирригации смешать «Белодез активатор» и «Белодез» жидкость 3 % (или 5,2 %) в объемном соотношении 1:1, или «Белодез активатор плюс» и «Белодез» жидкость 3 % (или 5,2 %) в объемном соотношении 1:25. Ирригацию проводить с помощью шприца и эндодонтической иглы.

При работе с прибором для ирригации использовать «Белодез активатор» и «Белодез» жидкость 3 %, которые согласно инструкции прибора по эксплуатации смешиваются в соотношении 1:1 при подаче в корневой канал.

Для расширения каналов и изоляции поверхности-опознания слез

Последовательно обрабатывать каналы «Белодез» жидкостью (3 % или 5,2 %) (при необходимости с активатором) и материалом на основе ЗДТА для химического расширения каналов («ЭндоЖи №2», «Эндобель»).

Перед установкой гуттаперчевых или металлических штифтов при постоянном пломбировании канала рекомендуется обработать их «Белодез» жидкостью (5,2 %), промыть дистиллированной водой и просушить.

Внимание! При пломбировании материала «Белодез» на слезистые оболочки промыть водой. При случайной интрузии материала за верхушку корня зуба эфиризировать содержимое корневого канала, промыть его физиологическим раствором. При необходимости назначить дальнейшее лечение.

Противопоказания. Повышенная чувствительность пациента к компонентам материала.

УТИЛИЗОВАТЬ как отходы класса А по СанПин 2.1.3684-21

ФОРМА ВЫПУСКА

1. «Белодез» жидкость 3 % (или 5,2 %), в составе:

- флакон с жидкостью «Белодез» (30 мл/100 мл/250 мл/500 мл/1 л)
- инструкция по применению
- адаптер (при необходимости)
- инструкция по использованию флакона с адаптером (при необходимости)
- крышка-капельница (при необходимости)
- «Белодез активатор», при необходимости, в составе
- флакон с «Белодез активатором» (30мл/100мл/250мл/500мл/1л)
- этикетка на «Белодез активатор»
- адаптер (при необходимости)
- инструкция по использованию флакона с адаптером (при необходимости)
- «Белодез активатор плюс», при необходимости, в составе:
- шприц с «Белодез активатором плюс» (5мл/10мл/20мл)
- этикетка на «Белодез активатор плюс»

- 1 шт;
- 1 шт;
- 1 шт;
- 1 шт;

2. «Белодез» гель 3 %, в составе:

- шприц с гелем «Белодез» 3 % (3 г)
- иглы (канюли) (при необходимости)
- инструкция по применению

- 1 шт;
- 3-5 шт;
- 1 шт

ВЛАДИВА

Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов «Белодез»

Белодез

Жидкость 5,2 %

Жидкость 1 л


НАЗНАЧЕНИЕ: Для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов. Область применения - стоматология. Для применения квалифицированным медицинским персоналом в условиях лечебно-профилактического учреждения. Материал «Белодез» выпускается в следующих исполнениях:
- «Белодез» жидкость 3 % (или 5,2 %), включенный в состав «Белодез активатор» и/или «Белодез активатор плюс» (при необходимости).
- «Белодез» гель 3 %.

Хранить при t от +5°C до +25°C
Срок годности 2 года
Транспортировать при t от -10°C до +30°C
ТУ 21.20.24-092-45814830-2022
РФ № ФСР 2008/02586 от

Производитель: Акционерное общество «Оптимизм-экспериментальный завод «ВладМиВа» (АО «ОЗ «ВладМиВа»)
308023, Россия
г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200 555

www.vladmiva.ru

Packer LOT



СОСТАВ: «Белодез» жидкость (3 % или 5,2 %) представляет собой стабилизированный водный раствор гипохлорита натрия с содержанием активного хлора 3 % (или 5,2 %). «Белодез» гель 3 % изготовлен на основе стабилизированного водного раствора гипохлорита натрия (содержание активного хлора 3 %) с добавлением гелеобразователя - карбопола, придающего раствору гелеобразную структуру.

«Белодез активатор» и «Белодез активатор плюс» представляют собой водные растворы поверхностно-активных веществ (ПАВ) амфотерного ПАВ (оксида амина) и катионных ПАВ (четвертичных аммониевых соединений), с добавлением динатриевой соли ЭДТА и пренормыоничи для применения поверхностного натяжения жидкостей «Белодез» с целью повышения эффективности их действия. «Белодез активатор» рекомендуется добавлять к «Белодез» жидкости при ручной ирригации и при работе с прибором для ирригации, если необходимо значительное снижение концентрации гипохлорита натрия в ирригационном растворе; «Белодез активатор плюс» добавлять к «Белодез» жидкости при ручной ирригации для улучшения проникающих свойств ирриганта без значительного понижения в нем концентрации гипохлорита натрия.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для антисептической обработки ирригационных каналов

«Белодез» жидкость 3 % набрать в шприц, установить эндодонтическую иглу и под небольшим давлением (для избежания вытока жидкости за apex) оросить каждый канал, затем промыть канал дистиллированной водой.

Для антисептической обработки полости зуба перед пломбированием внести небольшое количество «Белодез» жидкости (3 %) или «Белодез» геля (3 %) в полость зуба на 30-60 сек, затем смыть дистиллированной водой.

«Белодез» жидкость 5,2 % ввести в канал на 10-30 сек (не более 60 сек) на ватной турунде, затем промыть канал дистиллированной водой. Для проведения ручной ирригации «Белодез» жидкостью 5,2 % ее необходимо разбавить дистиллированной водой до необходимой концентрации или использовать после смешивания («Белодез» активатором в объеме соотношении 1:1.

Для антисептической обработки корневых каналов с применением активаторов

При ручной ирригации смешать «Белодез активатор» и «Белодез» жидкость 3 % (или 5,2 %) в

общем соотношении 1:1, или «Белодез активатор плюс» и «Белодез» жидкость 3 % (или 5,2%) в общем соотношении 1:25. Ирригацию проводить с помощью шприца и эндодонтической иглы. При работе с прибором для ирригации использовать «Белодез активатор» и «Белодез» жидкость 3 %, которые согласно инструкции прибора по эксплуатации смешиваются в соотношении 1:1 при подаче в корневой канал.

Для расширения каналов и удаления поверхности смазанного слоя

Последовательно обрабатывать каналы «Белодез» жидкостью (3 % или 5,2%) (при необходимости с активатором) и материалом на основе ЭДТА для химического расширения каналов («Эндожил № 2», «Эндобол»).

Перед установкой гуттаперчевых или металлических штифтов при постоянном пломбировании канала рекомендуется обработать их «Белодез» жидкостью (5,2 %), промыть дистиллированной водой и просушить.

Внимание! При попадании материала «Белодез» на слизистые оболочки промыть водой. При случайном эструзии материала за верхушку корня зуба аспирировать содержимое корневого канала, промыть его физиологическим раствором. При необходимости назначить дальнейшее лечение.


Противопоказания: Повышенная чувствительность пациента к компонентам материала.

УТИЛИЗОВАТЬ как отходы класса А по СанПиН 2.1.3.684-21

ФОРМА ВЫПУСКА

1. «Белодез» жидкость 3 % (или 5,2 %) в составе:	
флакон с жидкостью «Белодез» (30 мл/100 мл/250 мл/500 мл/1 л)	- 1 шт.
инструкция по применению	- 1 шт.
адаптер (при необходимости)	- 1 шт.
инструкция по использованию флакона с адаптером (при необходимости)	- 1 шт.
крышка-капельница (при необходимости)	- 1 шт.
«Белодез активатор», при необходимости, в составе:	
флакон с «Белодез активатором» (30мл/100мл/250мл/500мл/1л)	- 1 шт.
этикетка на «Белодез активатор»	- 1 шт.
адаптер (при необходимости)	- 1 шт.
инструкция по использованию флакона с адаптером (при необходимости)	- 1 шт.
«Белодез активатор плюс», при необходимости, в составе:	
шприц с «Белодез активатором плюс» (5мл/10мл/20мл)	- 1 шт.
этикетка на «Белодез активатор плюс»	- 1 шт.
2. «Белодез» гель 3 %, в составе:	
шприц с гелем «Белодез» 3 % (3 г)	- 1 шт.
иглы (каниюлы) (при необходимости)	- 3-5 шт.
инструкция по применению	- 1 шт.

Версия № от 01.2022



Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия
г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

TU 21.20.24-092-45814830-2022
ПУ № ФСР 2008/02586 от

Хранить в сухом темном месте
при t от +5°C до +10°C
Срок годности 2 года



Белодез

ВЛАДМИВА



Dental material based on stabilized solution of sodium hypochlorite
used for chemical expansion and antiseptic treatment of tooth root canals «Belodez»

Belodez gel 3 %

Gel

3 g

Endodontic materials

Manufacturer:
JSC «VladMiVa»
Experimental Plant
Studencheskaya st. 19
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Store in a dry and dark place
at t of +5°C to +10°C
2 years shelf-life



Packer

LOT



Материал стоматологический на основе стабилизированного
раствора гипохлорита натрия для химического расширения и
антисептической обработки корневых каналов зубов «Белодез»

Белодез® гель 3 %

Гель

3 г

Эндодонтические материалы



Белодез
активатор

Dental material based
on stabilized solution of
sodium hypochlorite used
for chemical expansion and
antiseptic treatment of tooth
root canals «Belodez»



Belodez activator

Solution for reducing surface tension
of material «Belodez»

Liquid 30 ml

Endodontic
materials

VLADMIVA

Manufacturer:
JSC "VladMiVa"
Experimental Plant
Studencheskaya st. 19.
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Store at t of +5°C to +25°C

3 years shelf-life



Packer

LOT



Материал стоматологический
на основе стабилизированного
раствора гипохлорита натрия
для химического расширения
и антисептической обработки
корневых каналов зубов «Белодез»



Белодез* активатор

Раствор для понижения
поверхностного натяжения
материала «Белодез»

Жидкость 30 мл

Эндодонтические
материалы

ВЛАДМИВА

Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия
г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Хранить при t
от +5°C до +25°C

Срок годности 3 года

TU 21.20.24-092-45814830-2022
ПУ № ФСР 2008/02586 от

Версия/Version: № . 01.2022



Белодез

Dental material based on stabilized solution of sodium hypochlorite used for chemical expansion and antiseptic treatment of tooth root canals «Belodez»



VLADMIVA

Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов «Белодез»



ВЛАДМИВА

Belodez activator

Solution for reducing surface tension of material «Belodez»

Manufacturer:
JSC "VladMiVa"
Experimental Plant:
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555
www.vladmiva.ru

Store in a dark place
at t of +5°C to +25°C
3 years shelf-life

Белодез® активатор

Раствор для понижения
поверхностного натяжения
материала «Белодез»


Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия
г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555
www.vladmiva.ru

Хранить в темном месте
при t от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года

ТУ 21.20.24-092-45814830-2022
РУ № ФСР 2008/02586 от


Liquid 100 ml

Endodontic
materials



Жидкость 100 мл

Эндодонтические
материалы



Версия/Version: № , 01.2022



Белодез
активатор

Dental material based
on stabilized solution of
sodium hypochlorite used
for chemical expansion and
antiseptic treatment of tooth
root canals «Belodez»



VLADMIVA


Belodez activator

Solution for reducing surface
tension of material «Belodez»

Manufacturer:
JSC "VladMiVa"
Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Store in a dark place
at t of +5°C to +25°C
3 years shelf-life



Liquid 250 ml
Endodontic
materials



Материал стоматологии высшей
качества с стабилизированным
раствором гипохлорита натрия
для химического расширения
и антисептической обработки
корневых каналов зуба «Белодез»



VLADMIVA

Белодез® активатор

Раствор для понижения
поверхностного натяжения
материала «Белодез»

Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия
г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555


www.vladmiva.ru

Хранить в темном месте
при t от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года

ТУ 21.20.24-092-45814830-2022
РУ № ФСР 2008/02586
от



Жидкость 250 мл
Эндодонтические
материалы



Версия/Version: № 01.2022

ВВ
ВЛАДИВА

Материал стоматологический
на основе стабилизированного
раствора гипохлорита натрия
для химического расширения и
антисептической обработки
корневых каналов зубов «Белодез»

Белодез активатор

Раствор для понижения поверхностного
натяжения материала «Белодез»

Жидкость 500 мл

Хранить при t от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года
Транспортировать при
t от -10°C до +30°C


TU 21.20.24-092-45814830-2022
РУ № ФСР 2008/02586 от

Производитель: Акционерное общество
«Опытно-экспериментальный завод
«ВладМиВа» (АО «ОЗЭ «ВладМиВа»)
308023, Россия
г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Packer

LOT



НАЗНАЧЕНИЕ: «Белодез активатор» предназначен для
понижения поверхностного натяжения материала
«Белодез» с целью увеличения эффективности его
применения.

СОСТАВ: «Белодез активатор» представляет собой
водный раствор поверхностно-активных веществ (ПАВ):
амфотерного и катионных ПАВ с добавлением
динатриевой соли ЭДТА. Применяется с материалом
«Белодез» (3 % и 5,2 % жидкости) в соответствии с
инструкцией по применению материала «Белодез».

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: «Белодез активатор» смешать
с материалом «Белодез» жидкость (3 %/ 5,2 %) в объемном
соотношении 1:1. Ирригацию проводить с помощью
шприца и эндодонтической иглы согласно
общепринятому протоколу.

При работе с прибором для ирригации корневых
каналов специальные емкости с «Белодез активатором» и
материалом «Белодез» жидкость 3 % установить в
держатель на блоке управления. Подачу растворов
регулировать в соответствии с Инструкцией по
эксплуатации прибора.

УТИЛИЗИРОВАТЬ как отходы класса А по СанПин
2.1.3684-21

ФОРМА ВЫПУСКА:

1. «Белодез активатор», в составе:

- флакон с «Белодез активатором» (30 мл/ 100 мл /
250 мл/ 500 мл/ 1л) 1 шт.;
- этикетка 1 шт.;
- адаптер (при необходимости) 1 шт.;
- инструкция по использованию флакона с адаптером (при
необходимости) 1 шт.;

2. «Белодез активатор плюс», в составе:

- шприц с «Белодез активатором плюс» (5 мл/ 10 мл/
20 мл) 1 шт.;
- этикетка 1 шт.;

Версия: № от 01.2022

ВЛАДИМИВА

Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов «Белодез»

Белодез активатор

Раствор для понижения поверхностного натяжения материала «Белодез»

Жидкость

1 л

Хранить при t от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года
Транспортировать при
t от -10°C до +30°C

TU 21.20.24-092-45814830-2022

РУ № ФСР 2008/02586 от

Производитель: Акционерное общество
«Опытный экспериментальный завод
«ВладМиВа» (АО «ОЭЗ «ВладМиВа»)
308023, Россия
г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru



ВНИМАНИЕ! При использовании препарата «Белодез активатор» необходимо соблюдать меры предосторожности, указанные в инструкции по применению.

НАЗНАЧЕНИЕ: «Белодез активатор» предназначен для понижения поверхностного натяжения материала «Белодез» с целью увеличения эффективности его применения.

СОСТАВ: «Белодез активатор» представляет собой водный раствор поверхностно-активных веществ (ПАВ): амфотерного и катионных ПАВ с добавлением динатриевой соли ЭДТА. Применяется с материалом «Белодез» (3 % и 5,2 % жидкости) в соответствии с инструкцией по применению материала «Белодез».

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: «Белодез активатор» смешать с материалом «Белодез» жидкость (3 %/ 5,2 %) в объемном соотношении 1:1. Ирригацию проводить с помощью шприца и эндодонтической иглы согласно общепринятому протоколу.

При работе с прибором для ирригации корневых каналов специальные емкости с «Белодез активатором» и материалом «Белодез» жидкость 3 % установить в держатель на блоке управления. Подачу растворов регулировать в соответствии с Инструкцией по эксплуатации прибора.

УТИЛИЗИРОВАТЬ как отходы класса А по СанПин 2.1.3684-21

ФОРМА ВЫПУСКА:




1. «Белодез активатор», в составе:

- флакон с «Белодез активатором» (30 мл/ 100 мл / 250 мл/ 500 мл/ 1л) 1 шт.;
- этикетка 1 шт.;
- адаптер (при необходимости) 1 шт.;
- инструкция по использованию флакона с адаптером (при необходимости) 1 шт.;

2. «Белодез активатор плюс», в составе:

- шприц с «Белодез активатором плюс» (5 мл/ 10 мл/ 20 мл) 1 шт.;
- этикетка 1 шт.;

Версия № от 01.2022



Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»
308023, Россия
г. Белгород,
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

TU 21.20.24-092-45814830-2022
РУ № ФСР 2008/02586 от

Хранить при t от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года



Dental material based on stabilized solution of sodium hypochlorite used
for chemical expansion and antiseptic treatment of tooth root canals «Belodez»

Belodez activator PLUS

Liquid

Endodontic materials

☐ 5 ml

☐ 10 ml



Manufacturer:
JSC "VladMiVa"
Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgorod, 308023, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Store at t of +5°C to +25°C
3 years shelf-life



Packer

LOT



Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия
для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зуба «Белодез»

Белодез активатор ПЛЮС

Жидкость

Эндодонтические материалы

☐ 5 мл

☐ 10 мл



Белодез
активатор ПЛЮС
VLADMIVA

Belodez
activator PLUS
VLADMIVA

Версия/Version: № 01-2022

Производитель:
АО «ОЗЗ «ВладМиВа»

308023, Россия
г. Белгород
ул. Студенческая, 19
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Хранить при t от +5°C до +25°C
Срок годности 3 года

TU 21.20.24-092-45814830-2022
РУ № ФСР 2008/02586 от



Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов «Белодез»

Белодез® активатор ПЛЮС

Раствор для понижения поверхностного натяжения материала «Белодез»

Жидкость


20 мл

Эндодонтические материалы

Manufacturer:
JSC "VladMiva"
Experimental Plant
Studencheskaya st. 19,
Belgrod, 308023, Russia
+7 4722 200-555

www.vladmiva.ru

Store at t of +5°C to +25°C
3 years shelf-life



47 01 2022 01
EXP.2025 01

Версия/Version: № 01.2022



Dental material based on stabilized solution of sodium hypochlorite used for chemical expansion and antiseptic treatment of tooth root canals «Belodez»

Belodez activator PLUS

Solution for reducing surface tension of material «Belodez»

Liquid

20 ml

Endodontic materials

Belodez
activator PLUS

VLADMIVA



В данном документе
пронумеровано, прошито
и скреплено печатью
листа(ов)
зам.нач. Ю. Курсенко З.В.