


ОКП 93 9800



Инструкция по применению

Раствор цитрата натрия 4% в контейнерах 250 мл

2010

PROOFREADING INSTRUCTION / RELEASE BLOCK

Proofreading Approval

File Name

Spells

Size



Futural

Инструкция по использованию 4-процентного раствора цитрата натрия (4-процентный цитрат натрия). Раствор антикоагулянта в контейнерах VIAPLEX™.

Примечание: 4-процентный цитрат натрия не пригоден для применения внутривенно или эпидурально.

Описание:

Антикоагулянт 4-процентный цитрат натрия является стерильным и изотоническим раствором, состоящим из чистых форм цитрата натрия VIAPLEX™ и изотонического раствора. Раствор специально предназначен для использования в контейнерах.

Состав:

Раствор цитрата натрия 40,0 г
вода для инъекций до 1000 мл
pH 6,4-7,5

Рекомендации по применению:

4-процентный раствор цитрата натрия является антикоагулянтом, предназначенным для формирования системы чистой крови при использовании контейнера для переливания.

Инструкция по использованию:

1. Проверьте правильность размещения контейнера и места назначения.
2. Проверьте целостность упаковки контейнера и наличие в ней раствора цитрата натрия. Если упаковка повреждена, не используйте контейнер. Не используйте контейнер, если в нем обнаружены признаки повреждения упаковки.
3. Проверьте, чтобы контейнер был правильно размещен в контейнере для переливания. Проверьте, чтобы контейнер был правильно размещен в контейнере для переливания. Проверьте, чтобы контейнер был правильно размещен в контейнере для переливания.
4. Проверьте, чтобы контейнер был правильно размещен в контейнере для переливания. Проверьте, чтобы контейнер был правильно размещен в контейнере для переливания. Проверьте, чтобы контейнер был правильно размещен в контейнере для переливания.
5. Проверьте, чтобы контейнер был правильно размещен в контейнере для переливания. Проверьте, чтобы контейнер был правильно размещен в контейнере для переливания. Проверьте, чтобы контейнер был правильно размещен в контейнере для переливания.
6. Проверьте, чтобы контейнер был правильно размещен в контейнере для переливания. Проверьте, чтобы контейнер был правильно размещен в контейнере для переливания. Проверьте, чтобы контейнер был правильно размещен в контейнере для переливания.
7. Проверьте, чтобы контейнер был правильно размещен в контейнере для переливания. Проверьте, чтобы контейнер был правильно размещен в контейнере для переливания. Проверьте, чтобы контейнер был правильно размещен в контейнере для переливания.

Меры предосторожности:

1. Перед использованием проверить дату изготовления контейнера.
2. Проверить герметичность упаковки контейнера с раствором цитрата натрия и наличие для трансфузии антикоагулянта на контейнере для переливания. Проверить, чтобы контейнер был правильно размещен в контейнере для переливания.

Правила безопасности:

1. Не использовать контейнер, если упаковка повреждена или контейнер негерметичен. Не использовать контейнер, если упаковка повреждена или контейнер негерметичен. Не использовать контейнер, если упаковка повреждена или контейнер негерметичен.
2. Не использовать контейнер, если упаковка повреждена или контейнер негерметичен. Не использовать контейнер, если упаковка повреждена или контейнер негерметичен. Не использовать контейнер, если упаковка повреждена или контейнер негерметичен.
3. Не использовать контейнер, если упаковка повреждена или контейнер негерметичен. Не использовать контейнер, если упаковка повреждена или контейнер негерметичен. Не использовать контейнер, если упаковка повреждена или контейнер негерметичен.
4. После завершения процедуры стерилизации контейнера, не использовать контейнер, если упаковка повреждена или контейнер негерметичен. Не использовать контейнер, если упаковка повреждена или контейнер негерметичен. Не использовать контейнер, если упаковка повреждена или контейнер негерметичен.

Противопоказания:

С учетом того, что данный препарат используется вместе с контейнером для переливания, его применение противопоказано в том случае, когда полностью отсутствует доступный уровень антикоагулянта.

Не разводить раствор:

Высокая концентрация антикоагулянта в контейнере для переливания может стать причиной возникновения таких симптомов, как зуд, чихание, кашель, рвота, диарея. Иногда может наблюдаться покраснение или зуд в области, где находится контейнер. Иногда может наблюдаться покраснение или зуд в области, где находится контейнер. Иногда может наблюдаться покраснение или зуд в области, где находится контейнер.

Важно! Не использовать раствор цитрата натрия для переливания крови. Раствор цитрата натрия предназначен для использования в контейнерах для переливания. Раствор цитрата натрия предназначен для использования в контейнерах для переливания. Раствор цитрата натрия предназначен для использования в контейнерах для переливания.

Важно! Не использовать раствор цитрата натрия для переливания крови. Раствор цитрата натрия предназначен для использования в контейнерах для переливания. Раствор цитрата натрия предназначен для использования в контейнерах для переливания. Раствор цитрата натрия предназначен для использования в контейнерах для переливания.

Не хранить при температуре выше 25° C.

Производитель:

Baxter S.A.
Baxter
7000 Luitpold
Baxter Park, Breda, NL

Производство для:

RUSSIA
Futural, Inc.
CMA, 10000, Montreal, QC H4S 1G7

Импортер:

Futural, Inc.
1-1405 Mont-Saint-Gilles

Импортер и дистрибутор в России:

300 - Ярославль, Вятская
123002, г. Москва
ул. Рязанская, д.119/1, 5 эт.
тел: +7 (495) 524-5829

Символы:



Примечание: в соответствии с требованиями
Директивы ЕС о маркировке медицинских изделий
(Medical Devices Directive) 93/42/EEC



Не нагревать. Не хранить при температуре
выше 25° C.



Альтернативный метод маркировки



Стерилизованный паром. Стерилизованный метод
информации.



Не использовать, при обнаружении каких-либо
знаков повреждения упаковки.



Не хранить герметично.



Содержит фталаты. Директива ЕС 609/10

RUSSIA является торговой маркой компании Futural, Inc.

VIAPLEX является торговой маркой компании Baxter International Inc.



07-19-00-387 REV: E
09/2010