

16

аптечка⁺ первой помощи ФЭСТ



КОЛЛЕКТИВНАЯ



Система менеджмента
качества ISO 9001

**Аптечка первой помощи «ФЭСТ» коллективная, исполнение № 1
для отдельного рабочего места (кабинета), 7-10 человек
футляр АП из полистирола**



**Аптечка первой помощи «ФЭСТ» коллективная, исполнение № 2
для коллектива 15-20 человек
футляр АП из полистирола**



**Аптечка первой помощи «ФЭСТ» коллективная, исполнение № 2
для коллектива 15-20 человек
футляр АТ из полиэстера**



**Аптечка первой помощи «ФЭСТ» коллективная, исполнение № 3
для крупных производственных подразделений, 100 человек
футляр АТ из полиэстера**



**Аптечка первой помощи «ФЭСТ» коллективная, исполнение №3
для крупных производственных подразделений, 100 человек
футляр АМ из металла**

Анальгин 0,5 №10 таблетки



ВНИМАНИЕ!
ПРИ РАЗРЫВЕ ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ ПАКЕТ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ ПАКЕТОВ НА РАССТОЯНИИ МЕНЕЕ 1М
ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПРЯМЫХ
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ

ГОР
Изготовитель
Россия, 156025
Тел./факс:

Пакет гипотермический для оказания первой помощи



<<СНЕЖОК>> №2

ТУ 9398-003-10973749-2007

ПУ ФСТ 2007/01584 от 22.10.2012 г

Система менеджмента качества ISO 9001:2008



НАЗНАЧЕНИЕ:

ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ТРАВМАХ (УШИБАХ, ПЕРЕЛОМАХ И Т.Д.)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:


ПОЛОЖИТЬ ПАКЕТ НА ТВЕРДУЮ ПОВЕРХНОСТЬ. УДАРОМ ТЫЛЬНОЙ
СТОРОНЫ ЛАДОНИ РАЗДАВИТЬ ВНУТРЕННИЙ ПАКЕТ С ЖИДКОСТЬЮ.
НЕСКОЛЬКО РАЗ ЭНЕРГИЧНО ВСТРЯХНУТЬ. ПРИМЕНЯТЬ В КАЧЕСТВЕ
ХОЛОДНОГО КОМПРЕССА. ЕСЛИ НАРУШЕНА ЦЕЛОСТНОСТЬ КОЖНЫХ
ПОКРОВОВ, ПОЛОЖИТЬ МЕЖДУ ТЕЛОМ И ПАКЕТОМ ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНУЮ ПРОКЛАДКУ ИЗ ТОНКОГО ПОЛИЭТИЛЕНА.

ВНИМАНИЕ!

ПРИ РАЗРЫВЕ ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ ПАКЕТ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ ПАКЕТОВ НА РАССТОЯНИИ МЕНЕЕ 1М
ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПРЯМЫХ
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ

ГОР
Изготовитель: ООО "Предприятие "ФЭСТ"
Россия, 156025, г. Ярославль, Рабочий пр-т, 8
Тел./факс: (49-32) 49-32-99, 49-32-43

Пакет гипотермический для оказания первой помощи



<<СНЕЖОК>> №2

ТУ 9398-003-10973749-2007

ПУ ФСТ 2007/01584 от 22.10.2012 г

Система менеджмента качества ISO 9001:2008



НАЗНАЧЕНИЕ:

ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ТРАВМАХ (УШИБАХ, ПЕРЕЛОМАХ И Т.Д.)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ГОР
Изготовитель: ООО "Предприятие "ФЭСТ"
Россия, 156025, г. Ярославль, Рабочий пр-т, 8
Тел./факс: (49-32) 49-32-99, 49-32-43

Кровоостанавливающий

Длительная транспортировка
через 30 минут) жгут надо еще (в тепле - через 40
до появления на ране капель - рану ослабить на
выше или ниже прежнего места).

Жгут

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ «ФЭСТ» ОДНОРАЗОВЫЙ №4



ООО "Предприятие "ФЭСТ"
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, 8
Тел./факс: (4942) 49-32-05, 49-32-43

<http://www.fest-k.ru>, e-mail: sale@fest-k.ru

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ISO 9001 (4. год):

БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ

MEDICAL GAUZE BANDAGE
STERILE


MEDICININIS MARLINIS TVARSTIS
STERILUS

5M X 10CM



Бинт стерильный 5м x 10см или 5м x 7см

Бинт стерильный 7 м x 14 см



Срок годности 3 года
Дата стерилизации см. на упаковке
рег. уд. ФСР 2009/04116, ТУ 9393-003-59132234-2008
Производитель: ООО "НПЦ "Сериал-Мед", г. Москва,
127247, Дмитровское шоссе, д.103, тел. (495) 778-49-02

Назначение:
Для остановки кровотечений
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость препаратов
Способ применения:
1. Вскрыть упаковку. 2. Наложить покрытие на рану.
3. Прижать к ране на 1 мин. 4. Зафиксировать бинтом или
пластырем. 5. Смену покрытия производить со смачиванием.

Гем ИАК
Армитекс®

Зшт. 7x10 см

Кровоостанавливающее

покрытие атравматическое с
лекарственными средствами для
первичного закрытия и лечения
ран, травм, ожогов

с йодопироном и аминокaproновой
кислотой



Стерильно

Автоаптечка



ИМ18

Салфетки или покрытия гемостатические не менее 6x10

Салфетки антисептические спиртовые



Срок годности 3 года
Дата стерилизации см. на упаковке
рег. уд. ФСР 2009/04116, ТУ 9393-003-59132234-2008
Производитель: ООО «НПЦ «Сериал-Мед», 127247,
Москва, ул. Звездная, д. 103, стр. 1 (495) 770-10-00

Назначение:
Для закрытия грязных ран и ожогов
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость препаратов
Способ применения:
1. Вскрыть упаковку. 2. Смочить водой и наложить покрытие
окрашенной стороной на рану. 3. Зафиксировать бинтом или
пластырем. 4. Смену покрытия производить со смачиванием.

ДЛРА

 **Гармитекс**[®]

1 шт. 7x10 см

Антимикробное

Покрывте атравматическое с
лекарственными средствами для
первичного закрытия и лечения
ран, травм, ожогов.


с диоксидином,
витамином С, рутином и аскорбиновой кислотой

Стерильно




ИМ18

Салфетки или покрытия стерильные не менее 6x10 см



**Йода раствор спиртовой 5% 10 мл или
Валик пропитан 10 % раствором повидон-йода или
Валик медицинский ватный «ФЭСТ», пропитанный
раствором спиртовым йода 5 %, в герметичном футляре Михайлова**



Лейкопластырь 1см x 250см

Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный №6



ООО "Предприятие "ФЭСТ"
Россия, 156025. г.Кострома,
Рабочий пр-т, 8
Тел./факс: (4942) 49-32-99, 49-32-43,
тел.: (4942) 49-32-05

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ
Бинт эластичный
трубчатый медицинский
нестерильный "ФЭСТ"

№ 6

ТУ 9393-006-10973749-2009
ПУ № ФСР 2009/05992 от 20.10.09 г.

Изготовлено _____

Срок годности - 4 года

перевязочных средств при
обработке ран и ожогов

6



ООО "Предприятие "Фест"
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий,
Тел.: (4942) 49-32-05
Тел./факс: (4942) 49-32-99, 49-32-45
<http://www.fest-k.ru>, e-mail: sale@fest-k.ru
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ISO 9001

Вата

МЕДИЦИНСКАЯ
ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
НЕСТЕРИЛЬНАЯ
50 г

ГОСТ 558-81
ТУ № ФСР 2008/03337 от 23.09.2008
Изготовлено (год): см. на упаковке

Вата нестерильная 50 г


СУЛЬФАЦИЛ-НАТРИЙ

КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ 20% СУЛЬФАЦЕТАМИД


СТЕРИЛЬНО



РУП "БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ"



Сульфацил - натрия раствор 20%-1 мл № 2 тубик-капельница
или флаконы по 5мл или по 10 мл



**Перекиси водорода раствор 3% 40 мл или
валик медицинский ватный «ФЭСТ», пропитанный
раствором перекиси водорода 3%, в герметичном футляре Михайлова**

Пену наносят до покрытия всей
раневой поверхности,
с расстояния 1-5 см.

Побочное действие:

Аллергические реакции.
При проявлении побочных
реакций необходимо отменить
применение препарата
и обратиться к врачу.

Передозировка:

Сведения о передозировке
препаратом отсутствуют.

**Взаимодействие с другими
лекарственными препаратами:**

В период лечения возможно
использование системной
антибактериальной терапии.
Возможность и необходимость
применения с другими
наружными лекарственными
средствами определяется
индивидуально лечащим
врачом в зависимости
от характера воспаления
и стадии регенерации
поврежденных тканей.

Особые указания:

Не влияет на способность
управлять автотранспортом
или работу с другими
потенциально опасными
механизмами.

Форма выпуска:

По 80 г в баллонах алюминиевых.

Каждый баллон
в пачке из картона.

Условия хранения:

В сухом месте,
при температуре не выше 15 °С,
вдали от источников огня,
отопительных приборов и прямых
солнечных лучей.

Хранить в недоступном
для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Не применять после
истечения срока годности,
указанного на упаковке

Условия отпуска из аптек:

Отпускают без рецепта

**Баллон следует оберегать
от ударов.**

**Баллон перед употреблением
встряхнуть 10-15 раз.**

Баллон не вскрывать.

Беречь от детей.

Производитель/организация,
принимаящая претензии:

ЗАО "АЛТАЙВИТАМИНЫ"

Адрес: 659325, Россия,
Алтайский край,


г. Бийск, ул. Заводская, 69

Телефон: (3854) 326-946, 338-719

Факс: (3854) 327-640

ОЛАЗОЛЬ®



аэрозоль
для наружного
применения



ЗАО "АЛТАЙВИТАМИНЫ"

80 г

**Спрей «Олазол» или Д-Пантенол мазь 5% 25 г или
Пантенол-ратиофарм 5% 35 г или Декспантенол 5% 25 г или 30 г
или Пантодерм 5% 30 г
или Актовегин крем 5% или гель 20% или
мазь 5% 20 г или 30 г или 50 г или 100 г**



Нитроглицерин 0,5мг № 20 капсулы или № 40 таблетки

ТАБЛЕТКИ ПОДЪЯЗЫЧНЫЕ 60 мг
6 таблеток

Состав на одну таблетку.

Левоментола раствор в ментил
изовалерате (валидол)..... 60 мг

Вспомогательных веществ: (сахароза
(сахар), кальция стеарат) ... достаточное
количество до получения таблетки
массой 1,223 г

Таблетку

положить под
язык и держать

до полного

рассасывания.



4 603679 000089

Хранить при температуре не выше 25 °С

в защищённом от влаги месте.



ЗАО "АУРОВИТАМИНЫ"

Россия, 659325, г. Благовещенск, ул. Заводская, 6

Тел. 326-046, 338-719, факс (3854) 397-640

ВАЛИДОЛ

ТАБЛЕТКИ ПОДЪЯЗЫЧНЫЕ 60 мг

Валидол 60 мг № 6 таблетки или валидол с глюкозой № 10

Устройство - маска
полиэтиленовая с обратным клапаном
для искусственной вентиляции
легких разового использования
"Рот-устройство-рот" - "ФЭСТ"


Устройство
с обратным
клапаном
для искусственной
вентиляции
легких
разового
использования
"Рот-устройство-рот"
по ТУ 9393-009-10973749-2002

Рег.уд. № ФСР 2007/00679
от 10.09.2012 года
ТУ 9393-009-10973749-2002
Дата выпуска 2014 год
Срок годности - 5 лет

ООО "Предприятие "ФЭСТ"
55025, Россия, Рабочий пр-т, 8,
Тел.: (4942) 49-32-05
т./факс: (4942) 49-32-49, 49-32-43
система менеджмента качества
ISO 9001


<http://www.festk.ru>,
e-mail: sale@festk.ru

Берегите от растительных
и источников тепла.
Настерильная упаковка



1. Ослабить одежду пострадавшего
2. Вычистить рот чистым платком или ватой
3. Извлечь из полости рта пострадавшего
4. Поддерживать максимальный наклон головы назад
5. Начать дыхание рот-в-рот

При проведении искусственного дыхания обязательно поддерживать голову пострадавшего в запрокинутом состоянии. Частота дыхания составляет 10-12 раз в минуту для взрослых, в случае с маленькими детьми - дышите часто и неглубоко. При правильном дыхании увидите, как грудная клетка пострадавшего поднимается при каждом Вашем выдохе. В противном случае необходимо улучшить проходимость дыхательных путей увеличением наклона головы



**Аммиака раствор 10%, 10 мл или 40 мл или
валик медицинский ватный «ФЭСТ», пропитанный
раствором аммиака 10%, в герметичном футляре Михайлова**

4 603179 000145



ОАО "УРАЛБИОФАРМ"
620026, г. Екатеринбург
ул. Куйбышева, 60
тел. (343) 254-01-83
факс (343) 254-01-79

УГОЛЬ
АКТИВИРОВАННЫЙ-УБФ
АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ

10 таблеток по 250 мг

Для приема внутрь.
Хранить в сухом месте
при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не использовать по истечении срока годности.
Инструкция по медицинскому применению
прилагается. Отпускается без рецепта.

Р №002523/01

4 603179 000145



ОАО "УРАЛБИОФАРМ"
620026, г. Екатеринбург
ул. Куйбышева, 60
тел. (343) 254-01-83
факс (343) 254-01-79

УГОЛЬ
АКТИВИРОВАННЫЙ-УБФ
АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ

10 таблеток по 250 мг

Для приема внутрь.
Хранить в сухом месте
при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не использовать по истечении срока годности.
Инструкция по медицинскому применению
прилагается. Отпускается без рецепта.


Р №002523/01

4 603179 000145



ОАО "УРАЛБИОФАРМ"
620026, г. Екатеринбург
ул. Куйбышева, 60
тел. (343) 254-01-83
факс (343) 254-01-79

Уголь активированный 250 мг №10



Корвалол-МФФ

капли для приема внутрь
15 мл

Состав:

Активные вещества:

Фенобарбитал - 1,96 г
Этилбромизовалерианат
(Этиловый эфир α -бромизо-
валериановой кислоты) - 2,15 г


Вспомогательные вещества: до 100,00 г

Натрия гидроксид
(натрия гидроокись) - 0,12 г
Мяты перечной масло - 0,15 г
Этанол (этиловый
спирт) 95 % - 51,08 г
Вода очищенная - 44,54 г


Подробную инструкцию
см. внутри упаковки.
P-N000438/01

Корвалол 15 мл, капли

Ножницы




44



Стаканчик мерный для приема лекарств

54

30



Термометр медицинский



Перчатки латексные

Прошито, пронумеровано,
опечатано

39 (тридцать один) листов

Копия верна
Директор Михайлов В.В.

