




АММИАК, РАСТВОР ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ И ИНГАЛЯЦИЙ 10% 40 мл., ФЛАКОНЫ

Отпускается без рецепта. Применять по назначению врача. Содержит сахарозу.

№ ЛС-002565



ОАО "Марбиофарм" 424008, Россия, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 121.
тел.: (8362) 42-03-12, факс: (8362) 45-00-00



Анальгин

метамизол натрия

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь. Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Отпускается без рецепта. Применять по назначению врача. Содержит сахарозу.

4 "602876" 000380 "



Анальгин

метамизол натрия

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь. Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Отпускается без рецепта. Применять по назначению врача. Содержит сахарозу.

№ ЛС-002565



ОАО "Марбиофарм" 424008, Россия, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 121.
тел.: (8362) 42-03-12, факс: (8362) 45-00-00



Анальгин

метамизол натрия


10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь. Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Отпускается без рецепта. Применять по назначению врача. Содержит сахарозу.

АНАЛЬГИН ТАБЛЕТКИ 500 мг №10




БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м x 7 см



БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ 7 м x 14 см

Бинт эластичный
трубчатый медицинский
нестерильный




Зарегистрировано под названием: Бинт эластичный трубчатый медицинский
нестерильный «Витап»
Предназначен для фиксации повязок и бинтов и создания компрессионной
повязки. По истечении срока годности использовать без бинтов отходы.
ТУ 9398-010-50887601-2006; EN № 1379-1:2005 от 10.04.2013
Производитель: ООО «Витап», 187322, Ленинградская обл., Кегарский р-н,
г.п. Синевно, ул. Сарвак д.2, п.б. +7 (812) 335-05-45, www.vitalp.ru
ГОСТ Р ИСО 9001-2008; ГОСТ Р ИСО 14001-2007
Дата производства: см. на упаковке
Срок годности: 5 лет



Длина бинта
№1 10±1 см
№3 10±1 см
№6 10±1 см
№1,3,6

БИНТ
ЭЛАСТИЧНЫЙ
ТРУБЧАТЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

Витап
фарм



БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

Валидол 10 таблеток

Ментола раствор в ментил изовалерате

таблетки подъязычные 60 мг

Хранить в сухом месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Применять согласно инструкции. Отпускается без рецепта



4 604060 021218

P. № 001400/01

 **ОАО "Татхимфармпрепараты"**

420091, Россия, г. Казань, ул. Беломорская, 260 (843) тел. 571-85-58; факс 571-85-38

Валидол 10 таблеток

Ментола раствор в ментил изовалерате


таблетки подъязычные 60 мг


Хранить в сухом месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Применять согласно инструкции. Отпускается без рецепта

4 604060 021218

P. № 001400/01

ВАЛИДОЛ ТАБЛЕТКИ 60 мг №10





ЖГУТ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ



ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»
Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, 10
Тел./факс: (4872) 41-04-73

Acidum Boricum

КИСЛОТА БОРНАЯ

порошок для приготовления раствора
для местного применения

Борная кислота

Р 67.554.66

Наружное

10г

КИСЛОТА БОРНАЯ

Производитель
ООО "Роспланта".
Россия, Санкт-Петербург,
Новочеркасский пр. д.1. лит. "Н"
Тел.: 740-79-67

СОДА ПИЩЕВАЯ

Масса нетто - 40г

ГОСТ 2156-76

Дата изготовления 07.2014
Срок хранения 12 месяцев

Утилизировать как бытовые отходы

www.rosplanta.ru

НАТРИЙ ДВУУГЛЕКИСЛЫЙ, 40 г.

Капсулы подъязычные

НИТРОГЛИЦЕРИН

40 капсул по 0,5 мг



Нитроглицерин (раствор нитроглицерина 4% в подсолнечном масле в пересчете на 100% вещество) – 0,5 мг; бутилгидрокситолуол (ионол) – 0,0074 мг; масло подсолнечное – до 50 мг. Состав капсулы: желатин медицинский – 17,1 мг; глицерол (глицерин) – 5,62 мг; метилпарагидроксibenзоат (нипагин) – 0,14 мг; азорубин (краситель кислотный красный 2С) – 0,14 мг.

НИТРОГЛИЦЕРИН

капсулы подъязычные 20 штук по 0,5 мг

Капсулу положить под язык.

ЛСР-000127/09 от 14.01.2009 г.

Список Б. Хранить в сухом, прохладном,

защищенном от света месте, вдали от огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

Применять по назначению врача.

Срок годности 2 года. Не применять

по истечении срока годности.

Отпускается без рецепта.

Адрес производства:

РФ, 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 49. Тел./факс: (343) 261-10-38



ООО «ЛЮМИ»

РФ, 191023, г. Санкт-Петербург,
Апраксин двор тер. корпус 42.
Тел./факс: (812) 327-76-70

НИТРОГЛИЦЕРИН КАПСУЛЫ 0,5 мг №20 ИЛИ ТАБЛЕТКИ 0,5 мг №40

Ножницы для разрезания повязок, с пуговой,
изогнутые, 180 мм GS-1061

Размер: 180 мм
Изготовлено: 2014 год
Гарантийный срок эксплуатации/хранения: 1 год
Срок службы: 5 лет

НЕСТЕРИЛЬНО!

Перед использованием производить
стерилизационную обработку в соответствии со
стандартами DINENISO 17665-1: 2006-11, ISO
14937:2009, ГОСТ Р ИСО 11140-2-2009


Хранить в сухом и защищенном от пыли месте
Избегать резких перепадов температур во
избежание образования конденсата.

Произведено: CILITALTD
Соединенное Королевство
Великобритании и Северной
Ирландии, 16/5 West Pilton Rise,
Edinburgh, EH 4UQ, United
Kingdom
РУ ФСЗ 2008/02700 от 21.10.2008
Поставщик: ООО «ЦИЛИТА», 390010, г. Рязань,
ул. Октябрьская, д.61

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ ПОВЯЗОК ПО ЛИСТЕРУ

ОЛАЗОЛЬ®

аэрозоль
для наружного
применения



ЗАО "АЛТАЙВИТАМИНЫ"

80 г

Состав на 1 баллон:

стеаринового масла.....	7,20 г
гидрофеникола.....	2,16 г
бензокаина (анестезин).....	2,16 г
лимонной кислоты.....	0,36 г
Вспомогательные вещества:	
тристеарин, ланолин безводный,	
аскорбиновая кислота, глицерол, вода	
растворенная, смесь хладагентов 22	
мк28 (дифторхлорметан + дифтор	
этан).....	

Хранить в сухом месте,
при температуре не выше 15°C,
удаляя от источников огня,
отопительных приборов
и прямых солнечных лучей.

Баллон следует оберегать
от ударов.

Баллон перед употреблением
встряхнуть 10-15 раз.

Баллон не вскрывать.

P N001491/01

ОЛАЗОЛЬ АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 80 г.

Пакет-контейнер гипотермический В^{ИТАЛ}



Для оказания первой помощи:

- при ушибах
- перегреве
- укусах насекомых



Внимание! Это средство для однократного применения! Не использовать для наружного применения! Избегать попадания на кожу и слизистые! При попадании содержимого пакета на кожу промыть большим количеством воды. Если содержимое было проглочено, выпить большое количество воды и обратиться за медицинской помощью. Показите врачу этот пакет. При нарушении кровообращения холодным средством пользоваться под наблюдением врача.



Способ применения: для активизации пакета положите изделие на ровную поверхность и надавите, с целью разрыва внутреннего контейнера с жидкостью. Встряхните изделие и приложите к нужной части тела.


Состав: селитра аммиачная, вода.
Дата изготовления: см. на упаковке.
Срок хранения: 5 лет.

ТУ 9398-010-50887801-2005;
РУ № ФСР 2006/03466
от 18.04.2013 г.



Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм», РФ, 187322, Ленинградская обл., Кировский р-н, г.п. Сивьяно, ул. Садовая, д.2, т/ф: +7 (812) 333-00-85, www.vitalpharm.ru

ПАКЕТ ГИПОТЕРМИЧЕСКИЙ ОХЛАЖДАЮЩИЙ



ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
РАЗМЕР М 1 ПАРА
Производитель: «Райзен
(Тяньцзинь) Хэлфкэа Продактс
Ко., Лтд », Китай
Импортер: ООО «Медком-МП»

ру ФСЗ 2012/13220 от 02.11.2012
ГОСТ Р ИСО 10993-99
ГОСТ Р 52238-2004
ГОСТ Р 52239-2004

Дата изготовления: ноябрь 2014
Срок годности: 5 лет

LEINA-WERKE GmbH

EIN STARKER PARTNER BRINGT SICHERHEIT

RETTUNGSDECKE

ПОКРЫВАЛО СПАСАТЕЛЬНОЕ

для пострадавших от перегрева
или переохлаждения, для комплектации
аптечек первой медицинской помощи.

160x210 см СЕРЕБРИСТЫЙ / ЗОЛОТИСТЫЙ

Защита от переохлаждения,
серебристой стороной к телу:

1. Уложить пострадавшего поверх покрывала на бок;
2. Обернуть покрывалом, оставив лицо открытым;
3. Зафиксировать край покрывала липкой лентой;
4. Вызвать «Скорую помощь».



Защита от перегрева,
золотистой стороной к телу:

1. Накрыть пострадавшего покрывалом, обеспечив свободный доступ воздуха к телу;
2. Вызвать «Скорую помощь».

Экстренная транспортировка:

Удерживать покрывало с пострадавшим за 4 угла.

Избегайте повреждения покрывала острыми предметами!

Сделано в Германии



ПОКРЫВАЛО СПАСАТЕЛЬНОЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ НЕ МЕНЕЕ 160 x 210 см

САЛФЕТКА МАРЛЕВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ



life
будьте здоровы!


САЛФЕТКА

Количество 10 штук
(десять двухслойных салфеток)

16 см x 14 см

ГОСТ 16427-93

Стерилизация



100% хлопок

Исходящее удостоверение № ФСР 2010/08939 от 14.12.2010г

Произведено по заказу ООО «Ивановская обл.», Кинешемский р-н, г. Наволоки,
153830 Россия, Ивановская обл., Кинешемский р-н, г. Наволоки,
м. Промышленная, д. 1. Тел.: (4932) 9-77-32; (4932) 59-11-11
Способ вскрытия: разорвите обочку по линии отреза
Дата стерилизации указана на упаковке

Хранить при температуре
от 0°C до +30°C.
Сделано в России.

 **армитекс**®

Гем ИАк

3 шт.

7x10 см

Кровоостанавливающее

покрытие атраumaticкое с
лекарственными средствами для
первичного закрытия и лечения
ран, травм, ожогов

с йодопином и аминокпроновой
кислотой



Стерильно
Автоаптечка



ИМ18

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ, КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕЕ СТЕРИЛЬНОЕ

EO

processed

amarelo - żółty
жёлтыйPlease note: if the
sterile barrier
system is damaged

steriCLIN®

ISO 11607

REF 230106

LOT 30

10 cm

1195

Фармитекс ИЛ 10x15 см (противоожоговое)

Покрывало атравматическое с лекарственными средствами

СОДЕРЖИТ: йодопирон и лидокаин

НАЗНАЧЕНИЕ: первичное закрытие ран, ожогов I-III AB степени, ран, травм на стадии воспаления и с

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Смочить покрытие 20-30 секунд в растворе для обработки ран;
2. Наложить окрашенной стороной с атравматической сеткой на рану;
3. Зафиксировать бинтом или пластырем;
4. При подсыхании орошать, не снимая повязки;
5. При обильном отделяемом наложить дополнительно наружный сорбционный слой (марля, вата);
6. Смену повязки проводить со смачиванием.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость лекарственных препаратов

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в сухом, темном месте.

СТЕРИЛЬНО. 12. 2014 Срок годности: 3 года.

ТУ 9393-003—59132234-08 Рег. уд. ФСР 2009/04116

ООО «НПЦ Серил-мед»

127247 г. Москва, Дмитровское ш. 103, т. (495) 778-49-02



ИМ10

STEAM

processed

castanho - brązowy
коричневый

processed


castanho - brązowy
коричневый

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ, ПРОТИВООЖГОВОЕ, СТЕРИЛЬНОЕ



СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ, ПРОТИВООЖГОВОЕ
















Сшито 30 (тридцать) листа(ов)
Генеральный директор
ЗАО «Витафарм»

Андросов В.В.

