




Футляр – сумка текстильный
(общий вид)




Футляр – сумка текстильный
(в раскрытом виде)



**Футляр – сумка текстильный
(в раскрытом виде, обратная сторона)**



Сумка – чехол для шин текстильная



Аммиак, раствор для наружного применения и ингаляций 10 % 40 мл.

ОАО "Марбиофарм" 424006, Россия, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. К.Маркса, 121.
тел.: (8362) 42-03-12, факс: (8362) 45-00-00



Анальгин

метамизол натрия

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь. Хранить в сухом, защищенном
от света месте при температуре не выше 25°C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Отпускается без рецепта. Применять
по назначению врача. Содержит сахарозу.



4 602876 000380




Анальгин

метамизол натрия

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь. Хранить в сухом, защищенном
от света месте при температуре не выше 25°C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Отпускается без рецепта. Применять
по назначению врача. Содержит сахарозу.

№ ЛС-002585



ОАО "Марбиофарм" 424006, Россия, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. К.Маркса, 121.
тел.: (8362) 42-03-12, факс: (8362) 45-00-00



Анальгин


метамизол натрия

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь. Хранить в сухом, защищенном
от света месте при температуре не выше 25°C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Отпускается без рецепта. Применять
по назначению врача. Содержит сахарозу.

Анальгин таблетки 500 мг № 1

Для приема внутрь. Отпускается без рецепта.
Хранить в защищенном от света месте,
при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.



ОАО "Фармстандарт - Томскхимфарм"
634009, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 211
www.pharmstd.ru

ЛС-002055

10 таблеток




Андипал

Состав:

Метамизол натрия (анальгин)	250 мг
Фенобарбитал	20 мг
Бендазол	20 мг
Папаверина гидрохлорид	20 мг

Для приема внутрь. Отпускается без рецепта.
Хранить в защищенном от света месте,
при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.



ОАО "Фармстандарт - Томскхимфарм"
634009, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 211
www.pharmstd.ru

ЛС-002055

10 таблеток




Андипал

Состав:

Метамизол натрия (анальгин)	250 мг
Фенобарбитал	20 мг
Бендазол	20 мг

Андипал, таблетки № 10



4 810201 004044 >



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД
МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ"

Республика Беларусь, г. Борисов, ул. Чапаева, 64/27

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь

Состав на одну таблетку:

Активное вещество:

ацетилсалициловая
кислота - 500 мг.

Применять по назначению
врача. Хранить в сухом месте,
при температуре не выше
30 °С. Хранить в недоступном
для детей месте.

Отпуск из аптек: без рецепта.
П N016154/01



4 810201 004044 >



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД
МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ"

Республика Беларусь, г. Борисов, ул. Чапаева, 64/27

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь

Состав на одну таблетку:

Активное вещество:

ацетилсалициловая
кислота - 500 мг.

Применять по назначению
врача. Хранить в сухом месте,
при температуре не выше
30 °С. Хранить в недоступном
для детей месте.

Отпуск из аптек: без рецепта.
П N016154/01



4 810201 004044 >



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД
МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ"

Республика Беларусь, г. Борисов, ул. Чапаева, 64/27

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ

Ацетилсалициловая кислота, таблетки 500 мг №10

БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ



life

будьте здоровы!

БИНТ

7м x 14см

Количество 1 штука

4 670003 600833

9001 : 2008




отходами" (утв. приказом Минздрава России от 9 декабря 2010 г. N 163). Возможна утилизация с бытовыми отходами.

100% хлопок

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08938 от 14.12.2010г.

Срок годности 5 лет
Сделано в России
ООО "ХБК" Навтекс - ООО "ТПП Тактиль"
Также для использования в домашних условиях.
Полноценный материал для хирургических операций.





Бриллиантового зеленого раствор для наружного применения, спиртовой 1% 10 мл.

ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ.

P N000124/01 от 27.03.2007



4 602824 001629



ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»
680001, Российская Федерация,
Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Ташкентская, 22,
т/ф (4212) 53-91-86

ВАЛЕРИАНЫ ЭКСТРАКТ

10 таблеток
покрытых оболочкой по 20 мг

ЭКСТРАКТ

10 таблеток

покрытых оболочкой по 20 мг

Состав:


валерианы экстракт густой - 0,02 г
вспомогательные вещества - до
получения таблетки
покрытой оболочкой массой 0,19 г

ХРАНИТЬ В СУХОМ, ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ.
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
МЕСТЕ. ОТПУСКАЕТСЯ БЕЗ РЕЦЕПТА ВРАЧА
ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ.

P N000124/01 от 27.03.2007



4 602824 001629



ОАО "Фармстандарт-Лексредства"
305022, Россия, г. Курск,
ул. 2-я Агрегатная, 1а/18
тел./факс: (4712) 34-03-13
www.pharmstd.ru

Валидол

Левоментола раствор в ментил изовалерате

10 таблеток подъязычных по 60 мг


Таблетку следует держать во рту
под языком до полного растворения.

Хранить при температуре не выше 25 °С.
Отпускается без рецепта. Хранить в
недоступном для детей месте. Содержит

Таблетку следует держать во рту
под языком до полного растворения

Хранить при температуре не выше 25 °С.
Отпускается без рецепта. Хранить в
недоступном для детей месте. Содержит
сахарозу и декстрозу.

Рег. номер: Р N000085/01




ОАО "Фармстандарт-Лексредства"
305022, Россия, г. Курск,

ВАЛОСЕРДИН®

капли для приема внутрь
15 мл

Фармакотерапевтическая
группа
Седативное средство.

Отпускается без рецепта.
Подробную инструкцию
см. внутри упаковки.



**ЗАО "Московская
фармацевтическая фабрика"**

Россия, 125239, г. Москва,
Фармацевтический пр-д, д. 1
тел.: (495) 956-05-71
факс: (495) 459-41-12
www.mosfarma.ru

ВАЛОСЕРДИН®

капли для приема внутрь
15 мл

Состав.

Активные вещества:

Фенобарбитал - 2,00 г
Этилбромизовалерианат
(Этиловый эфир
 α -бромизовалериановой
кислоты) - 2,00 г

Вспомогательные

вещества: - до 100 г
Мяты перечной масло - 0,14 г
Испанское хмелевое масло
(душицы масло) - 0,02 г
Этанол (этиловый
спирт) 95 % - 52,80 г
Вода очищенная - 43,04 г

P N000624/01

Валосердин, капли для приема внутрь, 15мл.



Ванночка глазная



Бата 50г. медицинская стерильная

АНТАЦИДНОЕ СРЕДСТВО ГАСТРАЦИД® 20 ТАБЛЕТОК

Natur
Produkt

Для устранения
ИЗЖОГИ И БОЛИ В ЖЕЛУДКЕ



Антацидный препарат, таблетки жевательные №20

Natur
Produkt
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ

АНТАЦИДНОЕ СРЕДСТВО ГАСТРАЦИД®

Gastracid
ТАБЛЕТКИ
жевательные

Произведено:
Natur Produkt Europa B.V.,
Твейберг 17, 5246 XL
Розмален, Нидерланды.

Состав на одну таблетку:

Активные вещества: магния гидроксид – 400 мг;
алгелдрат (алюминия оксид гидратированный) – 400 мг,
в пересчете на алюминия оксид – 214 мг.
Вспомогательные вещества: маннитол, сорбитол,
натрия сахаринат, сахароза, крахмал кукурузный,
ароматизатор мятный, магния стеарат.

Показания для применения:

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
в фазе обострения. Острый гастрит с повышенной и
нормальной секреторной функцией в фазе обострения,
острый дуоденит. Грыжа пищеводного отверстия
диафрагмы, рефлюкс-эзофагит. Дискомфорт, изжога и
боли в эпигастрии при погрешности в диете, после
приема лекарств, в том числе глюкокортикостероидов и
нестероидных противовоспалительных препаратов, а
также после употребления кофе, никотина, алкоголя.

Условия отпуска из аптек: без рецепта.

Срок годности: 3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Способ применения и дозы:

Внутрь. Таблетки следует разжевывать и держать во
рту до полного рассасывания. Взрослым и детям
старше 15 лет: по 1-2 таблетки 4 раза в сутки через 1 час
после еды и вечером перед сном или при
возникновении дискомфорта, болей в эпигастрии,
изжоги. При язвенной болезни желудка препарат
необходимо принять за 30 мин. до приема пищи.
Максимальная суточная доза – 12 таблеток. Детям от
10 до 15 лет назначают половину рекомендованной
дозы для взрослых. Для профилактики – по 1
таблетке за 15 минут до приема лекарств,
раздражающих слизистую оболочку пищевода,
желудка и двенадцатиперстной кишки.
Продолжительность лечения не должна превышать
15-20 дней.

Условия хранения: при температуре не выше 25°C.


Хранить в недоступном для детей месте!

Рег. уд.: П N011015 от 05.05.2011 г.

Дизайн упаковки © ЗАО «Natur Produkt Интернашнл» 2007, ® — зарегистрированный товарный знак компании ЗАО «Natur Produkt Интернашнл»



Грелка резиновая



**Устройство для проведения
искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»**

Зарегистрировано под названием. Воздуховод «Виталфарм»
для проведения искусственного дыхания способом «рот в рот»
ТУ 9398-010-50887801-2005; РУ № ФСР 2008/03466 от 18.04.2013 г.

Назначение:

Предназначен для свободного прохождения воздуха
во время искусственного дыхания или наркоза с помощью
аппарата или без него.

Подготовка к применению:

Ослабить одежду пострадавшего. Очистить его рот чистым
платком. Положить на ровную поверхность. Устройство
вставить укороченным концом мундштука в рот пострадав-
шего. Приподнять голову пострадавшего и зажать нос.
Сделать максимальный выдох через удлиненный конец
мундштука устройства. На 2 выдоха спасателя делается
15 надавливаний на грудину на глубину не менее 3-4 см.

Производитель/уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм» РФ. 187322, Ленинградская обл.,
Кировский р-н, г.п. Синявино, ул. Садовая д.2.

т/ф: +7 (812) 335-05-85.

www.vitalfarm.ru;

ГОСТ ISO 9001-2011;

ГОСТ Р ИСО 14001-2007

Дата изготовления: I квартал 2015 г.

Срок хранения: 5 лет.



4 607039 770414



Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»

Таблетки 40 мг.

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. 1, 2, 3, 4 или 5 упаковок вместе с инструкцией по применению в пачке картонной.

По 50 таблеток в банке ОС типа БДС или в банке полимерной типа БП с инструкцией по применению в пачке картонной.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года. Не использовать позже срока, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек:

Отпускают без рецепта.

Производитель:

ООО «АСФАРМА»

Претензии потребителей направлять по адресу:

652473, г. Анжеро-Судженск, Кемеровской обл., ул. Герцена, 7

Тел./факс: (8 38453) 5-23-51; 5-24-95.

ДРОТАВЕРИН


20 таблеток по 40 мг

Хранить в недоступном для детей месте.

Хранить в сухом, защищенном от света месте.

Р. ЛСР-004859/10





Йод, раствор спиртовой 5% 10 мл.

КЕТОПРОФЕН

гель

для наружного применения 2,5%, 30 г

100 г геля содержат кетопрофен 2,5 г, а также пропиленгликоль, этанол 95 % (спирт этиловый 95 %), карбомер (карбомер 940), тропамин (триэтаноламин), бензалкония хлорид (50 % раствор), воду очищенную.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать по истечении срока годности.

Отпускают без рецепта.

Р № ЛС-001968

ЗАО «Вертекс», Россия, г. Санкт-Петербург.

ВЕРТЕКС



КЕТОПРОФЕН

гель

для наружного применения 2,5%

ВЕРТЕКС

00115 49 022017

Кетопрофен гель для наружного применения 2,5% 30г

Шина транспортная
иммобилизационная
складная
ШТИВн-02-Медплант



Взрослая
"НОГА"

Шина транспортная
иммобилизационная
складная
ШТИВн-02-Медплант

Взрослая
"РУКА"

МЕДПЛАНТ
www.medplant.ru

Комплект шин транспортных (для верхней и нижней конечности)



Корвалол капли для приема внутрь 25 мл.



Кислота борная раствор спиртовой 3% 25 мл.

Закрытое акционерное общество «Медтехника»
1985101, С-Петербург, Петергоф, ул. Фабричная д.1
Тел/факс 8-812-612-06-71

Косынка фиксации верхних конечностей
КФК-Медтехника» ТУ 9398-024-27418804-2008

Регистрационное удостоверение
№ФСР 2010/06948 от 01.03.2010

1. Назначение и технические данные

1.1 Косынка фиксации верхних конечностей предназначена для фиксации руки при травме. Косынка разгружает травмированную конечность, обеспечивая обездвиживание в локтевом суставе и плече верхних конечностей.

Косынка выпускается трех типов образцов:

КФК-«Медтехника» - малая: 20х20 см;

КФК-«Медтехника» - средняя: 40х40 см;

КФК-«Медтехника» - большая: 50х50 см

Минимальная нагрузка на разрыв - не менее 25 кгс.

2. Комплектность

В комплект входят: изделие - 1шт., этикетка - 1шт.

3. Инструкция по эксплуатации и дезинфекции

Косынка надевается на поврежденную руку, шейная лента

перекидывается через голову и застегивается на груди

застежкой - «фастекс». Положение руки регулируется с

помощью пряжки.

По мере загрязнения изделие подвергается санитарно-

технической обработке. Косынка легко стирается в стиральной

машине со стиральным порошком.

Дальнейших действий по утилизации не требуется.

Выпуска: - НОЯ 2013

Принято ОТК

КФК-01

КФК-02



КФК-03

Дата продажи:

RUS Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе. Безболезненно удаляется и рекомендуется для чувствительной кожи. Используется для фиксации повязок, тампонов и компрессов. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Правила хранения: хранить в сухом месте при комнатной температуре РУ ФСЗ № 2008/01959 от 23.06.2008г.

UA Медичний пластр на нетканій основі. Безболісно видаляється і рекомендується для чутливої шкіри. Використовується для фіксації пов'язок, тампонів і компресів. Протипоказання: індивідуальна чутливість. Правила зберігання: Зберігати в сухому місці при кімнатній температурі.

ENG Hypoallergic non-woven fixing tape. It can be removed painlessly. It is recommended for a sensitive skin. It is used for fixation of different bandages, compresses, probes and catheters. Keep in dry place at room temperature. Contra-indication: individual intolerance.



UNIPORE

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе

1 x 250 cm

МАСТЕР ЮНИ МАСТЕР ЮНИ МАСТЕР ЮНИ МАСТЕР ЮНИ МАСТЕР ЮНИ


**БАКТЕРИЦИДНЫЙ
гипоаллергенный
на нетканой основе**

72мм x 19мм

Антисептик хлорид бензалкония

ДАТА ВЫПУСКА: 2014. 07
ГОДЕН ДО: 2019. 07
ПАРТИЯ №: 201407

Р/У ФС РФ №2008/01958 от 23.06.2008 г.
Уполномоченная организация/Импортёр в РФ: ООО "КОМПАНИЯ ЮНИФАРМ"
Москва, пр. Электродный, д. 14, стр.1. тел./факс: +7 495 780 09 03
Производитель: PharmLine Limited, Cornwall
Buildings, 45-51 Newhall Str., office 330,
Birmingham, B3 3QR, Great Britain Tel: +44 121 213 47 01
"Фармлайн Лимитед", Корнвал Билдингс,
45-51 Ньюхолл стрит, офис 330, Бирмингем,
Великобритания Тел. +44 121 213 47 01



открывать здесь

**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ
гипоаллергенный
на нетканой основе**



72мм x 19мм

Антисептик хлорид бензалкония

ДАТА ВЫПУСКА: 2014. 07
ГОДЕН ДО: 2019. 07
ПАРТИЯ №: 201407

MASTER UNI
МАСТЕР ЮНИ

Р/У ФС РФ №2008/01958 от 23.06.2008 г.
Уполномоченная организация/Импортёр в РФ: ООО "КОМПАНИЯ ЮНИФАРМ"
Москва, пр. Электродный, д. 14, стр.1. тел./факс: +7 495 780 09 03
Производитель: PharmLine Limited, Cornwall
Buildings, 45-51 Newhall Str., office 330,
Birmingham, B3 3QR, Great Britain Tel: +44 121 213 47 01
"Фармлайн Лимитед", Корнвал Билдингс,
45-51 Ньюхолл стрит, офис 330, Бирмингем,
Великобритания Тел. +44 121 213 47 01



открывать здесь

открывать здесь

**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ
гипоаллергенный
на нетканой основе**

72мм x 19мм

MASTER UNI
МАСТЕР ЮНИ

Р/У ФС РФ №2008/01958 от 23.06.2008 г.
Уполномоченная организация/Импортёр в РФ: ООО "КОМПАНИЯ ЮНИФАРМ"
Москва, пр. Электродный, д. 14, стр.1. тел./факс: +7 495 780 09 03
Производитель: PharmLine Limited, Cornwall
Buildings, 45-51 Newhall Str., office 330,
Birmingham, B3 3QR, Great Britain Tel: +44 121 213 47 01
"Фармлайн Лимитед", Корнвал Билдингс,



открывать здесь

открывать здесь

Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см x 7,2 см.

ЛОРАТАДИН ШТАДА

● ТАБЛЕТКИ

10 мг

10 таблеток

STADA


ЛОРАТАДИН
ШТАДА
10 таблеток

10 мг


МАКИЗФАРМА
ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛАТ»

Юридическое лицо, на имя которого
выдано регистрационное удостоверение:
ОАО «НИЖФАРМ», Россия,
603950, г. Нижний Новгород, ГСП-459,
ул. Салганская, д. 7.
Тел.: (831) 278-80-88, факс: (831) 430-72-28.
Произведено: ООО «МАКИЗ-ФАРМА», Россия.

Лоратадин таблетки 10мг №10



ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита»

**Маски медицинские
на резинках (трехслойные)**

(175x95 мм)

Для одноразового применения

Кол-во - 100 штук/пачка

номер партии: 08

Дата выпуска: 3 квартал 2013 г

Срок хранения - 5 лет

TU 9398-001-64015714-2010

РУ №ФСР 2010/07908 от 31 мая 2010 г.

По заказу ООО «Фарм-Глобал»

г Москва, +7 (495) 786-34-91

Маска медицинская нестерильная трехслойная

Капсулы подъязычные

НИТРОГЛИЦЕРИН

40 капсул по 0,5 мг

Нитроглицерин (раствор нитроглицерина 4% в подсолнечном масле в пересчете на 100% вещество) – 0,5 мг; бутилгидрокситолуол (ионол) – 0,0074 мг; масло подсолнечное – до 50 мг. Состав капсулы: желатин медицинский – 17,1 мг; глицерол (глицерин) – 5,62 мг; метилпарагидроксibenзоат (нипагин) – 0,14 мг; азорубин (краситель кислотный красный 2С) – 0,14 мг.



НИТРОГЛИЦЕРИН

капсулы подъязычные 20 штук по 0,5 мг.

Капсулу положить под язык.

ЛСР-000127/09 от 14.01.2009 г.

Список Б. Хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте, вдали от огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

Применять по назначению врача.

Срок годности 2 года. Не применять

по истечении срока годности.

Отпускается без рецепта.

Адрес производства:

РФ, 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 49. Тел./факс: (343) 261-10-38



ООО «ЛЮМИ»

РФ, 191023, г. Санкт-Петербург,
Алфавитный двор тир., корпус 42.
Тел./факс: (812) 327-76-78

Нитроглицерин капсулы 0,5мг № 20(2) или таблетки 0,5мг № 40.

Инструменты хирургические «CILITA»
режущие и ударные с острой
(режущей) кромкой:

Наименование

Ножницы для разрезания повязок
с пуговкой горизонтально... 14см

Не стерильно, для многократного использования.

1 штука в упаковке.

Производитель: Фирма «ЦИЛИТА ЛТД», Соединённое
Королевство Великобритании и Северной Ирландии,
16/5 West Pilton Rise Edinburgh EH14 4UQ, United Kingdom.

Поставщик: ООО «Цилита», Россия, 390042,

Рязанская обл., г. Рязань, ул. Октябрьская, дом 61.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02700 от
21 октября 2008 года.

Условия хранения: Хранить при температурном режиме
-50°C до +50°C

и относительной влажности воздуха до 100%
(без образования конденсата).

Номер партии:

Дата изготовления 15.11.2014

Гарантийный срок 12 месяцев

Срок службы: 5 лет



Ножницы для разрезания повязок по Листеру

ООО «НПФ «Медтехника»
Носилки мягкие «НПФ-Медтехника»
ТУ 9451-002-38140643-2012



Регистрационное удостоверение №РЗН 2013/1076 от 22.08.2013г.

ЭТИКЕТКА

1 Назначение и технические данные

1.1 Носилки мягкие «Медтехника» (в дальнейшем – носилки) предназначены для переноски людей при аварийных ситуациях, когда обычными носилками воспользоваться неудобно или невозможно. В частности мягкие носилки могут использоваться при транспортировании людей по узким лестницам и извилистым проходам.

1.2 Основные размеры: длина 1800±50 мм, ширина 750±50 мм. Имеют четыре пары ручек.

1.3 Носилки выдерживают распределённый по площади груз массой 150 ± 5 кг.

2 Комплектность

2.1 В комплекты НМ-01, НМ-02 и НМ-03 входят: носилки мягкие – 1шт, сумка-чехол, этикетка – 1шт. По заказу покупателя носилки дополнительно комплектуются фиксирующими ремнями (исполнение НМ-02); фиксирующими ремнями и плечевыми ремнями для переноски пострадавшего в положении сидя (исполнение НМ-03).

3 Инструкция по эксплуатации, указание мер безопасности, дезинфекция

3.1 Уложить транспортируемого человека на носилки.

3.2 Два или четыре человека берутся за ручки носилок и транспортируют пациента на необходимое расстояние.

Носилки мягкие



4 607 039 770179

Внимание!
 Только для внешнего применения!
 Не использовать для внутреннего применения!
 Беречь от детей. Детям использовать только под присмотром взрослых.
 Не употреблять! Избегать попадания на кожу и слизистые! При попадании содержимого пакета на кожу в глаза, промыть большим количеством воды.
 Если содержимое было проглочено, выпить большое количество воды и обратиться за медицинской помощью. Покажите врачу этот пакет.
 При нарушении кровообращения лечение холодом применяется только под непосредственным контролем врача.



Способ применения:
 для активизации пакета положите изделие на ровную поверхность и надавите, с целью разрыва внутреннего контейнера с жидкостью. Встряхните изделие и приложите к нужной части тела.

Состав: селитра аммиачная, вода.
 Дата изготовления: см. на упаковке.
 Срок хранения: 5 лет.

ТУ 9398-010-50887801-2005;
 РУ № ФСР 2008/03466
 от 18.04.2013 г.




Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм», РФ, 187322, Ленинградская обл., Кировский р-н, г.п. Синявино, ул. Садовая, д.2, т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

Пакет-контейнер гипотермический **Виталфарм**



Для оказания первой помощи:


- при ушибах
- перегреве
- укусах насекомых






Перекись водорода 3% 40 мл

PEEL DOWN TO OPEN
ОТКРЫВАТЬ ЗАГРУЗКУ



SFM Hospital Products GmbH | SFM Госпиталь Продакты ГмбХ
 Siegburgerdamm 67-69 12487 Berlin (Germany) | Зальц-Фингершам 67-69 12487 Берлин (Германия)
 Tel. +49 (30) 63 97 84 25, fax +49 (30) 63 90 85 19
 E-mail: sfmhz-leipzig@t-online.de



ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СМОТРОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ С ПУДРОЙ

Назначение: для диагностики и осмотра в медицинских целях.



- Содержание: ПАРА (2-е перчатки)
- Неваноминесцентная форма
- Изготовлены из латекса натурального каучука
- Гладкая поверхность
- С ПУДРОЙ (пудрование)
- Медицинский продукт отвечает требованиям стандартов DIN BS 4005/EN 453/ASTM D-3577
- Находится в стерильном состоянии, если упаковка не распечатана и не повреждена
- С ВАЛЖИКОМ

Внимание: Этот продукт содержит натуральный каучук/латекс и может в отдельных случаях вызывать аллергические реакции.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в прохладном и сухом месте, при t < 30 °C

Оптические условия беречь от попадания прямых солнечных лучей и ультрафиолетового света.
 Перчатки в процессе хранения не должны подвергаться воздействию влаги, масел, бензина, керосина, других органических растворителей, а также иных веществ, разрушающих резину.
 Перчатки должны находиться на расстоянии не менее 1 м от термолуцирующих приборов.
 Латексные перчатки высшего качества являются отличными биологическим барьером, но не защищают от вирусных и химических веществ.

Инструкция по применению :

- Перед использованием перчаток убедиться в отсутствии повреждений упаковки.

СТЕРИЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ.

- Вскройте упаковку в указанном месте, выньте перчатки.
- Аккуратно наденьте перчатки на правую и левую руку.
- После надевания перчаток, удалите с них пудру, тщательно вытерев стерильной влажной салфеткой или другим адекватным способом.

С ПУДРОЙ - POWDERED

STERILE R

GRÖSSE: SIZE: РАЗМЕР:	M
LOS: LOT: ПАРТИЯ:	203008581LPZA
MFG: Дата изготовления:	2014-09
EXP: Минимальный срок годности:	2019-09

ИМПОРТЕР в РФ:
 ЗАО НПО "ТАРАНТ" г.Москва
 129337 ул. Красная Сосна д. 30 стр.1
 t: +7 495 789 38 01

AQL 1.5
 P1 и P2 2014/738 от 25.7.2010
 Соответствие в Европе



ГОСТ Р 52238-2004



CE 9124



Осуществите утилизацию
 Single use only



4 036534 142700


Р.У. № ФСЗ 2011/08867 от 25 января 2011 г.
ГОСТ Р ИСО 10993, ГОСТ Р 50444-92
Срок годности: 25 лет
Дата выпуска: 2011 г.

Производитель:
Лайна-Верке ГмбХ, Германия
LEINA-WERKE GmbH, Germany
Maueler Feld 1, D-51570 Windeck
www.leina-werke.de

Генеральный дистрибьютор по РФ и СНГ:
ЗАО «ВИБА»
117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 54 кор. 5
Тел.: 8 (495) 795-33-50, 786-35-04
E-mail: rd@viba.ru
www.viba.ru

Продавец: ЗАО «Виталфарм»,
РФ, 187322, ЛО, Кировский р-н,
г.п. Синявино, ул. Садовая, 2,
т/ф.: (812) 335-05-85,
vitalfarm.spb

По истечении срока годности утилизировать
как бытовые отходы.



LEINA-WERKE GmbH

EIN STARKER PARTNER BRINGT SICHERHEIT

RETTUNGSDECKE


ПОКРЫВАЛО СПАСАТЕЛЬНОЕ

для пострадавших от перегрева
или переохлаждения, для комплектации
аптечек первой медицинской помощи.

160x210 см СЕРЕБРИСТЫЙ / ЗОЛОТИСТЫЙ

Защита от переохлаждения,
серебристой стороной к телу:

1. Уложить пострадавшего поверх покрывала на бок.
2. Обернуть покрывалом, оставив лицо открытым.
3. Зафиксировать края покрывала липкой лентой.
4. Вызвать «Скорую помощь».



Защита от перегрева,
золотистой стороной к телу:

1. Накрыть пострадавшего покрывалом,
обеспечив свободный доступ воздуха к телу.
2. Вызвать «Скорую помощь».

Экстренная транспортировка:

Удерживать покрывало с пострадавшим за 4 угла.
Избегайте повреждения покрывала острыми
предметами!

Сделано в Германии



Покрывало спасательное изотермическое 160 см x 210 см.



Салфетка или простыня впитывающая одноразовая стерильная 200 см x140см



5 мл

СУЛЬФАЦИЛ
НАТРИЯ - ДИА
(сульфацетамид)



КАПЛИ
ГЛАЗНЫЕ

20%



ЗАО «ДИАФАРМ»

140009, г. Люберцы,
ул. Митрофанова,
д. 20 А,
тел.: (495) 500-18-38

серия 05102014

годен до 11 2016

P N 001943/01-2002

Хранить при
температуре не
выше 25°C,
в защищенном
от света,
недоступном для
детей месте.
Не допускать
замораживания.

Сульфацил натрия 20% раствор 5 мл во флаконе

AND

Эй энд Ди, Япония

3 года
гарантия

МЕХАНИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР UA-100

Измеритель артериального
давления методом Короткова



Быстро. Легко. Точно.

AND



BO ADUA100 0913



4 580198 174128

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Модель UA-100

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Разработано: A&D Company, Limited, Japan / Эй энд Ди Компани, Лимитед, Япония

Юридический адрес: 1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585, Japan / 1-243 Asahi, Китамото-ши, Сайтама-кен, 364-8585, Япония

Фактический адрес: 3-23-14, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 170-0013, Japan / 3-23-14, Хигаши-Икебукуро, Тошима-ку, Токио, 170-0013, Япония

Адрес завода-изготовителя: A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd., Datianyang Industrial Zone, Tantou Village, Songgang Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province, China / Эй энд Ди Электроникс (Шеньжень) Ко., Лтд., Датианианг Индастриал Зон, Тантоу Вилладж, Сонгганг Твун, Баоан Дистрикт, Шеньжень, Гуангдонг Провинс, КНР

Импортер: ООО «Эй энд Ди РУС», РФ, 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17.
Тел.: 8 800-200-03-80.

Отзывы и предложения оставляйте на www.and-rus.ru

Регистрационное удостоверение ФС № 2006/534 (20.04.2006-20.04.2016)

Прибор для измерения артериального давления


16 см x 14 см

САЛФЕТКИ

МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ

Количество 10 штук. Двухслойные

СТЕРИЛЬНЫЕ



Регистрационное удостоверение: № ФСР 2011/11141 от 28.06.2011. ГОСТ 16427-93.

Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте. Беречь от огня и влаги.

Под-

processed
after green-verde-green
after green-verde-green

processed

FORM

processed
after green-verde-green
after green-verde-green

Фармитекс ИЛ 10x15 см (противоожоговое)

Покрывание асептическое с лекарственными средствами

СОДЕРЖИТ: йодопирон и лидокаин

НАЗНАЧЕНИЕ: первичное закрытие и лечение ожогов I-III АВ степен.

травм на стадии воспаления и очищения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Смочить покрытие 20-30 секунд в растворе для обработки ран;
2. Наложить окрашенной стороной с асептической сеткой на рану;
3. Зафиксировать бинтом или пластырем;
4. При подсыхании орошать, не снимая повязки;
5. При обильном отделяемом наложить дополнительно наружный сорбционный слой (марля, вата);
6. Смену повязки проводить со смачиванием.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость лекарственных препаратов


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в сухом, темном месте.

СТЕРИЛЬНО. 12. 2014 Срок годности: 3 года.

ТУ 9393-003—59132234-08 Рег. уд. ФСР 2009/04116

ООО «НПЦ Сернал-мед»

127247 г. Москва, Дмитровское ш. 103, т. (495) 778-49-02



ИМ18

ISO 11607
10 cm / 200 m
REF 230106 LOT 3011195 122012

STERILIN



processed
after yellow-giallo-amarillo-ami
after yellow-giallo-amarillo-ami



COLETEX

ООО "КОЛТЕКС"

Салфетка атравматическая, размер 6x10 см

КОЛТЕКС-СХГ-1

с хлоргексидином и альгинатом натрия

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Салфетку, смоченную водой или физ.раствором, положить на пораженную область.
- Зафиксировать салфетку бинтом или пластырем.
- Салфетку на ране желательно поддерживать во влажном состоянии.
- Салфетку можно не менять до 3-х суток.
- При присыхании салфетки к ране перед удалением смочить ее кипяченой или дистиллированной водой.

Марка: СХГ-1

Состав: альгинат
натрия, хлоргексидина
биглюконат.

Противопоказания:
аллергическая реакция
на препарат.

Количество: 1 шт

Срок годности: 3 года

Дата изготовления и номер партии
см. на шве упаковки

ТУ 9393-001-58223785-2005

РУ № ФСР 2010/08239 от 18 марта 2014 г.

Хранить в сухом, защищенном от
света месте при температуре
от +5 до +40°C.



Производитель: ООО «Колетекс», 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 21.

Тел./факс: +7 (495) 730-5645 (многоканальный) www.coletex.ru



 **армитекс**®

Гем ИАк

Зшт.

7x10 см

Кровоостанавливающее

покрытие атраumaticкое с
лекарственными средствами для
первичного закрытия и лечения
ран, травм, ожогов

с йодопионом и аминокaproновой
кислотой



Стерильно
Автоаптечка



Срок годности 3 года
Дата стерилизации см. на упаковке
рег. уд. ФСР 2009/04116, TV 9393-003-59132234-2008
Производитель: ООО "НПЦ "Сериал-Мед", г. Москва,
127247, Дмитровское шоссе, д.103. тел. (495) 778-49-02

Назначение:
Для остановки кровотечений
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость препаратов

Способ применения:
1. Вскрыть упаковку. 2. Наложить покрытие на рану.
3. Прижать к ране на 1 мин. 4. Зафиксировать бинтом или
пластырем. 5. Смену покрытия производить со смачиванием.

122014

Тавегил®


10 таблеток

Противоаллергическое
средство

- кожный зуд
- дерматит
- крапивница
- риниты

Клемастин 1 мг

Для приема внутрь.

Отпуск БЕЗ РЕЦЕПТА ВРАЧА.

Хранить при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

1 таб. = 1,34 мг клемастина гидрофумарата,
что эквивалентно 1 мг клемастина.

Вспомогательные вещества: магния стеарат,
повидон, тальк, крахмал кукурузный, лактозы
моногидрат.

Регистрационное удостоверение

№ П N008878/01

Способ применения и дозы – см. инструкцию

Новартис Консьюмер Хелс СА,
Швейцария

Произведено: Фамар Италия С.п.А.,
Италия

Manufactured by: Famar Italia S.p.A., Italy
via Zambelletti 25, Baranzate di Bollate, Italy

4  607045 192323

Средство противоаллергическое антигистаминное

ООО "КОЛТЕКС"

Салфетка

из трикотажного полотна



КОЛТЕКС СПФ-1

*с прополисом, фурагином
и альгинатом натрия*

Ускоряет процесс заживления

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Салфетку, смоченную водой или физраствором, положить на пораженную область.
- Зафиксировать салфетку бинтом или пластырем.
- Салфетку на ране желательно поддерживать во влажном состоянии.
- Салфетку можно не менять до 3-х суток.

Марка: СПФ-1

Состав: альгинат натрия, прополис, фурагин.

Противопоказания: аллергическая реакция на препараты.

ТУ 9393-002-58223785-2005.

Регистрационное удостоверение ФСР2010/08188

Производитель: ООО «Колетекс»

117418, Москва, Новочеремушкинская, д. 41, стр. 1.

Тел./факс: (495) 730-56-45 (многоканальный).

E-mail: koloteks@list.ru Web site: coloteks.ru



4 607050 160249



Количество: штука

Срок годности: 3 года

Дату изготовления и номер

партии см. на шве упаковки

Дата стерилизации

07.2018

Средство ранозаживляющее перевязочное стерильное



ПОВЕРОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

«Jiangsu Yuyue Medical Instruments Co., Ltd.», Jiangsu, KНР

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОВЕРКЕ

№ 042013

в эксплуатации термометры медицинского назначения (стеклянные «ИМПЭКС-МЕД») не поверяются

Средство измерений, тип: ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ
МАКСИМАЛЬНЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ «ИМПЭКС-МЕД»
 Исп. ТМР: № Госреестра 52345-12

Заводской № Lot No. 13028
 Производитель: «Jiangsu Yuyue Medical Instruments Co., Ltd.»
Китайская Народная Республика (Филиппинский завод)

поверено и на основании результатов поверки признано годным к применению:

Отметка поверительного класса

General Director: GUANG MING WU
подпись руководителя поверочной

Поверитель: WANGJULING

в 2-м квартале 2013 г.

№ 7

ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ «ИМПЭКС-МЕД» (РТУТНЫЙ)

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/11279 от 27.12.2011 года. Срок действия не ограничен.

Внесен в Гос. реестр средств измерений под № 52345-12.

Свидетельство об утверждении типа средств измерений С.Н.С.39.004.А № 49429 от 21.01.2013 года. Срок действия 29.12.2017 года.

Декларация о соответствии № РОСС CN.ИМ32.Д00096 от 19.06.2012 года. Срок действия 18.06.2015 года.

Сертификат соответствия № РОСС CN.ИМ32.Н00199 от 19.06.2012 года. Срок действия 18.06.2015 года.

Качество 93/42/EEC

Предел допустимой погрешности $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$

Цена деления шкалы $0,1^{\circ}\text{C}$

Диапазон измерения от 35 до 42°C

Начальное значение шкалы от 32 до 35°C

Конечное значение шкалы 42°C

Область применения — в лечебных учреждениях здравоохранения, на дому для личного пользования. Предназначен для измерения температуры тела человека.

Комплектность: термометр, футляр, инструкция, свидетельство о поверке.

Термометры могут комплектоваться футлярами: «СБРОС» для легкого сбрасывания столбика ртути или «ЛУПА» для легкого считывания результатов измерений.


Способ применения

Перед измерением температуры термометром ртутным необходимо взять его за верхнюю часть и встряхнуть таким образом, чтобы менiskus столбика ртути опустился ниже цифровой отметки $35,5^{\circ}\text{C}$. Термометр, готовый для измерения, необходимо разместить резервуаром в подмышечной впадине человека. Время измерения должно быть не менее 5 мин.

Меры безопасности

Рабочее вещество, применяемое в данных термометрах — ртуть, вещество I класса опасности по ГОСТ 12.1.005-88.

В случае боя термометров, рассыпанную ртуть следует собрать ветошью, смоченной раствором хлата марганцовокислого (марганцовки). Открытая ртуть испаряется и загрязняет воздух, наиболее сильное испарение паров ртути происходит при температуре выше $+20^{\circ}\text{C}$.



Термометр медицинский

ЗАО "МЕДИСОРБ", Россия, 614113, г. Пермь,
ул. Гальперина, 6, тел./факс (342) 259-41-41

УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ МС

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ

10 таблеток по 250 мг

ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ

ОТПУСК БЕЗ РЕЦЕПТА

ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ ПРИ

ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ ВЫШЕ 25°C

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ

ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

P N001289/01



4 603182 000019



МЕДИСОРБ

ЗАО "МЕДИСОРБ", Россия, 614113, г. Пермь,
ул. Гальперина, 6, тел./факс (342) 259-41-41

УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ МС

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ

10 таблеток по 250 мг

ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ

ОТПУСК БЕЗ РЕЦЕПТА

ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ ПРИ

ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ ВЫШЕ 25°C

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ

ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

P N001289/01



4 603182 000019



МЕДИСОРБ

ЗАО "МЕДИСОРБ", Россия, 614113, г. Пермь,
ул. Гальперина, 6, тел./факс (342) 259-41-41

УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ МС


АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ

10 таблеток по 250 мг

ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ

Уголь активированный таблетки 250 мг № 10

ПРЕПАРАТ СОДЕРЖИТ САХАРОЗУ (САХАР)
P N003262/01



ЗАО "МЕДИСОРБ", Россия, 614113, г. Пермь,
ул. Гальперина, 6, тел./факс (342) 283-65-31

"ЦИТРАМОН П"

Ацетилсалициловая кислота + Кофеин + Парацетамол

6 таблеток

Ацетилсалициловой кислоты	- 0,24 г
Парацетамола	- 0,18 г
Кофеина моногидрата	- 0,03 г

ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ

ОТПУСК БЕЗ РЕЦЕПТА

ПРИМЕНЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА

ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ ВЫШЕ 25°C

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

ПРЕПАРАТ СОДЕРЖИТ САХАРОЗУ (САХАР)

P N003262/01



ЗАО "МЕДИСОРБ", Россия, 614113, г. Пермь,

Цитрамон П таблетки не менее № 6



ТРИВЕС

Бандаж для жесткой фиксации шейного отдела позвоночника ТВ-«ТРИВЕС»

Модель ТВ-090

Описание:

- изготовлен из плотного гипоаллергенного, водостойкого, легко дезинфицируемого EVA-материала;
- состоит из двух частей согласно анатомическим особенностям головы и шеи;
- имеет отверстие над трахеей;
- фиксация бандажа осуществляется с помощью застежки «Велкро»;
- усилен пластиковыми элементами, придающими изделию необходимую жесткость;
- размер подбирается в зависимости от высоты и окружности шеи.

УПАКОВЩИК № 3

Обеспечивает:

- жесткую фиксацию и стабилизацию шейного отдела позвоночника и головы в функционально выгодном положении;
- разгрузку тел шейных позвонков и мышечно-связочного аппарата шеи;
- нормализацию кровообращения, уменьшение явлений воспаления и активацию восстановительных процессов в шейном отделе позвоночника.

Показания к применению:

- травмы шейного отдела позвоночника на догоспитальном этапе;
- хронические изолированные, переломы остистых и поперечных отростков шейных позвонков, тяжелых повреждений мышечно-связочного аппарата шеи;
- стабильные неосложненные переломы тел позвонков и комбинированные травмы шейного отдела позвоночника;
- реабилитация после оперативных вмешательств по поводу травм, новообразований и другой патологии шейного отдела позвоночника и мягких тканей шеи;
- после ожогов шеи для профилактики образования тянущих рубцов;
- остеомиелит шейного отдела позвоночника с корешковым синдромом;
- нестабильность в шейном отделе позвоночника.

Инструкция по применению:


- при подборе размера бандажа необходимо измерить высоту и окружность шеи;
- привести заднюю половину бандажа к задней поверхности шеи пациента;
- привести переднюю половину бандажа к передней поверхности шеи так, чтобы подбородок оказался в специальном углублении. Боковые стороны передней половины бандажа наложить сверху на боковые поверхности задней половины;
- с помощью фиксирующей ленты с застежками «Велкро» закрепить бандаж на шее так, чтобы он плотно прилегал к поверхности тела;
- не следует фиксировать бандаж слишком плотно во избежание образования гематом, а также сдавления артерий, вен, сосудов и нервов;
- верный монтаж бандажа определяется лечащим врачом.

Применять под контролем и по назначению врача.

Не представляет рентгеновскому исследованию и томографии.

Состав:

- полимерный материал EVA.



Уход за изделием:

- следует обрабатывать слабым мыльным раствором;
- не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор;
- сушить изделие от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

ИУ № ВЧР 2008/01802 от 13.12.2008 г. Срок действия не ограничен.
ТУ 9196-001-60037713-2008
Сертификация обязательная
Сертификат срок действия не ограничен
Дата окончания 5 лет
Производитель: ООО «Тривес», г. Тольятти, ул. Свободы, 107
Адрес: 446005, г. Тольятти, ул. Свободы, 107
тел./факс: 812 329-7247
www.trives.ru, info@trives.ru



ISO 13485-2003


Дата выпуска Штамп ОТК	ЯНВ 2015
Дата продажи Штамп торг. пр.	ОТК





Валериана – биологически активная добавка №50





Сшито 56 (пятьдесят шесть) листа(ов)
Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов В.В.

